

مقاله پژوهشی
اصیل
Original Article

آسیب‌شناسی روانی محور یک در چهار ماهه اول پس از آسیب مغزی ترومایک

سجاد رضائی^۱، دکتر ایرج صالحی^۲، دکتر حشمت ا... موسوی^۳، دکتر شاهرخ یوسف زاده^۴

Axis I Psychopathology during the First Four Months After Traumatic Brain Injury

Sajad Rezaei *, Iraj Salehi ^a, Heshmatollah Moosavi ^b, Shahrokh Yousefzaeh ^c

Abstract

Objectives: The aim of this research was to examine the dimensions of axis I disorders during the first four months after Traumatic Brain Injury (TBI) and mental states after TBI. **Method:** Overall, 238 patients (43 females and 195 males) with TBI, in a descriptive-longitudinal study, were selected by consecutive sampling procedure and each of them undergone medical examinations. After 4 months of follow-up, 65.1% (155 cases) of the patients referred to a psychiatrist to determine the nature of their mental disorder due to TBI, using a structured clinical interview, based on the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed. (DSM-IV). **Results:** The results showed that 75.5% (117 cases) of the patients had post-injury mental disorders secondary to TBI. Of these, 88 patients (75.2%) showed the comorbidity of mental disorders. However, the most common mental disorders due to TBI included personality change (58.6%), mood disorders (32.3%), anxiety disorders (20%), sleep disorders (19.3%), chronic amnesia (12.9%) and somatoform disorders (1.3%). Delirium, eating and psychotic disorders due to TBI, each up to 0.64%, were also diagnosed. **Conclusion:** The high frequency of mental disorders is evident in the acute phase after TBI, along with many novel cases of personality changes, mood and anxiety disorders. Therefore TBI patients must be monitored and evaluated at least in a 4-month period after the trauma to reduce the risk of mental disorders incident.

Key words: traumatic brain injury; mental disorder; comorbidity; neurobehavioral sequelae

[Received: 28 June 2010; Accepted: 21 December 2010]

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ابعاد آسیب‌شناسی روانی محور یک چهارماهه نخست پس از آسیب مغزی ترومایک (TBI) و حالت‌های روانی پس از رخداد TBI بود. **روش:** در چارچوب یک بررسی توصیفی- طولی، 238 بیمار دچار TBI (43 زن و 195 مرد) بهشیوه پایا نمونه گیری و معاینه شدند. پس از گذشت چهار ماه، 155 نفر (65/1%) از بیماران برای تعیین ماهیت اختلال روانی ناشی از TBI به کمک مصاحبه ساختار یافته پایی بر پایه معیارهای تشخیصی DSM-IV به یک روانپزشک مراجعه نمودند. **یافته‌ها:** نتایج نشان دادند که پس از آسیب دیدگی، 117 نفر (75/5%) دارای تشخیص اختلال‌های روانی ثانوی به TBI هستند. از این افراد، 88 بیمار (75/2%) همبوی اختلال‌های روانی نشان دادند. با این وجود، شایع‌ترین اختلال‌های روانی ناشی از TBI به ترتیب تغییر شخصیت (%58/6)، اختلال خلقی (%32/3)، اختلال اضطرابی (%20)، اختلال خواب (%19/3)، یادزدودگی مزمن (%12/9) و اختلال‌های جسمانی شده (%1/3) بودند. اختلال‌های دلیریوم، خوردن و روانپریشی ناشی از TBI نیز هر یک به میزان ۰/۶۴% تشخیص داده شدند. **نتیجه‌گیری:** فراوانی بالای اختلال‌های روانی در مرحله حاد پس از TBI به همراه بسیاری از موارد جدید تغییر شخصیت و اختلال‌های خلقی و اضطرابی، چشمگیر است و بیماران دچار TBI دست کم در مقطع زمانی چهارماهه پس از آسیب، باید مورد پایش و ارزیابی قرار گیرند تا خطر بروز اختلال‌های روانی کاهش یابد.

کلیدواژه: آسیب مغزی ترومایک؛ اختلال روانی؛ همبوی؛ پامدهای عصبی - رفتاری

[دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۷/۴؛ پذیرش مقاله: ۱۳۸۹/۳۰/۹]

¹ کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه گیلان. رشت، بیمارستان پورسینا، مرکز تحقیقات تروما و توسعه تحقیقات بالینی. دورنگار: 0131-3239842 (نویسنده مسئول)
² دکترای روانشناسی کاربردی، استادیار دانشگاه گیلان؛ ³ روانپزشک، دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ ⁴ متخصص جراحی عصبی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

* Corresponding author: MA. in Clinical Psychology, Guilan University, Guilan Trauma Research Center and Clinical Studies Development, Poursina Hospital, Rasht, Iran, IR. Fax: +98131- 3239842. E-mail: rezaei_psy@hotmail.com; a PhD. in Applied Psychology, Assistant prof. of Guilan University, b Psychiatrist, Guilan University of Medical Sciences, c Neurosurgery Specialist, Assistant prof. of Guilan University of Medical Sciences.

مقدمه

اعضای خانواده و سایرین شود. TBI می‌تواند عاملی خطرزا برای ایجاد اختلال‌های روانی باشد. برای نمونه فان¹³، کاتون¹⁴، اوماتو¹⁵ و اسلامان¹⁶ (1995) در بررسی پیامدهای اختلال روانی ناشی از آسیب مغزی در 50 بیمار سرپایی دچار TBI نشان دادند که 13 نفر از بیماران (26%) در زمان انجام بررسی به افسردگی اساسی¹⁷ دچار بودند و 14 نفر (28%) سابقه رخداد افسردگی اساسی پس از آسیب دیدگی را که بعداً از میان رفته بود، گزارش کردند. 12 بیمار (24%) اختلال اضطراب منتشر¹⁸ و چهار بیمار (8%) سوءصرف مواد/الکل را در حال حاضر گزارش نمودند. بررسی‌های بیشتر نشان دادند که هفت بیمار (14%) به دیستایمیا¹⁹ و دو بیمار (4%) به حملات پانیک مبتلا هستند. بررسی آنان افسردگی و اضطراب را در بیماران سرپایی دچار TBI، شایع نشان داد.

هیاردن²⁰، اویسال²¹، کلر²²، بوگدانی²³ و سیلور²⁴ (1998) با تمرکز بر میزان بروز و همبودی²⁵ اختلال‌های روانی و الگوی رفع اختلال‌های خلفی، اضطرابی و مصرف مواد، در 100 فرد بزرگسال دچار TBI (18 تا 65 سال) با میانگین هشت سال گذشت از آسیب دیدگی در آنها، دریافتند که پس از TBI شایع ترین اختلال‌های محور یک، اختلال افسردگی اساسی (61%), اختلال استرس پس از سانحه²⁶ (PTSD) (19%), اختلال وسواسی-اجباری²⁷ (15%), اختلال پانیک (2%) اختلال اضطراب منتشر (9%) و اختلال دوقطبه²⁸ (2%) بود. افزون بر آن، همبودی اختلال‌های روانی نیز بالا بود به طوری که 44% از افراد نمونه، دو و یا بیشتر از دو تشخیص را

آسیب مغزی ترومایک¹ (TBI) تجربه‌ای فاجعه‌بار است که زندگی افراد را پس از آسیب دیدگی دگرگون می‌کند. این آسیب به دلیل ماهیت پیچیده، تغییرات حاد و یا درازمدت که می‌تواند به نحو چشم‌گیری بر کیفیت زندگی پس از جراحت مغزی تأثیر بگذارد، مورد توجه قرار گرفته است. هم‌چنین TBI در بهداشت عمومی مسئله‌ای جهانی به شمار می‌رود و با عنوان «همه گیری خاموش یا پنهان² خوانده می‌شود (آشمن³، گوردون⁴، کانتور⁵ و هیاردن⁶، 2006؛ فینستاین⁷ و راپاپورت⁸، 2000).

هر سال دست کم 1/4 میلیون مورد TBI در ایالات متحده گزارش می‌شود که نزدیک به 50000 نفر آنها می‌میرند، 235000 نفر در بیمارستانها پذیرش می‌شوند و 1/1 میلیون نفر پس از درمان از بخش‌های اورژانس مرخص می‌شوند (لانگ⁹، لویس¹⁰، روتلاند-براؤن¹⁰ و والد¹¹، 2006). آسیب مغزی در ایران نیز از نظر مرگ و میر رتبه دوم را دارا است و یکی از علل ناتوانی‌های دراز مدت و از کارافتدگی افراد زیر 24 سال شناخته می‌شود (ابراهیمی‌فحار، مشیری و زند، 2006). پژوهش‌های پراکنده‌ای که در این باره در ایران انجام شده، در زمینه سوانح و تصادف‌ها، این کشور را در شمار نخستین کشورهای جهان نشان داده‌اند و بیشترین آسیب‌های وارد به سروگردان و آسیب‌های مغزی بوده است (رنگرز جدی و فرزندی‌پور، 2002؛ صادقی، 1998؛ خاتمی و همکاران، 2003، یوسف‌زاده چابک، احمدی دافچاهی و همکاران، 2007). یوسف‌زاده چابک، صفایی و همکاران (2006) در بررسی همه گیرشناسی ضربه‌های وارد به سر در استان گیلان، از 5256 بیمار آسیب دیده، مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت، 3396 نفر (64%) را دچار ضربه مغزی گزارش نمودند.

بیماران دچار TBI پس از فروکش کردن علائم جسمی و پیش‌شکی، برای استخدام یا بازگشت دوباره به کار و نیز مشارکت فعال در جامعه با مشکل رویرو می‌شوند (جاکوبز¹²، 1988). افزون بر آن بروز اختلال‌های روانی پس از TBI می‌تواند دامنه گسترده‌ای از مشکلات زیستی- روانی و اجتماعی را برای آنها به دنبال داشته باشد و سبب وابستگی به

1- traumatic brain injury
2- silent or hidden epidemic

3- Ashman	4- Gordon
5- Cantor	6- Hibbard
7- Feinstein	8- Rapoport
9- Langlois	10- Rutland-Brown
11- Wald	12- Jacobs
13- Fann	14- Katon
15- Uomoto	16- Esselman
17- major depression	
18- generalized anxiety disorder	
19- dysthymia	20- Hibbard
21- Uysal	22- Kepler
23- Bogdany	24- Silver
25- comorbidity	
26- post traumatic stress disorder	
27- obsessive-compulsive disorder	
28- bipolar disorder	

نمی شود. هم چنین اختلال های روانی مسئول بهبودی ضعیف، افسردگی، اختلال های اضطرابی، یا اختلال تبدیلی بودند.

کوپونن¹⁴ و همکاران (2002) در ارزیابی میزان شیوع اختلال های روانی محور یک بر روی 60 بیمار با میانگین 30 سال گذشت زمان از آسیب مغزی تروماتیک در آنها، نشان دادند که 29 نفر (48/3%) شروع یک اختلال محور یک را پس از TBI و 37 نفر (61/7%) ابتلا به یک اختلال محور یک را در طول عمر تجربه کرده اند. شایع ترین اختلال هایی که پس از TBI ایجاد شده بودند به ترتیب افسردگی اساسی (26/7%), سوءصرف یا وابستگی به الکل (11/7%), اختلال پانیک (8/3%), هراس مرضی اختصاصی (8/3%), اختلال های روانپریشی (6/7%) و نشانگان عضوی شخصیت¹⁵ (15%) بودند. پژوهشگران دریافتند که TBI می تواند دهها سال یا حتی برای همیشه آسیب پذیری در برابر اختلال های روانی را در برخی افراد سبب شود. هم چنین به نظر می رسد که بیماران را مستعد ابتلا به افسردگی و اختلال هذیانی می کند. ژانگ¹⁶، ژای¹⁷ و چن¹⁸ (2006) بروز اختلال های روانی را در 72/5% از بیماران دچار آسیب دیدگی سرگزارش کردند. کوپونن (2007) دریافت که حالت های بیمارگون روانی می توانند کار توانبخشی پس از آسیب مغزی تروماتیک را دشوار سازند. وی در بررسی بروز اختلال های روانی در 38 بیمار، 12 ماه پس از TBI به این نتیجه رسید که 44/7% از بیماران طی 12 ماه پس از TBI دچار اختلال روانی شده اند. ورما¹⁹، آناند²⁰ و ورما (2007) 25% از بیماران دچار TBI را دو تا سه ماه پس از آسیب دیدگی دچار بی خوابی و 50% آنان

پس از TBI نشان دادند. بیشتر کسانی که پیش از TBI اختلالی نداشتند، پس از TBI تشخیص اختلال افسردگی اساسی و اختلال سوءصرف مواد دریافت نمودند. بررسی آنان، TBI را عاملی خطرزا برای ناتوانی های روانپزشکی بعدی به شمار آورد. دب¹، لیونز²، کوتزوکیس³، علی⁴ و مک کارتی⁵ (1999) نیز نشان دادند که از 120 بیمار دچار TBI 21/7% دارای یک اختلال روانی هستند، در حالی که این رقم در گروه گواه (جمعیت عمومی) 16/4% بود. بیشترین میزان اختلال روانی در بیماران دچار TBI به ترتیب اختلال افسردگی (13/9%)، اختلال پانیک (9%)، وابستگی به الکل (4/9%)، اختلال اضطراب منشر (2/5%) و اختلال وسوسی - اجباری (1/6%) بود. در نهایت پژوهشگران دریافتند که در مقایسه با جمعیت عمومی، شمار بیشتری از بیماران بزرگسال، اختلال روانی را تا یک سال پس از آسیب مغزی تروماتیک نشان می دهند. میزان رخدادهای افسردگی و اختلال پانیک نیز به طور معناداری بیشتر از جمعیت عمومی بود.

سیلور⁷، کرامر⁸، گرین والد⁹ و وایزن¹⁰ (2001) نشان دادند از 5034 فرد زیر پوشش مؤسسه ملی بهداشت روان¹¹ (NIMH)، 361 نفر دارای سابقه آسیب مغزی شدید همراه با فقدان هشیاری یا گیجی بوده اند. بیشترین میزان اختلال های روانی برآورده شده در این پژوهش به ترتیب شامل وابستگی یا سوءصرف مواد (24%), اختلال افسردگی (11/1%)، اختلال وسوسی - اجباری (4/7%)، اختلال پانیک و اسکیزوفرنیا هریک (3/3%) و اختلال دوقطبی (1/7%) بود. افزون بر آن، خطر طول عمر روی آوردن به خودکشی در افرادی که از آسیب دیدگی سر رنج می برند، بیشتر بود. به طور کلی افرادی که تجربه TBI را نداشتند، بیشتر از افرادی که این اختلال را تجربه کرده بودند، در معرض خطر اختلال های روانی و تلاش برای خودکشی بودند. مونی¹² و اسپید¹³ (2001) نیز 76% از بیماران پس از TBI را دچار اختلال روانی گزارش کردند. آنان دریافتند بیمارانی که تنها آسیب مغزی دارند، بهتر بهبودی می یابند، اما در آن دسته از بیمارانی که مبتلا به همبودی های روانپزشکی هستند، بهبودی دیده

1- Deb	2- Lyons
3- Koutzoukis	4- Ali
5- McCarthy	6- alcohol dependency
7- Silver	8- Kramer
9- Greenwald	10- Weissman
11- National Institute of Mental Health	
12- Mooney	13- Speed
14- Koponen	
15- organic personality syndrome	
16- Zhang	17- Zhai
18- Chen	19- Verma
20- Anand	

(کیم^{۱۰} و همکاران، ۲۰۰۷). با این‌همه پلگرین- والرو^{۱۱}، گومز- هرناندز^{۱۲}، مونوز- سیسپدنس^{۱۳}، فرناندز- گواینا^{۱۴} و تیراپو- استاروز^{۱۵} (۲۰۰۱) شیوع بی‌احساسی^{۱۶} را پس از TBI شدید ۳۴/۵٪ و بی‌ثباتی هیجانی و تغییر شخصیت را ۳۲/۷٪ برآورد نمودند. اندرسون^{۱۷}، بکارا^{۱۸}، داماسیو^{۱۹}، ترانل^{۲۰} و داماسیو (۱۹۹۹) در پژوهش خود به نقش آسیب‌های زیرقشری^{۲۱} در ایجاد بی‌احساسی اشاره کردند. هم‌چنین در موردن‌رفتار پرخاشگرانه^{۲۲} پس از TBI، پلگرین- والرو و همکاران (۲۰۰۱) و تاتنه‌نو^{۲۳}، جورج^{۲۴} و راینسون^{۲۵} (۲۰۰۳) شیوع این عارضه را به ترتیب ۱۶/۴٪ و ۳۳٪ گزارش نمودند. در جدول ۱، نکات فنی و یافته‌های بررسی‌های انجام‌شده پیرامون اختلال‌های روانی از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۹ در بیماران دچار TBI نشان داده شده است.

آگاهی از همه‌گیرشناسی و ماهیت نشانگان اختلالات روانی پس از TBI نه تنها می‌تواند در فهم پیامد خود اختلال‌های ناشی از آسیب مغزی یاری رساند، بلکه در غنی‌سازی پروتکل‌های توانبخشی عصی - روانی بیماران و اصلاح شیوه‌های درمانی موجود نیز مؤثر است. در مجموع اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر با توجه به میزان شیوع بالای آسیب‌های سر و شمار بسیار زیاد و رو به افزایش این بیماران (به‌دلیل تصادف با خودرو و موتورسیکلت) و گستره نارسایی‌های شناختی و اختلال‌های روانی که افراد پس از TBI تجربه می‌کنند و هم‌چنین چالش‌های مالی که این بیماران به خانواده‌هایشان و نیز نظام سلامت کشور تحمل می‌کنند، چشم‌گیر و در خور توجه است.

1- hypersomnia	2- comorbid
3- Corrigan	4- Deutschle
5- Whelan-Goodinson	6- Ponsford
7- Johnston	8- Grant
9- personality change	10- Kim
11- Pelegrin-Varelo	12- Gomez-Hernandez
13- Munoz-Cespedes	14- Fernández-Guinea
15- Tirapu-Ustarroz	16- apathy
17- Anderson	18- Bechara
19- Damasio	20- Tranel
21- subcortical	22- aggressive behavior
23- Tateno	24- Jorge
25- Robinson	

را مبتلا به پرخوابی^۱ گزارش کردند. آنان اختلال خواب را در مرحله حاد آسیب مغزی تروماتیک پدیده شایعی دانستند. تشخیص‌های دوگانه یا همبود^۲ (سوء‌صرف مواد و بیماری شدید روانی) در افرادی که TBI را تجربه کرده‌اند، بیش از افرادی است که دچار TBI نشده‌اند (کوریگان^۳ و دی‌بوتسل^۴). آن‌دسته از بیماران دچار TBI که پیچیدگی‌های گستره‌تری در تشخیص اختلال‌های روانی نشان دادند، حالت‌های بیمارگون بیشتری (مانند درد و عوارض پزشکی مزمن) داشتند و بیشتر با یک تشخیص دیگر در اختلال‌های شخصیت (محور II) رویه‌رو می‌شدند. ولان- گودینسون^۵، پونزفورد^۶ و جانستون^۷ و گرنت^۸ (۲۰۰۹) در بررسی فراوانی اختلال‌های روانی در ۱۰۰ بیماری که از شش ماه تا ۵/۵ سال از آسیب مغزی تروماتیک آنها گذشته بود نشان دادند که ۵۲٪ از بیماران پیش از TBI مبتلا به اختلال روانی بوده‌اند که شایع‌ترین آنها اختلال مصرف مواد (۴۱٪)، اختلال افسردگی اساسی (۱۷٪) و اختلال‌های اضطرابی (۱۳٪) بود. ۶۵٪ از بیماران تشخیص اختلال روانی پس از TBI را دریافت نمودند که در این میان فراوان‌ترین‌ها اختلال افسردگی اساسی (۴۵٪)، اختلال‌های اضطرابی (۳۸٪) و اختلال مصرف مواد (۲۱٪) بودند. بیش از دو سوم موارد افسردگی و اضطراب پس از آسیب‌دیدگی جدید بودند ولی در اختلال مصرف مواد، موارد اندکی پس از TBI شروع شده بودند. بررسی آنان نشان داد که افراد دچار TBI باید برای اختلال‌های روانی در مقاطع زمانی مختلف، غریال شوند تا بتوان مداخله مناسب را برای آنها در نظر گرفت.

تغییر شخصیت^۹ که در R-DSM-III سندروم عضوی شخصیت خوانده می‌شد، به عنوان یکی از یافته‌های شایان توجه آسیب‌شناسی روانی محور یک به شمار می‌رود که پیوسته توسط اعضای خانواده به عنوان یک پیامد رنج‌آور آسیب مغزی گزارش می‌شود (رضائی، ۲۰۱۰). اما در ادبیات پژوهشی، تغییر شخصیت ثانوی به TBI همواره نماینده طبقه گستره‌های از نشانگان‌ها، همراه با علائم بسیار گوناگون است

جدول ۱- خلاصه یافته‌های به دست آمده در زمینه اختلال‌های روانی در بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک

سال انتشار	نمونه	تعداد	منبع	شدت	ابزار تشخیصی	معیار	درصد شیوع اختلالات
			نمونه گیری	آسیب مغزی	تعریف اختلال	در کل نمونه	در کل نمونه
فان و همکاران	بیماران سرپایی و مرکز توانبخشی	50	بیماران سرپایی و مرکز توانبخشی	خفیف، متوسط و شدید	DIS	DSM-III-R	-
هیارد و همکاران	بیماران سرپایی	100	بیماران سرپایی	خفیف، متوسط و شدید	SCID	DSM-IV	-
دب و همکاران	بیماران بستری	120	بیماران بستری	خفیف، متوسط، شدید و گروه فاقد آسیب (کنترل)	GHQ; SCAN	ICD-10	%21/7=TBI
(1995)							گروه کنترل
(1998)							
سیلور و همکاران	بیماران سرپایی	361	بیماران سرپایی	متوسط و شدید	DIS	DSM-III	-
(2001)							
مونی واسپید	بیماران سرپایی	80	بیماران سرپایی	خفیف	SCID; BSQ; DES; PCSSC	DSM-IV	%76
(2001)							
پلگرین - والرو و همکاران (2001)	بیماران بستری	55	بیماران بستری	شدید	SCID	DSM-IV	%34/5=بی احساسی
							%32/7=بی ثباتی
کوپونن و همکاران	بیماران ارجاعی به مرکز بهداشت روانی	60	بیماران ارجاعی به مرکز بهداشت روانی	خفیف، متوسط و شدید	SCAN; نسخه 2/1	DSM-III-R	%48/3=محور ۱
(2002)							طول عمر
تاته‌نو و همکاران	بیماران بستری و سرپایی	89	بیماران بستری و سرپایی	خفیف، متوسط و شدید	SCID	DSM-III-R	%33/7=رفار پر خاشگرانه
(2003)							
ژانگ و همکاران (2006)	بیماران بستری	255	بیماران بستری	خفیف، متوسط و شدید	SCID	DSM-IV	%72/5
ورما و همکاران	بیماران سرپایی	60	بیماران سرپایی	خفیف، متوسط و شدید	BDI; HAS; ESS	ICSD-R	-
(2007)							
ولان- گودیشنون و همکاران (2009)	بیماران سرپایی	100	بیماران سرپایی	خفیف، متوسط و شدید	SCID	DSM-IV	%52=پیش از TBI
							%65=TBI پس از

سرواژه‌های موجود در ستون ابزار تشخیصی در جدول بالا (به ترتیب حروف الفبای انگلیسی):

BDI= Beck Depression Inventory; **BSQ**= Body Sensations Questionnaire; **DES**= Dissociative Experiences Scale; **DIS**= Diagnostic Interview Schedule; **DSM**=Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; **ESS**=Epworth Sleepiness Scale; **GHQ**= General Health Questionnaire; **HAS**= Hamilton Anxiety Scale; **ICD**=International Classification of Diseases; **ICSD-R**= International Classification of Sleep Disorders, Revised (diagnostic and coding manual); **PCSSC**=Post-concussion Syndrome Symptom Checklist; **SCAN**= Schedule for Clinical Assessment in Neuropsychiatry; **SCID**= Structured Clinical Interview for DSM-IV

روش

بیمار تا سه ساعت پس از ورود به بیمارستان با استفاده از مقیاس اغمای گلاسکو (GCS)، سطح ناتوانی کلی بیمار به هنگام ترخیص از بیمارستان با استفاده از مقیاس پیامد گلاسکو⁶ (GOS) (جنت⁷، اسنونک⁸، باند⁹ و بروکس¹⁰، 1981)، نوع شکستگی جمجمه با توجه به تصاویر رادیوگرافی جمجمه برای آسیب دیدگی نیمکره‌ها، مکان جراحت مغزی و نوع آسیب موضعی یا منتشر مغز با توجه به برش نگاری رایانه‌ای (CT اسکن) و MRI¹¹ وجود ترمومای جسمی همراه با TBI مورد ارزیابی قرار می‌گرفت.

ج) چک‌لیست مصاحبه ساختار یافته بالینی برپایه ضوابط تشخیصی DSM-IV: اختلال‌های روانی محور یک پس از آسیب مغزی تروماتیک به کمک چک‌لیست مصاحبه ساختار یافته بالینی¹² (نوربالا، محمد، باقری یزدی و یاسمی، 2001) بررسی شد. این چک‌لیست دارای 149 پرسش درباره اختلال روانی شامل علائم اختلال‌های خلقی، اضطرابی، روانپریشی، بیماری‌های روان‌تنی، صرع، عقب‌ماندگی ذهنی و اختلال‌های عضوی مغز است. این پرسش‌ها به صورت بلی و خیر پاسخ داده می‌شوند. نخست درباره علائم هر بخش، طول مدت و شدت اختلال نیز پرسیده می‌شد. درجه‌بندی شدت علائم برپایه یک مقیاس سه‌درجه‌ای «خفیف، متوسط، شدید» است که مصاحبه کننده از تأثیری که بیماری بر عملکرد فردی، شغلی، تحصیلی، خانوادگی و اجتماعی فرد می‌گذارد آن را مشخص می‌کند. پس از پایان مصاحبه و بررسی علائم و نشانه‌های اختلال‌های مطرح در چک‌لیست، تشخیص و یا تشخیص‌های موردنظر با توجه به شدت و سابقه قبلی علائم بیماری در فرد، ثبت می‌شود. نوربالا و همکاران (2001) به منظور بررسی پایایی تشخیص‌ها و توافق بین روانپزشکان در استفاده از چک‌لیست مصاحبه بالینی، 30 نفر از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان روزبه را توسط دو روانپزشک به طور جداگانه مورد مصاحبه بالینی قرار دادند. این پژوهش‌گران برای سنجش میزان توافق تشخیص گذاری بین دو روانپزشک از ضریب کاپا استفاده

پژوهش حاضر از نوع توصیفی - طولی¹ است که با همکاری مرکز تحقیقات تروما و توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان واقع در بیمارستان آموزشی - درمانی پورسینای شهرستان رشت از فروردین تا بهمن ماه سال 1388 انجام شد. 238 بیمار دچار آسیب مغزی تروماتیک که معیارهای ورود و خروج به طرح پژوهشی را داشتند، به صورت پیاپی نمونه گیری شدند. برای کسب رضایت از بیماران نخست هدف از انجام پژوهش برای آنها شرح داده شد و پس از اعلام موافقت آگاهانه ایشان، ارزیابی‌ها آغاز گردید. در صورتی که بیمار دچار یادزدودگی پس از آسیب² (PTA) بود، کسب رضایت از او با موافقت سرپرست یا همراهان اصلی بیمار در بیمارستان انجام می‌گردید.

معیارهای ورود به پژوهش: (الف) داشتن سن 18 سال و بالاتر، (ب) نمره سطح هوشیاری (برپایه GCS³) پایین‌تر از پنج، (ج) آسیب موضعی یا منتشر بافت مغز که ناشی از یک نیروی مکانیکی خارجی باشد، (د) نداشتن هشیاری بیش از یک دقیقه، (ه) طول مدت یادزدودگی پس از تروما بیش از 20 دقیقه، (و) یافته‌های رادیوگرافی و یا برش نگاری رایانه‌ای⁴ (CT) نشان‌دهنده TBI (مانند شکستگی جمجمه، خونریزی درون جمجمه‌ای یا ناهنجاری حاد مغزی) و (ز) بیمارانی که علی‌رغم دارابودن نمره GCS 15، به مدت سه روز پی در پی دچار سردرد، سرگیجه یا حالت تهوع باشند. معیارهای خروج از پژوهش: (الف) بیماران دارای یافته‌های بالینی یا رادیولوژیکی نمایانگر آسیب طناب نخاعی، (ب) وجود هرگونه بیماری عصب‌شناختی پیش از TBI یا آسیب مغزی با منشأ غیرتروماتیک (مانند تومورهای مغزی، سکته مغزی، اتساع سرخرگی⁵، (ج) بیماران دارای وضعیت نباتی و یا نارسایی‌های هشیاری شدید که توانایی پاسخ‌گویی به مصاحبه گر را نداشته باشند و (د) نداشتن رضایت برای ورود به پژوهش.

برای گردآوری داده‌ها ابزارهای زیر به کار برده شد:

(الف) پرسش‌نامه ویژگی‌های جمیعت‌شناختی: دارای پرسش‌هایی در زمینه سن، جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، محل سکونت، علت وقوع و سابقه جراحی پس از TBI، موقعیت شغلی پیش از TBI، طول مدت بستری در بخش‌های مختلف بیمارستانی، و دعوی قضاوتی ناشی از رویداد منجر به TBI بود.

(ب) پرسش‌نامه محقق‌ساخته ارزیابی عصب‌شناختی و آسیب‌شناسی عضوی مغز: در این پرسش‌نامه نیز سطح هشیاری

- 1- descriptive -longitudinal
- 2- posttraumatic amnesia
- 3- Glasgow Coma Scale
- 4- computerized tomography
- 5- aneurism
- 6- Glasgow Outcome Scale
- 7- Jennett
- 8- Snoek
- 9- Bond
- 10- Brooks
- 11- magnetic resonance imaging
- 12- Structured Clinical Interview

جدول 2- ویژگی‌های جمعیت شناختی بیماران دچار آسیب مغزی
تروماتیک (N=238)

متغیرها (%)	فرابوی (%)
گروه سنی	
(30/8)72	18 تا 25 سال
(21/8)52	26 تا 35 سال
(12/2)29	36 تا 45 سال
(17/2)41	46 تا 65 سال
(7/1)17	66 تا 85 سال
(11/3)27	نامشخص
جنسیت	
(81/9)195	مرد
(18/1)43	زن
وضعیت تأهل	
(37)78	مجرد
(61/8)157	متاهل
(0/4)1	جداشده
(0/8)2	همسر فوت کرده
میزان تحصیلات	
(13)31	بی‌سواد
(16/8)40	ابتدایی
(24/8)59	راهنمایی
(24/8)59	دبیرستان
(8/8)21	دانشگاه
(11/8)28	نامشخص
محل سکونت	
(42/9)102	شهر
(45/4)108	روستا
(11/8)28	نامشخص
شغل پیش از TBI	
(0/85)2	حرفه‌ای/اتخасی
(9/2)22	مدیر میانی/دفتردار/کارمند/فروشنده
(21/4)51	صنعتگر/تعییر کار/سرکار گر (دانشجو)
(38/2)91	متصلی ماشین/نیروی خدماتی/خانه‌دار/کشاورز (دانش آموز)
	کار گر ساده (بی‌مهارت)
(13)31	بی کار
(1/7)4	
(23/9)37	نامشخص

میانگین سنی این بیماران در هنگام رخداد 36/7 TBI سال و دامنه سنی آنها بین 18 تا 85 سال بود. 31 بیمار (%13) بی‌سواد بودند و با کمک مصاحبه گر و اعضای خانواده

کردند و آن را 0/87 K= گزارش نمودند. آنها این چک لیست را دارای پایایی بالا دانستند که می‌تواند در ارزیابی تشخیصی اختلال‌های روانی به طور موفقیت‌آمیزی به کار برد شود.

بیماران مورد بررسی از بخش‌های اورژانس، تروما، داخلی و اعصاب بیمارستان پورسینا، اداره پزشکی قانونی استان گیلان و درمانگاه‌های محلی ارجاع شدند و تشخیص وجود آسیب مغزی تروماتیک (TBI) برای آنها توسط یک متخصص جراحی مغز و اعصاب مستقر در کلینیک تخصصی و فوق تخصصی حضرت امام رضا (ع) انجام شد. اگر بیمار دچار TBI معیارهای ورود به پژوهش را داشت، اطلاعات وی توسط یک کارشناس ارشد روانشناسی با همکاری متخصص جراحی اعصاب یادداشت می‌شد و سپس زیر نظر یک کارشناس ارشد روانشناسی اطلاعات مربوط به ویژگی‌های جمعیت شناختی گردآوری می‌شد. پس از آن از بیمار خواسته می‌شد دست کم سه ماه پس از آسیب دیدگی برای انجام معاینات تکمیلی ضربه سر، به یک روانپزشک نیز مراجعه نماید. هر چند این روانپزشک از همکاران مجری پژوهش حاضر بود، اطلاعات حاصل از ارزیابی عصب‌شناختی و آسیب‌شناسی عضوی مغز برای او کور می‌شد. باور مجری پژوهش این بود که آگاه‌بودن روانپزشک همکار از اطلاعات جراحی اعصاب می‌تواند در حذف یا کاهش سوگیری سنجش و یا سوگیری گمان تشخیصی مؤثر باشد. تعیین انواع اختلال‌های روانی به کمک مصاحبه ساختاریافته بالینی یک روانپزشک و بر پایه معیارهای تشخیصی DSM-IV انجام پذیرفت. در صورتی که آزمودنی دچار TBI، مبتلا به اختلال روانی نیز تشخیص داده می‌شد، برای وی پرونده تشکیل می‌گردد تا تحت درمان قرار گیرد. آن دسته از بیمارانی که مدت سه ماه از دوره پیگیری آنها می‌گذشت و به هر دلیل هنوز به روانپزشک مراجعه نکرده بودند، هر کدام تا دو بار و با فاصله دو هفته به صورت تلفنی به آنها یادآوری می‌شد. برای تحلیل داده‌های گردآوری شده، از روش‌های آمار توصیفی و نرم‌افزار رایانه‌ای SPSS-16¹ بهره گرفته شد.

یافته‌ها

در نه ماه نخست سال 1388، در مجموع 238 بیمار (195 مرد، 43 زن) دچار آسیب مغزی تروماتیک (TBI) که معیارهای ورود به پژوهش را داشتند، از نظر عصب‌شناختی و آسیب‌شناسی عضوی مغز معاینه شدند. برخی ویژگی‌های جمعیت شناختی بیماران مورد بررسی در جدول 2 نشان داده شده است.

درگیری یا خشونت و غیره با ارائه نامه پزشکی قانونی خواستار غرامت و یا درگیر در دعوی قضایی بوده‌اند.

جدول ۴، یافته‌های به دست آمده از معاینه‌های جراحی اعصاب و نیز یافته‌های برآمده از تصویربرداری عصبی مانند CT اسکن، MRI و رادیوگرافی جمجمه را نشان می‌دهد. بر پایه داده‌های جدول یادشده، بیشتر بیماران (67/2%) دچار TBI خفیف شده بودند و 33 بیمار (13/9%) از TBI شدید رنج می‌بردند. میانگین میزان هشیاری برپایه معیار اغمای گلاسکو (GCS) برای همه بیماران $12/1 \pm 36/30$ و در دامنه 5 تا 15 نمره GCS در نوسان بود. 199 بیمار (83/6%) به بهبودی مطلوب دست یافتند و 9 بیمار (3/8%) بر پایه معیار پیامد گلاسکو (GOS) تا زمان ترخیص از بیمارستان هنوز در ناتوانی شدید به سر می‌بردند. آسیب‌های لوب پیشانی (چپ، راست، و دو طرفه) از سایر موارد بیشتر بود. نکته شایان توجه میزان بالای آسیب‌های متعدد یا ترکیبی در بخش‌های گوناگون مغز (به ترتیب 11/8 و 12/8%) بود. افزون بر آن، 61 بیمار (25/6%) نیز دچار آسیب جسمی همراه با TBI (نظیر ضایعات ارتوپدیک یا جراحات مرتبط با جراحی عمومی) در اندام‌های مختلف بدن به ویژه دست‌ها و پاها شده بودند.


اطلاعات آنها تکمیل گردید. 21 بیمار (8/8%) تحصیلات دانشگاهی داشتند. میانگین میزان تحصیلات کل بیماران 7/8 سال و دامنه سال‌های تحصیلات آنها بین صفر تا 18 سال در نوسان بود.

شکل ۱ نشان دهنده فراوانی علل رخداد آسیب مغزی ترماتیک (TBI) است. همان‌گونه که در این شکل نشان داده شده، سوانح رانندگی و جاده‌ای، بیشترین سهم را در ایجاد آسیب داشته‌اند. افزون بر آن، 68 بیمار (28/6%) پس از TBI تحت عمل جراحی اعصاب قرار گرفته بودند.

جدول ۳، میانگین، انحراف معیار و دامنه مدت زمان بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان را نشان می‌دهد. اطلاعات این جدول نشان‌گر آن است که در مجموع، یک بیمار دچار TBI به طور متوسط 54/9 روز (انحراف معیار 6/16) را برای بازیابی بهبودی خود در بیمارستان سپری می‌کند، در حالی که برخی از بیماران اصلاً بستری نمی‌شوند و با معاینه مختصر سرپایی و یا رادیوگرافی ساده از جمجمه، از بیمارستان مرخص می‌شوند و برخی دیگر ممکن است تا بیش از شش ماه در بخش‌های مختلف آن (مانند ICU^۱، تروما، اورژانس و بخش داخلی اعصاب) بستری باشند.

نتایج هم‌چنین بیان‌گر آن بود که 146 بیمار (61/3%) به دلیل رویدادی که به TBI انجامیده است اعم از تصادف،

20
20



شکل ۱ - درصد فراوانی علل وقوع آسیب مغزی ترماتیک

جدول ۴- نتایج معایینات جراحی اعصاب و یافته‌های تصویربرداری
حصیبی بیماران دچار آسیب ترماتیک مغزی (TBI) (N=238)

فراوانی (%)	متغیرها	شدت TBI:
(67/2)160	خفیف (نمره GCS بین 13 تا 15)	
(18/9)45	متوسط (نمره GCS بین 12 تا 9)	
(13/9)33	شدید (نمره GCS 8 و پایین‌تر)	
	سطح ناتوانی کلی پس از TBI:	
(83/6)199	بهبودی مطلوب (نمره 5 در GOS)	
(12/6)30	ناتوانی متوسط (نمره 4 در GOS)	
(3/8)9	ناتوانی شدید (نمره 3 در GOS)	
	موارد شکستگی جمجمه:	
(21)50	ساده (خطی)	
(10/1)24	فرو رفت	
(2/1)5	قاعده جمجمه	
	جهت آسیب‌دیدگی نیمکره‌های مغز:	
(21/8)52	چپ	
(15/5)37	راست	
(21/8)52	دوطرفه	
	مکان جراحت مغزی (جهت نیمکره):	
(8/8)21	لوب پیشانی (راست)	
(9/7)23	لوب پیشانی (چپ)	
(4/6)11	لوب پیشانی (دوطرفه)	
(5)12	لوب آهینه‌ای (راست)	
(6/3)15	لوب آهینه‌ای (چپ)	
(0)0	لوب آهینه‌ای (دوطرفه)	
(0/8)2	لوب گیجگاهی (راست)	
(2/1)5	لوب گیجگاهی (چپ)	
(0)0	لوب گیجگاهی (دوطرفه)	
(0/8)2	لوب‌های پس سری	
(0/4)1	مخجه	
(0/4)1	ساقه مغز	
(11/8)28	مکان‌های آسیب‌دیده متعدد	
	موارد آسیب موضعی:	
(12/6)30	کونتوزیون (کوفنگی مغز)	
(13)31	هماتوم روی سخت شامه	
(5/9)14	هماتوم زیر سخت شامه	
(1/3)3	خونریزی تحت عنکبوتیه	
(0/6)1	خونریزی داخل بطنی	
(2/5)6	هماتوم داخل مغزی	
(12/8)29	آسیب‌های موضعی متعدد	
	موارد آسیب منتشر:	
(5/9)14	ادم	
(6/7)16	آسیب آکسونی منتشر	
(2/9)7	آسیب‌های منتشر متعدد	
	(ادم + آسیب آکسونی منتشر)	

جدول ۳- میانگین و انحراف معیار مدت اقامت در بخش‌های مختلف بیمارستان

طول مدت بستری (به روز)	میانگین	انحراف	معیار	دامنه
در بخش ویژه	8/21	38/2	0-60	
در بخش عمومی	8/8	16/9	0-150	
مجموع مدت بستری	16/6	45/9	0-195	

پس از گذشت سه ماه از پیگیری، از 238 بیمار، تنها 107 نفر برای معاینه روانپزشکی و تشخیص اختلال‌های روانی مراجعه نمودند. با بیمارانی که مراجعته نکرده بودند، دو بار با فاصله دو هفته برای یادآوری انجام معاینه تلفنی و پیگیری تلفنی گرفته شد. پس از پایان تماس‌های تلفنی و پیگیری یک ماه بعد، 48 بیمار دیگر نیز برای انجام معاینه روانپزشکی مراجعه نمودند. در مجموع از 238 بیمار ارزیابی شده پس از گذشت 145 روز (با انحراف معیار 53)، 155 بیمار (65/1%) به کمک مصاحبه ساختاریافته بالینی برپایه معیارهای تشخیصی DSM-IV برای تعیین اختلال‌های روانی پس از آسیب مغزی ترماتیک بررسی شدند. در جدول ۵، ماهیت و فراوانی بروز اندک از اخلاق اخلاق روانی پس از آسیب مغزی ترماتیک بر حسب جنسیت نشان داده است.

از 155 بیمار دچار TBI نشان داد که 117 نفر (75/5%) از آنها مبتلا به اختلال‌های روانی شده‌اند (99 مرد و 18 زن). افزون بر آن، به دلیل این که برخی از بیماران پس از TBI به بیش از یک اختلال روانی مبتلا شده بودند، شمار اخلاق اخلاق روانی از مجموع بیماران ارزیابی شده (n=155) بیشتر است. در پژوهش حاضر از مجموع 117 بیمار مبتلا به اختلال روانی، 88 بیمار (75/2%) دارای دو اختلال روانی و بیشتر بودند.

در جدول ۶، همبودی انواع اختلال‌های روانی در بیماران دچار TBI نشان داده شده است. شایع‌ترین اختلال‌های روانی ناشی از TBI اختلال تغییر شخصیت (58/6%)، اختلالات خلقی (32/3%)، اختلال‌های اضطرابی (20%)، اختلال خواب (19/3%)، اختلال یادزدودگی مزمن (12/9%) و اختلال‌های جسمانی شکل (1/3%) بودند. اختلال‌های دلیریوم، خوردن، و روانپریشی ناشی از TBI نیز هر یک 0/64% تشخیص داده شدند.

جدول ۷ شیوع طول عمر اختلال‌های روانی (محور ۱ و ۲) را پیش از رخداد TBI در 155 بیمار ارزیابی شده نشان می‌دهد.

جدول ۵- توزیع فراوانی اختلال‌های روانی، چهار ماه پس از آسیب مغزی تروماتیک (TBI) بر حسب جنسیت

			انواع اختلالات
	جمع (n=155)	زن (n=27)	مرد (n=128)
	فراوانی (%)	فراوانی (%)	فراوانی (%)
اختلالات خلقی ناشی از TBI:			
(10/32)16	(0/64)1	(9/68)15	همراه با افسردگی
(19/35)30	(4/52)7	(14/83)23	همراه با ویژگی‌های افسردگی اساسی
(1/29)2	(0)0	(1/29)2	همراه با ویژگی‌های مانیک
(1/29)2	(0/64)1	(0/64)1	همراه با ویژگی‌های مختلط
(32/26)50	(5/81)9	(26/45)41	مجموع اختلالات خلقی
اختلالات اضطرابی ناشی از TBI:			
(7/11)11	(1/29)2	(5/81)9	همراه با اضطراب منتشر
(0/64)1	(0/64)1	(0)0	همراه با حملات پانیک
(0/64)1	(0)0	(0/64)1	همراه با نشانگان وسوسی - اجرایی
(4/51)7	(1/93)3	(2/58)4	اختلال استرس پس از سانجه
(3/22)5	(1/93)3	(1/29)2	اختلال استرس حاد
(3/22)5	(1/29)2	(1/93)3	هراس اخصاصی
(0/64)1	(0)0	(0/64)1	اختلال پانیک همراه با اگورافوبیا
(20)31	(7/11)11	(12/89)20	مجموع اختلالات اضطرابی
تغییر شخصیت ناشی از TBI:			
(6/45)10	(0)0	(6/45)10	بی ثبات
(9/04)13	(0/64)1	(8/39)13	مهارگسیخته
(39/4)61	(3/87)6	(35/48)55	پرخاشگر
(3/22)5	(0/64)1	(2/58)4	بی احساس
(0/64)1	(0)0	(0/64)1	پارانوئید
(0/64)1	(0)0	(0/64)1	مرکب
(59/23)91	(5/06)8	(54/17)83	مجموع اختلال تغییر شخصیت
اختلالات خواب ناشی از TBI:			
(13/30)25	(1/93)3	(14/19)22	بی خوابی
(3/22)5	(0/64)1	(2/58)4	برخوابی
(1/29)2	(0)0	(1/29)2	اختلال در استمرار خواب
(19/34)32	(2/57)4	(16/77)28	مجموع اختلالات خواب
اختلالات جسمانی شکل ناشی از TBI:			
(0/64)1	(0)0	(0/64)1	خودبیمارانگاری
(0/64)1	(0)0	(0/64)1	اختلال تبدیلی همراه با تیک حرکتی
(1/29)2	(0)0	(1/29)2	مجموع اختلالات جسمانی شکل
اختلال آمنزی (یادزدودگی) ناشی از TBI:			
(12/9)20	(1/93)3	(10/97)17	نوع مزمن
(0/64)1		(0/64)1	اختلال دلیریوم ناشی از TBI
اختلالات خوردن ناشی از TBI:			
(0/64)1	(0)0	(0/64)1	پرخوری عصبی
اختلالات روانپریشی ناشی از TBI:			
(0/64)1	(0)0	(0/64)1	همراه با هذیانها

22
22

جدول ۶- تشخیص‌های همزمان اختلال‌های روانی در بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک (TBI) (n=88)

اختلالات مصرف مواد	اختلالات روانپردازی	اختلالات خودرسان	اختلالات دلیریوم	آمنی نوع مزون	اختلالات جسمانی شکل	اختلالات خوار بر	تغییر شخصیت	اختلالات اضطرابی	اختلالات خلقی	ردیف	اختلالات مصرف مواد	اختلالات روانپردازی	اختلالات خودرسان	اختلالات دلیریوم	آمنی نوع مزون	اختلالات جسمانی شکل	اختلالات خوار بر	تغییر شخصیت	اختلالات اضطرابی	اختلالات خلقی	ردیف
						x	x			45				x	x					1	
						x	x			46				x				x	x	2	
				x		x	x	x		47	x							x	x	3	
x						x	x	x		48				x	x	x		x	x	4	
x						x				49				x				x	x	5	
x						x				50				x			x	x		6	
						x	x			51			x		x	x				7	
						x	x	x		52				x			x	x	x	8	
						x		x		53	x			x	x		x	x	x	9	
x						x	x	x		54	x			x		x	x	x	x	10	
				x		x				55			x		x		x			11	
						x	x			56	x			x			x			12	
						x	x			57				x			x	x		13	
				x		x	x	x		58	x			x		x	x			14	
						x	x	x		59			x		x		x	x	x	15	
						x	x			60				x			x	x	x	16	
				x		x	x	x		61	x	x		x		x		x		17	
						x	x			62		x		x		x		x	x	18	
						x		x		63			x		x		x	x	x	19	
x							x			64	x			x			x			20	
x				x		x				65			x		x		x	x	x	21	
						x	x			66		x		x		x		x	x	22	
x					x	x	x			67		x		x	x	x	x	x	x	23	
						x	x			68		x	x	x	x	x	x	x	x	24	
						x		x		69		x		x	x					25	
x					x	x	x	x		70	x		x		x					26	
x				x		x				71			x		x		x	x	x	27	
						x	x			72		x		x		x		x	x	28	
x						x	x	x		73	x		x		x		x	x		29	
				x		x	x	x		74	x			x		x		x	x	30	
						x	x	x		75				x			x	x	x	31	
						x		x		76			x		x		x	x	x	32	
						x	x	x		77		x		x		x				33	
x					x	x	x	x		78			x		x		x	x		34	
x						x		x		79	x			x		x	x	x	x	35	
						x	x			80				x		x	x	x	x	36	
						x	x			81			x			x	x	x	x	37	
						x	x	x		82			x			x	x	x	x	38	
				x		x				83	x		x		x		x	x	x	39	
						x	x			84		x		x		x	x	x	x	40	
				x		x				85		x		x		x		x	x	41	
						x	x			86			x		x	x		x	x	42	
						x	x			87			x		x	x		x	x	43	
						x	x			88			x			x	x	x	x	44	

آسیب‌های مغزی و پدیدآمدن تغییرات ویران‌کننده زیستی- عصبی و پیامدهای مخرب روانی- اجتماعی آن است. بررسی‌های بسیاری به نقش آسیب‌شناسی عصبی⁵ در ایجاد اختلال روانی پرداخته‌اند. برای نمونه، جورج و همکاران⁶ (2004) به نقش تباہ‌کننده حجم ماده خاکستری منطقه پیش‌پیشانی⁷ چپ، لوین⁸ و همکاران (2005) به نقش ناهنجاری‌های آشکارشده در پیماش‌های CT و جورج، فیر⁹ و ولی¹⁰ (2007) به نقش کاهش حجم دو طرفه مناطق هیپوکامپی در بروز اختلال افسردگی پس از TBI اشاره کردند. جورج و همکاران (1993) و مورای¹⁰ و فیوجی موتو¹¹ (2003) بر نقش آسیب‌های پایه لوب گیجگاهی¹² در ایجاد اختلال مانیای ثانوی به TBI تأکید نمودند. در مورد اختلال وسوسی- اجاری پس از TBI نیز بر تیر¹³، کولی‌سفسکی¹⁴، گیرونل¹⁵ و لوپز¹⁶ (2001)، یلچیک¹⁷ و همکاران (2004) و اوگای¹⁸، لیو¹⁹، موری²⁰ و تاکی²¹ (2005) نقش جراحات قشر مداری پیشانی²²، شکنج سینگولیت²³ و هسته دمدار را بر جسته ساختند. فیوجی²⁴ و احمد (2002) نیز بر نقش ناهنجاری‌های موجود در EEG²⁵ و صرع همراه با TBI و بروز روانپریشی پس از TBI تأکید نمودند. ساجدو²⁶، اسمیت²⁷ و کات کارت²⁹ (2001) نیز پیشتر به نقش تعیین‌کننده آسیب‌دیدگی لوب گیجگاهی چپ و لوب آهیانه‌ای راست در پدیدآی روانپریشی شبه اسکیزوفرنیا³⁰ اشاره نمودند. در زمینه رابطه میان اختلال‌های سوء‌صرف یا وابستگی به الكل³¹ (AA/D) و اختلالات خلقی پس از TBI، جورج و همکاران (2005) دریافتند که پس از با قطع مدارهای عصبی که سامانه پاداش، خلق و کارکردهای اجرایی³² را تنظیم می‌کنند، بیماران در معرض خطر یافته‌تر اختلال‌های خلقی قرار می‌گیرند. تانه‌تو و همکاران (2003)

- 1- Kraepelin
- 2- Freshwater
- 3- Golden
- 4- Meyer
- 5- neuropathologic
- 6- prefrontal
- 7- Levin
- 8- Fear
- 9- Wessely
- 10- Murai
- 11- Fujimoto
- 12- temporal basal polar lesions
- 13- Berthier
- 14- Kulisevsky
- 15- Gironell
- 16- López
- 17- Bilgic
- 18- Ogai
- 19- Lyo
- 20- Mori
- 21- Takei
- 22- orbitofrontal region
- 23- cingulate gyrus
- 24- caudate nucleus
- 25- Fujii
- 26- electroencephalography
- 27- Sachdev
- 28- Smith
- 29- Cathcart
- 30- schizophrenia-like psychosis
- 31- alcohol abuse and/or dependence
- 32- executive function

جدول 7- شیوع طول عمر اختلال‌های روانی (محور 1 و 2) پیش از رخداد TBI (n=155)

انواع اختلالات	فراوانی (%)
اختلالات خلقی	(5/81)9
اختلالات اضطرابی	(2/58)4
اختلال سوء‌صرف مواد	(18/06)28
اختلال وابستگی به مواد	(4/52)7
اختلال وابستگی به الكل	(0/64)1
اختلالات شخصیت (محور 2)	(2/58)4
عقب‌ماندگی ذهنی خفیف	(2/58)4
اختلالات روانپریشی	(1/29)2
همبودی اختلالات خلقی/اضطرابی	(0/64)1
همبودی اختلالات خلقی/شخصیت (محور 2)	(0/64)1
مجموع اختلالات	(39/35)61

بر این اساس، 35 بیمار (32%) پیش از رخداد TBI دارای اختلال سوء‌صرف مواد بودند. 61 بیمار (43%) از 155 بیمار ارزیابی شده، پیش از رخداد TBI نشانگان اختلال‌های روانی برپایه معیارهای تشخیصی DSM-IV را داشته‌اند.

24
—
24

بحث

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی و تعیین ابعاد آسیب‌شناسی روانی محور یک (DSM-IV) در چهارماهه نخست پس از آسیب مغزی تروماتیک (TBI) بود. پرداختن به مسئله بروز اختلال‌های روانی پس از TBI پدیده نوظهوری نیست و حتی در پژوهش‌های کلاسیک سال‌های آغازین سده 1921، به نقل از فرشواتر² و گلدن³ (2002) براین باور بود که

آسیب‌های موضعی مغزی می‌تواند علت مستقیم اختلال افسردگی باشد. پیشتر از آن نیز میر⁴ (1904)، به نقل از همان‌جا) آسیب به بخش‌هایی از مغز را با آسیب‌شناسی روانی ویژه‌ای همراه دانسته بود. مهم‌ترین یافته پژوهش حاضر میزان بالای اختلال‌های روانی چهار ماه پس از آسیب مغزی تروماتیک بود (75/48%). یافته‌های پژوهش حاضر، با یافته‌های پژوهش‌های پیشین که بروز اختلال‌های روانی پس از TBI را 76% (مونی و اسپید، 2001)، 72/5% (زانگ و همکاران، 2006) و 65% (ولان- گودینسون و همکاران، 2006) گزارش کرده‌اند، همسوی دارد. میزان شیوع بالای بیماری‌های روانی در پژوهش حاضر و سایر بررسی‌های انجام شده، گویای ماهیت ناتوان‌کننده

بیمارانی که به تازگی دچار ضرب دیدگی و جراحت مغزی شده‌اند و بافت مغز هنوز به روند نهایی ترمیم و تعدیل ضایعات پس از تروما نرسیده است، پریشانی، بی‌احساسی، بی‌ثباتی، پرخاشگری، مهارگ‌سیختگی و سایر علائم مرتبط را بیشتر نشان دهند. در تبیین دیگری از این مسئله می‌توان به تغییرات زیست- عصب‌شناختی، نوروآتومیک و تغییر در شب و موازنۀ تولید و آزادسازی عصب‌رسانه‌ها، و استعداد ژنتیکی برخی از بیماران در برابر پیامدهای تروما اشاره نمود که به نظر می‌رسد با توجه به بررسی متون، در آینده نیاز به پژوهش بیشتری داشته باشد. هم‌چنین تاثنو و همکاران (2003) تغییر شخصیت نوع پرخاشگر را با میانگین زمانی $23/9 \pm 17/7$ روز پس از TBI، ۳۳٪/۷ برآورد نمودند که با یافته پژوهش حاضر (۳۹٪/۴) تفاوت چندانی ندارد. هم‌سو با یافته پژوهش حاضر در زمینه میزان سوءصرف مواد در بیماران دچار TBI (%22/6)، کوریگان و دیوتسلک (2008) و لان- گودینسون و همکاران (2009) بهمیزان بالای (2002) هم‌سو با یافته پژوهش حاضر در زمینه میزان سوءصرف مواد در بیماران دچار TBI اشاره کردند. در تبیین این یافته می‌توان گفت وابستگی به مصرف مواد و الکل می‌تواند با ایجاد آثار منفی در دستگاه عصبی مرکزی (مانند اختلال در توجه و تمرکز، تحریک‌پذیری شدید، خستگی، توهمند، ناهمانگی حرکتی و خواب آلودگی، TBI را بر اثر سوانح رانندگی، سقوط و خشونت در پی‌داشته باشد (فان و همکاران، 2002؛ کوریگان و دیوتسلک، 2008؛ لان- گودینسون و همکاران، 2009). با این همه از 228 بیمار ارزیابی شده، تنها ۱۵۵ نفر به روانپزشک مراجعه نمودند (افت ۳۴٪ درصدی). بنابراین، این احتمال وجود دارد که تنها بیماران دارای علایم اختلال‌های روانی مایل به شرکت در پژوهش باشند. این امر می‌تواند سبب افزایش کاذب میزان اختلال‌های روانی در این پژوهش شود. در این میان باید به عواملی مانند نگرش بد نسبت به مصاحبه روانپزشکی، دوری محل زندگی بیماران نسبت به مرکز انجام پژوهش، ارزیابی‌ها و انکار علائم اختلال‌های روانی از سوی خود بیمار پس از TBI بهدلیل دوری جستن از انگ اجتماعی اشاره نمود. افزون بر آن، در پژوهش حاضر گروه گواه گنجانیده نشده بود و هیچ یک از بیماران از نظر مداخله‌های دارویی، سطح مراقبت و میزان اقدامات

آسیب لوب پیشانی را در تغییر شخصیت نوع پرخاشگر مؤثر دانستند. اندرسون و همکاران (1999) نیز به نقش آسیب مناطق زیرقشری در پدیدآیی تغییر شخصیت نوع بی‌احساس اشاره نمودند و راینسون^۱، پاریخ^۲، لپسی^۳، استارکسین^۴ و پرایس^۵ (1993) آسیب‌های لوب پیشانی را در ایجاد بی‌ثباتی هیجانی ناشی از TBI مؤثر گزارش کردند. تفاوت در برآورد میزان بروز اختلال‌های روانی پس از TBI در بررسی‌های گزارش شده را می‌توان به عوامل زیر نسبت داد:

الف) تفاوت در تعریف نشانگان به کمک معیارهای تشخیصی گوناگون مانند معیارهای DSM و ICD،
 ب) به کاربردن پرسش‌نامه خودستجو و یا ابزارهای تشخیصی متفاوت برای تعیین اختلال،
 ج) تفاوت در شدت TBI در میان بیماران ارزیابی شده،
 د) روش شناسی متفاوت پژوهش‌ها (مقطعی^۶، گذشته‌نگر^۷، آینده‌نگر^۸، مورد- شاهدی^۹، کوهورت^{۱۰})،
 ه) تفاوت در جمعیت مورد بررسی و روش نمونه‌گیری،
 تفاوت در ملاک‌های ورود و خروج برای بیماران دچار TBI، نمونه‌گیری از جمعیت‌های مختلف مانند بیماران سرپایی، مراکز توانبخشی، مراکز ترومای حاد،
 کلینیک‌های روانپزشکی و یا پیمایش جمیعت عمومی از نظر TBI و) تفاوت در مدت زمان سپری شده پس از TBI،
 افزون بر موارد یادشده، یافته بر جسته این پژوهش میزان بالای همبودی اختلالات روانی در بیماران دچار TBI بود. به عبارت دیگر از مجموع ۱۱۷ بیمار مبتلا به اختلال روانی، ۸۸ نفر (75٪/21) همبودی اختلالات روانی را در خود نشان دادند. هم‌سو با این یافته، پژوهش‌های دیگری هم‌چون مونی و اسپید (2001) میزان بالای 60٪ را در بررسی‌های خود TBI برای وجود همبودی اختلالات روانی در بیماران دچار گزارش نمودند. در تبیین این مسئله، مونی و اسپید (2001) می‌نویسن «یکی از علل احتمالی میزان همبودی بالای اختلال روانی این است که TBI سبب آسیب‌پذیری موقتی در ایجاد اختلالات روانی هم‌چون افسردگی و اضطراب می‌شود که ممکن است به گونه دیگری [این همبودی‌ها] بدون وجود آسیب مغزی اتفاق نیفتد» (ص 784). در پژوهش حاضر هم‌چنین همبودی بالای سایر اختلالات با تغییرات شخصیت به نحو بر جسته‌ای نشان داده شده است. این یافته را می‌توان این گونه توجیه نمود که بیماران دچار TBI در این پژوهش در فاز حاد تروما (به طور میانگین چهار ماه پس از TBI) مورد ارزیابی روانپزشکی قرار گرفته‌اند؛ بنابراین شکفت‌آور نیست

1- Robinson
 3- Lipsey
 5- Price
 7- retrospective
 9- case-control

2- Parikh
 4- Starkstein
 6- cross-sectional
 8- prospective
 10- cohort

- behavior related to early damage in human prefrontal cortex. *Natural Neuroscience*, 2, 1032-1037.
- Ashman, T. A., Gordon, W. A., Cantor, J. B., & Hibbard, M. R. (2006). Neurobehavioral consequences of traumatic brain injury. *Mount Sinai Journal of Medicine*, 73, 999-1005.
- Berthier, M. L., Kulisevsky, J. J., Gironell, A., & López, O. (2001). Obsessive-compulsive disorder and traumatic brain injury: Behavioral, cognitive, and neuro-imaging finding. *Neuropsychiatry, Neuropsychology, and Behavioral Neurology*, 14, 23-31.
- Bilgic, B., Baral-Kulaksizoglu, I., Hanagasi, H., Saylan, M., Aykutlu, E., Gurvit, H., & Emre, M. (2004). Obsessive-compulsive disorder secondary to bilateral frontal damage due to a closed head injury. *Cognitive and Behavioral Neurology*, 17, 188-120.
- Binder, S., Corrigan, J. D., Langlois, J. A. (2005). The public health approach to traumatic brain injury: An overview of CDC's research and programs. *Journal of Head Trauma Rehabilitation*, 20, 189-195.
- Corrigan, J. D., & Deutschle, J. J. (2008). The presence and impact of traumatic brain injury among clients in treatment for co-occurring mental illness and substance abuse. *Brain Injury*, 22, 223-231.
- Deb, S., Lyons, I., Koutzoukis, C., Ali, I., & McCarthy, G. (1999). Rate of psychiatric illness after traumatic brain injury. *American Journal of Psychiatry*, 156, 374-378.
- Ebrahimi fakhar, H. R., Moshiri, E., & Zand, S. (2006). An investigation on quality of emergency care of head injury patients in emergency ward, Vali-e-asr Hospital, Arak 2005. *Journal of Arak University of Medical Science (Rahavard-e-danesh)*, 10(4), 1-12. (Persian).
- Fann, J. R., Katon, W., Uomoto, J., & Esselman, P. (1995). Psychiatric disorders and functional disability in outpatients with traumatic brain injuries. *American Journal of Psychiatry*, 152, 1493-1499.
- Fann, J. R., Leonetti, A., Jaffe, K., Kanton, W. J., Cummings, P., & Thompson, R. S. (2002). Psychiatric illness and subsequent traumatic brain injury: A case control study. *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry*, 72, 615-620.
- بیمارستانی، کیفیت مراقبت از بیمار پس از تروما در محیط خانواده و میزان کسب حمایت اجتماعی کنترل نشدن؛ از این رو باید در تعیین یافته‌ها احتیاط نمود.
- پیشنهاد می‌شود در بررسی‌های آینده ضمن از میان برداشتن این محدودیت‌ها، سابقه اختلال روانی پیش از TBI، اختلال‌های شخصیت (محور II) و سابقه اختلال روانی در خانواده بیمار دچار TBI ارزیابی شود. هم‌چنین اثر تعاملی علائم بروزیافته پس از TBI می‌تواند تشخیص دقیق اختلال‌های روانی را با دشواری همراه سازد. برای نمونه، بی‌خوابی و خستگی ناشی از TBI ممکن است به‌دلیل تشابه با علائم مرضی به تشخیص نادرست افسردگی ناشی از TBI بیانجامد، و یا افسردگی اساسی ثانوی به TBI خود می‌تواند سبب بی‌خوابی شود، اما در این حالت تشخیص اختلال خواب ناشی از TBI در کانون توجه بالینی باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های آینده برای تنظیم راهنمای تشخیصی استاندارد اختلال‌های روانی ناشی از TBI بکوشند. پیشنهاد می‌شود برای افزایش تعیین‌پذیری یافته‌های پژوهش با بهره‌گیری از شیوه‌های چندمرکزی (زیر پوشش قراردادن چند بیمارستان) نمونه‌گیری به‌شكل تصادفی انجام شود.
- به طور کلی می‌توان گفت فراوانی اختلال‌های روانی در مرحله حاد پس از آسیب مغزی تروماتیک به‌همراه بسیاری از موارد جدید تغییر شخصیت، اختلال‌های خلقی و اضطرابی، به نحو چشمگیری بالا است و بیماران دچار TBI می‌باشند، دست کم در مقطع زمانی چهارماهه پس از آسیب مغزی از نظر بروز اختلال‌های روانی، برای انجام اقدام‌های پیش‌گیرانه و مدیریت بهتر آسیب‌شناسی محور یک مورد پایش و ارزیابی قرار گیرند.
- ### سپاسگزاری
- از کارکنان کلینیک تخصصی و فوق تخصصی حضرت امام رضا (ع) تشکر نموده و از مرکز تحقیقات تروما و توسعه تحقیقات بالینی واقع در بیمارستان پورسینای شهرستان رشت به‌خاطر حمایت مالی از این پژوهش، قدردانی می‌شود.
- [بنابراین اظهار نویسنده مسئول مقاله، تعارض منافع وجود نداشته است.]
- ### منابع
- Anderson, S. W., Bechara, A., Damasio, H., Tranel, D., & Damasio, A. R. (1999). Impairment of social and moral

- Feinstein, A., & Rapoport, M. (2000). Mild traumatic brain injury: The silent epidemic. *Canadian Journal of Public Health*, 91, 325-326.
- Freshwater, S. M., & Golden, C. J. (2002). Personality changes associated with localized brain injury in elderly populations. *Journal of Clinical Geropsychology*, 8, 251-277.
- Fujii, D. E., & Ahmed, I. (2002). Characteristics of psychotic disorder due to traumatic brain injury: An analysis of case studies in the literature. *Journal of Neuro-psychiatry and Clinical Neuroscience*, 14, 130-140.
- Grafman, J., Schwab, K., Warden, D., Pridgen, A., Brown, H. R., & Salazar, A. M. (1996). Frontal lobe injuries, violence and aggression: A report of the Vietnam head injury study. *Neurology*, 46, 1231-1238.
- Granacher, R. P. (2007). *Traumatic brain injury: Methods for clinical & forensic Neuropsychiatric Assessment*, (2nd ed). Boca Raton: CRC.
- Hibbard, M. R., Uysal, S., Kepler, K., Bogdany, J., & Silver, J. (1998). Axis I psychopathology in individuals with traumatic brain injury. *Journal of Head Trauma Rehabilitation*, 13, 24-39.
- Jacobs, H. E. (1988). The Los Angeles head injury survey: Procedures and initial findings. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 69, 425-431.
- Jennett, B., Snoek, J., Bond, M. R., & Brooks, N. (1981) Disability after severe head injury: observations on the use of the Glasgow Outcome Scale. *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry*, 44, 285-293.
- Jorge, R. E., Fear, N. T., & Wessely, S. (2007). Shell shock and mild traumatic brain injury: A historical review. *The American Journal of Psychiatry*, 164, 1641-1645.
- Jorge, R. E., Robinson, R. G., Moser, D., Tateno, A., Crespo-Facorro, B., & Arndt, S. (2004). Major depression following traumatic brain injury. *Archives of General Psychiatry*, 61, 42-50.
- Jorge, R. E., Robinson, R. G., Starkstein, S. E., Arndt, S. V., Forrester, A. W., & Geisler, F. H. (1993). Secondary mania following traumatic brain injury. *American Journal of Psychiatry*, 150, 916-921.
- Jorge, R. E., Starkstein, S. E., Arndt, S., Moser, D., Crespo-Facorro, B., & Robinson, R. G. (2005). Alcohol misuse and mood disorders following traumatic brain injury. *Archives of General Psychiatry*, 62, 742-749.
- Khatami, S. M., Kalantar Motamed, M. H., Mohebbi, H. A., Tarighi, P., Farzanegan, Gh. R., Rezai, Y., Bakhshandeh, H., Shakiba, M., & Jalali, A. (2003). Epidemiology of trauma in Baqiatallah Hospital: A one-year prospective study. *Journal of Military Medicine*, 5(1), 13-19. (Persian).
- Kim, E., Lauterbach, E. C., Reeve, A., Arciniegas, D. B., Coburn, K. L., Mendez, M. F., Rummans, T. A., & Coffey, E. C. (2007). Neuro-psychiatric complications of traumatic brain injury: A critical review of the literature (A report by the ANPA Committee on Research). *Journal of Neuro-psychiatry and Clinical Neurosciences*, 19, 106-127.
- Koponen, S. (2007). The occurrence of psychiatric disorders in patients with traumatic brain injury. Abstract for poster sessions. *European Psychiatry*, 22, S221-S341.
- Koponen, S., Taiminen, T., Portin, R., Himanen, L., Isoniemi, H., Heinonen, H., Hinkka, S., & Tenovuo, O. (2002). Axis I and II psychiatric disorders after traumatic brain injury: A 30-year follow-up study. *American Journal of Psychiatry*, 159, 1315-1321.
- Langlois, J. A., Rutland-Brown, W., & Wald, M. M. (2006). The epidemiology and impact of traumatic brain injury: A brief overview. *Journal of Head Trauma Rehabilitation*, 21, 375-378.
- Levin, H. S., McCauley, S. R., Josic, C. P., Boake, C., Brown, S. A., Goodman, H. S., Merritt, S. G., & Brundage, S. I. (2005). Predicting depression following mild traumatic brain injury. *Archives of General Psychiatry*, 62, 523-528.
- Mooney, G., & Speed, J. (2001). The association between mild traumatic brain injury and psychiatric conditions. *Brain Injury*, 15, 865-877.
- Murai, T., & Fujimoto, S. (2003). Rapid cycling bipolar disorder after left temporal polar damage. *Brain Injury*, 17, 355-358.
- Noorbala, A. A., Mohammad, K., & Yasamy, M. T. (2001). *A View on mental health in Iran*. Tehran: Iranian Red Crescent Society Publications.

- Ogai, M., Lyo, M., Mori, N., & Takei, N. (2005). A right orbito-frontal region and OCD symptoms: A case report. *Acta Psychiatria Scandinavica*, 111, 74-76.
- Pelegrin-Valero, C. A., Gomez-Hernandez, R., Munoz-Cespedes, J. M., Fernández-Guinea ,S. D., & Tirapu-Ustarroz, J.(2001). Nosologic aspects of personality change due to head trauma. *Revista de Neurologia*, 32, 681-687.
- Rangraz Jeddi, F., & Farzandipour, M. (2002). Epidemiology of trauma in patients hospitalized in Naghavi Hospital, Kashan. *Journal of Kashan University of Medical Sciences (Feyz)*,6(2), 88-93. (Persian)
- Rezaei, S. (2010) *Determining the nature, frequency and predictive factors for the incidence of mental disorders after traumatic brain injury*. Unpublished master's thesis, Guilan University. (Persian)
- Robinson, R. G., Parikh, R. M., Lipsey, J. R., Starkstein, S. E., & Price, T. R. (1993). Pathological laughing and crying following stroke: Validation of a measurement scale and a double-blind treatment study. *American Journal of Psychiatry*, 150, 286- 293.
- Sachdev, P., Smith, J. S., & Cathcart, S. (2001) Schizophrenia-like psychosis following traumatic brain injury: A chart-based descriptive and case-control study. *Psychological Medicine*, 31, 231-239.
- Sadeghi, S. (1998) Epidemiology of trauma patients referred to the Hazrat Ali-Ebn-Abitaleb Hospital in Rafsanjan in 1997. *Journal of Kashan University of Medical Sciences (Feyz)*, 2, 77-82. (Persian).
- Silver, J. M., Kramer, R., Greenwald, S., & Weissman, M. (2001). The association between head injuries and psychiatric disorders: Findings from the New Haven NIMH Epidemiologic Catchment Area Study. *Brain Injury*, 15, 935-945.
- Tagliaferri, F., Compagnone, C., Korsic, M., Servadei, F., & Kraus, J. (2006). A systematic review of brain injury epidemiology in Europe. *Acta Neurochirurgica*, 148, 255-268.
- Tateno, A., Jorge, R. E., & Robinson, R. G. (2003). Clinical correlates of aggressive behavior after traumatic brain injury. *Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience*, 15, 155-160.
- Verma, A., Anand, V., & Verma, N. P. (2007). Sleep disorders in chronic traumatic brain injury. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 3, 357-362.
- Whelan-Goodinson, R., Ponsford, J., Johnston, L., & Grant, F. (2009). Psychiatric disorders following traumatic brain injury: Their nature and frequency. Melbourne, Monash University and the Monash-Epworth Rehabilitation Research Centre. *Journal of Head Trauma Rehabilitation*, 24, 324-332 .
- Yousefzade Chabok, S., Safayi, M., Hemati, H., Mohammadi, H., Ahmadi dafchahi, M., Koochaki nezhad, L., & Shabani, S. (2006). Epidemiology of head injury in patients who were referred to Poorsina Hospital. *Journal of Guilan University of Medical Science*, 64(16), 112-119. (Persian)
- Yousefzadeh Chabok, S., Ahmadi Dafchahi, M., Mohammadi Maleksari, M., Dehnadi Moghadam, A., Hemati, H., & Shabani, S. (2007) Epidemiology of injuries and their causes among Poursina Hospital traumatic injured inpatients. *Behbood, Scientific Quarterly of Kermanshah University of Medical Sciences*, 3(11), 286-295. (Persian)
- Zhang, J. X., Zhai, A. L., & Chen, M. (2006). Study on the correlative factors for mental disorder in patients with head injury. *Chinese Journal of Forensic Medicine*, 21, 24-27.