

مقاله پژوهشی
اصیل
Original Article

اثربخشی درمان شناختی - رفتاری گروهی و مواجهه درمانی بر میزان سوگیری تعبیر و ترس از ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی

دکتر حسین داداشزاده^۱، دکتر رخساره یزداندوست^۲، دکتر بنفشه غرابی^۲، دکتر علی اصغر اصغرnejad فرید^۳

Effectiveness of Cognitive - Behavioral Group Therapy and Exposure Therapy on Interpretation Bias and Fear of Negative Evaluation in Social Anxiety Disorder

Hosein Dadashzadeh*, Rokhsare Yazdandoost ^a, Banafsheh Gharraee ^a, Aliasghar Asgharnejad farid ^b

40
—
40

Abstract

Objectives: The purpose of this study was to compare the effectiveness of cognitive-behavioral group therapy and exposure therapy on the reduction of interpretation bias and fear of negative evaluation in social anxiety disorder.

Method: In a pre-posttest experimental design with control group, 24 students studying at B.Sc. level in the Health School of Iran University of Medical Sciences with the diagnosis of social anxiety disorder were selected by convenience sampling. Then, all of the subjects were randomly allocated into three groups (cognitive-behavioral group therapy, exposure therapy, and waiting list control group). Twelve sessions of cognitive-behavioral group therapy and exposure therapy were carried out according to a standard manual of therapy, and the waiting list control group did not receive any treatment. Data were gathered through administration of Social Phobia Inventory (SPIN), Interpretation Questionnaire- Revised, and Brief Fear of Negative Evaluation Scale (BFNE-S). Univariate analysis of covariance was used for data analysis. **Results:** The cognitive-behavioral group therapy comparing to the exposure therapy ($p<0.01$) and the waiting list control group ($p<0.001$) significantly led to the reduction of interpretation bias in the socially anxious subjects. It was also found that exposure therapy alone did not significantly reduce interpretation bias in the social anxiety patients and showed no difference with the waiting list control group. On the other hand, both cognitive-behavioral group therapy and exposure therapy in comparison with the waiting list control group significantly reduced fear of negative evaluation ($p<0.001$ & $p<0.001$ respectively), but there was no significant difference between these groups themselves. **Conclusion:** Both cognitive- behavioral group therapy and exposure therapy, reduced fear of negative evaluation in social anxiety disorder. On the other hand, the cognitive-behavioral group therapy also reduced interpretation bias, but the exposure therapy could not do so.

Key words: social anxiety disorder; cognitive-behavioral group therapy; exposure therapy; interpretation bias; fear of negative evaluation

[Received: 8 May 2010; Accepted: 22 February 2011]

چکیده

هدف: هدف این پژوهش مقایسه اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری گروهی و مواجهه درمانی در کاهش میزان سوگیری تعبیر و ترس از ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی بود. **روش:** در چارچوب یک طرح تجربی پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه، آزمودنی های پژوهش (24 نفر) دانشجوی دوره کارشناسی در رشته های بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران (درمان شناختی - رفتاری گروهی، مواجهه درمانی و گروه گواه همراه است انتظار) دسترسی انتخاب شده بودند، به تصادف در سه گروه هشت نفری (درمان شناختی - رفتاری گروهی، مواجهه درمانی و گروه گواه همراه است انتظار) جایگزین شدند. درمان شناختی - رفتاری گروهی و مواجهه درمانی به مدت 12 جلسه و بر پایه دستنامه راهنمای استاندارد برای آزمودنی ها اجرا شد و گروه گواه فهرست انتظار هیچ گونه درمانی دریافت نکردند. داده های پژوهش به کمک پرسشنامه هراس اجتماعی، فرم کوتاه پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی و فرم تجدیدنظر شاهد پرسشنامه تعبیر، گردآوری شدند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس یک طرفه بهره گرفته شد. **یافته ها:** درمان شناختی - رفتاری گروهی در مقایسه با گروه گواه ($p<0.001$) و نیز در مقایسه با گروه گواه ($p<0.01$) به طور معنی داری سوگیری تعبیر را در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی کاهش داد. هم چنین مواجهه درمانی به تنهایی تأثیر معنی داری بر کاهش سوگیری تعبیر در اختلال اضطراب اجتماعی و تفاوت معنی داری با گروه گواه نداشت. از سوی دیگر یافته ها نشان دادند که درمان شناختی - رفتاری گروهی و مواجهه درمانی در مقایسه با گروه گواه به طور معنی داری کاهش ترس از ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی را در پی داشته است (به ترتیب $p<0.001$ و $p<0.01$ ، اما تفاوت معنی داری بین این دو روش درمانی دیده نشد). **نتیجه گیری:** درمان شناختی - رفتاری گروهی استاندارد و مواجهه درمانی، هردو کاهش میزان ترس از ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی را در پی دارد. درمان شناختی - رفتاری گروهی میزان سوگیری تعبیر را نیز در این اختلال کاهش می دهد در حالی که مواجهه درمانی چنین اثری ندارد.

کلیدواژه: اختلال اضطراب اجتماعی؛ درمان شناختی - رفتاری گروهی؛ مواجهه درمانی؛ سوگیری تعبیر؛ ترس از ارزیابی منفی

[دریافت مقاله: 1389/2/18؛ پذیرش مقاله: 1389/12/3]

¹ دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تبریز، بلوار شهید باکری (ایل گلکی)، مرکز آموزشی درمانی رازی، گروه روانپردازی. دورنگار: ۰۴۱۱-۳۸۰۳۳۵۱ (نویسنده مسئول) E-mail: hdadashzadeh823@gmail.com

² دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ ³ دکترای تخصصی روانشناسی عمومی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران. *Corresponding author: PhD. in Clinical Psychology, Assistant Prof. of Tabriz University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Ael Goli Ave, Tabriz, Iran, IR. Fax: +98411- 3803351, E-mail: hdadashzadeh823@gmail.com; ^aPh.D. in Clinical Psychology, Assistant Prof. of Tehran University of Medical Sciences; ^b Ph.D. in General Psychology, Assistant Prof. of Tehran University of Medical Sciences, Tehran Institute of Psychiatry, Mental Health Research Center.

مقدمه

اختلال اضطراب اجتماعی افرون برآن که بسیار شایع است (کسلر¹³ و همکاران، 1994؛ کسلر، مک گوناگل¹⁴ و زآو¹⁵، 2005)، اغلب در سال‌های نخست دوران جوانی آغاز می‌شود، به طور چشمگیری در شکل‌گیری طبیعی مهارت‌های سازگاری تأثیرگذار نماید و کاهش اختلال در سازوکارهای مقابله‌ای¹⁶ را در پی دارد (بانگر¹⁷، دیویدسون¹⁸ و لکروپر¹⁹، 1998). اگر مداخله‌های درمانی انجام نشود، این اختلال، دوره طولانی ناتوانی را در پی دارد و فرد مبتلا با مشکلات زیادی در حوزه کارکرد شخصی و اجتماعی رو به رو می‌شود (ریچ²⁰ و هافمن²¹، 2004؛ مونتگمری²²، 1999).

ترس از ارزیابی منفی²³، و نیز سوگیری تعییر²⁴ از جمله عوامل شناختی مهم در اختلال اضطراب اجتماعی هستند. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی باورهای منفی در زمینه سایر افراد و موقعیت‌های اجتماعی دارند و گمان می‌کنند که مردم آن‌ها را منفی ارزیابی خواهند نمود (لیری²⁵، کوالاسکی²⁶ و کمپل²⁷، 1988؛ استوپا²⁸ و کلارک²⁹، 2000). سوگیری تعییر یکی از انواع سوگیری‌ها در پردازش اطلاعات و از جمله موضوعات جالب در رابطه با اختلال‌های اضطرابی، به‌ویژه اختلال اضطراب اجتماعی می‌باشد. هر چند در رابطه با سوگیری تعییر در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بررسی‌های اندکی انجام شده است (استوپا، 1995، به نقل از ولز³⁰ و کلارک، 1997؛ امیر³¹، فو³² و کولز³³، 1998؛ استوپا و کلارک، 2000)، همین بررسی‌ها نشان‌دهنده تأثیر سوگیری احتمالی تعییر در شکل‌گیری و دوام اختلال اضطراب اجتماعی هستند.

بخش بزرگی از الگوهای شناختی - رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی به این مسئله اختصاص دارد که اختلال

هم‌چنان‌که در نسخه تجدیدنظر شده چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی¹ (DSM-IV-TR) آمده است، اختلال اضطراب اجتماعی شامل ترس از آن دسته از موقعیت‌های اجتماعی است که در آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و یا تماس با غریبه‌ها نگرانی فرد را به دنبال دارد. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی می‌ترسند که در موقعیت‌های اجتماعی، مانند بودن در جمع، سخنرانی در حضور دیگران و دیدار با افراد جدید، چهار شرمساری² و حضور دیگران و دیدار با افراد جدید، چهار شرمساری² و خجالت‌زدگی شوند. آن‌ها ممکن است ترس‌های ویژه‌ای در زمینه فعالیت‌های مانند نوشتن، غذاخوردن و سخن‌گفتن در حضور دیگران داشته باشند، یا ممکن است گونه‌ای ترس مبهم و غیراختصاصی در زمینه شرم‌سارشدن داشته باشند (садوک³ و سادوک، 2007).

فرد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی می‌کوشد از موقعیت‌هایی که در آنها ممکن است مورد ارزیابی دیگران قرار گیرد و نشانه‌های اضطراب در او ظاهر شود و یا به روشی رفتار کند که خجالت زده شود، پرهیز کند (دیویسون⁴، نیل⁵ و کرینگ⁶، 2004). ترس‌های مربوط به عرق کردن شدید و سرخ شدن چهره نیز از جمله علایمی هستند که در این افراد زیاد دیده می‌شود. به بیان دیگر هر کاری که در حضور دیگران انجام دهنده، می‌تواند اضطراب شدید و یا حتی یک حمله کامل وحشت‌زدگی⁷ در آنان پدید آورد (دیویسون و همکاران، 2004).

DSM-IV-TR یک ویژگی اختصاصی را برای اختلال اضطراب اجتماعی در نظر گرفته است. بر پایه این راهنمای افرادی که از بسیاری از موقعیت‌های اجتماعی می‌ترسند، مبتلا به نوع منتشر⁸ اختلال اضطراب اجتماعی دانسته شده‌اند (انجمن روانپزشکی آمریکا⁹، 2000). این افراد از آغاز کردن گفتگو در بسیاری از موقعیت‌ها، قرار دیدار گذاشتن با کسی یا شرکت کردن در بسیاری از فعالیت‌های گروهی یا گردهمایی و نیز از گفتگو با اشخاص مهم دچار هراس می‌شوند (садوک و سادوک، 2007). هر چند DSM-IV-TR زیرگروهی به نام نوع غیرمنتشر اختلال اضطراب اجتماعی مشخص نکرده است، بسیاری از پژوهشگران افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی را که ترسیان شامل موقعیت‌های زیاد نمی‌شود، با عنوان اختلال اضطراب اجتماعی غیرمنتشر گروه‌بندی می‌کنند (تورک¹⁰، هیمبرگ¹¹ و هوپ¹²، 2001).

1- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Fourth Edition- Text Revision

2- embarrassment 3- Sadock

4- Davison 5- Neale

6- Krings 7- panic attack

8- generalized

9- American Psychiatric Association

10- Turk 11- Heimberg

12- Hope 13- Kessler

14- Mc Gonagle 15- Zhao

16- coping mechanisms 17- Ballenger

18- Davidson 19- Lecrubier

20- Rich 21- Hofmann

22- Montgomery 23- fear of negative evaluation

24- interpretation bias 25- Leary

26- Kowalski 27- Campbell

28- Stopa 29- Clark

30- Wells 31- Amir

32- Foa 33- Coles

اثر مواجهه‌درمانی، بر کاهش سوگیری تعییر و ترس از ارزیابی منفی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بررسی شده است. در ایران پژوهشی که بخواهد اثربخشی این دو نوع درمان (درمان شناختی-رفتاری گروهی و مواجهه‌درمانی) را در کاهش سوگیری تعییر منفی و ترس از ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی بررسی کند، یافت نشد.

در پژوهش حاضر کوشش شده است که اثر درمان شناختی-رفتاری گروهی و مواجهه‌درمانی در کاهش ترس از ارزیابی منفی و سوگیری تعییر در اختلال اضطراب اجتماعی، بررسی و با هم مقایسه شوند.

روش

فرضیه‌های مطرح شده در پژوهش حاضر در چارچوب یک طرح آزمایشی پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه آزمون شدند. در این پژوهش متغیرهای مستقل، درمان شناختی-رفتاری گروهی و مواجهه‌درمانی بودند که هر دو توسط متخصص روانشناسی بالینی که از همکاران اصلی گروه پژوهش بود، اجرا شدند. متغیرهای وابسته، میزان سوگیری تعییر منفی و میزان ترس از ارزیابی منفی بودند که هر دو از بخش‌های اختلال اضطراب اجتماعی هستند. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی تشکیل می‌دادند که در زمان انجام پژوهش در مقطع کارشناسی رشته‌های بهداشت محیط و بهداشت حرفة‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران تحصیل می‌کردند. حجم نمونه به کمک نرمافزار PS¹⁹ و با در نظر گرفتن $\alpha=0.5$ ، توان آزمون برابر $0/66$ و اندازه‌ی اثر برابر 12 نمره در پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN)،²⁰ انحراف معیار 10 و میانگین 36 نمره در SPIN به تعداد 27 نفر یعنی 9 نفر در هر گروه تعیین گردید.

آزمودنی‌های پژوهش 24 نفر از دانشجویان هر دو جنس مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی در مقطع کارشناسی

اضطراب اجتماعی تا اندازه‌ای پاسخ به ارزیابی منفی دیگران است که توسط فرد مبتلا ادراک می‌شود (رپی¹ و هیمبرگ²، 1997). سازه² ترس از ارزیابی منفی شامل احساس‌های ترس مربوط به ارزیابی‌های دیگران، پریشانی خاطر ناشی از این ارزیابی‌های منفی و انتظار این که دیگران او را منفی ارزیابی خواهند کرد، می‌شود (واتسون³ و فرند⁴، 1996).

در درمان اختلال اضطراب اجتماعی، هم از درمان‌های دارویی و هم از درمان‌های روانشناسی بهره گرفته می‌شود. هرچند بررسی‌های چندی در رابطه با تعیین برتری یکی از این‌ها نسبت به دیگری انجام شده، هنوز یافته‌های باشتابی که بتواند برتری یک روش را بر دیگری نشان دهد به دست نیامده است (تورک و همکاران، 2001؛ رووا⁵ و آتونی⁶، 2005).

درمان‌های شناختی-رفتاری برای اختلال اضطراب اجتماعی مبتنی بر الگوهای گوناگون شناختی در سبب‌شناسی این اختلال هستند و دو روش مواجهه و بازسازی شناختی بیش از سایر روش‌ها از سوی کارشناسان مورد تأکید قرار گرفته‌اند (لیهی⁷ و هالند⁸، 2000؛ تورک و همکاران، 2001؛ کروزیر⁹ و آلدن¹⁰، 2005؛ رووا و آتونی، 2005). این دو روش درمانی یعنی مواجهه و بازسازی شناختی هر کدام به‌نهایی نیز در درمان اختلال اضطراب اجتماعی به کار می‌روند، اما از آنجاکه ترس از ارزیابی منفی و سوگیری تعییر از اجزای شناختی مهم در این اختلال به شمار می‌روند، از سوی دیگر چون بازسازی شناختی یکی از اثرات مهم درمان شناختی-رفتاری استاندارد است (تیلور¹¹، 1996؛ تورک و همکاران، 2001)، پیش‌بینی می‌شود که درمان شناختی-رفتاری در مقایسه با مواجهه‌درمانی، کاهش بیشتر این دو بخش شناختی را در این اختلال در پی داشته باشد.

درمان شناختی-رفتاری گروهی در واقع شکل گروهی درمان شناختی-رفتاری انفرادی است که در یک گروه هشت‌نفره از مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی به طور هفتگی و به مدت دو ساعت اجرا می‌شود. در درمان شناختی-رفتاری گروهی برای اختلال اضطراب اجتماعی، درمان‌گر روش‌های بازسازی شناختی¹² و مواجهه را در هم ادغام می‌کند (تورک و همکاران، 2001؛ هیمبرگ، 2002).

در میان پژوهش‌های انجام‌شده تنها در دو پژوهش تأثیر درمان شناختی-رفتاری در کاهش سوگیری تعییر در اختلال اضطراب اجتماعی سنجیده شده است (ولیسون¹³ و رپی، 2005؛ فرانکلین¹⁴، هوپرت¹⁵، لانگر¹⁶، لیرگ¹⁷ و فوکس¹⁸، 2005). در پژوهش حاضر اثر درمان شناختی-رفتاری گروهی و نیز

1- Rapee	2- construct
3- Watson	4- Friend
5- Rowa	6- Antony
7- Leahy	8- Holland
9- Crozier	10- Alden
11- Taylor	12- cognitive restructuring
13- Wilson	14- Franklin
15- Huppert	16- Langer
17- Leiberg	18- Fox
19- Power and Sample Size Calculation	
20- Social Phobia Inventory	

بالینی و پژوهشی SCID به وسیله فرست²، اسپیتر³ و گیبون⁴ (1997) به نقل از سادوک و سادوک، (2005) برای تشخیص‌های DSM-IV تدوین شد.

با توجه به اینکه SCID-CV یک ابزار کاملاً ساختاریافته نیست و قضاوت بالینی در آن نقش مهمی دارد، پایایی آن بستگی به شرایط انجام آن دارد (فرست و همکاران، 1997، به نقل از بختیاری، 2000). شریفی و همکاران (2004) در بررسی 299 نفر آزمودنی 18 تا 65 ساله، توافق تشخیصی برای بیشتر تشخیص‌های خاص و کل نسخه فارسی SCID-I را متوسط تا خوب (کاپای بالاتر از 0/6) یافتند. توافق کلی (کاپای مجموع) برای کل تشخیص‌های کنونی 0/52 و برای کل تشخیص‌های طول عمر 0/55 بود و بیشتر مصاحبه‌شوندگان و مصاحبه‌کنندگان قابل اجرابودن نسخه فارسی SCID را مطلوب گزارش کردند.

بختیاری (2000) روای⁵ این ابزار را به کمک متخصصان روانشناسی بالینی بررسی و تأیید نمود و پایایی آن را به روش بازآزمایی⁶ با فاصله یک هفته 0/95 گزارش کرد. در این پژوهش مصاحبه بالینی ساختاریافته‌ای که برپایه معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR و مبتنی بر I SCID ساخته شده بود، برای تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی توسط یکی از پژوهشگران (روانشناس بالینی) به کار برده شد. مصاحبه کننده مطابق مصاحبه‌های تشخیصی معمول به موارد تشخیص‌های افتراقی و تشخیص‌های همبود توجه می‌نمود.

پرسش‌نامه هراس اجتماعی (SPIN): این پرسش‌نامه توسط کانور⁷، دیویدسون، چرچیل⁸، شرود⁹ و فو¹⁰ (2000) برای ارزیابی هراس اجتماعی (اختلال اضطراب اجتماعی) ساخته شده است. این ابزار یک مقیاس خودسنجدی¹¹ 17 ماده‌ای است که دارای سه مقیاس فرعی ترس¹² (شش ماده)، پرهیز¹³ (هفت ماده) و ناراحتی فیزیولوژیک¹⁴ (چهار ماده) می‌باشد. SPIN با دارابودن ویژگی‌های باثبات روانسنجی می‌تواند به عنوان یک ابزار معتبر برای سنجش شدت علایم اختلال اضطراب اجتماعی به کار رود و با توجه به این که نسبت به کاهش علایم در طی زمان حساس است، می‌تواند به عنوان

رشته‌های بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران بودند. 86 نفر از دانشجویان به روش تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از پرسش‌نامه هراس اجتماعی (SPIN) غربالگری شدند و افرادی که نمره‌های بالاتر از 20 در SPIN داشتند، به کمک ملاک‌های تشخیصی DSM-IV-TR برای اختلال اضطراب اجتماعی، مصاحبه بالینی شدند. سپس از میان دانشجویان دارای اختلال اضطراب اجتماعی 27 نفر مطابق معیارهای شمول، انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه جای داده شدند (گروه درمان شناختی - رفتاری گروهی، گروه مواجهه‌درمانی، و گروه گواه فهرست انتظار). در پایان، هر کدام از گروه‌های مورد بررسی هشت نفر آزمودنی داشت؛ زیرا دو نفر به دلیل غیبت بیش از اندازه مجاز و یک نفر به دلیل ناقص بودن اطلاعات پرسش‌نامه، از بررسی کنار گذاشته شدند. معیارهای انتخاب آزمودنی‌ها در هر سه گروه آزمایشی و گواه داشتن سن دست کم 18 سال و بالاتر تا سن 40 سال و داشتن ملاک‌های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی (هراس اجتماعی) بر پایه ملاک‌های تشخیصی DSM-IV-TR بود. تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی بایستی تشخیص اصلی و اولیه آنان می‌بود و نه ثانوی بر یک اختلال دیگر. ملاک‌های حذف، مبتلا بودن به یکی از اختلال‌های پسیکوتیک، اختلال دوقطبی و اختلال تجزیه‌ای، ابتلا به هر نوع بیماری پزشکی شدید که مانع از ادامه درمان شود، نمره بالاتر از 29 در پرسش‌نامه افسردگی بک، ابتلا به سوءصرف مواد و ابتلا به اختلال‌های اضطرابی ناشی از شرایط پزشکی عمومی بودند.

برای گردآوری داده‌ها ابزارهای زیر به کار برده شدند: مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال اضطراب اجتماعی بر پایه ملاک‌های تشخیصی DSM-IV-TR: این ابزار برپایه ملاک‌های تشخیصی DSM-IV-TR برای اختلال اضطراب اجتماعی که خود مبتنی بر I SCID¹⁵ می‌باشد، توسط پژوهشگر تهیه شده است.

SCID-I به عنوان ابزاری برای تشخیص‌های DSM-III-R ساخته شده است (سادوک و سادوک، 2005). از نسخه بالینی (SCID-CV) SCID-I برای استاندارد کردن فرآیند سنجش در موقعیت بالینی بهره گرفته می‌شود. این ابزار تنها شامل تشخیص‌هایی از DSM-IV است که در کار بالینی دیده می‌شود و شامل خرده گروه‌ها و اختلال‌ها نمی‌شود. نسخه

- 1- Structured Clinical Interview for DSM-IV axis disorder
- 2- First
- 3- Spiter
- 4- Gibbon
- 5- validity
- 6- test-retest
- 7- Connor
- 8- Churchill
- 9- Sherwood
- 10- self-rating
- 11- fear
- 12- avoidance
- 13- physiological

یک سویه نشان داد که در BFNE-S تفاوت معناداری ($p < 0.001$) میان گروه بیماران اختلال اضطراب اجتماعی و آزمودنی‌های غیر مضطرب گروه گواه وجود دارد. از نظر اعتبار همگر، BFNE-S ضرایب همبستگی معناداری با دیگر مقیاس‌های اضطراب اجتماعی نشان داد. پس از اعمال اصلاح بونفرونی⁸ ($0.0125/4 = 0.003125$) معلوم شد که BFNE-S ضریب همبستگی ۰/۵۶ با مقیاس اختلال اضطراب اجتماعی لیبوویتز⁹ ۰/۳۸ با مقیاس اضطراب تعامل اجتماعی¹⁰ (LSAS) و ۰/۸۰ با مقیاس رفتاری حاضر فرم کوتاه (SIAS) دارد (همان‌جا). در پژوهش حاضر فرم کوتاه پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (BFNE-S) توسط پژوهشگر به فارسی ترجمه و اعتبار محتوایی آن توسط سه نفر از استادان روانشناسی بالی و روانپزشکی تأیید شد. همچنین در این پژوهش پایایی این آزمون به روش بازآزمایی و با فاصله زمانی دو هفته بر روی ۱۵ نفر از دانشجویان دوره کارشناسی برابر با ۰/۹۸ و همسانی درونی آن به روش آلفای کرونباخ و بر روی ۲۴ نفر از دانشجویان دوره کارشناسی برابر با ۰/۸۳ به دست آمد.

فرم تجدیدنظرشده پرسش‌نامه تعبیر¹¹: نسخه اصلی این پرسشنامه در سال ۱۹۸۳ توسط بالتر¹² و متیوز¹³ (۱۹۸۳) برای مقایسه تعبیر رویدادها در دو گروه افراد مبتلا به اختلال اضطرابی و اختلال افسردگی و آزمودنی‌های بهنجار به کار برده شد. امیر و همکاران (۱۹۹۸) نیز برای بررسی سوگیری تعبیر در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی، این پرسشنامه را از نظر محتوایی، شکل و ماده‌ها بازبینی نمودند و فرم نهایی یا تجدیدنظرشده خود را ارائه کردند. فرم تجدیدنظرشده پرسشنامه تعبیر دارای دو نسخه مربوط به خود (۲۲ ماده) و مربوط به دیگران (۲۲ ماده) می‌باشد و هر نسخه نیز خود دارای مقیاس‌های فرعی رویدادها یا سناریوهای اجتماعی مبهم (۱۵ ماده) و سناریوها و رویدادهای غیراجتماعی مبهم (۷ ماده) است. هردو نسخه فرم تجدیدنظرشده پرسشنامه تعبیر دارای همسانی درونی یا

یک ابزار غربالگری و نیز برای آزمودن پاسخ به درمان در اختلال اضطراب اجتماعی و یا تمیزدادن درمان‌های با کارآیی متفاوت به کار گرفته شود (همان‌جا). کانور و همکاران (همان‌جا) پایایی این مقیاس را به روش بازآزمایی در گروه‌های با تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی برابر با ۰/۷۸ تا ۰/۸۹، همسانی درونی یا ضریب آلفای در گروهی از افراد بهنجار را برای کل مقیاس برابر ۰/۹۴ و برای مقیاس‌های فرعی ترس ۰/۸۹، پرهیز ۰/۹۱ و ناراحتی فیزیولوژیک برابر ۰/۸۰ گزارش کردند. روایی همگرا¹ برای کل مقیاس در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی در مقایسه با نمرات مقیاس هراس اجتماعی فرم کوتاه² (BSPS) (دیویدسن و همکاران، ۱۹۹۷) ضرایب همبستگی ۰/۵۷ تا ۰/۸۰ را به دست داد که ضریب‌های همبستگی معنادار و بالایی به شمار می‌رود و روایی همگرای بالای این پرسشنامه را نشان می‌دهد.

در پرسشنامه SPIN، (نقطه برش³ ۱۹ با کارآیی یا دقت تشخیصی ۷۹٪) افراد با اختلال اضطراب اجتماعی و بدون این اختلال را از هم تشخیص می‌دهد. نقطه برش ۱۵ با کارآیی ۷۸٪ و نقطه برش ۱۶ با کارآیی ۸۰٪ آزمودنی‌های با تشخیص هراس اجتماعی را از گروه گواه غیر روانپزشکی یا افراد روانپزشکی غیر از هراس اجتماعی جدا می‌کند (دیویدسن و همکاران، ۱۹۹۷). عبدی (۲۰۰۳) همسانی درونی کل مقیاس را به روش آلفای کرونباخ برابر با ۰/۸۶، پایایی به روش بازآزمایی را ۰/۸۳ و اعتبار محتوایی این پرسشنامه را مورد تأیید سه نفر از استادان روانشناسی گزارش نمود.

فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی⁴ (BFNE-S): فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی دارای ۱۲ ماده پنج گزینه‌ای به روش لیکرت است که در آن گزینه «یک» (به هیچ وجه در مورد من صدق نمی‌کند) و «پنج» (کاملاً در مورد من صدق می‌کند) می‌باشد. (لیری⁵، ۱۹۸۳، به نقل از ویکس و همکاران، ۲۰۰۵). بررسی گروهی از دانشجویان مقطع کارشناسی به کمک این مقیاس نشان داد که این ابزار همبستگی بالایی ($r=0/96$) با فرم اصلی این مقیاس⁶ (FNES) دارد. همچنین روشن شد که همسانی درونی بالایی دارد (آلفای کرونباخ برابر با ۰/۹۰). بررسی پایایی به روش بازآزمایی با فاصله چهار هفته در پژوهش یادشده، ضریب ۰/۷۵ را نشان داد (میلر⁷، ۱۹۹۵). در پژوهش دیگری ویکس و همکاران (۲۰۰۵) همسانی درونی یا آلفای کرونباخ کل مقیاس را ۰/۸۹ گزارش کردند. همچنین تحلیل واریانس

1- convergent validity

2- Brief Social Phobia Scale

3- cut-off point

4- Brief Fear of Negative Evaluation Scale

5- Leary

6- Fear of Negative Evaluation Scale

7- Miller

8- Bonferroni correction

9- Liebowitz Social Anxiety Scale

10- Social Interaction Anxiety Scale

11- Interpretation Questionnaire-R

12- Butler

13- Mathews

هر نشست و کل¹² 12 نشست (تورک و همکاران، 2001) توسط متخصص روانشناسی بالینی (یکی از پژوهشگران) اجرا شد. درمان شناختی-رفتاری گروهی بر پایه دست‌نامه راهنمای درمان که با برداشت از درمان شناختی-رفتاری گروهی هیمبرگ (تورک و همکاران، 2001) نوشته شده است، اجرا شد. این راهنمای انگلیسی به فارسی برگردانده شد، سپس به صورت یک کتاب راهنمای گام‌به‌گام، مبنای کار در درمان شناختی-رفتاری گروهی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی قرار گرفت. برای آزمودنی‌های گروه مواجهه‌درمانی، درمان به صورت گروهی، یک روز در هفته، به مدت دو ساعت در هر نشست و کل¹² 12 نشست، بر پایه دست‌نامه راهنمای درمان (لیهی و هالند، 2000) توسط روانشناس بالینی که درمان شناختی-رفتاری گروهی را اداره می‌کرد، اجرا شد. برای رعایت نکات اخلاقی، به افراد گروه فهرست انتظار گفته شد که باید برای مدتی (نژدیک سه ماه) برای شرکت در نشست‌های درمانی منتظر بمانند. بر پایه کارهای انجام شده پیشین (تورک و همکاران، 2001)، در فرآیند درمان تا دو جلسه غیبت برای آزمودنی‌ها مجاز شمرده می‌شد و با سه جلسه غیبت، آزمودنی از بررسی کنار گذاشته می‌شد.

پس از انجام 12 نشست درمان شناختی-رفتاری گروهی و مواجهه‌درمانی، دوباره همه آزمودنی‌های پژوهش (افراد گروه‌های آزمایشی و گروه گواه) از نظر متغیرهای وابسته بررسی شدند. به این ترتیب پرسش‌نامه‌های مربوطه، به عنوان پس آزمون با همه آزمودنی‌ها اجرا شد. در پایان مداخله درمانی به دلیل غیبت بیش از اندازه و حذف سه نفر، هشت نفر در هر گروه باقی ماندند. داده‌های به دست آمده از پیش آزمون و پس آزمون به کمک روش‌های آمار توصیفی، روش‌های پارامتریک و تحلیل کوواریانس⁹ (ANCOVA) یک‌سویه و بهره‌گیری از نرم‌افزار رایانه‌ای SPSS-15¹⁰ تحلیل شدند.

هر چند آزمودنی‌ها به شیوه تصادفی در گروه‌ها جای داده شدند، برای اطمینان بیشتر و برای کنترل آماری متغیرهای ییگانه و حذف پراش¹¹ ناشی از آنها (هومن، 2006)،

ضریب آلفای بالایی هستند. در نسخه مربوط به خود، ضریب آلفا برابر $\alpha=0/85$ و در نسخه مربوط به دیگران ضریب آلفا برابر $\alpha=0/88$ به دست آمد (امیر و همکاران، 1998). در پژوهش عبدی (2003) همسانی درونی هر دو نسخه مربوط به خود و مربوط به دیگران به کمک روش آلفای کرونباخ به ترتیب $\alpha=0/79$ و $\alpha=0/83$ بگزارش شده است. این پرسش‌نامه یک روش معتبر بوم‌شناختی برای بررسی سوگیری تعییر در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی می‌باشد (امیر و همکاران، 1998). در پژوهش حاضر نسخه «مربوط به خود» این پرسش‌نامه به کار برده شده است.

پرسش‌نامه افسردگی بک-نسخه 2¹² (BDI-II): پرسش‌نامه افسردگی بک به عنوان یک ابزار خودگزارشی برای سنجش شناخت‌های وابسته به افسردگی کاربرد گسترده‌ای داشته است. بیست و یک عبارت موجود در این پرسش‌نامه با بررسی نگرش‌ها و نشانه‌های نوعی بیماران افسرده به دست آمده است (بک، وارد²، مندلسون³، ماک⁴ و ارباف⁵، 1961، به نقل از گرات-مارنات⁶، 2003). این عبارت‌ها هر یک بر حسب شدت وضعیت گزارش شده توسط بیمار، از صفر تا سه نمره گذاری می‌شوند. نمره‌های صفر تا نه گویای کمترین میزان افسردگی یا عادی بودن می‌باشد. نمره‌های 10 تا 16 افسردگی خفیف، 17 تا 29 افسردگی متوسط، و 30 تا 63 افسردگی شدید را نشان می‌دهند (بک و استیر⁷، 1993). نسخه بازنگری شده این پرسش‌نامه (BDI-II) در مقایسه با نسخه اول، بیشتر با نظام DSM-IV هم خوان است و همه عناصر افسردگی بر پایه نظریه شناختی را نیز پوشش می‌دهد (استیر، کلارک، بک و رانیر⁸، 1999). بک، استیر و رانیر، (1996) نشان دادند که نسخه دوم نیز همانند نسخه اول وجود و شدت علایم افسردگی را در بیماران و جمعیت بهنجار نشان می‌دهد. آنها ضریب همسانی درونی این نسخه (BDI-II) را در بیماران سرپایی روانپزشکی برابر 0/91 گزارش کردند. فتنی (2003) با اجرای این پرسش‌نامه بر روی یک نمونه 94 نفری ایرانی، ضریب آلفا را 0/91 گزارش کرده است. غرایی (2003) با اجرای آن بر روی 30 دانش‌آموز دختر و پسر با فاصله دوهفته ضریب پایایی آن را 0/81 گزارش نمود.

برای آزمودنی‌های گروه درمان شناختی-رفتاری گروهی که در آغاز نه نفر بودند، درمان شناختی-رفتاری گروهی هیمبرگ به صورت یک‌روز در هفته و به مدت دو ساعت در

- 1- Beck Depression Inventory- II
- 2- Ward
- 3- Mendelson
- 4- Mock
- 5- Erbaugh
- 6- Groth- Marnat
- 7- Steer
- 8- Ranier
- 9- analysis of covariance
- 10- Statistical Package for Social Sciences-15
- 11- variation

اضطراب اجتماعی را در پی دارد، نتایج نشان دادند که بین نمرات پس آزمون این پرسشنامه در سه گروه از آزمودنی‌ها تفاوت معنی‌داری وجود دارد ($F=13/71$, $df=2$, $p<0/001$). برای مشخص کردن این که تفاوت معنی‌دار، بین کدام‌یک از گروه‌ها وجود دارد، به کمک تحلیل کوواریانس، مقایسه‌های دوتایی بین گروه‌های مورد بررسی انجام شد و برای کاهش احتمال خطای نوع اول در مقایسه‌های دو گروهی از اصلاح بونفرونی بهره‌گرفته شد. نتایج این تحلیل‌ها در جدول 3 آمده است.

نتایج تحلیل‌های تعقیبی نشان داد که درمان شناختی- رفتاری گروهی به طور معنی‌داری بهتر از مواجهه‌درمانی ($p<0/01$) و گروه گواه فهرست انتظار ($p<0/001$) عمل می‌کند و هم‌چنین در مقایسه با گروه گواه به طور معنی‌داری کاهش بیشتر سوگیری تعییر را در پی دارد. در ارتباط با این فرضیه که درمان شناختی- رفتاری گروهی در مقایسه با مواجهه‌درمانی و گروه گواه، کاهش ترس از ارزیابی منفی دیگران در اختلال اضطراب اجتماعی را به دنبال دارد، نتایج نشان دادند که بین نمرات پس آزمون این پرسشنامه در سه گروه از آزمودنی‌ها تفاوت معنی‌دار است ($F=11/13$, $df=2$, $p<0/001$). برای مشخص شدن این که تفاوت معنی‌دار بین کدام‌یک از گروه‌ها وجود دارد، مقایسه‌های دوتایی میان گروه‌های مورد بررسی انجام شد و برای کاهش احتمال ارتکاب به خطا ای نوع اول در مقایسه‌های دو گروهی از اصلاح بونفرونی استفاده شد. نتایج این تحلیل‌ها در جدول 4 آمده است.

بهره‌گیری از تحلیل کوواریانس مناسب تشخیص داده شد. از آن‌جا که در پژوهش حاضر تحلیل کوواریانس به کار برده شده است، برای مقایسه‌های دوتایی نیز به جای آزمون χ^2 ، از تحلیل کوواریانس بهره گرفته شد. هم‌چنین مقایسه‌های دو گروهی مربوط به تحلیل‌های تعقیبی¹، نیز با تحلیل کوواریانس انجام شد. برای کاهش احتمال ارتکاب به خطا نوع اول، از اصلاح بونفرونی برای آلفا استفاده شد (استیونس², 2003؛ سرمد، 2005).

یافته‌ها

آزمودنی‌ها از نظر دامنه سنی و میزان تحصیلات یکسان بودند و در زمان انجام پژوهش در مقطع کارشناسی رشته‌های بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران تحصیل می‌کردند. در پایان پژوهش، نُفر از آزمودنی‌ها تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی منتشر و 15 نفر غیرمنتشر داشتند و توزیع آن‌ها در سه گروه مورد بررسی یکسان بود. از نظر وجود تشخیص‌های همراه، هیچ‌یک از آزمودنی‌ها اختلال همبود در محور یک نداشتند و در محور دو تنها یک نفر از آنها اختلال شخصیت اجتنابی نیز داشت. برخی ویژگی‌های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها در جدول 1 آمده است.

میانگین و انحراف معیار نمره‌های سه گروه مورد بررسی در پیش‌آزمون و پس آزمون در جدول 2 نشان داده شده است. در ارتباط با یکی از فرضیه‌های پژوهش مبنی بر این که درمان شناختی- رفتاری گروهی در مقایسه با مواجهه‌درمانی و گروه گواه فهرست انتظار کاهش سوگیری تعییر در اختلال

جدول 1- ویژگی‌های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها در سه گروه مورد بررسی ($N=24$)

سن	جنس		گروه‌ها
	مرد	زن	
	میانگین (انحراف معیار)	فراوانی (درصد)	
(2) 22/5	(50) 4	(50) 4	درمان شناختی- رفتاری گروهی
(0/51) 21/62	(37/5) 3	(62/5) 5	مواجهه‌درمانی
(1/64) 22/87	(37/5) 3	(62/5) 5	گروه گواه فهرست انتظار
(1/51) 22/33	(41/66) 10	(58/33) 14	کل

جدول 2- میانگین و انحراف معیار نمره‌های گروه‌ها در پیش‌آزمون و پس‌آزمون ابزارهای اندازه‌گیری

کنترل	مواجهه‌درمانی	درمان شناختی - رفتاری گروهی		
		میانگین (انحراف معیار)	میانگین (انحراف معیار)	میانگین (انحراف معیار)
(10/44) 35	(13/80) 35/25	(8/39) 36/25	پیش‌آزمون	SPIN
(11/08) 33/62	(12/20) 17/25	(6/92) 18/62	پس‌آزمون	
(6/01) 26/75	(6/71) 26	(4/06) 27	پیش‌آزمون	Interpretation Q-R
(6/30) 26/5	(6/39) 22/5	(2/06) 17/62	پس‌آزمون	
(11/86) 37/37	(12/81) 37/37	(10/14) 36/37	پیش‌آزمون	BFNE-S
(12/15) 35/5	(10/24) 26/12	(5/19) 22/12	پس‌آزمون	

SPIN: پرسشنامه هراس اجتماعی؛ Q-R: فرم تجدیدنظرشده پرسشنامه تعییر؛ BFNE-S: فرم کوتاه پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی

رفتاری گروهی و مواجهه‌درمانی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (جدول 4). نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی نشان داد که بین نمره‌های پس‌آزمون این پرسشنامه در دو گروه مواجهه‌درمانی و گواه تفاوت معنی‌داری وجود دارد ($p < 0.002$) (جدول 4). این یافته نشان می‌دهد که مواجهه‌درمانی در مقایسه با گروه گواه به طور معنی‌داری کاهش ترس از ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی را در پی دارد.

نتایج نشان دادند که بین نمره‌های پس‌آزمون پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی در دو گروه درمان شناختی - رفتاری گروهی و گواه تفاوت معنی‌داری وجود دارد (جدول 4) و بخشی از این فرضیه که درمان شناختی - رفتاری گروهی در مقایسه با گروه گواه به کاهش ترس از ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی می‌انجامد، در سطح معنی‌داری $p < 0.001$ تأیید شد.

همچنین نتایج نشان دادند که بین نمره‌های پس‌آزمون پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی در دو گروه درمان شناختی -

جدول 3- نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس‌آزمون پرسشنامه تعییر به صورت مقایسه‌های دوتایی بین گروه‌های مورد بررسی

سطح معنی‌داری	F	df	منبع تغییرات	گروه‌های مورد مقایسه
0/001	32/83	1	عامل بین گروهی	گروه درمان شناختی - رفتاری و گروه گواه
0/01	8/43	1	عامل بین گروهی	گروه درمان شناختی - رفتاری و گروه مواجهه‌درمانی
0/07	3/84	1	عامل بین گروهی	گروه مواجهه‌درمانی و گروه گواه

جدول 4- نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس‌آزمون پرسشنامه‌ی ترس از ارزیابی منفی به صورت مقایسه‌های دوتایی بین گروه‌های مورد بررسی

سطح معنی‌داری	F	df	منبع تغییرات	گروه‌های مورد مقایسه
0/001	20/81	1	عامل بین گروهی	گروه درمان شناختی - رفتاری و گروه گواه
0/25	1/46	1	عامل بین گروهی	گروه درمان شناختی - رفتاری و گروه مواجهه‌درمانی
0/002	14/51	1	عامل بین گروهی	گروه مواجهه‌درمانی و گروه گواه

بحث

واقعیت که درمان شناختی - رفتاری در مقایسه با مواجهه‌درمانی به تنهایی اثرات شناختی بیشتری دارد، قابل توجیه است. تأییدشدن این فرضیه که درمان شناختی - رفتاری گروهی در مقایسه با مواجهه‌درمانی به کاهش بیشتر سوگیری تعییر می‌انجامد، می‌تواند دلیلی برگستره‌بودن درمان‌های شناختی - رفتاری استاندارد باشد.

یکی از یافته‌های این پژوهش تأیید این فرضیه است که «درمان شناختی - رفتاری گروهی در مقایسه با گروه گواه کاهش ترس از ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی را در پی دارد». این بخش از یافته‌های پژوهش هم‌سو با یافته‌های گاستون³، ابات⁴، رپی و نیری⁵ (2006) و اتو⁶، پولاك⁷، گولد، وورستون⁸ و مک‌آردل⁹ (2000) می‌باشد که در پژوهش خود ترس از ارزیابی منفی را به عنوان یکی از متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار داده‌اند. البته کاهش ترس از ارزیابی منفی به دنبال درمان‌های رفتاری و شناختی تغییری است که رخداد آن پیش‌بینی می‌شود، زیرا ترس از ارزیابی منفی یکی از مؤلفه‌های اصلی اختلال اضطراب اجتماعی است و گفته می‌شود که اختلال اضطراب اجتماعی تا اندازه‌ای گونه‌ای پاسخ به ارزیابی منفی توسط دیگران است که فرد مبتلا آن را در ک می‌کند (رپی و هیمبرگ، 1997). سازه چشم داشت‌ها، داوری‌های اجتماعی منفی و رفتارهای شرم‌آور است و بنابراین کاهش آن در روند درمان می‌تواند یکی از نشانگرهای خوب برای میزان بهبود فرد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی باشد (کولیز¹⁰، وسترا¹¹، دوزویس¹² و استوارت¹³، 2005؛ ویکس و همکاران، 2005) و در پژوهش حاضر کاهش چشم‌گیر و معنی‌دار آن می‌تواند دلیل دیگری بر مؤثربودن درمان شناختی - رفتاری گروهی به شمار رود.

فرضیه دیگر این پژوهش «درمان شناختی - رفتاری گروهی در مقایسه با مواجهه‌درمانی کاهش بیشتر ترس از ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی را در پی دارد»، تأیید نشد. یعنی هر چند درمان شناختی - رفتاری گروهی و مواجهه‌درمانی در مقایسه با گروه گواه فهرست انتظار به طور

با نگاهی به میانگین و انحراف معیار نمره‌های گروه‌ها در پیش‌آزمون و پس‌آزمون متغیرهای وابسته می‌توان تصویر نسبتاً روشنی از وضعیت گروه‌ها در مرحله پیش از مداخله درمانی و پس از آن به دست آورد.

یکی از فرضیه‌های پژوهش حاضر گویای این بود که درمان شناختی - رفتاری گروهی در مقایسه با گروه گواه به طور معنی‌داری به کاهش سوگیری تعییر در اختلال اضطراب اجتماعی می‌انجامد و این فرضیه تأیید شد. سوگیری تعییر یکی از انواع سوگیری‌ها در پردازش اطلاعات است و کارشناسان علوم رفتاری سال‌هاست که به‌اهتمام آن به عنوان یک بخش مهم شناختی در تداوم اختلال اضطراب اجتماعی پی برده‌اند (کلارک و ولز، 1995، به نقل از ولز و کلارک، 1997؛ امیر، فوآ و کولز، 1998؛ استوپا و کلارک، 2000؛ هیرش¹ و کلارک، 2004). این یافته پژوهش هم‌سو با یافته‌های ویلسون² و رپی (2005) و فرانکلین و همکاران (2005) است. این پژوهش‌ها نیز نشان دادند که درمان شناختی - رفتاری از میزان سوگیری تعییر منفی در بیماران اختلال اضطراب اجتماعی می‌کاهد. کاهش سوگیری تعییر منفی به دنبال درمان شناختی - رفتاری که یکی از یافته‌های این پژوهش است، می‌تواند بیانگر اهمیت دستکاری این بخش شناختی در درمان اختلال اضطراب اجتماعی باشد. هر چند این کار در جریان درمان شناختی - رفتاری به‌طور غیرمستقیم انجام می‌شود، می‌توان در نشست‌های درمانی آن را به‌طور مستقیم تری در نظر داشت.

1- Hirsch
3- Gaston
5- Neary
7- Pollack
9- Mc Ardele
11- Westra
13- Stewart

2- Wilson
4- Abbott
6- Otto
8- Worthinton
10- Collins
12- Dozois

یک یافته جالب و قابل پیش‌بینی در پژوهش حاضر کاهش معنی‌دار سوگیری تعییر، به دنبال درمان شناختی - رفتاری است. هر چند مواجهه‌درمانی در کاهش شدت کلی اختلال اضطراب اجتماعی با درمان شناختی - رفتاری استاندارد برابر می‌کند (داداشزاده، یزداندوست، غرایی و اصغرثزاد، 2009)، وقتی نتایج درمان از لحاظ کاهش سوگیری تعییر منفی با هم مقایسه می‌شوند، درمان شناختی - رفتاری سودمندی بیشتری نشان می‌دهد. در پژوهش حاضر درمان شناختی - رفتاری گروهی در مقایسه با گروه گواه به‌طور معنی‌داری کاهش بیشتر سوگیری را در پی داشت و در مقایسه با مواجهه‌درمانی نیز به‌طور معنی‌داری به کاهش بیشتر سوگیری تعییر انجامید. اما مواجهه‌درمانی چنین نبود و تفاوت معنی‌داری با گروه گواه نداشت. این یافته با درنظرگرفتن این

منابع

- Abdi, R. (2003). *Interpretation bias in individuals with social anxiety disorder*. Clinical Psychology MA degree thesis, Tehran Psychiatric Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Persian).
- American Psychiatric Association (2000). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th ed., text revision). Washington, DC: APA.
- Amir, N., Foa, E. B., & Coles, M. E. (1998). Negative interpretation bias in social phobia. *Behaviour Research and Therapy*, 36, 945-957.
- Bakhtiari, M. (2000). *Mental disorders in patients with body dysmorphic disorder*. Clinical Psychology MA degree thesis, Tehran Psychiatric Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Persian).
- Ballenger, J. C., Davidson, J. R., & Lecrubier, Y. (1998). Consensus statement on social anxiety disorder from the international consensus group on depression and anxiety. *Journal of Clinical Psychiatry*, 59, 54-60.
- Beck, A. T. (1967). *Depression: Clinical, experimental, and theoretical aspects*. New York: Harper & Row.
- Beck, A. T., & Steer, R. A. (1993). *Beck depression inventory manual*. San Antonio, TX: Psychological Corporation.
- Beck, A. T., Steer, R. A., & Ranier, W. F. (1996). Comparison of Beck Depression Inventories -IA and -II in psychiatric outpatients. *Journal of Personality Assessment*, 67, 588-597.
- Butler, G., & Mathews, A. (1983). Cognitive processes in anxiety. *Advances in Behavior Research and Therapy*, 5, 51-62.
- Collins, K., Westra, H. A., Dozois, D. J., & Stewart, S. H. (2005). The validity of the brief version of the Fear of Negative Evaluation Scale. *Journal of Anxiety Disorders*, 19, 345-359.
- Connor, K. M., Davidson, J. R. T., Churchil, L. R., Sherwood, A., Foa, E., & Weisler, R. H. (2000). Psychometric properties of the Social Phobia Inventory (SPIN): New self-rating scale. *British Journal of Psychiatry*, 176, 379-386.
- Crozier, W. R., & Alden, L. E. (2005). *The essential handbook of social anxiety for clinicians*. New York: John Wiley & Sons Ltd.

معنی داری به کاهش ترس از ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی انجامید، در مقایسه با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند. از آن جا که ترس از ارزیابی منفی و نیز سوگیری تغییر شرایطی هستند که دارای بخش های شناختی زیادی می باشند (بک، 1967)، پیش بینی می شود که درمان شناختی - رفتاری در مقایسه با مواجهه درمانی تغییرات بیشتری را به دنبال داشته باشد. چنین چشم داشتی در این پژوهش تنها در زمینه سوگیری تغییر، محقق شد و نتایج نشان دادند که درمان شناختی - رفتاری گروهی در مقایسه با مواجهه درمانی به طور معنی داری بهتر عمل می کند. در توجیه یافته های این پژوهش در زمینه ترس از ارزیابی منفی می توان به نبود پسگیری در پژوهش حاضر اشاره نمود. اگر یافته های به دست آمده برای مدتی (برای نمونه شش ماه) پسگیری می شد، شاید تفاوت های مفروض بین دو روش درمانی خود را نشان می دادند.

به طور کلی، یافته های این پژوهش نشان دادند که در درمان اختلال اضطراب اجتماعی، هر دو روش درمان شناختی - رفتاری گروهی استاندارد (هیمبرگ) و مواجهه درمانی گرینه های خوبی هستند و از نظر اثربخشی بر کاهش شدت دو عامل مهم در اختلال اضطراب اجتماعی تفاوت معنی داری با شرایط عدم درمان (گروه گواه فهرست انتظار) دارند، اما از آن جا که درمان شناختی - رفتاری در مقایسه با مواجهه درمانی اثربخشی بیشتری بر کاهش سوگیری تغییر منفی دارد، به عنوان یک پرتوکل درمانی استاندارد نسبت به مواجهه درمانی به تنهایی، برتری دارد.

یکی از محدودیت های این پژوهش اجرای نشست های درمانی توسط یک نفر بود در حالی که تورک و همکاران (2001) برای جلوگیری از خستگی زیاد درمانگر پیشنهاد نمودند که درمانگر و کمک درمانگر اداره نشست های درمانی را بر عهده گیرند. از آن جا که نمونه مورد بررسی، دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بودند، لازم است تعمیم یافته ها به مراجعه کنندگان به درمانگاه ها و مراکز بهداشت روان با احتیاط انجام شود. احتمال سوگیری در داوری درمانگر که خود ارزیابی هم می نمود، در پژوهش های مداخله ای برابر صفر نیست، هر چند که در جریان اجرای پژوهش کوشش شد که این اثر به کمترین میزان برسد. [با] به اظهار نویسنده مسئول مقاله، حمایت مالی از پژوهش و تعارض منافع وجود نداشته است.]

- Dadashzadeh, H., Yazdandoost, R., Gharaee, B., & Asgharnejad, A. A. (2009). Comparison of effectiveness of cognitive-behavioral group therapy and exposure therapy in social anxiety disorder. *Journal of Psychology (Tabriz University)*, 15, 103-131. (Persian).
- Davidson, J. R. T., Miner, C. M., De Veau-Geiss, J., Tupler, L. A., Colket, J. T., & Potts, N. L. S. (1997). The Brief Social Phobia Scale: A psychometric evaluation. *Psychological Medicine*, 27, 161-166.
- Davison, G. C., Neale, J. M., & Kring, A. M. (2004). *Abnormal psychology* (9th ed.). New York: John Wiley and Sons.
- Fata, L. (2003). *Meaning assessment structures/schemas, emotional states and cognitive processing of emotional information: Comparison of two conceptual frameworks*. Clinical Psychology Ph.D. dissertation, Tehran Psychiatric Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Persian)
- Franklin, M. E., Huppert, J., Langer, R., Leiberg, S., & Fox, E. B. (2005). Interpretation bias: A comparison of treated social phobics, untreated social phobics and controls. *Cognitive Therapy and Research*, 29, 289-300.
- Garaie, B. (2003). *Conditions of identity and its relationship with identity styles and depression in Tehran adolescents*. Clinical Psychology Ph.D. dissertation, Tehran Psychiatric Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Persian)
- Gaston, J. E., Abbott, M. J., Rapee, R. M., & Neary, S. A. (2006). Do empirically supported treatment generalize to private practice? A benchmark study of a cognitive-behavioural group treatment programme for social phobia. *British Journal of Clinical Psychology*, 45, 33-48.
- Groth-Marnat, G. (2003). *Handbook of psychological assessment* (4th ed.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Heimberg, R. G. (2002). Cognitive-behavioral therapy for social anxiety disorder: Current status and future directions. *Biological Psychiatry*, 51, 101-108.
- Hooman, H. A. (2006). *Research methodology in behavioral sciences*. Tehran: Peyke Farhang Press. (Persian)
- Kessler, R. C., Mc Gonagle, K. A., & Zhao, S. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the national comorbidity survey replication. *Archives of General Psychiatry*, 62, 593-602.
- Kessler, R. C., Mc Gonagle, K. A., Zhao, S., Nelson, C. B., Hughes, M., Eshleman, S., Wittchen, H. U., & Kendler, K. S. (1994). Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States. *Archives of General Psychiatry*, 51, 8-19.
- Leahy, R. L., & Holland, S. J. (2000). *Treatment plans and interventions for depression and anxiety disorders*. New York: Guilford Press.
- Leary, M. R., Kowalski, R. M., & Campbell, C. (1988). Self-presentational concerns and social anxiety: The role of generalized impression expectancies. *Journal of Research in Personality*, 22, 308-321.
- Miller, R. S. (1995). On the nature of embarrassability: Shyness, social evaluation, and social skill. *Journal of Personality*, 63, 315-339.
- Montgomery, S. A. (1999). Social phobia: Diagnosis, severity and implications for treatment. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 249, 51-56.
- Otto, M. W., Pollack, M. H., Gould, R. A., Worthinton, J. J., McArdele, E. T., & Rosenbaum, J. F. (2000). A comparison of the efficacy of clonazepam and cognitive-behavioral group therapy for the treatment of social phobia. *Journal of Anxiety Disorders*, 14, 345-358.
- Rapee, R. M., & Heimberg, R. G. (1997). A cognitive-behavioral model of anxiety in social phobia. *Journal of Behaviour Research and Therapy*, 35, 741-756.
- Reich, J., & Hofmann, S. G. (2004). State personality disorder in social phobia. *Annals of Clinical Psychiatry*, 160, 139-144.
- Rowa, K., & Antony, M. M. (2005). Psychological treatments for social phobia. *Canadian Journal of Psychiatry*, 50, 308-316.
- Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2005). *Comprehensive textbook of psychiatry* (8th ed.). Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins.
- Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2007). *Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry*, (10th ed.). Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins.
- Sarmad, Z. (2005). *Inferential statistics: Selected topics in*

- univariate analyses.* Tehran: Samt. (Persian)
- Sharifi, V., Asaadi, S. M., Amini, H., Kavyani, H., Semnani, Y., Shabani, A., Shahrivar, Z., Davari Ashtyani, R., Hakim-shoushtari, M., Seddig, A., & Jalali Roudsari, M. (2004). Reliability and applicability of Persian version of Structured Clinical Interview for DSM Disorders (SCID). *Journal of Contemporary Neuroscience*, 6, 10-22.
- Steer, R. A., Clark, D. A., Beck, A. T., & Renier, W. F. (1999). Common and specific dimensions of self-reported anxiety and depression: The BDI-II versus the BDI-I. *Behavior Research and Therapy*, 37, 189-191.
- Stevens, J. (2003). *Applied multivariate statistics for social sciences (4th ed.)*. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Stopa, L., & Clark, D. M. (2000). Social phobia and interpretation of social events. *Behavior Research and Therapy*, 38, 273-283.
- Taylor, S. (1996). Meta-analysis of cognitive-behavioral treatments for social phobia. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 27, 1-9.
- Turk, C. L., Heimberg, R. G., & Hope, D. A. (2001). Social anxiety disorder. In: H. D. Barlow (Ed.). *Clinical handbook of psychological disorder: A step-by-step treatment* (3rd.ed.). New York: Guilford Press.
- Watson, D., & Friend, R. (1969). Measurement of social-evaluative anxiety. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 33, 448-457.
- Weeks, J. W., Heimberg, R. G., Fresco, D. M., Hart, T. A., Turk, C. L., Schneier, F. R., & Liebowitz, M. R. (2005). Empirical validation and psychometric evaluation of the brief fear of negative evaluation scale in patients with social anxiety disorder. *Psychological Assessment*, 17, 179-190.
- Wells, A., & Clark, D. M. (1997). Social phobia: A cognitive approach. In G. L. Davey (Ed.). *Phobias: A handbook of description, treatment and theory*. Chichester, Sussex: Wiley.
- Wilson, J. K., & Rapee, R. M. (2005). The interpretation of negative social events in social phobia: Changes during treatment and relationship to outcome. *Behavior Research and Therapy*, 43, 373-389.