

بررسی میزان موفقیت حاملگی در دو روش نزدیکی زمان بندی شده و تلقیح داخل رحمی اسپرم در بیماران مبتلا به آمنوره هایپوتالامیک مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ناباروری ولیعصر

طاهره افتخار (M.D)^۱، شیرین قاضیزاده (M.D)^۲، لدن کاشانی (M.D)^۳، مریم باقری (B.Sc.)^۴.

۱- استادیار، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران.

۲- دانشیار، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران.

۳- دستیار، گروه زنان و زایمان، بیمارستان ولیعصر، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران.

۴- کارشناس، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: آمنوره هایپوتالامیک یکی از شایع‌ترین اشکال عدم تخمک‌گذاری است که در آن کمبود ترشح ضربانی GnRH دیده می‌شود. در صورت رد عل تخدانی و هیپوفیزی عدم تخمک‌گذاری این تشخیص مطرح می‌شود. شایع‌ترین نوع آن سرکوب عملکرد تولید مثل است که اغلب نوعی پاسخ روانی-زیست‌شناختی به حوادث زندگی است و آمنوره هایپوتالامیک عملکردی نامیده می‌شود. بیماران مبتلا به آمنوره هایپوتالامیک که خواهان حاملگی هستند باید تحت تحریک تخمک‌گذاری توسط گونادوتروپین‌های اگزوژن و یا GnRH قرار گیرند. GnRH به طور مداوم و به شکل ضربانی توسط یک پمپ کوچک قابل حمل به دو روش داخل‌وریدی و زیرجلدی تجویز می‌شود. بسیاری از بیماران آن را نامناسب می‌دانند زیرا مجبور هستند در زمان خواب نیز آن را همراه داشته باشند. متأسفانه در ایران پمپ تجویز GnRH در دسترس نیست و بنابراین جهت القاء تخمک‌گذاری از گونادوتروپین اگزوژن استفاده می‌شود. پس از تحریک تخمک‌گذاری، بیماران یا توصیه به نزدیکی زمان‌بندی شده (TI) و تلقیح داخل رحمی اسپرم (IUI) می‌شوند و یا تحت لاقاح آزمایشگاهی (IVF) و حتی ترزیق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI) قرار می‌گیرند. TI روشنی آسان و کم هزینه‌تر نسبت به IUI و IVF است. هدف از این مطالعه مقایسه میزان موفقیت حاملگی در دو روش IUI و TI می‌باشد.

روش بررسی: این مطالعه به صورت گذشته‌نگر روی ۳۶ بیمار مبتلا به آمنوره هایپوتالامیک مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ناباروری بیمارستان ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی تهران در فاصله فروردین ۱۳۷۸ لغایت بهمن ۱۳۸۳ انجام شد. این افراد بر اساس معیارهای ورود و خروج، در مطالعه شرکت نمودند. افراد پس از تحریک تخمک‌گذاری، توسط یکی از دو پروتکل درمانی IUI و TI تحت درمان قرار گرفتند و سپس از نظر میزان موفقیت حاملگی با هم مقایسه گردیدند. از جمله معیارهای ورود، سن بین ۴۰-۲۰ سال و اسپرم‌وگرام طبیعی بود. پروندهایی که در آن علت ناباروری، عامل مردانه ذکر شده بود، آنومالی رحمی همزنان و یا انسداد لوله رحمی وجود داشت، از این مطالعه خارج شدند. روش‌های آماری این مطالعه

روش Fisher's Exact test و Unpaired Student t- test و SPSS و نرم افزار مورد استفاده (10.5) P<0.05 در نظر گرفته شد.

نتایج: در گروه TI از ۲۷ سیکل، ۱۹ مورد حاملگی (۷۰/۳۷٪) و در گروه IUI از ۲۹ سیکل، ۷ مورد حاملگی (۲۴/۱۳٪) اتفاق افتاده است که اختلاف بین این دو روش درمانی معنی دار است ($p=0.05$). از نظر تعداد سقط، حاملگی خارج رحمی و چندقولی اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود نداشت. همچنین از نظر مدت زمان ناباروری، میانگین سن و سایر مشخصات دموگرافیک و زمینه‌ای اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که روش TI با توجه به سهولت، ارزانی و نیاز به تجهیزات کمتر می‌تواند به عنوان اولین روش جهت درمان بیماران مبتلا به ناباروری با علت آمنوره هایپوتالامیک مورد توجه قرار گیرد و روش‌های دیگر به عنوان گام‌های بعدی در درمان این بیماران لحاظ شود.

کلید واژگان: آمنوره هایپوتالامیک، ناباروری، نزدیکی زمان بندی شده، تلقیح داخل رحمی.

مسئل مکاتبه: دکتر شیرین قاضی‌زاده، مرکز تحقیقات ناباروری ولیعصر، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران.

پست الکترونیک: shirin_ghazizadeh@yahoo.com

تغییرات کمتر در ترشح ضربانی GnRH عدم تخمک‌گذاری روی می‌دهد (۳،۴). در کمبود ایزوله GnRH (سندرم کالمن)^۷ تکامل بلوغ وجود ندارد و یا ناکامل است. این سندرم هر دو جنس را متاثر می‌کند اما در پسرها شایع‌تر بود و اکثر موارد تک‌گیر^۸ است اما می‌تواند ارشی نیز باشد که به صورت اتوزوم غالب وابسته به کروزوم X و یا مغلوب می‌باشد. در بعضی موارد غیرطبیعی بودن زن KAL-I مسئول کدگذاری گلیکوپروتئین و شبیه مولکول چسبندگی عصبی، باعث مهاجرت نورون‌های GnRH از پیاز بویایی هیپوتالاموس می‌شود؛ اما در اکثر موارد اختلال ژنتیکی وجود ندارد و نقصی در ترشح موزون GnRH سبب اختلال در افزایش ترشح GnRH طی بلوغ می‌شود (۵). الگوهای مختلف ترشح ضربانی LH دیده شده است؛ اما در اکثر موارد دامنه ضربان LH پایین است و مشابه الگوی قبل از بلوغ می‌باشد. در سایر موارد ضربان‌های GnRH دامنه و فرکانس نامنظم دارند. در بعضی موارد الگوی مشابه تکامل ناقص بلوغ همراه ترشح شباهن LH وجود دارد (۶،۷).

بیماران مبتلا به آمنوره هایپوتالامیک که خواهان حاملگی هستند، تحت القاء تخمک‌گذاری قرار می‌گیرند و پس از آن بیماران یا به نزدیکی زمان‌بندی شده (TI)^۹ یا تلقیح داخل رحمی اسپرم (IUI)^{۱۰} توصیه می‌شوند و یا تحت درمان با روش‌های پیشرفتی ART نظیر تزریق داخل سیتوبلاسمی اسپرم (ICSI)^{۱۱} و لقادم داخل آزمایشگاهی (IVF)^{۱۲} قرار می‌گیرند. برای القای تخمک‌گذاری در بیماران مبتلا به آمنوره هایپوتالامیک از GnRH ضربانی و یا گونادوتروپین‌ها استفاده می‌شود (۸). GnRH به طور مداوم و به شکل ضربانی

زمینه و هدف

کمبود ترشح ضربانی GnRH می‌تواند منجر به فاز لوئیال ناکافی، عدم تخمک‌گذاری با قاعده‌گی نامنظم و حتی آمنوره هایپوتالامیک^۱ شود. این تشخیص یکی از شایع‌ترین اشکال عدم تخمک‌گذاری است و تنها بعد از کنار گذاشتن علل تخدمانی و هیپوفیزی عدم تخمک‌گذاری مطرح می‌شود. آمنوره هایپوتالامیک عملکردی علت شایع قابل برگشت عدم تخمک‌گذاری است و ۵٪ زنان در سنین باروری دچار آن هستند. در بسیاری از بیماران علت مشخص نیست؛ اما آمنوره اغلب به علت کاهش وزن شدید، ورزش سنگین (ژیمناستیک و یا دو قهرمانی) و استرس روانی به وجود می‌آید. اختلالات نوراندوکرین^۲ متعدد در آمنوره هایپوتالامیک عملکردی وجود دارد که شامل افزایش فعالیت محور آدرنال-هیپوفیز-هیپوتالاموس است که باعث افزایش ترشح کورتیزول، اوپیوئید^۳، افزایش تون دوپامینرژیک^۴ و افزایش ترشح شباهن ملاتونین می‌شود (۱،۲).

آزاد شدن GnRH توسط مخدراهای داخلی، هورمون آزادکننده کورتیکوتروپین، ملاتونین و گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA)^۵ مهار می‌شود. اما کاتکول‌آمین‌ها واستیل کولین و پلی‌پپتید وازاکتیو روده‌ای (VIP)^۶ ضربان‌های GnRH را تقویت می‌کنند. بدین ترتیب بیماری‌های مزمن و سوء تغذیه، استرس، بیماری‌های روانی و ورزش، ضربان‌های GnRH را مهار می‌کنند و بنابراین دوره‌های قاعده‌گی را تغییر می‌دهند. افزایش پرولاکتین خون، بیماری کوشینگ و آکرومگالی نیز باعث مهار ترشح GnRH می‌شوند. در موارد کاهش شدید GnRH، آمنوره ایجاد می‌شود و با

7- Calman's syndrome

8- Sporadic

9- Timed Intercourse

10-Intra Uterine Insemination

11- Intra Cytoplasmic Sperm Injection

12- In Vitro Fertilization

1- Hypothalamic amenorrhea

2- Neuroendocrine

3- Opioid

4- Dopaminergic tone

5- Gamma-Amino Butyric Acid

6- Vasoactive Intestinal Poly peptide

۱۷ سیکل IUI انجام شد. ۲۱ مورد حاملگی (٪/۲۶/۳) اتفاق افتاد که باعث ۸ مورد سقط (٪/۲۸/۱) و ۱۳ مورد زایمان (٪/۴۰/۶) شد (۱۱).

در سال ۲۰۰۱ نیز مطالعه‌ای به صورت گذشته‌نگر روی ۲۴ بیمار مبتلا به آمنوره هایپوتالامیک در ۴۴ سیکل با GnRH وریدی انجام شد. توسط سونوگرافی و ارزیابی سرویکال Insler system زمان تجویز HCG و در صورت لزوم انجام IUI تعیین شد. میزان تخمک‌گذاری ٪۹۵ و میزان کل حاملگی به ازای هر سیکل تخمک‌گذاری ٪۴۵ و میزان حاملگی به ازای هر بیمار ٪۸۳ بود (۱۲).

براساس بررسی‌های فوق تاکنون هیچ مطالعه‌ای در بیماران مبتلا به آمنوره هایپوتالامیک، میزان موفقیت حاملگی در دو روش TI و IUI را به دنبال تحریک تخمک‌گذاری مقایسه نکرده است. لذا هدف این مطالعه بررسی میزان موفقیت حاملگی در دو روش IUI و TI بود.

روش بررسی

مطالعه حاضر به صورت گذشته‌نگر در سال ۱۳۸۲-۸۳ در بخش زنان و زایمان بیمارستان ولی‌عصر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. کلیه بیماران مبتلا به آمنوره هایپوتالامیک که در فاصله سال‌های ۱۳۷۸-۱۳۸۳ مراجعه کرده بودند و همچنین همسرانشان اسپرم‌وگرام طبیعی داشتند و دارای سن ۴۰-۲۰ سال بودند وارد مطالعه شدند. معیارهای خروج از مطالعه موارد ناباروری با علت مردانه، وجود آنومالی‌های رحمی همزمان و وجود انسداد لوله‌های رحمی بود. حجم نمونه ۳۶ بیمار و ۵۶ سیکل بود. از آنجا که همه بیماران این طرح از مرکز تحقیقات ناباروری ولی‌عصر بودند، تکنیک آماده‌سازی بیماران برای همگی یکسان بود. همچنین تمامی بیماران از داروهای تهیه شده از یک

توسط یک پمپ کوچک قابل حمل در سطح بدن، به دو روش داخل وریدی و زیر جلدی تجویز می‌شود. بسیاری از بیماران این پمپ را نامناسب می‌دانند زیرا آنها مجبور هستند در زمان خواب نیز پمپ را همراه داشته باشند. مزایای استفاده از پمپ GnRH نسبت به تجویز گونادوتروپین شامل خطر کمتر حاملگی چندقولی است و بیمار مانیتورینگ کمی نیاز دارد (۱). راه دیگر القای تخمک‌گذاری، تجویز گونادوتروپین‌های اگزوژن است. میزان پاسخ بیماران به این روش مقاومت است. گروهی از زنان به دوز پایین گونادوتروپین (۴۵ IU) حساس هستند و گروهی نیازمند گونادوتروپین با دوز بالا (۷۵ IU) برای بیشتر از ۱۴ روز می‌باشند (۹). در یک مطالعه در سال ۱۹۹۳ شانزده بیمار مبتلا به آمنوره هایپوتالامیک تحت القاء پا شده بیمار مبتلا به آمنوره هایپوتالامیک تحت القاء پا شدند. میزان تخمک‌گذاری ۴۷ درصد در مجموع طی تعداد ۴۷ GnRH وریدی قرار گرفتند. در فاز ۲۰ µgr/۹۰ min با دوز ۴۸h سیکل، GnRH با دوز ۱۰۰ IU/۴۸h در طی فاز فولیکولی تجویز شد و به دنبال آن در ۳-۵ روز بعد از تخمک‌گذاری به ۱ پالس کاهش یافت. فاز لوتئال نیز با HCG ۱۰۰ IU تا پایان هفته پنجم حمایت شد. در خانم‌هایی که همسر آنان دارای آنالیز اسپرم طبیعی بود، نزدیکی جنسی و در موارد ناباروری با علت مردانه IUI انجام شد. در ٪۸۳ سیکل‌ها تخمک‌گذاری اتفاق افتاد که منجر به ٪۱۳ حاملگی کلینیکی و ٪۱۹ حاملگی بیوشیمیایی شد. با کنار گذاشتن ناباروری با علت مردانه میزان حاملگی ٪۲۶ کل سیکلها، ٪۲۸ سیکل‌های تخمک‌گذاری و ٪۵۶ خانمها بود (۱۰).

در مطالعه دیگری در سال ۱۹۹۹، سی و دو بیمار مبتلا به آمنوره هایپوتالامیک با ۱۲۰ سیکل GnRH یا HMG تحت درمان قرار گرفتند. ۲۲ بیمار ۲۸-۲۴ ساله تحت ۱۲۰ سیکل PCO تحریکی با GnRH قرار گرفتند و ۷ بیمار مبتلا به HMG با ۸۰ سیکل به علت عدم پاسخ به GnRH با HMG درمان شدند. تخمک‌گذاری بعد از تجویز HMG و LH در ۱۳۰ سیکل از ۶۲ سیکل (٪۷۷/۷) اتفاق افتاد. در ۶۲ سیکل TI و در

شماره ۱ آمده است.

تعداد سیکل‌ها در دو گروه TI و IUI: در گروه TI میانگین و انحراف معیار تعداد سیکل‌ها 15 ± 0.85 بود. در گروه IUI میانگین و انحراف معیار تعداد سیکل‌ها 16.1 ± 0.6 بود. Mann – whitney test داد که اختلاف معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت.

تعداد حاملگی در دو گروه TI و IUI: در گروه TI، ۱۹ حاملگی در ۲۷ سیکل ($70/37\%$) و در گروه IUI، ۷ حاملگی در ۲۹ سیکل ($24/12\%$) مشاهده شد. داد Fisher's Exact test دو طرفه نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین دو گروه وجود داشته است ($p=0.05$).

تعداد چند قلوبی در دو گروه TI و IUI: در گروه TI، ۶ مورد چند قلوبی در ۲۷ سیکل و در گروه IUI، ۲ مورد چند قلوبی از ۲۹ سیکل مشاهده شد. داد Fisher's Exact test دو طرفه نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت.

تعداد حاملگی خارج رحمی در دو گروه TI و IUI: در هر گروه یک مورد حاملگی خارج رحمی مشاهده شد. اختلاف معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت.

تعداد سقط در دو گروه TI و IUI: در گروه TI، ۴ مورد سقط و در گروه IUI، ۱۰ مورد مشاهده شد. داد Fisher's Exact test دو طرفه نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت.

شرکت دارویی (Serono, Italy) استفاده نمودند؛ لذا از این لحاظ هیچ اختلافی بین بیماران وجود نداشت.

روش اجرایی مطالعه به این شکل بود که بیماران مبتلا به آمنوره هایپوتالامیک مراجعه کننده جهت درمان ناباروری براساس معیارهای ورود و خروج مطالعه، یکی از ۲ پروتکل درمان یعنی IUI و TI را جهت درمان ناباروری دریافت کرده بودند، نتایج درمان و همچنین اطلاعات دموگرافیک از پروندهای این بیماران اخذ و وارد فرم اطلاعاتی گردید و سپس این اطلاعات جهت آنالیز به فایل (10.5) SPSS منتقل شد.

در این مطالعه برای مقایسه سن بین دو گروه، مدت زمان ناباروری بین دو گروه از unpaired Student's t- test تعداد سیکل‌ها بین دو گروه از آزمون ناپارامتری Mann- Whitney استفاده گردید.

برای مقایسه تعداد حاملگی، حاملگی خارج رحمی، چند قلوبی و سقط از Fisher's Exact test استفاده شد. اطلاعات مربوط به شغل و تحصیلات به صورت آمار توصیفی بیان شده است. $p < 0.05$ به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

نتایج

مشخصات دموگرافیک و زمینه‌ای بیماران در جدول

جدول ۱- مشخصات دموگرافیک بیماران در دو گروه TI و IUI در مبتلایان به آمنوره هایپوتالامیک مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ناباروری و لیعصر، ۱۳۷۸-۸۳

متغیر	گروه	نژدیکی زمان‌بندی شده	تلقیح داخل رحمی اسپیرم	p-value
سن (سال) ($M \pm SD$)			$26/27 \pm 2/84$	$0/58$
طول مدت ناباروری (سال) ($M \pm SD$)			$4 \pm 3/95$	$0/69$
ذیر دیپلم		۶	۵	--
دیپلم		۹	۱۱	--
تحصیلات دانشگاهی		۳	۲	--
خانه‌دار		۱۱	۱۱	--
کارگر		۱	۲	--
کارمند		۶	۵	--

از نظر سقط، چند قلوبی و حاملگی خارج رحمی مشاهده نشد. در جستجویی که در نمایه نامه Medline از سال ۱۹۶۶ تا پایان سال ۲۰۰۴ انجام شد، هیچ مطالعه‌ای که به طور مستقیم دو روش TI و IUI را با هم مقایسه نماید، مشاهده نگردید. در مطالعه‌ای که توسط Dessole و همکاران در سال ۱۹۹۳ انجام گرفت درصد حاملگی از کل سیکل‌ها فقط ۲۶٪ بود که به نظر می‌رسد بسیار کمتر از درصد حاملگی در مطالعه ما باشد (۲۰). در مطالعه دیگری که توسط Marci و همکاران در سال ۱۹۹۹ انجام گرفت، مجموع بارداری در دو گروه TI و IUI ۲۸٪ بود (۱۱).

نتیجه‌گیری

با توجه به محدودیت‌های این مطالعه از جمله روش مطالعه که به صورت گذشته‌نگر انجام گرفته است و تعداد نسبتاً محدود بیماران، به طبع نمی‌توان نتیجه‌گیری قاطعی انجام داد. با این حال مطالعه حاضر می‌تواند جرقه‌ای برای انجام یک مطالعه آینده‌نگر، با حذف عوامل مخدوش‌کننده و تعداد حجم نمونه بالا باشد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که روش TI با توجه به سهولت، ارزانی و نیاز به تجهیزات کمتر می‌تواند بعنوان اولین روش جهت درمان بیماران مبتلا به ناباروری به دلیل آمنوره هایپوتalamیک مورد توجه قرار گیرد و روش‌های دیگر به عنوان کامهای بعدی در درمان این بیماران لحاظ شود.

بحث

ناباروری بار روانی و مالی زیادی بر بیمار و خانواده وی تحمیل می‌کند. استفاده از روش‌های درمانی تخصصی و پر هزینه در اولین قدم و شکست این روش‌ها علاوه بر هزینه‌های مالی، آثار روحی و روانی مضاعفی را نیز بر زوجین خواهد گذاشت. استفاده از درمان‌های آسان و کم هزینه‌تر در اولین قدم انتخاب خوبی برای بیمار خواهد بود. چرا که حتی شکست این روش‌ها آشار مخبر فکری کمتری برای بیمار دارد. در صورت شکست روش‌های تخصصی این مسئله قویاً فکر و ذهن بیمار را به خود مشغول کرده و می‌تواند سبب نامیدی وی شود.

در مطالعه حاضر مشخص شد در گروه TI از ۲۷ سیکل، ۱۹ مورد حاملگی و در گروه IUI از ۲۹ سیکل فقط ۷ مورد حاملگی اتفاق افتاده است. لذا اختلاف معنی‌داری بین این دو روش حتی با این تعداد کم حجم نمونه مشاهده شد. به نظر می‌رسد نتایج مطالعه کنونی ممید این امر است که احتمالاً TI روش موثرتری در مقایسه با IUI در درمان ناباروری بیماران مبتلا به آمنوره هایپوتalamیک خواهد بود. با توجه به بار اقتصادی کمتر روش TI نسبت به IUI، صرف وقت کمتر، و نیاز به تجهیزات محدودتر، به نظر می‌رسد روش TI قابل اجرا در بسیاری از مراکز با امکانات محدود باشد.

در مطالعه حاضر اختلاف معنی‌داری بین دو گروه

References

- 1- Jaffe R.B. Long-term follow up of functional hypothalamic amenorrhea and prognostic factors. *Obstet Gynecol Sur.* 2002;57:512-514.
- 2- Berga S.L. Functional hypothalamic amenorrhea. *Curr Opin Endocrinol Diabetes.* 2001;8: 207-313.
- 3- Berek J.S. Novak's Gynecology. 13th Edition. 2002. Lippincott Williams and Wilkins. Baltimore, USA.
- 4- Speroff L., Glass R.H., Kase N.G. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. 6th Edition. 1999.

Lippincott Williams and Wilkins. Baltimore, USA.

- 5- Marshall J.C., Eagleston C.A., McCartney C.R. Hypothalamic dysfunction. *Molecul Cellul Endocrinol.* 2001; 183:29-32.
- 6- Reame N.E., Sauder S.E., Case G.D. Pulsatile gonadotropin secretion in women with hypothalamic amenorrhea: evidence that reduced frequency of gonadotropin-releasing hormone secretion is the mechanism of persistent anovulation. *J Clin Endocrinol Metab.* 1985; 61:851-858.

- 7- Hainsleider D.J., Dalkin A.C., Marshall J.C. Regulation of gonadotropin gene expression. In: Knobil, E., Neill, J. (Eds), *The physiology of Reproduction*, second ed. Raven Press, New York, NY, p:1793, Chapter 31.
- 8- Wolf L.J. Ovulation induction. *Clin Obstet Gynecol.* 2000;15:902-915.
- 9- Gardner D.K., Weissman A., Howles C.M., Shoham Z. *Textbook of Assisted Reproductive Techniques Laboratory and Clinical Perspectives* (2nd Edition). 2004. Taylor and Francis.
- 10- Dessole S., Germond M., Senn A., Welti H., De Grandi P. Ovulation induction by Pulsatile intravenous administration of Gn-RH to patients with hypothalamic amenorrhea. *Minerva Ginecology.* 1993;45:71-76.
- 11- Marci R., Dessole S., Senn A., Grandi P., Germond M. Follow-up of 32 hypothalamo-hypopituitary patients treated with Pulsatile gonadotropin-releasing hormone or human menopausal gonadotropin. *Gynecol Endocrinol.* 1999;13(6):375-81.
- 12- Kesrouani A., Abdallah M.A., Attieh E., Abboud J., Atallah D., Makhoul C. Gonadotropin-releasing hormone for infertility in women with primary hypothalamic amenorrhea. Toward a more interventional approach. *J Reprod Med.* 2001;46:23-28.