

بررسی فراوانی تومورهای بینایینی تخدمان، برخی عوامل خطرساز و نحوه درمان آنها

زهره یوسفی (M.D)^۱، صدیقه آیتی (M.D)^۲، فاطمه همایی (M.D)^۳، محمدتقی شاکری (Ph.D)^۴

۱- گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی مشهد، مشهد، ایران.

۲- گروه انکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی مشهد، مشهد، ایران.

۳- گروه آمارحیاتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: تومورهای بینایینی تخدمان ۱۰-۱۵٪ سرطان‌های اپی‌تیال تخدمان را شامل می‌شوند که دارای پتانسیل بدخیمی پایینی بوده و تمایل دارند مدتها در محدوده تخدمان باقی بمانند. از نظر بیولوژیک به دلیل خاصیت تهاجمی کم تومورها و پتانسیل بدخیمی کم آنها، تشخیص زودهنگام، شناخت علایم بالینی و نحوه درمان این بیماران از اهمیت ویژه‌ای برخودار است. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی بیماری و برخی عوامل خطرساز آن، نحوه درمان و بیماران دارای تومور بینایینی تخدمان بود.

روش بررسی: این مطالعه بر روی پرونده ۱۲۲ بیمار مبتلا به سرطان اپی‌تیال تخدمان مراجعه کننده به بخش سرطان‌شناسی بیمارستان‌های قائم و امید مشهد در فاصله سال‌های ۱۳۷۳-۸۲ انجام شد. ابزار مطالعه پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک بود. بررسی اطلاعات از طریق کامپیوتر با نرم افزار SPSS انجام شد و از t-test و χ^2 استفاده شد. ضریب اطمینان مطالعه ۹۵٪ در نظر گرفته شد و $p \leq 0.05$ معنی‌دار تلقی گردید.

نتایج: متوسط سن بیماران مبتلا به تومور بینایینی ۲۵/۰۷±۳/۲۵ سال بود. ۶/۰۶٪ از بیماران تومور بینایینی تخدمان داشتند. بیشترین نوع آسیب‌شناسی تومور بینایینی تخدمان موسینوسيست آدنوم (۷۱/۳٪) بود. اکثر بیماران در مرحله یک بیماری بودند (۷۸/۴٪). افزایش مارکر CA125 در ۱/۴۲٪ موارد وجود داشت. عمل جراحی محافظه‌کارانه در ۱/۴۲٪ و اعمال جراحی کامل در بقیه بیماران انجام شد. عود بیماری در ۳/۲۱٪ از بیماران گزارش گردید. ۳/۲۱٪ از بیماران بعلت گسترش خارج تخدمانی بعدازیکسال فوت کردند.

نتیجه‌گیری: سرطان بینایینی تخدمان پیش‌آگهی نسبتاً خوبی داشته ولی بعلت احتمال عود بیماری و مرگ و میر در این بیماران پیگیری مرتب بعد از درمان توصیه می‌شود.

کلید واژگان: سرطان بینایینی تخدمان، سرطان مهاجم اپی‌تیال تخدمان، پیش‌آگهی، عود، میزان بروز، تومور مارکر، مرحله بیماری، درمان محافظه‌کارانه، شیمی درمانی.

مسئول مکاتبه: دکتر زهره یوسفی، بخش زنان، بیمارستان قائم (عج)، مشهد، ایران.

پست الکترونیک: yousfi@mums.ac.ir

همکاران طول عمر پنج ساله بیماران BOT در I Stage را ۹۸٪ و طول عمر ده ساله آنها را ۹۳٪ گزارش کرده‌اند (۹). مطالعات اخیر نقش مهمی را برای درمان محافظه کارانه (برداشت کیست یا تومور تخدمان) قایل شده‌اند. در مطالعه Goff و همکاران گزارش شد که در ۳۵ بیمار با BOT سروز تخدمان که تنها برداشت کیست تخدمان^۳ انجام شده بود، فقط در چهار بیمار عود دیده شد و بقیه بیماران بدون شواهدی از بیماری بعد از جراحی اولیه ۱۸-۳ سال زنده ماندند (۱۰). در مطالعات جدیدتر گروه ژنیکولوژی انکولوژی پیشنهاد شده است که حتی برداشت کیست تخدمان در مقابل برداشت تمام بافت تخدمان درمان مناسبی می‌باشد؛ چون خطر عود یا بروز تومور جدید ۱۰-۱۵٪ بوده و درمان جراحی مجدد آن نیز موفقیت‌آمیز بود (۱۱).

از آنجایی که پیش آگهی بیماران به خصوص در مراحل اولیه بیماری نسبتاً خوب است؛ لذا باید بر تشخیص زود هنگام بیماری، شناخت علایم و نحوه درمان این بیماران تاکید کرد. هدف از این مطالعه بررسی بروز، برخی عوامل خطرساز و نحوه درمان بیماران مبتلا به BOT می‌باشد.

روش بررسی

مطالعه حاضر مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی و گذشته‌نگر است که به مدت ده سال (۱۳۷۳-۸۲) بر روی پرونده بیماران مبتلا به سرتان تخدمان در بخش شیمی درمانی و پرتو درمانی بیمارستان‌های قائم (عج) و امید وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. از تعداد ۱۳۲ بیمار مبتلا به تومورهای اپی‌تیال تخدمان، ۱۴ بیمار تومور بینایینی تخدمان داشتند که پرونده آنها تحت مطالعه قرار گرفت. برای کسب اطمینان، نمونه آسیب‌شناسی کلیه بیماران با تومور بینایینی توسط دو نفر متخصص پاتولوژی به طور جداگانه مورد بررسی

3- Cystectomy

زمینه و هدف

تومورهای بینایینی تخدمان (BOT)^۱ گروه مهمی از تومورهای تخدمانی هستند که دارای پتانسیل بدخیمی پایین بوده و برای مدت‌های طولانی محدود به لگن باقی می‌مانند. این تومورها به طور مشخصی با پیش‌آگهی نسبتاً خوب همراه می‌باشند (۱).

از مشخصات ویژه بافت‌شناسی تومورهای بینایینی تخدمان، عدم تهاجم سلول بدخیم به بافت استرومای تخدمان است؛ گرچه سایر تغییرات بدخیمی مانند تکثیر سلول‌های بدخیم، آنتیپی هسته و تغییرات میتوزی هم وجود دارند (۲).

سن بروز این تومورها نسبت به تومورهای مهاجم تخدمان کمتر است و اکثرًا در سنین ۳۰-۵۰ سالگی دیده می‌شوند (۳). علیرغم پیشرفت روش‌های تشخیصی مثل سونوگرافی و اندازه‌گیری تومور مارکرهای، هنوز تشخیص این ضایعات قبل از جراحی و بررسی آسیب‌شناسی نمونه ممکن نمی‌باشد. به علت رشد کند این تومورها مدت زمان لازم از ایجاد بیماری تا بروز علایم در این بیماران نسبتاً با تأخیر قابل توجهی همراه است (۴). با این وجود، بیماری در مقایسه با تومورهای مهاجم تخدمان بیشتر در مراحل اولیه^۲ تشخیص داده می‌شود (۵).

Karen و همکاران در مطالعه‌ای در نروژ در سال ۱۹۹۳ شیوع BOT را ۱۰-۱۵٪ گزارش کردند (۶).

درمان این بیماری، جراحی با حذف لوله‌ها و تخدمان‌های دو طرف و رحم می‌باشد، ولی به علت جوان بودن بیماران، درمان‌های محافظه کارانه نیز پیشنهاد می‌شود (۷).

Battaglia و همکاران در سال ۲۰۰۵ بارداری موفق ۵ سال بعد از درمان جراحی محافظه کارانه و شیمی درمانی در یک بیمار در Stage IC تومور بینایینی تخدمان گزارش شده است (۸).

1- Borderline Ovarian Tumors

2- Early stage

(۶/۲۸٪) بود. محل تومور در ۱/۴۲٪ موارد در طرف راست و در ۴/۲۱٪ بیماران تومور دو طرفه بود. از نظر مرحله بیماری، ۵۰٪ بیماران در IA Stage، ۲۱/۳٪ در Stage IC و ۷/۱٪ در Stage IB بودند که در مجموع ۷/۸٪ موارد در مرحله یک بیماری، ۱/۷٪ در Stage IIIB و ۱/۷٪ در Stage IIIA و ۱/۷٪ در Stage IVA بودند.

میزان تومور مارکر CA125^۱ در ۱/۴۲٪ بیماران افزایش داشت (بیش از ۵۰ IU/ml) اما در ۸/۳۵٪ افراد مقداری طبیعی دیده شد (کمتر از ۳۵ IU/ml). در ۱/۲۲٪ افراد این شاخص اندازه‌گیری نشد ولی سطح CEA^۲ در بیمارانی که درخواست شده بود در حد طبیعی بود.

درمان جراحی به صورت برداشت تخدمان یکطرفه در ۱/۴۲٪، دو طرفه در ۲/۱۴٪ و جراحی سیتوردکتیو^۳ در ۱/۴۲٪ از بیماران انجام شد. در بیماران جوان عمل جراحی محافظه‌کارانه با حفظ رحم و تخدمان سالم انجام شد - ۱- مرحله‌بندی جراحی در ۸/۳۵٪ افراد انجام شد.

بعد از عمل جراحی دو بیمار به علت گسترش ضایعه، تحت شیمی درمانی با رژیم حاوی سیسپلاتین- سیکلوفسفاماید قرار گرفتند. پرتو درمانی در هیچ‌کدام از بیماران انجام نشد. عود زودرس بین ۱-۲ سال در ۳/۲۱٪ از بیماران دیده شد و متاستاز دور دست در ۳/۲۱٪ از بیماران مشاهده شد که در یک مورد به اومنتوم و یک مورد به کبد متاستاز گسترش یافته بود. ۳/۲۱٪ از بیماران به علت گسترش خارج تخدمانی تومور بعد از یکسال فوت کردند.

بحث

در واقع سرطان تخدمان، مرگبارترین سرطان دستگاه تناسلی در زنان است. به علت موقعیت تخدمانها که در فضای عمیقی لگن قراردارند، معاینه فیزیکی در تشخیص این سرطان در مراحل اولیه چندان کمک کننده نیست

قرار گرفت و بینایی بودن تومور آنها مورد تأیید واقع شد.

روش جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای حاوی سن بیمار، تعداد بارداری، سن شروع قاعدگی، سن شروع یائسگی، نوع بافت‌شناسی تومور، درجه‌بندی مرحله بیماری، نحوه درمان (جراحی- شیمی درمانی یا پرتو درمانی) بود. لازم به ذکر است که درمان جراحی به صورت برداشت توده تخدمان و برداشت کامل یک یا دو تخدمان (درمان محافظه‌کارانه) یا برداشت رحم و ضمائم دو طرف همراه با مرحله‌بندی تومور بود. این پرسشنامه‌ها با بررسی پرونده‌های موجود در بخش‌های مذکور و بررسی نتایج آسیب‌شناسی توسط یک پژوهشگر (پزشک) تکمیل شد. بعد از جمع‌آوری اطلاعات و طبقه‌بندی آنها با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی آماری انجام شد.

نتایج

در این مطالعه ۱۲۲ بیمار مبتلا به سرطان اپی‌تیال تخدمان با میانگین سنی ۵۲/۲۹±۱۲/۶۱۶ سال بررسی شدند. ۱۴ بیمار مبتلا به تومور بینایی تخدمان بودند؛ لذا شیوع تومور بینایی تخدمان ۶/۰۶٪ بود. در بررسی بیماران با تومورهای بینایی تخدمان، جوانترین بیمار ۱۹ سال و مسن‌ترین آنها ۶۴ سال سن داشت. متوسط سن این بیماران ۲۵/۰۷±۳/۲۵ سال بود. قاعدگی زودرس (در سنین کمتر از ۱۳ سالگی) در ۴/۱۴٪ و یائسگی دیررس (بعد از ۵۰ سالگی) در ۷/۷٪ از بیماران با تومور بینایی تخدمان وجود داشت. میانگین تعداد بارداریها در این بیماران ۱/۷±۱/۷ بود. سابقه فامیلی سرطان تخدمان در کمتر از ۵٪ این بیماران وجود داشت.

در بررسی پرونده بیماران مبتلا به تومور بینایی تخدمان، شایعترین نوع آسیب‌شناسی تومور بینایی موسینوسیست آدنوما (۳/۷۱٪) و بعد سروسیت آدنوما

1- Carcinoma Antigen 125

2- Carcinoma Embryonic Antigen

3- Cytoreductive surgery

BOT در زمان جراحی بوده و انجام سونوگرافی و بررسی تومور مارکر در این مرحله چندان کمک کننده نیست (۱۸). بررسی تومور مارکرهای CEA، CA125، C19-9 در این بیماران توصیه شده است. در تعداد معده دی از تومورهای بینایی سطوح افزایش یافته CA125 قبل از عمل گزارش شده است (۱۹). در مطالعه حاضر افزایش CA125 در ۴۲/۱٪ بیماران وجود داشت؛

ولی CEA در هیچیک از بیماران افزایشی نداشت.

۰-۲۵٪ افراد با تومورهای بینایی دارای تومور دو طرفه هستند (۲۰)، در مطالعه حاضر ۲۱/۴٪ افراد تومور دو طرفه داشتند. این نکته از نظر درمان‌های جراحی در زنان جوان برای حفظ باروری مهم است. درمان این بیماران برداشت تومور همراه با مرحله‌بندی جراحی آن می‌باشد و در موارد درگیری فراتر از حفره لگن و یا وجود اجزاء میکروپاپیلری در آسیب‌شناسی تومور، شیمی درمانی بعد از جراحی توصیه شده است (۲۰). به علت جوان بودن بیماران و تلاش در جهت حفظ باروری، درمان‌های محافظه‌کارانه نیز پیشنهاد شده‌اند که در این صورت باید مرحله‌بندی جراحی انجام شده باشد و ضایعه در مرحله اولیه بیماری و با درجه بدخیمی کم بوده و همچنین امکان پیگیری مرتب بیماران نیز وجود داشته باشد (۲۱). اعمال جراحی محافظه‌کارانه با حفظ شرایط فوق در ۱۴/۲٪ از بیماران مطالعه کنونی انجام شد. در موارد جراحی محافظه‌کارانه حذف کیست تخدمان باید حاشیه سالم باشد و تأیید این امر با برش منجده^۱ حین عمل جراحی انجام شده باشد.

در مطالعات سال‌های اخیر جراحی از طریق لاپاراسکوپی هم انجام شده است (۲۲) که در مطالعه کنونی هیچکدام از بیماران از این طریق درمان نشده‌اند. تأکید WHO و FIGO در تشخیص تومورهای بینایی تخدمان بر مبنای تومور اولیه بدون توجه

(۱۲). علیرغم پیشرفت‌های تکنیکی موجود از قبیل اندازه‌گیری تومور مارکرها و سونوگرافی در تشخیص سرطان تخدمان، به علت افزایش هزینه و نتایج مثبت کاذب، این روش‌ها هنوز عنوان تست‌های غربالگری مورد تایید قرار نگرفته‌اند (۱۳). شیوع BOT در Mطالعه Yuen و همکاران ۱۰-۱۲٪ و در Mطالعه Karen و همکاران ۱۰-۱۵٪ گزارش شده است (۶،۱۴) و در Mطالعه حاضر نیز فراوانی ۱۶/۰٪ بود؛ که مشابه مطالعات سایر محققین در کشورهای دیگر است. بنابراین باید بر شناخت علایم بالینی غیراختصاصی جهت تشخیص این سرطان تاکید نمود. گرچه اکثر بیماران با سرطان مهاجم تخدمان در زمان تشخیص در مراحل پیشرفت‌های بیماری هستند، اما در مورد BOT، بیماران در مراحل زودتری تشخیص داده می‌شوند (۱۵).

۰-۲۵٪ بیماران دارای سنی کمتر از ۴۰ سال هستند. میانگین سنی بیماران در Mطالعه Plante و همکاران بین ۳۰-۵۰ سال و در Mطالعه کنونی ۲۵/۰۷ سال بود. شاید تفاوت در میانگین سن در Mطالعه حاضر به علت تعداد کم نمونه‌ها باشد.

از عوامل خطرساز سرطان تخدمان، قاعده‌گی زودرس، یائسگی دیررس و سابقه فامیلی سرطان تخدمان و ناباروری را می‌توان ذکر کرد (۱۶). در Mطالعه حاضر به جز قاعده‌گی زودرس (۱۴/۴٪) عامل خطر دیگری به دست نیامد.

نوع آسیب‌شناسی تومور در Mطالعات مختلف متفاوت است؛ ولی در اکثر Mطالعات موسینو سیست آدنوم بینایی غالب می‌باشد (۱۷) و در Mطالعه کنونی نیز این نوع تومور شایعتر بود (۷۱/۳٪).

در بررسی Link و همکاران ۹۰-۷۴٪ بیماران با BOT در هنگام تشخیص در مرحله یک بیماری بودند. در Mطالعه حاضر نیز ۴/۷۸٪ بیماران در Stage I بیماری بودند. گرچه مشخص شده که تشخیص اکثر بیماران

۱- Frozen section

درمان نداشتند. اینکه میزان عود بعد از عمل جراحی محافظه‌کارانه بیشتر می‌شود هنوز تأیید نشده است؛ گرچه در یک مطالعه گزارش عود تومور بعد از این نوع درمان گزارش شده است (۲۸)؛ ولی در مطالعه کنونی در هیچکدام از بیماران با درمان محافظه‌کارانه عودی دیده نشد (۲۹).

در انتها یاد آور می‌گردد که با وجودیکه ۷۸/۴٪ بیماران با تومور بینابینی تخدمان در مرحله یک بیماری بودند و از طرفی با توجه به نوع بدخیمی تومور یعنی عدم مهاجم بودن این تومورها، ۲۱/۳٪ مرگ و میر وجود داشت؛ لذا در تومورهای بینابینی تخدمان هم مثل تومورهای مهاجم درمان صحیح و پیگیری مرتب بیماران توصیه می‌شود.

نتیجه‌گیری

سرطان بینابینی تخدمان گرچه پیش‌آگهی نسبتاً خوبی دارد ولی درمان‌های محافظه‌کارانه جراحی با پیگیری پس از درمان سودمند می‌باشد. حفظ عملکرد تخدمان در این بیماران در مراحل اولیه بیماری باید مدنظر بوده و جراحی محافظه‌کارانه به خصوص در بیماران جوان با تمايل به حفظ باروری توصیه می‌شود. بدیهی است لازمه این روش درمانی، انجام مرحله‌بندی جراحی به طور کامل همراه با پیگیری دقیق و طولانی مدت می‌باشد. با این حال مطالعات وسیعتر با حجم نمونه بیشتر و مدت پیگیری طولانی‌تر جهت ارزیابی نتیجه دراز مدت این بیماران توصیه می‌شود.

تشکر و قدردانی

در پایان از زحمات سرکار خانم دکتر سارا سعادت که در جمع‌آوری این نمونه‌ها و سرکار خانم اکرم مشتاقی که در تایپ این مجموعه همکاری داشتند تشکر و قدردانی می‌گردد.

به هیستوپاتولوژی و متاستازهای خارج تخدمانی است؛ بنابراین اگر کاشته شده^۱ پریتوئنی BOT از نوع مهاجم باشد هنوز تومور بینابینی طبقه‌بندی می‌شود؛ گرچه کاشته شده متاستازها مثل سرطان مهاجم عمل می‌کنند. در مطالعه Morice گزارش شد در موارد تومور بینابینی با سلول‌های کاشته شده مهاجم ۱۷٪ و در موارد کاشت بدون تهاجم ۹۴٪ عدم پیشرفت بیماری دیده شد (۲۳). در مطالعه حاضر در مواردی که Staging انجام شده بود امپلانت‌های مهاجم وجود نداشت.

احتمال عود بیماری در موارد تومورهای بینابینی تخدمان حدود ۱۰-۱۵٪ است و محل عود بیشتر در لگن و در تخدمانها می‌باشد. گرچه درگیری نقاط دوردست نیز گزارش شده است (۲۴). در یک مطالعه درگیری غدد لنفاوی پستانی داخلی نیز گزارش شده بود (۲۵). در مطالعه حاضر درگیری دور دست در اومنتوم و کبد مشاهده شد. با توجه به اینکه ۷۸/۴٪ بیماران مطالعه کنونی در زمان تشخیص در مرحله یک بیماری بودند و متاستاز دور دست از جمله کبد، در این مرحله از بیماری شیوع کمتری دارد، بروز متاستاز در کبد و اومنتوم در بیماران مطالعه حاضر شاید علیرغم تائید تشخیص آسیب‌شناسی تومور بینابینی توسط دو آسیب‌شناس، بیماری در مرحله تهاجمی بوده باشد. گرچه عود زودرس در یک بیمار با Stag IC بیماری گزارش شده است (۲۶) ولی عود بیماری معمولاً دیررس بوده و اکثرًا به صورت ضایعات با درجه بدخیمی پایین تظاهر می‌کنند (۲۷). در مطالعه کنونی ۲۱/۳٪ از بیماران عود داشتند که اکثراً زودرس و در مدت ۱-۲ سال اولیه بیماری بودند. در مواردیکه بعد از درمان و پیگیری مرتب، بارداری رخ داده است، میزان عود بیماران با سایرین فرقی نداشته است (۲۸). در مطالعه حاضر هیچکدام از بیماران بارداری بعد از

1- Implant

References

- 1- Seracchioli R, Venturoli S, Colombo FM, Govoni F, Missiroli S, Bagnoli A, M.D. Fertility and tumor recurrence rate after conservative laparoscopic management of young women with early-stage borderline ovarian tumors. *Fertil Steril.* 2001;76(5):999-1004.
- 2- Idotta R, Scopelliti P, Polimeni C, Lirosi MF. Serous papillary cystic ovarian borderline tumor: case report. *Clin Exp Obstet Gynecol.* 2002;29(4):293-6.
- 3- Mikami M, One A, Sakaiya N, Kurahashi T, Komiya S, Komuro Y. Case report of serous ovarian tumor of borderline malignancy (Stage Ic) in a pregnant woman. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2001; 98(2):237-9.
- 4- Vine MF, Ness RB, Calingaert B, Schildkraut JM, Berchuck A. Types and duration of symptoms prior to diagnosis of invasive or borderline ovarian tumor. *Gynecol Oncol.* 2001;83(3):466-71.
- 5- Moreira AL, Yao J, Waisman J, Cangiarella JF. Metastatic borderline papillary ovarian tumor in an intramammary lymph node. *Breast J.* 2002;8(5):309-10.
- 6- Kaern J, Trope CG, Abeler VM, Abeler VM. A retrospective study of 370 borderline tumors of the ovary treated at the Norwegian Radium Hospital from 1970 to 1982. A review of clinicopathologic features and treatment modalities. *Cancer.* 1993;71:1810-20.
- 7- Camatte S, Morice P, Atallah D, Pautier P, Lhomme C, Haie-Meder C, Duvillard P, Castaigne D. Lymph node disorders and prognostic value of nodal involvement in patients treated for a borderline ovarian tumor: an analysis of a series of 42 lymphadenectomies. *J Am Coll Surg.* 2002;195(3):332-8.
- 8- Battaglia F, Plotti F, Zullo MA, Panici PB, Plotti G. Successful pregnancy after conservative surgery for stage IC ovarian cancer with serous borderline tumor on contralateral ovary: A case report. *Gynecol Oncol.* 2005;(21):465-71.
- 9- Schilder JM, Thompson AM, Depriest PD, Ueland FR, Cibull ML, Kryscio RJ, et al. Outcome of reproductive age women with stage IA or IC invasive epithelial ovarian cancer treated with fertility-sparing therapy. *Gynecol Oncol.* 2002;87(1):1-7.
- 10- Goff BA, Mandel L, Muntz HG, Melacon CH, Ovarian cancer diagnosis results of a national ovarian cancer surgery. *Cancer.* 2000;89:2068-75.
- 11- Verness B, Elnbibakh GH. Familial ovarian cancer and early ovarian cancer biologic, pathologic and clinical features. *Int J Gynecol Pathol.* 2001;(20):48-63.
- 12- Li CC, Hirokawa M, Qian Z, Fujii Y, Ino H, Wakatsuki S, Horiguchi H, Kagawa N, Sano T. Morules with optically clear nuclei in ovarian borderline endometrioid tumor. *APMIS.* 2002;110(11): 783-8.
- 13- Kir G, Eren S, Kir M. Hyperplastic mesothelial cells in pelvic and abdominal lymph node sinuses mimicking metastatic ovarian microinvasive serous borderline tumor. *Eur J Gynecol Oncol.* 2004;25(2):236-8.
- 14- Yuen PM. Wound recurrence by implantation of a borderline ovarian tumour following laparoscopic removal . *Br J Obstet Gynecol.* 1994;101:1026-7.
- 15- Parker RL, Clement PB, Chercover DJ, Sornarajah T, Gilks CB. Early recurrence of ovarian serous borderline tumor as high-grade carcinoma: a report of two cases. *Int J Gynecol Pathol.* 2004;23(3):265-72.
- 16- Canis M, Mage G, Pouly JL, Wattiez A, Mannes H, Bruhat MA. Laparoscopic diagnosis of adnexal cystic masses: a 12-year experience with long-term follow-up. *Obstet Gynecol.* 1994;83:707-12.
- 17- Lim Tan SK, Cagiagis HE, Scully R. Ovarian cystectomy for serous borderline tumors: a follow-up study of 35 cases. *Obstet Gynecol.* 1988;72:775-80.
- 18- Trope C, Vergote JB, Kristensen G, Kristensen G, Abeler V. Are borderline tumors of the ovary overtreated both surgically and systemically?. A review of four prospective randomized trials including 253 patients with borderline tumors. *Gynecol Oncol.* 1993; 51:236-43.
- 19- Engelen MJ, Bruijn HW, Hollema H, Hoor KA, Willemse PH, Aalders JG, Serum CA 125, carcinoembryonic antigen, and CA19-9 as tumor markers in borderline ovarian tumors. *Gynecolo Oncol.* 2000;78 (1):16-20.
- 20- Link CJ Jr, Kohn E, Reed E, Review the relationship between borderline ovarian tumors and epithelial ovarian carcinoma: epidemiologic, Pathologic and molecular aspects. *Gynecol Oncol.* 1996;60:347-54.
- 21- Gotlieb WH, Flikker S, Davidson B, Korach Y, Koppolovic J, BenBaruch G. Borderline tumors of the ovary: Fertility treatment, conservative management and pregnancy outcome. *Cancer.* 1998;82:141-6.
- 22- Seracchioli R, Venturoli S, Colombo FM, Govoni F, Missiroli S, Bagnoli A. Fertility and tumor recurrence rate after conservative laparoscopic management of young women with early-stage borderline ovarian tumors. *Fertil Steril.* 2001;76(5):999-1004.
- 23- Morice P, Thoury A, Sabourin JC, Camatte S, Atallah D, Armand JP, Madelenat P, Duvillard P, Castaigne D. Case 2. Spontaneous regression of peritoneal implants in borderline ovarian tumor after salpingo-oophorectomy. *J Clin Oncol.* 2003;15;21(18):3536-8.

- 24- Morris RT, Gershenson DM, Silva EG, Follen M, Morris M, Wharton JT. Outcome and reproductive function after conservative surgery for borderline ovarian tumors. *Obstet Gynecol.* 2000;95:541-7.
- 25- Chamberlin MD, Eltabakh GH, Mount SL, Leavitt BJ. Metastatic serous borderline ovarian tumor in an internal mammary lymph node: a case report and review of the literature. *Gynecol Oncol.* 2001;82(1): 212-5.
- 26- Battaglia F, Plotti F, Zullo MA, Panici BP Plotti G. Successful pregnancy after conservative surgery for stage IC ovarian cancer with serous borderline tumor on contralateral ovary: A case report. *Gynecol Oncol.* 2005;(6)463-471.
- 27- Lobo RA. Potential options for preservation of fertility in women. *N Engl J Med.* 2005;353(1):64-73.
- 28- Papadimitrou DS, Martin-Hirsch P, Kitchener HC, Lolis DE, Dalkalitsis N, Paraskevaidis E. Recurrent borderline ovarian tumours after conservative management in women wishing to retain their fertility. *Eur J Gynecol Oncol.* 1999;2:94-7.
- 29- Longacre TA, Mckenney JK, Tazelaer Hb. Ovarian serous tumors of low malignant (borderline tumors). Outcome-based study of 276 patients with long term follow-up. *Am J Surg Pathol.* 2002;29(6):707-23.