

مدل‌سازی سری زمانی برای پیش‌بینی تلاطم^۱ در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران

غلامرضا کشاورز حداد

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف - G.K.Haddad@sharif.edu

موسی اسمعیلزاده

کارشناس ارشد اقتصاد - musa_3717@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۸۶/۴/۲ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۱۰/۱۵

چکیده

بازار سرمایه، در مقایسه با سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت از ریسک و ناظمینانی بالایی برخوردار است، بنابراین انتظار می‌رود سود حاصل از سرمایه‌گذاری از حداقل بازدهی مورد انتظار بدون ریسک افزون‌تر باشد. به همین دلیل به کارگیری تکنیک‌ها و تحلیل‌های تخصصی برای تخمین و پیش‌بینی تلاطم بازار مالی برای بهینه سازی سرمایه‌گذاری در بازار مالی، ضروری به‌نظر می‌رسد. در این تحقیق روش‌های مختلف پیش‌بینی تلاطم در بازدهی دارایی‌ها مدل‌سازی و دقت آن‌ها مورد ارزش‌بایی قرار می‌گیرد. الگوسازی، برآورد و پیش‌بینی‌های این ویژگی با استفاده از روش‌های^۲ ARIMA-SCRL، ARIMA-XRL، GARCH-C، GARCH و ریسک متیریک و با استفاده از «داده‌های هفتگی» انجام می‌شود. این تحقیق تلاطم تحقق‌یافته‌ی قیمت سهام سیمان تهران را از دوره‌ی ۱۳۷۰/۰۱/۰۳ تا ۱۳۸۵/۰۷/۲۶، با استفاده از انواع روش‌های غیرخطی که در آن "اثرات بازده‌های وقفه‌ای" ، «اثرات اهرمی» «شکست ساختاری" گنجانده می‌شود و هم‌چنین مدل‌سازی و دقت آن‌ها را با یکدیگر مقایسه و ادبیات مربوط به این موضوع را در حد وسیعی معرفی می‌کند. نتایج تخمین‌ها و پیش‌بینی‌ها با وجود اثرات ARCH در رفتار بازدهی سهام سیمان تهران، حاکی از برتری الگوی ARIMA-SCRL نسبت به مدل‌های دیگر است. هم‌چنین در این تحقیق نشان داده می‌شود که اخبار خوب و بد اثرات متقارنی بر قیمت سهام سیمان تهران دارند و مجموع توان دوم بازده‌های هفتگی، سنجدشی بدون تورش را برای تلاطم تحقق‌یافته میسر می‌کند.

طبقه‌بندی JEL: C22, C53, G15

کلید واژه: تلاطم تحقق‌یافته، داده‌های پر فراوانی^۳، اثر اهرمی^۴، پیش‌بینی تلاطم، مدل ARMA، قیمت سهام سیمان تهران.

۱- واژه‌ی تلاطم به معنی volatility به کار گرفته شده است، در پاره‌ای از مقالات از واژه‌ی نوسان نیز استفاده کرده‌اند.

2-Autoregressive Moving Average Structural Change Absolute Return Leverage Effects

3 -Realized Volatility

4 -High-frequency Data

5 -Leverage Effect

۱- مقدمه

قیمت یک دارایی تابعی از تلاطم شرطی است، به همین دلیل پیش‌بینی تلاطم شرطی بازدهی سهام اهمیت زیادی در انتخاب پرتفوی (سبد دارایی)، مدیریت دارایی‌ها و حتی قیمت‌گذاری سهام شرکت‌هایی که به تازگی وارد بورس می‌شوند، دارد. هم‌چنین می‌توان نشان داد که شوک‌ها در دوره‌های تلاطم بالا و یا در دوره‌های تلاطم پایین چه تأثیری بر بازار سهام دارند. با بررسی و مدل‌سازی تلاطم بازار مالی، می‌توان عوامل تأثیرگذار بر تلاطم بازار مالی را شناسایی و وجود حافظه‌ی طولانی، اثرات اهرمیو دیرپایی تلاطم را آزمون کرد. هدف این مقاله یافتن پاسخ‌هایی برای تبیین وجود اثرات ARCH در رفتار بازدهی قیمت سهام سیمان تهران و بررسی تأثیر متقاضی اخبار خوب و بد بر قیمت این سهم است. فرضیه‌ی ما در این بررسی این است که، تأثیر اخبار بد (تکانه‌ی منفی) یا هرگونه واقعه‌ای که سبب سقوط شدید بازار سهام شود، مانند نتایج انتخاباتی غیرمنتظره، تهدیدهای کشورهای بیگانه، متفاوت از تأثیر اخبار خوب (تکانه‌ی مثبت) است.

در این تحقیق مدل‌های غیرخطی^۱ ARIMA-GARCH-GARCH-XRL و ARIMA-GARCH-GARCH برای پیش‌بینی و اندازه‌گیری تلاطم بازدهی سهام سیمان تهران برآورد شده و دقیق‌ترین مدل براساس معیارهای دقت پیش‌بینی، انتخاب می‌شود. داده‌های آماری به صورت بازدهی هفتگی از بورس اوراق بهادار تهران به دست آمده‌اند. این تحقیق در پنج بخش تدوین شده است، پس از این بخش، در بخش دوم به ادبیات موضوع پرداخته می‌شود. در بخش سوم الگوی‌های مختلف در خصوص تلاطم بازدهی سهام مرور می‌شود. بخش چهار به معرفی ساختار داده‌ها، ارایه‌ی نتایج تخمین، آزمون فرضیه‌های تحقیق و مقایسه‌ی دقت مدل‌های مختلف در پیش‌بینی تلاطم می‌پردازد. سرانجام نتیجه‌گیری حاصل از محاسبات و پیش‌بینی‌ها در بخش پنج ارائه می‌شود.

۲- سیری در نوشتارهای پیشین

مهرآرا و عبدالی (۱۳۸۵)، نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام ایران را در شاخص قیمت بورس تهران^۲ (TEPIX) مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند. در این مقاله رابطه‌ی تکانه‌های بازدهی یا قیمت سهام (اخبار) و نوسانات شرطی با استفاده از

1 -Autoregressive Integrated Moving Average Nonlinear Models
2 -Tehran Exchange Price Index

الگوهای GARCH، TARCH و EGARCH متقارن و غیرمتقارن و به صورت روزانه در بازار اوراق بهادار تهران، بررسی و «فرضیه عدم تقارن» آزمون شده، و این طور نتیجه گرفته می‌شود که الگوهای متقارن و غیرمتقارن مذکور، هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر وجود اثرات نامتقارن قوی و معنی‌داری را نشان نمی‌دهند، به این مفهوم که اخبار خوب و بد با اندازه‌ی یکسان، تأثیر مشابهی بر نوسانات شرطی بازدهی دارند. ابونوری و ایزدی (۱۳۸۵)، به ارزیابی اثرهای روزهای هفتگی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. داده‌ها شامل آخرین قیمت معامله شده‌ی روزانه مربوط به شاخص کل و شاخص‌های صنایع و در خلال تیرماه ۱۳۷۱ تا بیستونهم اسفندماه ۱۳۸۲ می‌باشد. ابونوری و ایزدی، به علت وجود ناهمسانی در واریانس شرطی بازده سهام تهران، از مدل‌های GARCH و ARCH و به صورت متقارن و نامتقارن استفاده کرده‌اند. در این مقاله دوره‌ی بررسی نمونه به دو دوره‌ی کم رونق و پر رونق تفکیک شده است، به گونه‌ای که در زیر دوره اول اثر سه‌شنبه، منفی، ولی در زیر دوره‌ی دوم اثر شنبه، یکشنبه و دوشنبه منفی است. ابونوری، یحیی‌زاده‌فر و شبایی (۲۰۰۶) نیز اثرات روزهای هفته را در بازدهی اوراق بهادار تهران را بررسی کرده‌اند. داده‌های مورد بررسی در این مقاله از مارس ۱۹۹۸ (فروردين ۱۳۷۷) تا مارس ۲۰۰۵ (اسفند ۱۳۸۳) و مربوط به شاخص قیمت بورس تهران (TEPIX) مربوط می‌باشد. در این مقاله از مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی GARCH و ARCH و CLR استفاده شده است. آن‌ها با استفاده از آزمون ناهمسانی واریانس وايت^۱ دریافتند که ناهمسانی واریانس فقط در دوره‌ی آوریل ۲۰۰۰ تا مارس ۲۰۰۱ مشاهده می‌شود، بنابراین تنها برای این دوره از مدل GARCH و برای سایر دوره‌ها از مدل CLR استفاده شده است. سرانجام نتیجه گرفتند که اثر شنبه برای بازده، مثبت و اثر یکشنبه برای بازده، منفی معنی‌دار است، و برای دیگر روزهای هفته هیچ اثر معنی‌داری وجود ندارد.

اندرسون، بولرسلو و لانگ (۱۹۹۹)، در مقاله‌ای با عنوان پیش‌بینی تلاطم بازار مالی، به مدیریت و اندازه‌گیری ریسک بازارهای مالی پرداخته‌اند. داده‌های به کار رفته در این مقاله نرخ ارز دلار-مارک (DM/\$) از دوره‌ی دسامبر ۱۹۸۶ تا نوامبر ۱۹۹۶ است. در این مقاله از سری‌های زمانی و از فرآیند VAR برای اندازه‌گیری و پیش‌بینی تلاطم بهره گرفته شده است و مدلی که در این تحقیق بکار رفته، از نوع (1,1) GARCH و به صورت پیوسته و گسسته است. این مقاله نشان می‌دهد روش معتبری برای انتخاب

۱ -White

مدل که در کل قابل قبول باشد؛ وجود ندارد. کلاسن و میتینک (۲۰۰۴)، از شاخص سهام DAX و VDAX طی دوره‌ی سوم فوریه‌ی سال ۱۹۹۲ تا بیست و نهم دسامبر سال ۱۹۹۵ برای مطالعه‌ی تلاطم بازارهای مالی آلمان استفاده کرده‌اند. آن‌ها برای پیش‌بینی تلاطم بازده با تحلیل اطلاعات تلاطم ضمنی^۱، بر مدل‌های مشاهده‌ی قیمت اختیارات^۲ و نیز مدل‌های سری‌های زمانی مانند مدل گام تصادفی، مدل میانگین متحرک و مدل GARCH(۱,۱) متمرکز شده‌اند. با ترکیب هر دو منبع اطلاعاتی، نتایج پیش‌بینی خارج از نمونه و داخل نمونه، حمایت قوی‌تری برای فرضیه‌ی نبود اطلاعاتی فراتر از انتظارات تلاطم بازار بازده‌های گذشته در شاخص قیمت‌های اختیارات DAX، ارائه می‌دهند. به هر حال، فرضیه‌ای که تلاطم ضمنی، یک تخمین‌زن بدون تورش برای تلاطم تحقق یافته‌ی یک، دو و یا چهار هفته آینده است، رد می‌شود. با گنجاندن اطلاعات تلاطم ضمنی در معادله‌ی GARCH و یا با ترکیب پیش‌بینی تلاطم ضمنی با یک جزء ثابت، محقق می‌تواند به پیروی از گرانجر^۳ و رامانathan^۴ (۱۹۸۴) تورش میانگین را اصلاح کند. به‌طور خلاصه نویسنده‌گان نتیجه‌ی می‌گیرند که تلاطم ضمنی اگر چه یک معیار پیش‌بینی کننده‌ی تورش‌دار برای تلاطم آینده می‌باشد، ولی این معیار بسیار آگاهی بخش است. علاوه بر این، تلاطم ضمنی از نظر اطلاعاتی نسبت به منابع اطلاعاتی تلاطم گذشته‌ی دیگر کارآثر و مؤثرتر است.

نلسون و تیلور (۲۰۰۰)، در مطالعه‌ای با عنوان تلاطم تحقیق‌یافته از قیمت‌های آتی^۵ شاخص FTSE 100 به بررسی بازارهای بین‌المللی نرخ ارزهای آتی لندن^۶ (LIFFE) پرداخته‌اند. این مطالعه تمام قراردادهای آتی را که از دوم ژانویه‌ی ۱۹۸۶ تا بیست و نهم دسامبر ۱۹۹۸ بسته شده است، را بررسی می‌کند. نلسون و همکارش نشان دادند که نه توزیع لگاریتمی تلاطم و نه توزیع بازده‌های استاندارد شده از تلاطم تحقیق‌یافته، هیچ کدام دارای توزیع نرمال نیستند، اگر چه توزیع لگاریتم نرمال برای متغیر تلاطم توسط هیچ‌کدام از تئوری‌ها مطرح نمی‌شود، با وجود این، جالب توجه است که توزیع متغیر تلاطم خیلی نزدیک به قانون توزیع لگاریتم نرمال می‌باشد. با توجه به این نکته که تمایز آن با توزیع لگاریتم نرمال در مقادیر بسیار بالای تلاطم است، رفتار سری‌های

1 -Implied Volatility

2 -Observed Option Prices Models

3 -Granger

4 -Ramanathan

5 -Futures Prices

6 -Financial Time Stock Exchange 100 Index

7- London International Financial Futures Exchange

زمانی تلاطم تحقیق یافته 100 FTSE با فرآیند حافظه‌ی بلند مدت، به بهترین صورت توصیف می‌شود. لگاریتم‌های تلاطم روزانه، خودهمبستگی‌های چشم‌گیری را نشان می‌دهند که با افزایش وقفه‌ی زمانی، مقادیر ضرایب خودهمبستگی به سختی به صفر می‌گراید. این در حالی است که در فرآیند کوتاه مدت (مانند مدل‌های ARMA) خودهمبستگی‌ها به سرعت به صفر کاهش می‌یابند، در عوض اختلاف‌های کوچک از تلاطم روزانه، سری‌های اصلاح شده را ارائه می‌دهند که اغلب همبسته نیستند. برکویتز (۲۰۰۰)، برای پیش‌بینی قیمت اختیارات^۱ و مدیریت ریسک از فرآیند VAR استفاده و این فرآیند را با فرآیند شیوه‌سازی مونت‌کارلو و فرآیند حرکتی براونی^۲ مقایسه کرده است. نکته‌ی جالب این مقاله در تعداد مشاهدات مورد استفاده در آن می‌باشد. در سال‌های اخیر با افزایش اهمیت نحوه‌ی پیش‌بینی تلاطم بازارهای مالی، تعداد زیادی از محققان به این موضوع می‌پردازند و بسیاری از آن‌ها معتقدند که فقط با داشتن هزاران مشاهده می‌توان پیش‌بینی‌های فاصله‌ای را ارزیابی کرد. این مقاله در مورد این‌که در پیش‌بینی‌های فاصله‌ای با داشتن داده‌های کم، پیش‌بینی نامناسبی خواهیم داشت، اغراق شده است. در این مقاله آزمون‌های آماری و تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی با تعداد ۵۰۰، ۱۵۰، ۱۰۰ و ۲۵۰ مشاهده انجام گرفته است. نتایج هر بررسی در اندازه‌ی نمونه‌های مختلف نشان داده شده است که این نتایج تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.

اندروز و قی‌سلس^۳ (۲۰۰۲)، کارآیی چندین آزمون برای شکستهای ساختاری در پویایی واریانس شرطی از بازده‌های دارایی را برای داده‌های شاخص‌های 100 FTSE، HSI^۴، NIKKEI^۵ و S&P 500^۶ طی دوره‌ی چهارم ژانویه‌ی ۱۹۸۹ تا نویزدهم اکتبر ۲۰۰۱، بررسی کرده‌اند. هم‌چنین در تجزیه و تحلیل‌ها از نرخ ارز دلار-ین (\$/ ¥) نیز استفاده شده که به صورت بازده‌های پنج دقیقه‌ای از اول دسامبر ۱۹۸۶ تا ششم نوامبر ۱۹۹۶ است. هدف این مقاله، بررسی پیشرفت‌های اخیر در حیطه‌ی نظریه‌ی تخمین نقطه‌ی تغییر^۷، با استفاده از تخمین‌زن‌های متعدد CUSUM به روش نقطه‌ی تغییر و آزمون‌های مربوط به چندین شکست در زمینه‌ی مدل‌های تلاطم، می‌باشد. این آزمون‌ها مبتنی بر مدل خاصی نبوده و برای رده‌ی وسیعی از فرآیندهای به‌شدت

1- Option Prices

2- Brownian Motion

3 -Eric Ghysels

4 -The Hang-Seng Index

5 -The Nikkei 500 Index

6 -The Standard And Poor's 500 Index

7 -Change-Point

همبسته نظری فرآیندهای ARCH و تلاطم تصادفی^۱ (SV) به کار می‌روند. تحقیقات گسترده‌ی شبیه‌سازی مربوط به عملکرد آزمون‌های کوکوسزکا و لیپوس^۲ (۲۰۰۰)، شواهدی را مبنی بر این که آزمون‌ها دارای خواص خوبی در تعیین و تشخیص تغییرات کوچک در همه‌ی پارامترهای GARCH هستند ارائه می‌دهد، اما تا اندازه‌ای متحمل انحرافاتی در دیرپایی مدل GARCH می‌شود. برای فرضیه‌ی شکستهای ساختاری چندگانه، این تحقیق می‌یابد که هر دو آزمون دارای ویژگی توان بالا به ویژه برای معیار RSS در BIC لاویل و مولینس (۲۰۰۰) هستند. همچنین، کاربرد آزمون‌های تغییر-نقطه‌ای^۳ برای سنجش‌های دقیق‌تر تلاطم، مثل فرآیندهای با داده‌های با تناوب بالا ارائه می‌شود که توسط اندرسن و همکارانش (۲۰۰۱)، اندرو قی‌سلس (۲۰۰۰)، در تجزیه و تحلیل‌های کاربردی، سری‌های زمانی مالی گوناگون مثل نرخ ارز و بازدهی اوراق بهادر برای بازارسهام هنگ‌کنگ، ژاپن، انگلیس و امریکا به کار گرفته شده است. کاربردهای آزمون‌های کوکوسزکا و لیپوس (۲۰۰۰)، به خوبی آزمون‌های لاویل و مولینس^۴ (۲۰۰۰) نقاط تغییر را در پویایی تلاطم تشخیص می‌دهد، که به بحران‌های مالی آسیا و روسیه مرتبط است.

اندرسن، بلرسلو، لابیس و دیبولد (۲۰۰۰)، پایه‌های نظری آزمون و آنالیز سری‌های زمانی تلاطم تحقیق یافته از بازدههای فاصله‌ای طول روز با تناوب بالا برای یک دوره‌ی ده ساله از بازدههای پنج دقیقه‌ای نرخ دلار-مارک (DM/\$) و دلار-ین (¥/\$) را تجزیه و تحلیل کردند. آن‌ها دریافتند که توزیع واریانس تحقیق‌یافته‌ی روزانه، انحراف معیار و کوواریانس‌ها چولگی به طرف راست و کشیده هستند، ولی توزیع‌های لگاریتمی انحراف معیار و همبستگی‌ها تا حدودی شبیه توزیع گاوی‌اند. همچنین نتیجه گرفتند که ارزش شواهد فعلی، اثرات قوی خوشبندی تلاطم را در بازدههای روزانه تأیید می‌کند. هر چند که، برخلاف کارهای قبلی انجام شده، این موارد اغلب نشان می‌دهند که دیرپایی تلاطم^۵ به سرعت در طول زمان کاهش می‌یابد، این مقاله در می‌یابد که حتی تلاطم‌های تحقیق‌یافته ماهانه به شدت دیرپا هستند. با وجود این، تلاطم‌های تحقیق‌یافته دارای ریشه‌ی واحد نبوده و انباشتگی^۶ کسری دارند. یافته‌ها نشان می‌دهد

1 -Stochastic Volatility

2 -Kokoszka and Leipus Tests

3 -Change-Point Tests

4 -Lavielle and Moulines Tests

5 -Volatility Persistence

6 -Fractional Integration

که مدل خطی چند متغیره‌ی حافظه‌ی بلند مدت گاوسی برای خود همبستگی و انحراف معیار لگاریتمی تحقیق‌یافته‌ی روزانه، مناسب است. چنین مدلی می‌تواند به پیشرفت‌های مهمی در دقت تلاطم و پیش‌بینی‌های همبستگی و محاسبات از نوع ارزش در معرض ریسک^۱ منجر شود.

اومن (۲۰۰۴)، به مدل‌سازی واریانس تحقیق‌یافته، وقتی که بازده‌ها همبستگی پیاپی دارند، پرداخته است. در این مطالعه از فرآیند ARIMA و از داده‌های شاخص FTSE 100 به مدت ده سال (از اول ماه مه ۱۹۹۰ تا یازدهم ژانویه ۲۰۰۰) استفاده شده است. این مقاله نشان می‌دهد هنگامی که بازده‌های اضافی^۲ دارای خود همبستگی پیاپی هستند، واریانس تحقیق‌یافته^۳ یک تخمین‌زن تورش دار از واریانس بازده‌ها بوده و رابطه‌ی بین فراوانی نمونه‌گیری و وجود همبستگی پیاپی بازده‌ها، با جزئیات بیشتر آنالیز شده و نشان می‌دهد که همبستگی پیاپی در بازده‌ها تحت شرایط هم‌فروزنی زمانی با یک نرخ نزولی کاهش می‌یابد، که منطبق با یک فرآیند ARMA است. یک روش مبتنی برتابع خودکواریانس برای انتخاب تناوب نمونه‌گیری بهینه پیشنهاد می‌شود. در این زمینه سه رویکرد را می‌توان مورد بررسی قرار داد. رویکرد اول، استفاده از همه‌ی داده‌های موجود برای مدل‌سازی صریح اثرات زیر ساختاری بازار^۴ است. دوم این‌که، اصلاح برای تورش با تقسیم تخمین واریانس تحقیق‌یافته تورش دار بر یک برآورد ثابت مناسب (یا هر نوع تابعی که تخمین‌زن غیرتورش دار را به دست می‌آورد) و رویکرد سوم، استفاده از تخمین‌زن‌های کواریانس از نوع Newey-West^۵ برای درنظر گرفتن خود همبستگی پیاپی در داده‌های مزیت رویکرد سوم این است که کارآتر از رویکرد هم‌فروزنی زمانی می‌باشد. با توجه به مجموعه‌ی داده‌های FTSE-100، او من نتیجه گرفت که سری‌های واریانس تحقیق‌یافته می‌توانند به عنوان یک فرآیند ARFIMA مدل‌سازی شوند.

1 -Value-at- Risk

2 - بازده‌هایی را که بیش‌تر از بازده‌های در نظر گرفته شده برای مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی هستند، بازده‌های اضافی می‌نامند.

3 -Realized Variance

4 - Explicitly Modeling The Market Microstructure Effects.

5 - یک روشی برای تخمین واریانس است. از این روش در صورت نقض فروض کلاسیک (CLR)، یعنی وجود ناهمسانی واریانس یا خود همبستگی، استفاده می‌شود.

مک‌کوردی و محو^۱ (۲۰۰۲)، با استفاده از فرآیندهای تلاطم تصادفی، GARCH (۱,۱) و مدل‌های مارکف، تلاطم تحقیق‌یافته را با تلاطم غیرقابل مشاهده^۲ طی دوره‌ی اول دسامبر ۱۹۸۶ تا اول دسامبر ۱۹۹۶، به صورت بازده‌های پنج دقیقه‌ای از سهام شاخص FX، بررسی کردند. آن‌ها نشان می‌دهند که تلاطم تحقیق‌یافته، سنجشی بدون خطای تلاطم غیرقابل مشاهده‌ی گذشته نگر^۳ نخواهد بود. بیان یک رابطه‌ی تابعی بین تخمین مستقیم از تلاطم و فرآیند تولید داده‌های غیرقابل مشاهده برای تلاطم روزانه، این امکان را فراهم می‌کند که برای فرآیند تولید داده‌های تلاطم روزانه، بر حسب تلاطم تحقیق‌یافته و دیگر متغیرهای موجود در مجموعه اطلاعات و جزء خطای پارامتری-سازی شود. در این چارچوب مدل‌های تلاطم غیرقابل مشاهده‌ی استاندارد، جایگزین مدل سری‌های زمانی ARMAX می‌شوند. هم‌چنین نشان دادند که مدل غیرخطی این بررسی، چندین ویژگی مهم تلاطم FX را ندارد. برای مثال، شواهدی از دیرپایی وابسته به زمان^۴ در تلاطم مشاهده می‌شود و هم‌چنین واریانس شرطی تلاطم، به زمان وابسته است. بازده‌های FX، دوره‌های نرمال دارای تلاطم پایین و نسبتاً ثابت و سایر دوره‌های تلاطم بالا را نوسانی نشان می‌دهند. ویژگی دوم معمولاً اتفاق نمی‌افتد، ولی ممکن است برای دوره‌ی زمانی بلند مدت ادامه داشته باشد. شواهد غیرخطی بودن در تلاطم تحقیق-یافته دارای توصیه‌های سیاستی مهمی نظیر، دقت در پیش‌بینی‌ها، پوشش ریسک و قیمت‌گذاری مشتقات^۵ برای مالیه‌ی تجربی است. این موضوع از دو جهت اهمیت دارد. اول این‌که، بررسی تغییرات شدید ناگهانی در سطح تلاطم شاخص اختیارات FX، دوم برای بررسی اثر تغییرات زمانی واریانس در قیمت‌گذاری مشتقات که برای آن موضوع قابل اهمیت یک معیار نظری شاخص تلاطم است.

حال و کوپمن (۲۰۰۲)، توانائی‌های پیش‌بینی مدل‌های شش‌گانه‌ی تلاطم را از دوره‌ی ششم ژانویه‌ی ۱۹۹۷ تا بیستونهم دسامبر ۲۰۰۰ و به صورت بازده‌های پنج دقیقه‌ای، تجزیه و تحلیل کردند. آن‌ها به‌طور تجربی کارآیی پیش‌بینی خارج از نمونه را برای روش‌های متعدد با شاخص سهام S&P 100 در طی دوره‌ی سیزدهم مارس تا بیستونهم دسامبر ۲۰۰۰ و با دامنه‌ی افق یک روز تا یک هفته پیش‌بینی کردند و نتیجه گرفتند که مدل‌های شامل اطلاعات درون روز، بهتر از مدل‌های تنها مبتنی بر

1- John M. Maheu.

2- Latent Volatility.

3- Ex-post Latent Volatility.

4- Time-Varying Persistence.

5 -Heding and Pricing of Derivatives

بازدههای روزانه، تلاطم را پیش‌بینی می‌کند. دقیق‌ترین پیش‌بینی‌ها با مدل ARFIMA-RV به دست می‌آید که با مدل تلاطم تصادفی SVX و UC-RV همراه شود. اگرچه مدل (1,1) GARCH با تلاطم درون روزانه به کار بسته می‌رود، اما وقتی پیش‌بینی‌های آن براساس روش‌های رگرسیونی ارزیابی می‌شود، برای انجام پیش‌بینی، مطلوب به نظر می‌رسد. سایر معیارهای ارزیابی نشان می‌دهند که این روش، تلاطم را دست بالا تخمین می‌زند، همان‌طوری که مدل (1,1) GARCH با این مشکل روبرو است. سرانجام این که در نبود اطلاعات تلاطم درون‌روز، مدل تلاطم تصادفی بهترین مدل برای پیش‌بینی تلاطم تشخیص داده می‌شود.

هانسن (۱۹۹۹)، ارتباط بین تلاطم تحقیق‌بافته و تلاطم ضمنی در شاخص سهام اختیارات دانمارک (KFX) را در خلال سپتامبر ۱۹۹۵ تا آوریل ۱۹۹۸ بررسی کرده است. او از روش‌های OLS و 2SLS برای تجزیه و تحلیل‌های خود استفاده می‌کند. این مقاله نحوه اندازه‌گیری تلاطم ضمنی را با استفاده از قیمت‌های اختیارات خرید و فروش در شاخص KFX دانمارک مورد مطالعه قرار می‌دهد و علاوه بر آن چگونگی پیش‌بینی تلاطم بازده شاخص تحقیق‌بافته آتی‌ها را مد نظر قرار داده است و نتیجه می‌گیرد که تلاطم بازده گذشته، اطلاعاتی فراتر از تلاطم ضمنی را به دست نمی‌دهد، حتی اگر اطلاعات بیشتری در معیار تلاطم تاریخی در مقایسه با تلاطم تحقیق‌بافته با وقهی ساده آورده شود. از این‌رو نمی‌توان فرضیه‌ی کارآیی را در تلاطم ضمنی یک ماهه، ولی با یک تخمین‌زن اندکی تورش‌دار از تلاطم ضمنی، شاخص قیمت اختیارات خرید یا فروش KFX، رد کرد. تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بازار اختیارات S&P ممکن است کارآیی یکسانی با بزرگ‌ترین بازار اختیارات مانند OEX در شاخص 100، داشته باشد. در برخی از ماه‌ها به علت کاهش خرید و فروش اختیارات شاخص KFX، امکان قیمت‌گذاری یا تعیین قیمت‌های اختیارات خرید یا فروش توسط آربیترژها وجود نداشته است، بنابراین یک تلاطم ضمنی متعارف را معرفی می‌کند که آن شامل اطلاعاتی از قیمت‌های اختیارات خرید و فروش است، به گونه‌ای که هیچ مشاهده‌ی از دست رفته (مفقوده) نخواهیم داشت. هانسن نتیجه می‌گیرد که این معیار از تلاطم ضمنی یک پیش‌بینی مناسبی از تلاطم بازده‌ی تحقیق‌بافته آینده در مقایسه با تلاطم‌های ضمنی اختیارات خرید و فروش جداگانه است. این معیار کارآ حتی در رگرسیون‌های مرکب که در آن تلاطم تاریخی نیز به عنوان متغیر توضیحی آورده

می‌شود، معنی دار است، بنابراین روشی برای پیش‌بینی تلاطم بازدهی تحقیق یافته در یک بازار با مبادله‌ی اختیارات غیر متناوب ایجاد می‌شود.

بلرسло و رایت (۲۰۰۱)، پویائی‌های مدل‌سازی تلاطم با داده‌های پر فراوانی و با استفاده از مدل‌های (.) ARMA لگاریتم مجذور بازده‌ها، مجذور بازده‌ها و قدر مطلق بازده‌ها را طی دروهی اول دسامبر ۱۹۸۶ تا اول دسامبر ۱۹۹۶ و نرخ ارز دلار-مارک (آلمان) تحلیل کردند. در تجزیه و تحلیل آن‌ها از فرآیند (1,1) ARMA و مدل EGARCH و GARCH می‌گیرند که وقتی داده‌های درون‌روز پر فراوانی به کار گرفته می‌شود، مدل‌های ARMA(.) ساده‌دارای کارکرد بهتری در پیش‌بینی تلاطم آینده نسبت به مدل‌های EGARCH و GARCH متناسب با داده‌های روزانه و درون‌روز، دارند.

ویلر و نیلی (۲۰۰۱)، پیش‌بینی تلاطم نرخ ارزین-مارک (DM/¥) را با استفاده از مدل‌های برنامه‌ی ژنتیک، (1,1) GARCH و ریسک‌متريک، طی دوره‌ی ژوئن ۱۹۷۵ تا سپتامبر ۱۹۹۹ مورد بررسی قرار داده‌اند. این مقاله به تجزیه و تحلیل پیش‌بینی تلاطم شرطی در بازار ارز برای توصیف نقاط قوت و ضعف برنامه‌ریزی ژنتیک^۱ می‌پردازد. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که مدل برنامه‌ریزی ژنتیک در مقایسه با مدل GARCH و ریسک‌متريک، از دقت بیشتری برخوردار است. مدل برنامه‌ریزی ژنتیک پیش‌بینی قابل قبولی از تلاطم خارج از نمونه را دارد، که این مقایسه به وسیله‌ی معیار MSE و همچنین^۲ R رگرسیون مدل انجام می‌گیرد. همچنین نشان داده شده است که اگر فراوانی مشاهدات بین روز افزایش یابد، دقت پیش‌بینی‌ها براساس مدل GARCH (1,1) بهبود می‌یابد.

۳- مدل‌سازی‌های تلاطم

روش‌های خطی در پیش‌بینی دراز مدت، ناتوانی این روش‌ها در تشخیص الگوهای موجود در داده‌های یک سری زمانی غیرخطی و عدم پایداری روش‌های خطی در برابر اختلال‌های موجود، سبب شده است که اقتصاددانان در جستجوی روش‌های غیرخطی باشند، که در این تحقیق نیز از این سه مدل ARCH، ARIMA-SCRL و GARCH غیرخطی در کنار مدل‌های دیگر، برای پیش‌بینی تلاطم هفتگی بازده سهام استفاده می‌شود.

1- Genetic Programming.

2- Autoregressive Moving Average Structural Change Absolute Return Leverage Effects.

برای سادگی فرض را بر این قرار می‌دهیم که $p_{t,i}$ لگاریتم قیمت سهام شرکت سیمان تهران از روز t در هفته t باشد، بنابراین بازده بین دو روز از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$r_{t,j} = p_{t,i} - p_{t,i-1} \quad (1)$$

بنابراین،

$$s_t^2 = \sum_{j=1}^5 r_{t,j}^2 \quad (2)$$

که در آن s_t^2 تلاطم تحقیقته‌ی هفته t است شود، یک روش ساده که در آن غیرخطی بودن می‌تواند وارد سری زمانی گردد، در نظر گرفتن واریانس (یا واریانس شرطی) فرایند در یک زمان‌های خاص تاپیوسته یا در تمام زمان‌ها به صورت پیوسته، می‌باشد. اگرچه فرض مانایی ایجاب می‌کند که واریانس، فرایند مستقل از زمان باشد، ولی این به معنی ثابت بودن واریانس شرطی نیست، زیرا که هر نوع گشتاور شرطی تابعی از مقادیر شرط است. این مدل اولین بار توسط انگل شناخته شده از مدل‌های غیرخطی برای سری‌های زمانی مالی است. در پاره‌ای از کاربردهای ARCH، معادلات واریانس شرطی با وقفه‌های نسبتاً طولانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که تعیین ساختار وقفه‌ها برای جلوگیری از مشکل پارامترهای منفی در واریانس، ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان فرایندی با حافظه‌ی طولانی‌تر و ساختار وقفه‌ی انعطاف‌پذیرتر، از رده‌ی^۱ ARCH انتخاب کرد. برای دستیابی به انعطاف‌پذیری بیشتر، یک تعمیم دیگر به صورت فرآیند ARCH تعمیم یافته (GARCH) پیشنهاد شده است.

مدل‌های میانگین متحرک انباسته‌ی خود همبسته^۲ (ARIMA) نیز برای توصیف خواص دینامیک لگاریتم تلاطم تحقیقته به کار گرفته می‌شود، به طوری که:

$$\phi(L)(1-L)^d(s_t^2 - \mu_t^2) = \varepsilon_t \quad (3)$$

$$\phi(L) = 1 - \phi_1 L - \dots - \phi_p L^p \quad (4)$$

1- First Order Autoregressive Conditional Heteroskedastic.

2- Class.

3- Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Process.

که در آن d مرتبه‌ی انباشتگی و $(L)^d$ یک چند جمله‌ای از مرتبه‌ی P می‌باشد که دارای ریشه‌های خارج از دایره‌ی واحد و ϵ_t فرایند نویز سفید است. برای به دست آوردن ویژگی‌های تلاطم تحقق یافته‌ی بازار مالی، می‌توان مدلی را برای تغییر تدریجی سطح، اثرات غیرخطی بازده‌های تأخیری به کار بست:

$$\mu_t = \alpha_0 + p(t) + \beta_1 |r_{t-1}| + \beta_2 I[r_{t-1} < 0] + \beta_3 |r_{t-1}| I[r_{t-1} < 0] \quad (5)$$

$$p(t) = \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \alpha_3 t^3 + \alpha_4 t^4 + \alpha_5 t^5 \quad (6)$$

$p(t)$ یک چند جمله‌ای از درجه‌ی ۵ است. عبارت (۶)، به مدل اجازه می‌دهد تا شکست ساختاری را در تلاطم محاسبه کند. مدل ARMA بالا با تغییر ساختاری^۱ (SC)، بازدهی مطلق (R) و اثرات اهرمی (L) را نتیجه می‌دهد، که آن را با SCRL نشان می‌دهند.

هم‌چنین مدل دیگری را برآورد می‌کنیم که در آن مؤلفه‌های مربوط به بازدهی‌های با تأخیر در قسمت میانگین شرطی μ_t گنجانده نمی‌شوند، اما به عنوان متغیرهای توضیحی بروزنزای (X) در مدل آورده شده و با ARMA-SCXRL نشان داده می‌شوند:

$$\Phi(L)(1-L)^d(s_t - \mu_t) = \tilde{\beta}_1 |r_{t-1}| + \tilde{\beta}_2 I[r_{t-1} < 0] + \tilde{\beta}_3 |r_{t-1}| I[r_{t-1} < 0] + \varepsilon_t \quad (7)$$


به طوری که در آن:

$$\mu_t = \alpha_0 + p(t) \quad (8)$$

در این مقاله سه تکنیک یاد شده مهم‌ترین روش‌هایی هستند که در تحلیل ساختار تلاطم بازدهی سهام سیمان تهران به کار بسته می‌شوند، ولی علاوه بر آن از تکنیک ریسک متریک نیز استفاده و نتایج آن مقایسه می‌شود.


۴- ساختار داده‌ها

داده‌های این تحقیق مشاهدات مربوط به قیمت سهام شرکت سیمان تهران و به صورت نرخ رشد قیمت سهام (بازده) می‌باشد که در خلال سوم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد تا بیست و ششم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج انجام گرفته شده است. این داده‌های روزانه (پنج روز در هفته) برای سازگاری با مدل تحقیق به داده‌های هفتگی تبدیل می‌شوند. منابع جمع‌آوری داده‌ها سازمان بورس و اوراق بهادر تهران است. نمودار (۱)، میانگین هفتگی لگاریتم قیمت سهام شرکت سیمان تهران را از ۱۳۷۰/۰۱/۲۶ تا ۱۳۸۵/۰۷/۲۶ نشان می‌دهد.




نمودار ۱- لگاریتم قیمت سهام شرکت سیمان تهران

نمودار (۲)، سری‌های زمانی واریانس تحقیق‌یافته (الف) قیمت سهام شرکت سیمان تهران و هم‌چنین سری‌زمانی انحراف معیار تحقیق‌یافته (ب) برای دوره‌ی نمونه از ۱۳۷۰/۰۱/۲۶ تا ۱۳۸۵/۰۷/۲۶ را ارائه می‌دهد.



نمودار ۲-الف: واریانس تحقق یافته‌ی سهام



نمودار ۲-ب: انحراف معیار واریانس تحقق یافته‌ی سهام

در جدول (۱)، آماره‌های توصیفی از میانگین، واریانس و انحراف معیار قیمت سهام آورده می‌شود. هم‌چنین اندازه‌گیری تلاطم برای بازده‌های هفتگی r_t ، که در آن $r_t = \sum_{j=1}^5 r_{t,j}$ ، ویژگی‌های آماری واریانس و انحراف معیار تحقق یافته‌ی هفتگی، خواص آماری قیمت سهام و لگاریتم قیمت سهام محاسبه شده است. میانگین قیمت در دوره بررسی نمونه‌ی ۱۱۶۵/۱۹ و انحراف معیار آن، ۱۰۹۰/۱۹ و به صورت لگاریتمی به ترتیب $۳/۹۱۲$ و $۰/۳۵۴$ می‌باشد. مقادیر انحراف معیار نشان می‌دهد که این متغیر در طول دوره‌ی مورد بررسی از تلاطم بالایی برخوردار بوده است. این شدت تلاطم را نمودار (۲) نیز نشان می‌دهد. در مورد میانگین، واریانس و انحراف معیار هفتگی قیمت


و لگاریتم قیمت سهام می‌توان این تلاطم را مشاهده کرد. ویژگی‌های جالبی از جدول (۱) به دست می‌آید، که همانند ویژگی‌های توزیعی برای تلاطم نرخ ارز ارائه شده در تحقیقات اندرسون است. اولاً مقایسه‌ی مجدد بازده‌های هفتگی با واریانس تحقق یافته (۸۴) نشان می‌دهد که هر دو تقریباً دارای یک میانگین (به ترتیب ۰/۰۰۰۴۲ و ۰/۰۰۰۶) هستند و انتظار داریم که هر دو آن‌ها معیارهای بدون تورشی از تلاطم تحقق یافته باشند. اگر چه انحراف معیار، واریانس تحقق یافته برابر با ۰/۰۳۲ بوده و بزرگ‌تر از انحراف معیار مجدد بازده‌هاست که در حدود ۰/۰۰۲۳ می‌باشد.

جدول ۱- توصیف آماری داده‌ها


	میانگین	میانه	Min	Max	انحراف معیار	ضریب چولگی	ضریب کشیدگی
قیمت سهام	۱۱۶۵۱.۱۹۰	۷۰۶۲	۱۶۶۱	۵۰۹۰۰	۱۰۹۱۰.۱۹۴	۱.۶۶۲۱۰	۱.۹۱۰۶۳
میانگین هفتگی قیمت سهام	۱۰۸۶۱.۲۳۵	۶۷۱۰	۱۶۶۱	۴۹۸۹۶	۱۰۵۸۰.۶۷۵	۱.۷۸۴۸۳	۲.۴۴۶۳۰
واریانس هفتگی قیمت سهام	۹۵۷۸۷.۴۵۲	۱۷۲۴۸	.	۱۱۱۳۰.۵۹۴	۴۹۱۲۲۸.۳۰	۱۵.۷۱۷۱	۳۲۴.۰۳۲
انحراف معیار هفتگی قیمت سهام	۱۴۵۶۸۵۰.۴	۴۱.۴۲۱	.	۳۳۳۶.۲۵۴۶	۲۷۲.۵۸۱۹۶	۴.۳۵۳۹۱	۳۱.۳۶۷۵
لگاریتم قیمت سهام	۳.۹۱۲۸۰	۳.۸۴۸۹۲۷	۳.۲۲۰.۳۶	۴.۷۰۶۷۱	۰.۳۵۴۳۳	۰.۴۲۸۳۹	-۰.۶۵۱۲
میانگین هفتگی لگاریتم قیمت	۳.۸۷۵۸۸	۳.۸۲۶۵۸۰	۳.۲۲۰.۳۶	۴.۶۹۸۱۰	۰.۳۵۷۴۱	۰.۵۱۴۸۲	-۰.۵۸۸۳
واریانس هفتگی لگاریتم قیمت	۰۰۰۰۱۱۵	-۶۸۶.۷۴۵	.	۰۰۰۸۰۰	۰۰۰۰۷۳	۷.۶۲۹۶۵	۶۳.۴۶۲۰
انحراف معیار هفتگی لگاریتم قیمت	۰۰۰۰۵۶۷	۰۰۰۲۵۹۶	.	۰۰۱۸۹۴۷	۰۰۱۰۹۶	۴.۵۶۷۴۵	۲۵.۲۱۹۴
بازدهها	۰۰۰۰۳۱۷	.	-۰.۱۶۳۳۶	۰.۱۷۹۲۵	۰۰۲۰۳۸	۲.۲۸۵	۲۹.۴۹۰
مجذور بازدهها	۰۰۰۰۹۵۰	۰۰۰۰۳۶۹	.	۰.۰۳۲۱۳	۰۰۰۲۳۷	۱۰.۱۷۵	۱۱۴.۴۵۴
قدر مطلق بازدهها	۰۰۰۰۰۶۰	۰۰۰۰۰۱	.	۰.۱۷۹۲۵	۰۰۱۸۳۱	۵.۲۴۰	۳۶.۷۱۸
واریانس تحقق یافته	۰.۰۱۰۱۹	۰.۰۰۴۳۷	.	۰.۰۳۸۳۱	۰۰۰۳۲۵	۷.۹۸۳	۶۹.۴۱۷
تلاطم تحقق یافته			.	۰.۱۹۵۷۵	۰۰۲۲۲۹	۵.۱۵۸	۳۰.۹۸۳

منبع: جدول داده‌های هفتگی قیمت سهام سیمان تهران برای توصیف بازده، واریانس تحقق یافته، تلاطم تحقق یافته، دوره‌ی نمونه از ۱۳۷۰/۰۱/۰۳ تا ۱۳۸۵/۰۷/۲۶ (شامل ۸۱۲ مشاهده‌ی هفتگی)

دوم این که متغیر واریانس تحقیق یافته و انحراف معیار آن چولگی به راست داردند. هم‌چنین دمب آن‌ها باریک و کشیده است و آزمون‌های آماری نشان می‌دهند که این فرایند نرمال نیست. این نمودارها ضریب کشیدگی^۱ را نیز بیش از کشیدگی توزیع نرمال نشان می‌دهند. توزیع آن‌ها در نمودار (۳) نشان داده شده است.




نمودار ۳-الف- توزیع تلاطم تحقیق یافته‌ی هفتگی



نمودار ۳-ب- توزیع انحراف معیار تحقیق یافته‌ی هفتگی قیمت سهام

سوم این که توزیع بازده‌های هفتگی سهام تقریباً متقاضی است، ولی آزمون نرمال بودن توزیع بازده‌ها نشان می‌دهد که توزیع بازده‌ها نیز نرمال نیست و دمب آن باریک است. نمودار (۴) نشان می‌دهد که توزیع بازده‌های هفتگی دارای کشیدگی بلند و دمب آن مسطح است.

1- Kurtosis Coefficient.



نمودار ۴- توزیع بازده هفتگی سهام سیمان تهران

۱-۱- برآوردها و تحلیل نتایج

در این بخش ابتدا به بررسی کلی تلاطم تحقق یافته اشاره کرده و سپس به تخمین مدل‌های ARIMA می‌پردازیم. آزمون ریشه‌ی واحد حاکی از نبود ریشه‌ی واحد در سری بازده است، بنابراین $d=0$ و در نتیجه مدل به صورت ARMA می‌باشد. با توجه به نمودار (۲) که واریانس تحقق یافته را نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد که تلاطم در اوایل دوره‌ی نمونه به طور متوسط بالاتر از تلاطم موجود در طی پایان دوره‌ی نمونه می‌باشد. به طور کلی از سال ۱۳۷۰ الی سال ۱۳۷۵ افزایش تدریجی تلاطم مشخص است. بدین مفهوم که چندین شکست ساختاری در طی این دوره روی داده است. اما از سال ۱۳۷۵ به بعد تلاطم به صورت نزولی کاهش یافته و در این دوره شکست ساختاری مشاهده نمی‌شود.

$$s_t^2 = -0.0002 + 0.0584 |r_{t-1}| + 0.0002 I[r_{t-1} < 0] \\ \begin{pmatrix} -1/26 \\ 0/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8/14 \\ 0/... \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0/99 \\ 0/320 \end{pmatrix} \\ + 0.0482 |r_{t-1}| I[r_{t-1} < 0] \\ \begin{pmatrix} 3/72 \\ 0/... \end{pmatrix} \quad (9)$$

اگر $\phi(L) = 1 - \phi(L)$ باشد، با جایگذاری μ_t در رابطه‌ی (۷) و بعد از اعمال عملیات ریاضی، رابطه‌ی فوق به صورت معادله (۱۰) خلاصه می‌شود:

$$s_t^r = \alpha_0 + p(t) + \phi_1 s_{t-1}^r + \beta_1 |r_{t-1}| + \beta_2 I[r_{t-1} < 0] + \beta_3 |r_{t-1}| I[r_{t-1} < 0] + \varepsilon_t \quad (10)$$

این مدل به ARMA-SCXRL مشهور است. در این قسمت مدل‌های متفاوتی نظیر مدل اثرات اهرمی (L)، بازده‌های وقفه‌ای (R) و شکست ساختاری (SC) را به صورت جداگانه برآورد کرده و مورد بحث قرار می‌دهیم. همچنین با توجه به نمودار (۲)-(الف)، برای تخمین و پیش‌بینی بهتر تلاطم، از پنج متغیر مجازی^۱ روزهای هفته استفاده می‌شود. بنابراین رابطه‌ی (۱۰) در نهایت به صورت زیر بیان می‌شود:

$$s_t^r = \alpha_0 + p(t) + \phi_1 s_{t-1}^r + \beta_1 |r_{t-1}| + \beta_2 I[r_{t-1} < 0] + \delta_1 dum_1 t + \delta_2 dum_2 t + \delta_3 dum_3 t + \delta_4 dum_4 t + \delta_5 dum_5 t + \varepsilon_t \quad (11)$$

که در آن متغیرهای مجازی روزهای کاری هفته از شنبه تا چهار شنبه است. نتایج جدول (۲) اشاره می‌کند که در مدل‌های مربوط به بازده‌های تأخیری رابطه‌ی معنی‌داری بین r_{t-1} و s_t^r وجود دارد، یعنی افزایش یا کاهش بازده دوره گذشته با افزایش تلاطم رابطه‌ی مستقیمی دارد. همچنین شواهد موجود، اثر اهرمی را رد می‌کند. بدین معنی که تأثیر اخبار خوب و اخبار بد بر بازار سهام شرکت سیمان تهران از تقارن برخوردار است. به عبارت دیگر تأثیر اندازه‌ی تکانه‌های مثبت و منفی در بازار سهام یکسان می‌باشد. این نتیجه متفاوت از ماهیت بورس کشورهای توسعه یافته است، زیرا در کشورهای توسعه یافته تأثیر اخبار خوب و بد بر بازار بورس از عدم تقارن دارد، این نتیجه‌ی غیرمتعارف می‌تواند به دلایل زیر باشد:

(اول) دخالت دولت در تعیین قیمت سیمان، نقش بهسازی در تلاطم بازار سیمان دارد

(دوم) تلاطم قیمت در بورس تهران با توجه تنظیم و مداخلات دولتی نمی‌تواند از یک دامنه‌ی مشخصی بالاتر رود.

۱- با توجه به نمودار ۲ قسمت (الف)، مشاهده می‌شود که در طی دوره‌ی ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۰ چند تلاطم شدید اتفاق افتاده است. این موضوع نشان دهنده‌ی این است که ظاهراً در آن سال‌ها این نوسانات به علت خاصی رخ داده است که متأسفانه مسئولان شرکت سیمان تهران از علت این نوسانات اطلاعی نداشتند.

جدول ۲- برآوردهای تلاطم تحقیق یافته و آمارهای آزمون - معادله ۱۱

	ARMA-X	ARMA-XR	ARMA-XRL	ARMA-SCX	ARMA-SCXR	ARMA-SCXRL
α_0	..262 (-....)	..259 (-....)	..262 (-....)	..265 (-....)	..262 (-....)	..265 (-....)
β_1	-	..82 (-....)	..81 (-....)	-	...80 (-....)	..82 (-....)
β_2	-	-	-AEY1 (-....)	-	-	-AE1.93 (-....)
β_3	-	-	..520 -...48 (-....)	-	-	..51 (-....)
$\hat{\phi}_1$..337 (-....)	..147 (-....)	..143 (-....)	..317 (-....)	..179 (-....)	..163 (-....)
$\hat{\sigma}_\epsilon$..32 ..985 -...68	..32 ..986 -...67	..33 ..987 -...64	..32 ..985 -...65	..32 ..985 -...66	..32 ..985 -...62
R ²	-...1.7 (-....)	-...1.2 (-....)	-...1.0 (-....)	-...1.9 (-....)	-...1.4 (-....)	-...1.7 (-....)
dum1	...68 (-....)	...67 (-....)	...64 (-....)	...65 (-....)	...66 (-....)	...62 (-....)
dum2	(-....)	(-....)	(-....)	(-....)	(-....)	(-....)
dum3	-...82 (-....)	-...85 (-....)	-...85 (-....)	-...81 (-....)	-...83 (-....)	-...84 (-....)
dum4	-...39 (-....)	-...41 (-....)	-...41 (-....)	-...40 (-....)	-...41 (-....)	-...41 (-....)
dum5	-...31 (-....)	-...29 (-....)	-...30 (-....)	-...32 (-....)	-...30 (-....)	-...30 (-....)
MA(1)	-	..875 (-....)	-...120 (-....)	-	-	-
MA(2)	-	(-....)	(-....)	-	-	-
MA(3)	..580 (-.1.5)	-	-	-	-	-
MA(4)	..1219 (-....)	..1.50 (-....)	..1144 (-....)	-	-	-
MA(5)	-	-	-	-	-	-
MA(6)	-	-	-	-	-	-
MA(7)	-	-	-	-	-	-
MA(8)	-	-	-	-	-	-
MA(9)	-	-	-	-	-	-
MA(10)	-	-	-	-	-	-
AIC	-...785 (-....)	..876 (-....)	-...662 (-....)	-	-	-
LMSC(1)	-12.811 (-....)	-12.855 (-....)	-12.879 (-....)	-12.897 (-....)	-12.879 (-....)	-12.872 (-....)
LMSC(2)	-12.871 (-....)	-12.776 (-....)	-12.793 (-....)	-12.777 (-....)	-12.754 (-....)	-12.745 (-....)
LMSC(3)	-1.893 (-....)	-7.244 (-....)	-3.933 (-....)	1.0.9 (-....)	9.74 (-....)	10.9. (-....)
LMSC(4)	-6.633 (-....)	(-....)	(-....)	(-....)	(-....)	(-....)
LMSC(5)	-3.846 (-....)	-7.054 (-....)	-7.280 (-....)	-1.685 (-....)	2.68 (-....)	2.99 (-....)
LMSC(6)	-1.873 (-....)	-6.19 (-....)	-6.02 (-....)	-0.501 (-....)	-0.20 (-....)	(-....)
ARCH LM	1.78 (-....)	9.64 (-....)	6.181 (-....)	1.73 (-....)	2.0.3 (-....)	2.34 (-....)
	..59 (-....)	(-....)	(-....)	(-....)	(-....)	(-....)

منبع: تخمین پارامتری مدل های ARMA برای تلاطم تحقق یافته هی هفتگی قیمت سهام سیمان تهران برای دوره ۱۰۳/۰۷/۲۶ الی ۱۳۸۵/۰۷/۲۶.

با توجه به شش مدل تخمين زده شده مشاهده می شود که مدل ARMA-XRL کمترین مقدار را برای معیارهای آکایک و شوارتز دارد. همچنین مدل از R^2 بسیار مناسب، یعنی ۹۸.۷٪ برخوردار می باشد. با توجه به مقدار $(LM_{SC}(5), LM_{SC}(10))$ و $LM_{SC}(P)$ -در ستون ARMA-XRL، مشاهده می شود که مدل با مشکل خودهمبستگی مواجه نیست. سرانجام این که آزمون وجود اثرات ARCH نشان داد که رفتار بازدهی قیمت سهام سیمان تهران دارای اثرات ARCH است.

۳-۲- برآورد تلاطم با استفاده از مدل های غیرخطی

در این بخش ابتدا مدل های (1,1)-GARCH و (1,1)-C-GARCH و مدل ریسک متریک، که تلاطم گذشته را با کاهش نمایی و زنی به کار می گیرد، برآورد می شوند، سپس دقت پیش بینی های به دست آمده از این مدل ها، با دقت پیش بینی های حاصل از مدل ARMA مربوط به مدل سازی واریانس تحقق یافته مقایسه می شود. دوره‌ی پیش بینی نمونه از ۱۳۷۰/۰۱/۰۳ تا ۱۳۸۵/۰۷/۲۶ است. برای اهداف مقایسه‌ای، پیش بینی ها به وسیله‌ی چند مدل انجام می شود که داده‌های هفتگی در برآورد آنها به کار می روند، همچنین تلاطم را به عنوان متغیر تحقق یافته تعریف می کنیم.

$$\sigma_t^2 = \lambda \sigma_{t-1}^2 + (1-\lambda) r_{t-1}^2 \quad (12)$$

مدل های نامتقارن انگل (AARCH) و سنتانا (Sentana's ARCH) درجه‌ی دو (QARCH)¹، دو نمونه از چنین مدل هایی هستند که می توانند به صورت ساده و به صورت زیر نوشته شوند:

$$r_t = \mu + \varepsilon_t \quad (13)$$

$$\varepsilon_t | \Psi_{t-1} \sim N(0, \sigma_t^2) \quad (14)$$

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \delta \varepsilon_{t-1} + \beta_1 \sigma_{t-1}^2 \quad (15)$$

1- Sentana's Quadratic ARCH.


به طوری که σ_{t-1}^2 ، مجموعه اطلاعات حاوی اطلاعات روزانه‌ی بیش از t روز است و u_t جزء خطای توزیع نرمال شرطی با میانگین صفر و واریانس σ^2 است. مقدار منفی δ بدین معناست که اخبار خوب، تلاطم را کمتر از اخبار بد، افزایش می‌دهد و این به علت وجود شکل توان دوم ϵ_{t-1} است.

۴-۲-۱-برآورد مدل ریسک‌متیریک

مدل ریسک‌متیریک تعیین یافته با مؤلفه‌های میانگین متحرک (برای افزایش دقت پیش‌بینی) به صورت ذیل تخمین زده می‌شود:

$$\begin{aligned}\sigma_t^2 = & .3692\sigma_{t-1}^2 + .1826x_{t-1}^2 - .1362\epsilon_{t-1}^2 + .3809\epsilon_{t-2}^2 + .00631\epsilon_{t-5}^2 \\& (.000) \quad (.000) \quad (.003) \quad (.000) \quad (.0047) \\& -.00823\epsilon_{t-6}^2 + .0094\epsilon_{t-7}^2 + .200\epsilon_{t-8}^2 - .1069\epsilon_{t-9}^2 - .1557\epsilon_{t-29}^2 \\& (.0011) \quad (.0007) \quad (.000) \quad (.0001) \quad (.000) \\& + .1277\epsilon_{t-33}^2 + .1167\epsilon_{t-34}^2 + .278\epsilon_{t-35}^2 \\& (.000) \quad (.000) \quad (.000)\end{aligned}$$

تمام ضرایب معنی دار و همبستگی‌نگار^۱ مدل نشان دهنده‌ی نبودن مشکل خودهمبستگی است. سرانجام نمودار (۶)، پیش‌بینی حاصل از این مدل را نشان می‌دهد.



نمودار ۶- پیش‌بینی مدل ریسک‌متیریک

^۱- به دلیل محدودیت تعداد صفحات، ارایه‌ی آن امکان پذیر نبود، در صورت نیاز قابل ارایه است.


۳-۲-۴ مدل GARCH(1,1)

برای مدل برآورده شدهی GARCH(1,1) داریم:

$$\sigma_t^2 = 4.51E - 5 + 0.1125\epsilon_{t-1}^2 + 0.7546\sigma_{t-1}^2 \quad (17)$$

(.000) (.000) (.000)

که تمام ضرایب معنی دار و همبستگی نگار پسماندهای آن نیز نشانگر نبود مدل مشکل خود همبستگی است. نمودار (7)، پیش‌بینی مقادیر برآش شده را ارائه می‌دهد:



نمودار ۷- پیش‌بینی مدل GARCH(1,1)


۳-۲-۵ مدل GARCH(1,1)-C

نتایج مدل برآورده شدهی GARCH(1,1)-C به شکل (18) است:

$$\sigma_t^2 = q_t - 0.2372(\epsilon_{t-1}^2 - q_{t-1}) + 0.8294(\sigma_{t-1}^2 - q_{t-1}) \quad (18)$$

(.006) (.000)


تمام ضرایب معنی دار بوده و آزمون های مشخص نمایی نیز نشانگر نویه سفید بودن اجزای پسماند است. نمودار (8)، پیش‌بینی حاصل از این برآش را نشان می‌دهد.



نمودار ۸- پیش‌بینی مدل GARCH (1,1)-C

۴-۲-۴- دقت پیش‌بینی مدل ARMA-XRL

جدول (۲)، برآوردهای مدل ARMA-XRL را نشان می‌دهد، که در آن تمام ضرایب به جز ضریب $I[r_{t-1}]^5 < 0$ ، معنی‌دار بوده و پسمند‌های مدل نویه سفید است.
نمودار (۹)، پیش‌بینی مدل ARMA-XRL را نشان می‌دهد.



منبع: نمودارهای (۶)، (۷)، (۸) و (۹)، پیش‌بینی‌های واریانس تحقق یافته‌ی قیمت هفتگی سهام سیمان تهران را با استفاده از مدل‌های ریسک‌متریک، (1,1)-GARCH و ARMA-XRL طی دوره‌ی ۱۳۷۰/۰ ۱۳۸۵/۰ تا ۱۳۷۰/۰ ۱۳۸۵/۰ نشان می‌دهد، که از نتایج محاسبات تحقیق هستند
نمودار ۹- پیش‌بینی مدل ARMA-XRL

نمودار (۶)، نشان می‌دهد که مدل ریسک‌متریک نتوانسته است نوسانات را با دقت بالا پیش‌بینی^۱ کند، هم‌چنین طبق تعریف مدل، مجموع ضرایب σ_{t-1}^2 و σ_{t-2}^2 باید عدد صحیح یک باشد. آزمون والد^۲، فرضیه‌ی یک بودن مجموع ضرایب σ_{t-1}^2 و σ_{t-2}^2 را P-مقدار برابر با صفر رد می‌کند. نتایج نمودار (۶) و جدول (۳) حاکی از نامناسب بودن مدل ریسک‌متریک برای پیش‌بینی تلاطم است.

هم‌چنین با توجه به نمودارهای (۷) و (۸) که پیش‌بینی مدل‌های (۱,۱) و GARCH(۱,۱) را نشان می‌دهند، ملاحظه می‌شود که این مدل‌ها فقط یک نوسان کوچک را در ابتدای دوره پیش‌بینی کرده و سرانجام تا آخر دوره پیش‌بینی، یک عدد ثابت را برای دوره‌های متوالی پیش‌بینی می‌کنند. نمودار (۹)، نشان می‌دهد که مدل ARMA-XRL تمام نوسانات دوره‌ی پیش‌بینی را به‌طور مناسب پیش‌بینی کرده است، بنابراین هم‌چنان که قبلاً اشاره شده، مدل ARMA-XRL مناسب‌ترین مدل برای تخمین و پیش‌بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان است. این مدل‌ها در بخش بعدی به‌صورت مژروح با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

۴-۳- پیش‌بینی با استفاده از انحراف معیار

نتایج پیش‌بینی‌ها برای واریانس لگاریتمی از نظر کیفی مشابه هستند به علاوه پیش‌بینی‌ها برای h هفته‌ی بعد محاسبه می‌شوند، یعنی:

$$\hat{S}_{i+h|t} = \sqrt{\sum_{j=1}^h \hat{S}_{t+j|t}^2} \quad (19)$$

تعدادی از معیارهای اندازه‌گیری عملکرد پیش‌بینی‌های دوره‌ی نمونه، برای ارزیابی و مقایسه‌ی مدل‌های متعدد به کار بسته می‌شوند. دقت پیش‌بینی، تک‌تک آن‌ها با رگرسیون انحراف معیار معین h هفته‌ی برای پیش‌بینی ارزیابی می‌شود.

$$\hat{S}_{i+h|t+1} = \sqrt{\sum_{j=1}^h \hat{S}_{t+j|t}^2} = b_0 + b_1 \hat{S}_{i+h|t} + v_t \quad (20)$$

۱- در نمودارهای (۶)، (۷)، (۸) و (۹)، پیش‌بینی‌ها در خلال سوم فروردین ماه هزارو-سیصد و هفتاد تا بیست و ششم مهرماه هزار و هشتاد و پنج می‌باشد. خطوط پر رنگ (آبی رنگ)، تلاطم تحقیق یافته و خطوط نقطه چین (قرمز رنگ) پیش‌بینی مدل‌ها را نشان می‌دهند.

2 -Wald

جایی که b_0 و b_1 برای پیش‌بینی کارا و بدون تورش در نظر گرفته می‌شوند، پیش‌بینی‌ها از دو مدل مختلف به‌طور مستقیم با مفاهیمی از رگرسیون مقایسه می‌شود.

$$S_{i+h|t+1} = \sqrt{\sum_{j=1}^h S_{t+j}^2} = b_0 + b_1 \hat{S}_{i+h|t,(1)} + b_2 \hat{S}_{i+h|t,(2)} + v_t \quad (21)$$

به‌طوری که $\hat{s}_{t+h|t,(i)}$ پیش‌بینی مدل $i=1,2$ برای تلاطم از $t+1$ به $t+h$ می‌باشد که در پایان هفته t ام به‌دست می‌آید. به‌طور کلی معین کردن یک معیار برای بررسی دقیقت پیش‌بینی که در کل قابل قبول باشد، غیر ممکن است و این مسئله در مفهوم تلاطم غیرخطی حادتر می‌شود، بنابراین علاوه بر خطاهای مشاهده شده و محاسبه شده، خطای پیش‌بینی محدود میانگین $MSPE = (1/R) \sum_{i=1}^R (s_{t+h|t+1} - \hat{s}_{t+h|t})^2$ تعداد پیش‌بینی‌ها می‌باشد و خطای میانگین مطلق $|MAE = (1/R) \sum_{i=1}^R |s_{t+h|t+1} - \hat{s}_{t+h|t}||$ سرانجام خطای میانگین را گزارش می‌کنیم $ME = (1/R) \sum_{i=1}^R (s_{t+h|t+1} - \hat{s}_{t+h|t})$. نتایج پیش‌بینی‌های یک هفته بعد، از مدل‌های ریسک‌متريک، GARCH(1,1)، ARMA(1,1) و GARCH(1,1)-C در جدول (۳) نشان داده شده است.

جدول ۳- نتایج برآورد انواع مدل‌ها برای پیش‌بینی یک هفته به جلو

	b.	b ₁	b ₂	R ²	ME	MSPE	MAE
Riskmetrics	.1248 (.....)	-0.0083 (-0.625)		.976	0.0036	0.0004	0.0091
GARCH(1,1)	.1108 (.....)	0.7787 (0.148)		.976	-0.0084	0.0005	0.0161
GARCH(1,1) - C	.1067 (.....)	1.0507 (0.132)		.976	-0.0075	0.0005	0.0155
ARMA - X	.1246 (.....)	0.0100 (0.193)		.976	-0.0040	0.0004	0.0110
ARMA - XR	.1246 (.....)	0.0096 (0.200)		.976	-0.0037	0.0004	0.0107
ARMA - XRL	.1246 (.....)	0.0099 (0.190)		.977	-0.0040	0.0004	0.0107
ARMA - SCX	.1246 (.....)	0.0105 (0.163)		.977	-0.0039	0.0004	0.0109
ARMA - SCXR	.1247 (.....)	0.0102 (0.174)		.971	-0.0036	0.0004	0.0107
ARMA - SCXRL	.1211 (.....)	0.0103 (0.201)		.976	-0.0036	0.0004	0.0107
ARMA - XRL +	.1240 (.....)	0.0173 (0.027)	.0223 (0.216)	.977			
Riskmetrics	.1099 (.....)	0.0151 (0.038)	0.7784 (0.000)	.977			
GARCH(1,1)	.1057 (.....)	0.0148 (0.042)	1.0521 (0.000)				
GARCH(1,1) - C							

جدول (۳)، نتایج یافته‌های تحقیق را نشان می‌دهد. در مدل‌های ریسک‌متریک، ARMA و GARCH(1,1) - C، GARCH(1,1) و Riskmetrics، R² رگرسیون برابر ۹۷.۶٪ می‌باشد، ولی نتایج معیارهای MAE، MSPE و ME حاکی از برتری مدل‌های غیرخطی ARMA به مدل‌های GARCH(1,1) - C، GARCH(1,1) و ریسک‌متریک می‌باشد، به طوری که در مدل GARCH(1,1) - C، MAE، MSPE و GARCH(1,1) به ۰.۰۰۰۵ و ۰.۰۱۶۱ و ۰.۰۰۰۴ می‌باشد.

و ۱۰۷ کاهش یافته و این در حالی است که ME از ۰۰۰۸۴-به ۰۰۰۴۰-افزایش یافته است. بهترین عملکرد پیش‌بینی را مدل ARMA-XRL در بین مدل‌های MSPE انجام داده است، زیرا با وجود برابر بودن R^2 رگرسیون و معیارهای ARMA و ME (به ترتیب ۰۰۰۴ و ۰۰۰۴۰)، مقدار معیار MAE در مدل‌های ARMA-X از ۱۱۰ به ۱۰۷ در مدل ARMA-XRL کاهش جزئی یافته است، یعنی اثر بازده‌های تأخیری و اهرمی سبب بهبود مدل در پیش‌بینی می‌شود. در جدول (۳) عملکرد مدل‌های ARMA-XRL که منجر به شکست ساختاری می‌شود نیز آورده شده، در حالی که R^2 رگرسیون به ۹۷.۷٪ افزایش یافته است، ولی نتایج معیارهای MAE و ME نشان دهنده‌ی این است که شکست ساختاری منجر به بهبود پیش‌بینی تلاطم یک هفته بعد در بازار سهام نمی‌شود.

جدول ۴- نتایج برآورد انواع مدل‌ها برای پیش‌بینی دو هفته به جلو

	b ₀	b ₁	b ₂	R ²	ME	MSPE	MAE
Riskmetric	.1311 (.000)	.1283 (.0003)		.888	.0073	00012	00107
GARCH(1,1)	.1566 (.000)	-.6190 (.0340)		.887	-.00171	00017	00303
GARCH(1)-C	.1624 (.000)	-.8108 (.0326)		.887	-.00152	00017	00289
ARMA - X	.1143 (.000)	.2950 (.000)		.900	-.00082	00007	00171
ARMA - XR	.1139 (.000)	.2885 (.000)		.900	-.00075	00006	00162
ARMA - XRL	.1148 (.000)	.2919 (.000)		.900	-.00077	00006	00162
Riskmetric	.1150 (.000)	.2956 (.000)	-.00169 (.0721)	.900			
GARCH(1,1)	.1347 (.000)	.3010 (.000)	-.005078 (.0047)	.901			
GARCH(1)-C	.1380 (.000)	.3006 (.000)	-.006211 (.0049)	.901			

جدول ۵- نتایج برآورد انواع مدل‌ها برای پیش‌بینی سه هفته به جلو

	b_0	b_1	b_2	R^2	ME	MSPE	MAE
Riskmetrics	.۴۳۷۹ (۰.۰۰۰)	.۱۴۹۵ (۰.۰۰۰)		.۹۶۷	.۰۰۱۱۰	.۰۰۰۲۲	.۰۰۲۰۸
	.۴۶۲۱ (۰.۰۰۰)	-.۳۱۷۱ (۰.۱۰۴)		.۹۶۵	-.۰۰۲۵۶	.۰۰۰۳۵	.۰۰۴۳۸
GARCH(۱,۱)	.۴۶۲۶ (۰.۰۰۰)	-.۳۴۲۱ (۰.۲۳۵)		.۹۶۵	-.۰۰۲۲۸	.۰۰۰۳۴	.۰۴۱۶
	.۴۶۲۶ (۰.۰۰۰)	-.۳۴۲۱ (۰.۲۳۵)		.۹۶۵	-.۰۰۲۲۸	.۰۰۰۳۴	.۰۴۱۶
GARCH(۱,۱)-C ARMA-X	.۳۹۲۰ (۰.۰۰۰)	.۱۹۴۰ (۰.۰۰۰)		.۹۷۳	-.۰۰۱۲۳	.۰۰۰۱۱	.۰۰۲۳۰
	.۳۹۱۱ (۰.۰۰۰)	.۱۹۶۸ (۰.۰۰۰)		.۹۷۳	-.۰۰۱۱۲	.۰۰۰۰۹	.۰۰۲۱۱
ARMA-XR ARMA-XRL	.۳۹۰۶ (۰.۰۰۰)	.۱۹۷۱ (۰.۰۰۰)		.۹۷۳	-.۰۰۱۱۵	.۰۰۰۰۹	.۰۰۲۱۱
	.۳۹۱۹ (۰.۰۰۰)	.۲۱۰۹ (۰.۰۰۰)	-۰.۰۵۸۹ (۰.۰۱۴)	.۹۷۳			
ARMA-XRL+ Riskmetrics GARCH(۱,۱)	.۴۰۵۴ (۰.۰۰۰)	.۱۹۳۰ (۰.۰۰۰)	-۰.۲۴۳۳ (۰.۰۸۷)	.۹۷۳			
	.۴۰۷۸ (۰.۰۰۰)	.۱۹۳۲ (۰.۰۰۰)	-۰.۳۰۱۶ (۰.۱۴۲)	.۹۷۳			
GARCH(۱,۱)-C							

منبع: جداول (۳)، (۴) و (۵) تخمین‌های از انحراف معیار تحقیق‌یافته

$$s_{t+h|t+1} = (\sum_{j=1}^h s_{t+j}^2)^{1/2} = b_0 + b_1 \hat{s}_{t+h|t} + \nu_t$$


$$(s_{t+h|t+1})^2 = (\sum_{j=1}^h s_{t+j}^2)^2 = b_0^2 + b_1^2 \hat{s}_{t+h|t,(1)}^2 + b_2^2 \hat{s}_{t+h|t,(2)}^2 + \nu_t^2$$



برای پیش‌بینی یک، دو و سه هفته‌ی آینده با دوره‌ی بررسی از ۱۳۷۰/۰۷/۲۶ تا ۱۳۸۵/۰۷/۲۶ از قیمت هفتگی سیمان تهران است.

نتایج رگرسیون‌های در برگیرنده‌ی مدل ARMA-XRL با مدل‌های ریسکمتریک، GARCH(۱,۱)-C و GARCH(۱,۱)-C در جدول (۳)، نتایج جالبی را نشان می‌دهد، که ضمن معنی‌دار بودن تمام ضرایب در مدل ترکیب شده ARMA-XRL با مدل‌های GARCH(۱,۱)-C و GARCH(۱,۱)-C رگرسیون به


۹۷.۷٪ افزایش یافته است. همچنین این نتایج نشان می‌دهد که مدل ترکیبی ARMA – XRL با مدل ریسک‌متیریک سبب بهبود پیش‌بینی تلاطم نمی‌شود. نتایج جداول (۴) و (۵) که پیش‌بینی‌های دو و سه هفته بعد را انجام می‌دهند، به طور واضح‌تر نتایج قبلی را تأیید می‌کنند. در جدول (۴) ضمن معنی‌دار نبودن ضریب b_1 در مدل $(1,1)$ GARCH، R^2 رگرسیون از ۸۸.۷٪، به ۹۰٪ در مدل ARMA – XRL افزایش یافته است. آمارها نشان می‌دهد که MAE و MSPE از ۳۰۳ و ۱۷۱ به ۰۰۰۶ و ۰۰۰۱۶۲ کاهش یافته در حالی که میزان معیار ME از ۱۷۱ به ۰۰۰۷۷ افزایش رسیده است.


نتایج ترکیب مدل ریسک‌متیریک، $GARCH(1,1)$ ، $C-GARCH(1,1)$ یافته‌های قبلی را نیز تأیید می‌کند، بدین معنی که ضمن نامناسب بودن ترکیب مدل با ARMA – XRL و مدل ریسک‌متیریک، ترکیب این مدل با مدل $(1,1)$ GARCH و $C-GARCH(1,1)$ سبب بهبود پیش‌بینی تلاطم بازار سهام می‌شود، به‌طوری‌که R^2 رگرسیون از ۹۰٪ در مدل ARMA – XRL به ۹۰.۱٪ در مدل ترکیبی ARMA – XRL با $GARCH(1,1)$ افزایش می‌یابد. نمودار (۱۰)، پیش‌بینی انحراف معیار یک، دو و سه هفته بعد را نشان می‌دهد. این پیش‌بینی‌ها از مدل ARMA – XRL تخمین زده شده است. نمودار (۱۰) نیز نتایج یافته‌های تحقیق را تأیید می‌کند، یعنی این که مدل ARMA – XRL مناسب‌ترین مدل برای پیش‌بینی است.





نمودار ۱۰- پیش‌بینی‌های تلاطم تحقق یافته‌ی مدل ARMA – XRL





منبع: نمودارهای (۱۰) و (۱۱)، پیش‌بینی تلاطم تحقیق‌یافته یک، دو و سه هفته به جلوی مدل‌های ARMA-
GARCH (۱,۱) و XRL (۱,۱) دوره‌ی ۱۳۷۰/۰۷/۲۶ تا ۱۳۸۵/۰۷/۲۶ از قیمت هفت‌های سهام سیمان تهران
نشان می‌دهد.

نمودار ۱۱- پیش‌بینی‌های تلاطم تحقیق‌یافته‌ی مدل GARCH(۱,۱)

نمودار (۱۱)^۱، پیش‌بینی انحراف معیار یک، دو و سه هفته‌ی آینده را با استفاده از مدل GARCH(۱,۱) نشان می‌دهد. همان‌گونه که قبل‌نیز اشاره شد، این مدل پیش‌بینی دقیقی از تلاطم را نمی‌دهد. این امر را می‌توان در نمودار (۱۱) مشاهده کرد. پیش‌بینی مقادیر منفی برای انحراف معیار در ابتدای دوره‌ی تخمین حاکی از عملکرد ضعیف مدل فوق در تلاطم سهام سیمان است.

۵- نتیجه‌گیری

در این پژوهش به ارزیابی مدل‌های مختلف برای تخمین و پیش‌بینی تلاطم بازدهی در قیمت سهام سیمان تهران پرداختیم. سرانجام نشان داده شد که این تحقیق مدل غیرخطی ARMA را برای تخمین و پیش‌بینی تلاطم‌های تحقیق‌یافته پیشنهاد می‌کند. با استفاده از این الگو می‌توان تأثیر بازده‌های وقفه‌ای، اثرات اهرمی و همچنین شکست ساختاری را بهتر از سایر مدل‌ها تبیین کرد. تخمین‌ها نشان می‌دهند که تأثیر اخبار خوب و اخبار بد متقارن است. به عبارت دیگر، تأثیر تکانه‌های منفی و تکانه‌های مثبت بر تلاطم بازار سهام سیمان تهران یکسان می‌باشد. این نتیجه در تعارض با رفتار سایر بازارهای بورس در کشورهای توسعه یافته است. همچنین نشان داده شد که شکست ساختاری تأثیری در بهبود تخمین تلاطم در بازدهی قیمت سهام سیمان تهران ندارد، به این مفهوم که شکست ساختاری علاوه بر این که تخمین و پیش‌بینی تلاطم را بهبود نمی‌بخشد، منجر به کاهش دقت تخمین و پیش‌بینی تلاطم نیز می‌شود.

نتایج پیش‌بینی‌های یک، دو و سه هفته بعد نشان می‌دهد که از میان الگوهای ARMA – XRL مدل GARCH(۱,۱) و ریسک متریک، مدل C، GARCH(۱,۱) مناسب‌ترین الگو برای پیش‌بینی می‌باشد. معیارهای MSPE، MAE و ME نیز این نتیجه مهم را تأیید می‌کنند. به عبارت دیگر، مدل GARCH(۱,۱) و دیگر مدل‌ها نمی‌توانند پیش‌بینی دقیقی از تلاطم هفته‌های بعدی تلاطم بازدهی سهام سیمان تهران داشته باشند.

نتایج تخمین و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تلاطم در بازدهی بازار سهام سیمان تهران دیرپا نیست، بدین مفهوم که اثرات شوک‌ها در فاصله‌ی زمانی کوتاه مدت از بین

۱- در نمودارهای (۱۰) و (۱۱) پیش‌بینی‌ها در خلال سوم فروردین ماه هزار و سیصد و هفتاد تا بیست و ششم مهرماه هزار و هشتاد و پنج می‌باشد. خطوط پر رنگ (آبی رنگ) انحراف معیار تحقیق‌یافته و خطوط نقطه‌ی چین (قرمز رنگ) پیش‌بینی مدل‌ها می‌باشد.

می‌رود. هم‌چنین نتایج پیش‌بینی‌های دوره‌های اخیر (یک، دو و سه هفته آینده) نشان می‌دهد که تلاطم در بازدهی سهام سیمان تهران نسبت به دوره‌ی ۱۳۷۰-۱۳۷۵ بهشت کاهش یافته است، لذا سرمایه‌گذار می‌تواند با قبول ریسک ناچیز، بازار سهام سیمان تهران را در سبد دارایی خود قرار دهد.

فهرست منابع

- ۱ - ابونوری، اسماعیل. ایزدی، رضا (۱۳۸۵). ارزیابی اثر روزهای هفتگی در بورس اوراق بهادران با استفاده از الگوهای ARCH و GARCH، دانشگاه تهران، مجله‌ی تحقیقات اقتصادی، شماره‌ی ۷۲، صفحات ۱۶۳-۱۹۰.
- ۲ - مهرآر، محسن. عبدالی، قهرمان (۱۳۸۵). نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران، دانشگاه علامه طباطبائی، فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره‌ی ۲۶، صفحات ۴۰-۲۵.
- 3- Andersen, T.G. and T. Bollerslev and S. Lange (1999), Forecasting financial market volatility: Sample frequency vis-a-vis forecast horizon, *Journal of Empirical Finance* 6, 457-477.
- 4- Andersen T.G., T. Bollerslev, F.X. Diebold and P. Labys (2000), The Distribution of Realized Exchange Rate Volatility, *Journal of the American Statistical Association* 96, 42-55.
- 5- Andersen T.G., T. Bollerslev, F.X. Diebold and P. Labys (2001), The Distribution of Realized Exchange Rate Volatility, *Journal of the American Statistical Association* 96, 42-55.
- 6- Andersen, T.G., T. Bollerslev and F.X. Diebold (2002), Parametric and Nonparametric volatility measurement, forthcoming in Ait-Sahalia and L.P. Hansen (eds.), *Handbook of Financial Econometrics*, Amsterdam: North Holland.
- 7- Andersen, T.G., T. Bollerslev, F.X. Diebold and P. Labys (2003), Modeling and Forecasting Realized Volatility, *Econometrica* 71, 579-625.
- 8- Andreou, E., and E. Ghysels (2000): "Rolling-sample Volatility Estimators: Some New Theoretical, Simulation and Empirical Results," University of North Carolina, Chapel Hill.
- 9- Andreou E. and E. Ghysels (2002), Detecting Multiple Breaks in Financial Market Volatility Dynamics, *Journal of Applied Econometrics* 17, 579-600.
- 10- Areal, N.M.P.C. and S.J. Taylor (2000), The Realized Volatility of FTSE-100 Futures Prices, *Journal of Futures Markets* 22, 627-48.

- 11- Berkowitz, J. (2000), Testing Density Forecasts with Applications to Risk Management, *Journal of Business & Economic Statistics* 19, 465–474.
- 12- Bollerslev T. and J.H. Wright (2001), High-Frequency Data, Frequency Domain Inference, and Volatility Forecasting, *Review of Economics and Statistics* 83, 596–602.
- 13- Engle, R.F. (1982), “Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation,” *Econometrica*, 50, 987-1008.
- 14- Granger, C.W.J. and Ramanathan, R. (1984), Improved Methods of Combining Forecasts, *Journal of Forecasting*, 3, 197–204.
- 15- Hansen, C.S. (1999), The relationship between implied and realized volatility in the Danish option and equity markets, School of Economics and Management University of Aarhus.
- 16- Hol, E. and S.J. Koopman (2002), Stock Index Volatility Forecasting with High Frequency Data, Discussion Paper No. 2002-068/4, Tinbergen Institute.
- 17- Kokoszka, P. and R. Leipus (2000), “Change-point estimation in ARCH models”, *Bernoulli*, 6, 1-28.
- 18- Lavielle, M. and E. Moulines (2000), “Leat-squares Estimation of an Unknown Number of Shifts in Time Series”, *Journal of Time Series Analysis*, 20, 33-60.
- 19- Maheu, J.M. and T.H. McCurdy (2002), Nonlinear Features of Realized FX Volatility, *Review of Economics and Statistics* 84 668–681.
- 20- Martens,M and D. V. Dijk and M.de Pooter (2003), Modeling and Forecasting S&P 500 Volatility:Long memory, Structural Breaks and Nonlinearity, *Journal of Econometric Institute Erasmus University Rotterdam*.
- 21- Mills, T.C. (1999). The Econometric Modeling of Financial Time Series, 2nd Edition, Cambridge University Press.
- 22- Mittnik,S and H. Claessen (2004), Forecasting Stock Market Volatility and the Informational Efficiency of the DAX Index Options Market, Center For Financial studies.
- 23- Oomen, R.C.A. (2002), Modeling Realized Variance when Returns are Serially Correlated, working paper, University of Warwick.
- 24- Weller, P.A. and Neely, C.J. (2001), Predicting Exchange Rate Volatility: Genetic Programming vs. GARCH and RiskMetrics, The Federal Reserve Bank Of St. Louis.
- 25- Yahyazadehfar, M. Abounoori, E. Shababi, H. (2006), Days-of –Week Effect on Tehran Stock Exchange Returns: An Empirical Analy sis, *Journal of Economics University of Tehran*, No 16, 149-164.