

آفات و بیماری‌های گیاهی

جلد ۷۹، شماره ۲، اسفند ۱۳۸۰

معرفی سه گونه جدید لاروکنه از زیر خانواده

Callidosomatinae (Acari, Prostigmata, Erythraeidae)

(Orthoptera: Acrididae) انگل ملخ‌های شاخک کوتاه

از نواحی ورامین و کرج

Three new species of larval Callidosomatinae (Acari, Prostigmata, Erythraeidae)

Parasitic on short horned grasshoppers (Orthoptera: Acrididae)

from Varamin and Karaj, region of Iran.

جعفر صادق کربیمی ابروائلو، کریم کمالی و علی اصغر طالبی

گروه حشره‌شناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

(تاریخ دریافت: آذر ۱۳۷۹، تاریخ پذیرش: اسفند ۱۳۸۰)

چکیده

به منظور جمع‌آوری و شناسایی کنه‌های پارازیتی‌گونای خاکزی^۱ از ملخ‌های شاخک کوتاه خانواده Acrididae که به ترتیب با همدیگر رابطه اکتوپارازیتی و میزبانی دارند با نمونه برداری به فواصل هر دو هفته یک بار از مزارع کشاورزی منطقه ورامین و کرج در سال ۱۳۷۷ انجام گرفت.

سه گونه مربوط به زیر خانواده Callidosomatinae از جنس *Charletonia Oudemans*, *Acrotylus insubricus Scop. nov.* از روی ملخ‌های *C. damavandica sp. nov.* ۱۹۱۰ شامل: گونه *C. nazelae sp. Nov.* از منطقه ورامین؛ گونه *Mioscirtus wagneri Kitt.* از روی ملخ‌های

terrestrial Parasitengona

از منطقه کسرج و گونه *Palasiella turcomana* F-W. و *Heliopteryx humeralis* Kuthy از روی ملخ *C. saboortii* sp. nov از منطقه ورامین توصیف (Br. W.) *Heteracris littoralis similis* (Br. W.) و نام‌گذاری شدند.

واژه‌های کلیدی: گونه جدید، Acari، انگل (Parasite)، Erythraeidae، Aceridae

مقدمه

از دهه ۱۹۴۰ به بعد و پس از بروجود آمدن آفت کش‌ها سمپاشی‌های بسیاری علیه ملخ‌ها انجام گرفته ولی از روش‌های کنترل بیولوژیک علیه آنها خیلی کمتر استفاده شده است (Gangwere et al., 1997). در کنار استفاده از سایر روش‌ها، می‌توان از کنه‌های پارازیتنگونای خاکزی نیز به عنوان دشمنان طبیعی بالقوه در کنترل بیولوژیک ملخ‌ها نام برد (Welbourn, 1983). بر اساس (Gangwere et al 1997) اولین گزارش در مورد کنه‌های انگل ملخ‌ها مربوط به (Riley 1878) می‌باشد. مرحله لاروی این کنه‌ها انگل و مراحل پس از آن (نمف‌ها و بالغین) شکارگر مراحل مختلف تخم بند پایان می‌باشند. بنابر گزارش (Welbourn 1983) حدود ۸۰۰ جنس و ۷۰۰۰ گونه از گروه پارازیتنگونا تاکنون در جهان شناسایی شده‌اند. برخی از گونه‌ها مانند کنه‌های قرمز مخلملی، کنه‌های قرمز یا سبز که در دریاچه‌ها و استخرها فعالیت داشته و برخی انگل حشرات و سایر بندپایان و ناقل بیماری‌های مختلف در مهره داران شناخته شده‌اند. در این ارتباط بررسی‌های دامنه داری درباره تاکسونومی، اکولوژی و مرفو‌لوژی این گروه از کنه‌ها انجام شده و علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، گروه فوق هنوز به خوبی در جهان شناخته نشده‌اند. کنه‌های پارازیتنگونا بر حسب محیط زندگی آنها به دو زیر گروه پارازیتنگونای آبرزی^۱ و پارازیتنگونای خاکزی تقسیم می‌شوند. این کنه‌ها اغلب گسترش جهانی (Cosmopolitan) دارند و سیکل زندگی آنها خیلی پیچیده است (Welbourn, 1983). بر اساس بررسی‌های (Southcott 1991، 1993) تا کنون ۴۳ گونه از جنس *Charletonia* از کشورهای استرالیا، تانزانیا، ایتالیا، سیرالنون، مصر، بربیل و آفریقای جنوبی و سایر کشورها به عنوان انگل خارجی ملخ‌های شاخک کوتاه معرفی شده‌اند.

^۱ - Aquatic Parasitengona

در این بررسی، از زیر گروه پارا زینتگونای خاکری خانواده Erythracidae، زیر خانواده Callidosomatinae و جنس *Charletonia* سه گونه جدید برای اولین بار از دو منطقه ورامین و کرج به عنوان انگل خارجی پنج گونه از ملخ های شاخک کوتاه (Arididae) معروفی می شوند. از ایران از زیر خانواده Callidosomatinae، گونه هایی از جنس های *Grandjeanella*, *Charletonia* و *Hauptmannia*, *Abrotophus* گزارش شده است (صبوری، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۷).

روش بررسی

در این پژوهش، از تیرماه ۱۳۷۷ الی آبان ماه همان سال، نمونه برداری های به فواصل هر دو هفته یک بار از مزارع کشاورزی نواحی ورامین و کرج برای جمع آوری ملخ های شاخک کوتاه خانواده Arididae و کنه های انگل آنها از زیر گروه پارا زینتگونای خاکری انجام گرفت.


ملخ ها با استفاده از تور حشره گیری استاندارد جمع آوری و طبق روش های علمی مورد استفاده اتابه گردیدند. سپس کنه های متصل به آنها از قسمت های مختلف بدن جدا و طبق روش Krantz (1978) اسلامید میکروسکوپی از آنها تهیه و مشخصات مرفو لوژیک و مرفو متریک آنها مورد مطالعه قرار گرفتند. در فرهنگ واژه ها و اختصارات برای معرفی کنه ها از روش Southcott (1961, 1988) پیروی شده است. اندازه ها و ابعاد به میکرون می باشد.

نتیجه و بحث

در این بررسی سه گونه جدید از جنس *Charletonia* Oudemans, 1910 جمع آوری و تشخیص داده شدند که توصیف هر کدام از آنها بشرح ذیل می باشد.


گونه (۱-۳) *Charletonia damavandica* sp. nov.

مشخصات: لارو هولوتیپ با کد K در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۷۷ از روی قاعده بال های زیرین ملخ *Acrotylus insubricus* Scop. از منطقه ورامین و لارو پسارتیپ با کد P₁ از روی قاعده بال های بزرگ زیرین ملخ *Mioscirtus wagneri* Kitt. نمونه های فوق در




شكل ۱، *Charletonia damavandica* sp. nov.، لاروهولوتیپ. الف، سطح پشتی بدن، ب، سطح
شکمی بدن

Fig. 1, *Charletonia damavandica* sp. nov., larva, holotype. A, dorsal view. B, ventral view.



شکل ۲. *Charletonia damavanica*, لاروهولوتیپ، الف. سطح شکمی پاهای اول، دوم و سوم.
ب. سطح شکمی پالپ

Fig. 2. *Charletonia damavanica* sp. nov., larva, holotype. A. Ventral view of legs I, II, III, B.
Ventral view of plap



شکل ۳. *Charletonia damavandica* sp. nov., لاروهولو تیپ، الف، سطح پشتی پاهای اول، دوم، سوم

Fig. 3. *Charletonia damavandica*, sp. nov., larva, holotype, dorsal view of legs I, II, III..

مجموعه کنه شناسی موزه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس نگهداری می‌شوند.

الف- سپر: پنج ضلعی، منقوط یکنواخت، حاشیه جلویی در قسمت میانی محدب، حاشیه های کناری در امتداد موهای سیر مستقیم، عرض بیشتر از طول، دارای ۳ جفت موی سپری، پایه موهای حسی عقبی (PSF) برآمده، در قسمت میانی مقعر، طول آنها بیشتر از موهای حسی جلویی (ASE)، نوک موهای سپر گرد، دارای مویچه های ریز، موهای عقبی جانبی جلویی (AL) بلندتر از موهای جلویی جانبی (AL)، پایه موهای سپری (AL) و ML در PL یک امتداد، موهای حسی جلویی بین پایه موهای سپری (AL) و ML و نخی شکل.

ب- سطح پشتی ایدیوزوما: رنگ عمومی بدن در حالت زنده قرمز؛ طول ایدیوزوما ۶۱۹ و عرض آن ۲۳۵، طول کل بدن ۷۳۱ (ایدیوزوما + گناتوزوما، بدون احتساب بخشی از آن که در داخل ایدیوزوما واقع شده است). نسبت طول ایدیوزوما به عرض آن ۱/۸۵، قطر حلقه اسکلروتینی چشم ۲۱، تعداد موهای سطح پشتی ایدیوزوما (AL) ۳۶ عدد، با مویچه های ریز، دارای یک عدد مو در جلوی هر کدام از چشم ها.

ج- سطح شکمی ایدیوزوما: تعداد موهای سطح شکمی ایدیوزوما با احتساب موهای سینه ای ۲۴ عدد، دارای مویچه های ریز، میانگین طول موهای پشتی و شکمی تقریباً برابر، تعداد کل موهای سطح پشتی و شکمی (NDV) ۵۶ عدد (موهای سینه ای اول و دوم در ۱۷ احتساب نمی شوند)، در میان هر کدام از پیش ران پاهای اول و دوم دارای دو عدد موی سینه ای (StI, StII)، فاصله مرکز پایه دو موی سینه ای اول ۷۱.

د- گناتوزوما: طول آن ۱۲۹، عرض بدون احتساب پالی ها ۸۴، دارای دو عدد گاله آلای پروش به طول ۲۹؛ دارای دو عدد مو هیبوستومی عقبی نوک تیز و به طول ۳۶ (موهای هیبوستومی جلویی نا واضح). طول پالپ با ناخن ۱۰۵، کلیسرا خمیده و محکم؛ فرمول موهای پالپ ۰، ۰، ۱، ۱، ۰، ۰؛ طول موی ران پالپ ۴۶ و پیروش؛ موی زانوی پالپ پیروش و به طول ۲۳؛ موی فوق پیش رانی پالپ به طول ۸؛ ناخن های پالپ دو شاخه و در انتهای خمیده.

Archive of SID

ه - پاهای طول پاهای بدون اختساب ناخن و ساقه در پای اول ۵۸۲، پای دوم ۵۷۴ و پای سوم ۵۸۵، اسکوبالاهای پاهای باریک، دارای ماهیچه‌های ریز، انتهای آنها نوک تیز، مسوی فوق پیش رانی پای اول به طول ۴، پیش ران پای اول دارای یک و پیش ران پاهای دوم و سوم هر کدام دارای دو مو، موهای جانبی و میانی پای دوم طولی‌تر از موهای جانبی و میانی پای سوم، هر کدام از پی رانهای اول تا سوم دارای یک عدد مو، طول موی پی ران پای اول ۵۳، دوم ۴۲ و سوم ۳۴.

فرمول موهای پاهای:

پای اول: Ta: ۱ξ ۱ ω, ۲۶ B, ۱ε; Ti: ۲ϕ, ۱κ, ۱۵ B; Ge: ۱σ, ۱κ, ۱۲ B; Tf: ۵B; Bf: ۴ B

پای دوم: Ta: ۱ξ ۲۴ B; Ti: ۱ϕ, ۱۷ B; Ge: ۱κ, ۱۳ B; Tf: ۴ B; Bf: ۴ B

پای سوم: Ta: ۱ξ ۲۷ B; Ti: ۱۹ B; ۱ϕ Ge: ۱κ, ۱۲ B; Tf: ۵ B; Bf: ۲ B

اندازه‌های مربوط به ۵۰ خصوصیات استاندارد در جدول ۱ آمده است.


علت نام‌گذاری: چون این گونه از استان تهران و شهر ورامین جمع‌آوری شده است به اسم قله معروف دماوند که نزدیک به محل جمع‌آوری است نام‌گذاری شده است.

گونه (شکل ۷-۴) *Charletonia nazelae* sp. nov.

مشخصات: لارو هولوتیپ با کد N-20II در تاریخ ۱۳۷۷/۷/۲۴ از روی پیش قفسه سینه ملخ شاخک کوتاه *Heliopteryx humeralis* Kuthy از منطقه کرج و لارو پاراتیپ با کد P1 N2 OII از روی قاعده بال‌های زیرین ملخ *Palasiella turcomana* F-W. از منطقه کرج جمع‌آوری گردید. این نمونه‌ها در مجموعه کنه‌شناسی موژه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس نگهداری می‌شوند.


توصیف

الف- سپر: پنج ضلعی، منقوط، ضلع بالایی (به طرف گناتوزو ما) در قسمت میانی برآمده، طول آن بیشتر از عرض، زوایای اضلاع بالایی تقریباً قائم و زوایای اضلاع جانبی منفرجه، با گوشه‌های گرد، دارای ۳ جفت موی سپری و ۲ جفت موی حسی معمولی، یا یه موهای حسی عقبی برآمده و این برآمدگی به طرف خارج سپر کشیده شده به طوری که




شكل ٤، لارو هولوتیپ *Charletonia nazeleae*. لارو، هولوتیپ، الف، سطح پشتی ب، موى سطح پشتی ایدیوزوما ج، سیر

Fig. 4, *Charletonia nazeleae* sp. nov., larva, holotype, A, dorsal view, B, scutum.




شكل ٥، لارو هولوتیپ *Charletonia nazeleae* sp. nov. لارو، هولوتیپ، الف، سطح شکمی، ب، سطح شکمی پالپ.

Fig. 5, *Charletonia nazeleae* sp. nov., larva, holotype, A, ventral view of larva; B, ventral view of palp.



شکل ۶. لاروهولوتیپ *Charletonia nazeleae* sp. nov. لارو، هولوتیپ، سطح شکمی پاهای
اول، دوم و سوم

Fig. 6. *Charletonia nazeleae* sp. nov., larva, holotype, ventral view of legs I, II, III.



شکل ۷ لارو هولوتیپ، *Charletonia nazeleae* sp. nov. لارو، هولوتیپ، سطح پشتی پاهای
اول، دوم و سوم

Fig. 7, *Charletonia nazeleae* sp. nov., larva, holotype, dorsal view of legs I, II, III.

به صورت دو برا آمدگی در گوشه پایین سپر دیده می شوند. موهای حسی عقبی بلندتر از موهای حسی جلویی، در نیمه انتهایی دارای مویچه، قادر علامت خاصی روی سپر، موهای PI، بلندتر از موهای AI، انتهای همگی آنها تا حدودی باریک و دارای مویچه های فراوان.

ب- سطح پشتی ایدیوزوما: رنگ عمومی بدن در حالت زنده قرمز، چشم ها در بالای پیش ران پاهای دوم، قطر حلقه اسکلروتینی آنها ۳۲، فاصله مرکز چشم ها از همدیگر ۳۰۱، فاصله مرکز قاعده دو موی کنار چشمی از همدیگر ۲۲۴؛ تعداد موهای سطح پشتی (ID) ۴۸ عدد، انتهای آنها توک تیز نمی باشد، از این تعداد ۲ عدد در ردیف اول در پروپودوزوما^۳ و در کنار چشم ها، در ردیف دوم ۱۰ عدد بین پیش ران های اول و سوم و در طرفین و روی شیار سیوگال^۴، در ردیف سوم در متابودوزوما^۵ ۶ عدد که در روی شیار پست پدال^۶ ردیف شده اند، در بخش جلویی اپیستوزوما^۷ ۸ عدد مو که طول آنها کمتر از سایر موهای سطح پشتی ایدیوزوما است به طور نامنظم قرار گرفته اند. بقیه موها که طول آنها در مقایسه با سایر موهای سطح پشتی نسبتاً زیاد است در قسمت پایین اپیستوزوما قرار دارند. طول ایدیوزوما ۶۸۸ و عریضترین پهنهای آن ۴۵۶، نسبت طول به عرض ۱/۰۵۱، طول کل بدن (ایدیوزوما + گناتوزوما) ۸۵۱؛ نسبت طول ایدیوزوما به طول گناتوزوما ۴؛ نسبت عرض ایدیوزوما به عرض گناتوزوما (عریضترین بخش بدون احتساب پالپ ها) ۷/۵۵.

ج- سطح شکمی ایدیوزوما: دارای ۱۴ (موی سینه ای اول و دوم در ۱V احتساب نمی شوند) عدد مو (۱V)؛ ۲ عدد موهای سینه ای اول بین پیش ران های اول به طول ۵۲ و فاصله مرکز پایه آنها ۱۵۱، دو عدد موی سینه ای دوم، بین پیش ران های دوم به طول ۵۳ و فاصله مرکز پایه ۱۴۷، دو عدد بین پیش ران های سوم به طول ۳۶ و فاصله مرکز پایه

³ - Propodosoma

⁴ - Sejugal furrow

⁵ - Metapodosoma

⁶ - Postpedal furrow

⁷ - Opisthosoma

۱۰۵، موهای سطح شکمی نوک تیز و دارای مویچه های ریز هستند. تعداد کل موهای سطح پشتی و سطح شکمی (NDV) ۶۲ عدد.

د- گناتوزوما: قاعده کلیسرا گرد، فاقد علامت مخصوص، هرمی شکل، طول آن ۱۷۲ (از نوک گاله آ)، عریضترین پهنهای آن ۱۰۵ (بدون احتساب پالپ ها)، گاله آلاها ساده، سوزنی طول آنها ۳۶، موهای هیبوستومی عقبی به طول ۴۲، موهای هیبوستومی جلویی تا واضح؛ فرمول موهای پالپ ۰، ۱، ۳، ۷؛ موی ران پالپ نوک تیز، خمیده، دارای مویچه های ریز، به طول ۵۳؛ موی زانوی پالپ نوک تیز، پروش، به طول ۴۴؛ موی فوق پیش رانی پالپ کوچک، به طول ۶، ناخن ساق پالپ در انتهای خمیده و دو شاخه، طول پالپ ها با احتساب ناخن ۱۸۰.

ه- پاهای پاهای طویل، طول پاهای اول، دوم، سوم بدون احتساب ناخن و ساقه به ترتیب ۱۰۸۴، ۱۰۰۶ و ۱۲۳۰؛ اسکوبالاهای^۸ پاهای بلند، نوک تیز و دارای مویچه؛ موی فوق پیش رانی پای اول به طول ۶؛ طول موهای پیش رانی جانبی و میانی پاهای دوم طویلتر از طول موهای پیش رانی جانبی و میانی پاهای سوم، بی رانها هر کدام دارای یک مو، طول مسوی پی ران های اول، دوم و سوم به ترتیب ۷۶.

.۵۵ و .۶۷

فرمول موهای پاهای:

Ta: ۱\x, ۱\w. 26 B; ۱e; Ti: 2\phi. ۱\k, 17 B; Ge: ۱\sigma, ۱\k. 10 B; Tf: 5B; Bf: 4 B

پای اول:

Ta: ۱\x, ۱\w. 27 B; Ti: 1\phi, 19 B; Ge: ۱\k, 12 B; Tf: 5 B; Bf: 4 B

پای دوم:

Ta: ۱\x, 28 B; Ti: 1\phi, 17 B; Ge: 12 B; Tf: 5 B; Bf: 2 B

پای سوم:

اندازه های مربوط به ۵۰ خصوصیات استاندارد در جدول ۱ آمده است.

علت نام گذاری: این گونه به اسم نازله فرزند نویسنده اول نام گذاری شده است.

(شکل ۸-۱۰) *Charletonia saboorii* sp. nov.

مشخصات: لارو هولوتیپ با کد N-22H در تاریخ ۱۳۷۷/۵/۲۹ از روی قاعده بالاها زیرین ملخ. از منطقه ورامین جمع آوری شد.

^۸- Scobalae

این نمونه در مجموعه کنه شناسی موزه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس نگهداری می‌شود.

توصیف

الف- سیر: پنج ضلعی، منقوط، ضلع بالایی به طرف گناتوزوما راست: عرض آن بیشتر از طول، دارای ۳ جفت موی سیر و ۲ جفت موی حسی، موهای سپر دارای مویچه های فراوان و ریز، پایه موهای میانی-جانبی (ML) به پایه موهای جلویی-جانبی (AL) نزدیکتر از پایه موهای عقبی جانبی (PL) موهای عقبی-جانبی، طویلتر و باریکتر از موهای جلویی-جانبی، نوک آنها گرد، اصلاح بالایی و جانبی تشکیل زاویه قائمه و دو ضلع جانبی تشکیل زاویه منفرجه با گوشهای گرد می‌دهند. فاصله پایه موهای PL از همدیگر بیشتر از فاصله موهای AL از همدیگر می‌باشد. موهای حسی عقبی طویل‌تر از موهای حسی جلویی، نسبت طول موهای حسی عقبی به موهای حسی جلویی ۱/۴۵، فاصله پایه موهای حسی عقبی از همدیگر بیشتر از فاصله پایه موهای حسی جلویی، قاعده موهای حسی عقبی برآمده و از قسمت عقبی سیر بیرون آمده است.

ب- سطح پشتی ایدیوزوما: رنگ عمومی بدن در حالت زنده قرمز، تعداد موهای سطح پشتی ایدیوزوما، ۴۰، نوک آنها تیز، دارای مویچه های ریز، ۲ عدد از این موها در قسمت جلویی چشمها به طول ۴۴ و فاصله پایه آنها ۱۳۷، تعداد ۱۰ عدد از آنها بین پیش ران پاهای دوم و سوم، تعداد ۶ عدد بین پیش ران پاهای سوم و مابقی در ناحیه اپیستوزوما قرار دارند. طول کلی بدن (ایدیوزوما+گناتوزوما) ۷۳۱؛ طول ایدیوزوما ۶۰۲، عرض آن ۲۸۳، نسبت طول به عرض ۲/۱۳، نسبت طول ایدیوزوما به طول گناتوزوما ۴/۲۴؛ نسبت عرض ایدیوزوما به عرض گناتوزوما بدون احتساب پالپ ۳/۰۸، چشم‌ها در سطح پشتی و در قسمت جلویی پیش ران پاهای اول، قطر حلقه اسکلروتینی آنها ۲۱ و فاصله مرکز آنها از همدیگر ۱۵۱ می‌باشد.

ج- سطح شکمی ایدیوزوما: موهای سطح شکمی (IV) به تعداد ۲۴ عدد، ۲ عدد از آنها بین پیش ران پاهای اول (StI) به طول ۴۶ و فاصله پایه موها از همدیگر ۹۷، ۲ عدد مابین پیش ران پاهای دوم (StIII) طول ۴۸ و فاصله پایه آنها از همدیگر ۲،۴۸ عدد مابین پیش

ران پاهای سوم، به طول ۳۲ و به فاصله پایه ۳۲؛ موهای سطح شکمی نوک تیز و دارای مویچه‌های ریز، تعداد کل موهای سطح پشتی و شکمی (NDV) ۶۴ عدد می‌باشد.
د- گناتوزوما: هرمی شکل، طول آن از نوک گاله آ ۱۴۲، عرض آن بدون احتساب پالپ‌ها ۹۷، نسبت طول به عرض ۱/۴۶؛ دارای دو عدد گاله آلای پروش به طول ۳۴، موهای هیپوستومی جلویی ناواضح و طول موهای هیپوستومی عقبی ۲۱، طول موی فوق پیش رانی پالپ ۴، طول پالپ با ناخن‌های ساق ۱۶۶، موهای ران پالپ‌ها پروش به طول ۵۷، موهای زانوی پالپ‌ها پروش به طول ۳۷؛ فرمول موهای پالپ، ۰، ۱، ۱، ۳، ۷؛ ناخن‌ها در انتهای دو شاخه و نوک آنها خمیده می‌باشد.

ه- پاهای طول پاهای اول، دوم، سوم به ترتیب: ۷۱۳، ۶۸۸ و ۸۱۳. اسکوبالاهای یاها نسبتاً طویل، نوک تیز، دارای مویچه‌های خیلی ریز، موی فوق پیش رانی پای اول کوتاه به طول ۴، طول موهای جانبی پیش ران دوم طویلتر از طول موهای جانبی پیش ران سوم ولی طول موهای میانی پیش رانهای دوم و سوم با هم برابرند. طول موی پی ران پاهای اول تا سوم به ترتیب عبارت است از: ۵۹، ۶۳ و ۴۸.

فرمول موهای پاهای:

Ta: ۱ξ، ۱ω، 27 B، 1ε؛ Ti: 1κ، 2φ، 16 B؛ Ge: 1κ، 1σ، 11
B؛ Tf: 5B؛ Bf: 4 B

پای اول:

Ta: ۱ξ، ۱ω، 26 B؛ Ti: 2φ، 15 B؛ Ge: 1κ، 12 B؛ Tf: 5 B؛
Bf: 4 B

پای دوم:

Ta: ۱ξ، 24 B؛ Ti: 1φ، 18 B؛ Ge: 16 B؛ Tf: 5 B؛ Bf: 2 B

پای سوم:

اندازه‌های مربوط به ۵۰ خصوصیات استاندارد در جدول شماره ۱ آمده است.

علت نامگذاری: این گونه به افتخار آفای دکتر علیرضا صبوری همکار محترم و متخصص کنه‌های پارازیتیگونای خاکزی و عضو هیأت علمی گروه گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران نامگذاری شده است.

مشخصات لاروهای خانواده Erythraeidae (شکل ۱۱)

اغلب لاروها انگل خارجی بند پایان و برخی از آنها زندگی آزاد دارند (Krantz, 1978؛ فاقد موهای حسی بوتريالا^۹ در پاهای ناخن‌های جانبی پنجه‌ها (مثل ناخن‌های نولترال^{۱۰})

^۹- Bothrialae= Sensillae= trichobothria setae

نولترال^{۱۰}) معمولاً نامشابه (استثنایاً مثل، *Pussardia*, *Hauptmannia*, *Mypongia*, *Girandjeanella* و کنه‌های کاملاً بزرگ به رنگ قرمز یا قرمز متمايل به قهوه ای هستند (Southcott, 1961).

مقایسه سه گونه فوق با گونه‌های مشابه در جهان

بر اساس (Southcott, 1991, 1993) این سه گونه از ۵۰ گونه موجود در جهان قابل تفکیک می‌باشد. نزدیکترین گونه‌ها به سه گونه فوق، به دلیل داشتن دو مو در بین پیش ران های دوم و سوم و $Ds < 50$, گونه‌های *C. bucephalia* Beron, 1993 و *C. blascoi* Southcott, 1993 های 1975 هستند. ویژگی‌های استاندارد این دو گونه با گونه‌های فوق جهت مقایسه در جدول ۱، نشان داده شده است. بر اساس جدول ۱ در گونه *C. blascoi* $Til > 100$, $AW < 50$ و $Til < 100$, $AW > 50$ می‌باشد در حالتی که در سه گونه مذکور $Til < 100$ و $AW > 50$ می‌باشد.

گونه *C. bucephalia* در اکثر ویژگی‌های موجود در جدول ۱ با سه گونه فوق

اختلاف دارد مثل: L , AW/AP , AL/AAS , AW/AL , Til/AW , $TiIII/AW$, Lat , $Cox III$

کلید شناسایی گونه‌های *Charletonia* انگل ملح‌های شاخک کوتاه در منطقه کرج و ورامین

۱- طول سپر بیشتر از عرض آن
.....

۲- طول سپر کمتر از عرض آن *C. nazelae, sp. nov.*

(۱)- نسبت $TiIII/AW > 3$ و نسبت $AW/AL > 2/5$
C. saboorii, sp. nov.

- نسبت $TiIII/AW < 3$ و نسبت $AW/AL < 2/5$
C. damavandica, sp. nov.


¹⁰- Neolateral pedal claws

جدول ۱: مقایسه اندازه و سایر خصوصیات مرغوب‌لوزیک سه گونه جدید از جنس *Charletonia* با گونه‌های *C. blascoi* و *C. bucephalia* که از بین ملخ‌های شاخک کوتاه در ورامین و کرج جمع آوری شده‌اند.

Table 1. Comparison of size and other morphologic characteristics of three new species of genus *Charletonia* with *C. bucephalia* and *C. blascoi* which were collected on short-horned grasshoppers from Varamin and Karaj, Iran.


					اندازه (میکرومتر) (μ)	ویژگی Characters
<i>C. saboorii</i>	<i>C. nazeleae</i>	<i>C. damavandica</i>	<i>C. blascoi</i>	<i>C. bucephalia</i>	Size	
69	69	65	44	63		AW
76	82	74	56	73		MW
80	92	76	57	85		PW
15	15	15	8	13		SB _a
19	22	19	13	17		SB _b
13	15	15	18	22		LX
~	~	~	0	0		ASBM
19	36	21	27	20		ASB _a
63	86	63	54	73		ISD
86	125	84	84	100		L
90	105	90	68	100		W
25	32	25	24	29		AAS
17	22	19	18	21		AM
38	52	40	43	45		AP
23	39	32	27	48		AL
34	47	40	27	43		PL
55	78	63	36	65		ASE
80	95	84	37	70		PSF
36	38	41	23-30	37-40		DS
44	48	53	28	49		"Oe"
32	42	34	23	38-39		MDS
36	48	38	30	41-58		PDS
129	215	109	53	120		Gel
155	267	126	56	155		Til
149	174	116	63	147		Tal (L)
17	17	17	21	20		Tal (H)
120	1.25	1.16	1.06	1.29		Til/Gel
108	194	99	48	105		Gell
151	228	126	50	135		Till
145	193	122	63	145		Tall (L)
17	17	19	20	21		Tall (H)
1.17	1.18	1.27	1.04	1.29		Til/I/Gel
125	206	105	57	118		GellII
215	323	183	78	192		TillII
158	210	137	63	150		TallII (L)
17	17	17	20	17		TallII (H)
1.72	1.56	1.74	1.37	1.63		TillII/GelII
1.10	0.8	1.03	0.81	0.86		AW/ ISD
1.66	1.65	1.58	1.26	1.62		ISD/AP
1.82	1.33	1.63	1.02	1.40		AW/AP
46	52	36	20	40		StI
69	61	57	45	44		CoxI
48	44	46	18	51		Lat CoxII
53	58	48	32	44		Med CoxII
40	40	27	21	71		Lat CoxIII
53	50	32	25	47		Med CoxIII
2.25	3.87	1.94	1.27	2.46		Til / AW
3.12	4.68	2.82	1.77	3.05		TillII/AW
2.76	1.77	2.03	1.63	1.31		AW/Al.
1	1.22	1.28	1.13	1.66		Al./AAS

- جهت اطلاع از اختصارات و شرح آنها به مبحث ضمیمه مقاله مراجعه شود




شكل ٨، *Charletonia saboorii* sp. nov. لارو، هولوتیپ، الف، سطح پشتی بدن، ب، سطح شکمی بدن، ج، سطح شکمی پالپ.


Fig. 8. *Charletonia saboorii* sp. nov., larva, holotype. A, dorsal view, C, ventral view of palp.



شکل ۹. *Charletonia saboorii* sp. nov. ♀، لارو، هولوتیپ، سطح پشتی پاهای اول، دوم و سوم
Fig. 9. *Charletonia saboorii* sp. nov., larva, holotype, dorsal view of legs I, II, III



شکل ۱۰. لارو، هولوتیپ، سطح شکمی پاهای اول، دوم و سوم *Charletonia saboorii* sp. nov. ۱۰
Fig. 11, *Charletonia saboorii* sp. nov., larva, holotype, ventral view of legs I, II, III.



شکل ۱۱. کوتاکسی انواع سیر پشتی در لاروهای Erythraeidae الف، برای لاروهای دارای ۲+۲ موی سپرب، برای لاروهای دارای ۳+۳ موی سیر.

Fig.11. Chaetotaxy of dorsal scuta in erythraeid larvae. A. larvae with 2+2 scutalae and B. with 3+3 scutalae.

ضمیمه: واژگان مورد استفاده در توصیف لاروهای بالا خانواده *Erythraeoidea*
 (اقتباس از 1988; Southcott, 1961) (شکل ۱۱).

AW	فاصله بین پایه موهای جلویی - جانبی سپر (موهای AI)
MW	فاصله بین پایه جفت دوم موهای سپر (موهای MI) در حالتی که سه جفت موی سپر یا بیشتر وجود دارد
PW	فاصله بین پایه موهای عقبی - جانبی سپر (موهای PI)
SB _a	فاصله بین پایه موهای حسی جلویی
SB _p	فاصله بین پایه موهای حسی عقبی
ASB _a	فاصله خط عمودی بین پایه موهای حسی جلویی و لبه جلویی سپر
ISD	فاصله بین موهای حسی یا فاصله بین پایه موهای حسی جلویی و عقبی که موازی با محور طولی بدن اندازه گرفته می شود.
AP	فاصله بین مرکز موهای AI و PI که در یک طرف سپر اندازه گیری می شود
ASE	طول موهای حسی جلویی
PSE	طول موهای حسی عقبی
A-M	فاصله بین پایه موهای AI و AM یک طرف سپر
LX	فاصله بین پایه موهای AI و AL یک طرف سپر پشتی - جلویی
AAS	فاصله بین پایه موهای AI و AL
OC	طول موهای چشمی، یعنی نزدیکترین مو به چشم روی ایدیوزوما
STI	طول موهای سینه ای اول
L	طول سپر
W	عرض سپر
AL	موی جلویی - جانبی سپر یا طول آن
PL	موی عقبی - جانبی سپر یا طول آن
ML	موی میانی سپر یا طول آن
Med	طول موی میانی پیش ران پاهای اول، دوم و سوم
Cox I, II, III	

فاصله بین رأس جلویی سپر تا مرکز لبه جلویی سپر	ASBM
طول بند قاعده ای ران (Basifemur)	Bf
پشتی	D
جلویی	A
شکمی	V
علامت پاهای اول، دوم و سوم یا موهای سینه ای (I, II, III)	III, II, I
عقبی	P
طول بند بیرونی ران (Telofermur)	Tf
بی ران	Tr
طول موی جانبی پیش ران دوم و سوم	Lat CoxII, III
طول موی میانی پیش ران دوم و سوم	Med Cox II, III
تعداد موهای سطح پشتی ایدبیوزوما	FD
تعداد موهای سطح شکمی ایدبیوزوما	FV
طول موهای پشتی ایدبیوزوما	DS
طول موهای پشتی - میانی ایدبیوزوما	MDS
طول موهای پشتی - عقبی ایدبیوزوما	PDS
طول زانوی پاهای اول، دوم و سوم	Ge I, II, III
طول ساق پاهای اول، دوم و سوم	Ti I, II, III
طول پنجه پاهای اول، دوم و سوم	Ta (I) I, II, III
عرض پنجه پاهای اول، دوم و سوم	Ta (II) I, II, III
وستیزیالا (Vestigiala) موی بسیار کوچک و نامشخص روی سطوح پشتی پاهای	K
سوئنیدی (Solenidion) موی حسی به شکل میله به ترتیب از راست به چپ روی پنجه، ساق و زانو	σ, φ, ω
اسکربالا (Scobalae) موهای معمولی پاهای	Scb
فامولوس روی پنجه	C

بیوپاتیدی روی پنجه	ی
موی منشعب	B
موی بدون انشعاب	N

سپاسگزاری

از مستولان محترم دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و همچنین دانشمند فرزانه مرحوم آقای مهندس هایک میرزا یانس از مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی به خاطر شناسایی و تأیید گونه های ملخ ها، آقای دکتر رانگ از موزه تاریخ طبیعی لندن برای شناسایی و تأیید نمونه های کنه و آقای دکتر علیرضا صبوری به خاطر بررسی نمونه های کنه و تأیید جدید بودن آنها صمیمانه سپاسگزاریم.

نشانی نگارنده: مهندس حعفر صادق کریمی ایروانلو، دکتر کریم کمالی و دکتر علی اصغر طالبی، گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی ۱۱۱-۱۴۱۱۵، تهران.