

آفات و بیماری‌های گیاهی  
جلد ۷۶، شماره ۱، شهریور ۱۳۸۷

## تأثیر عوامل محیطی بر جوانه‌زنی بذر علف‌هرز *Physalis divaricata* پشت پرده یک‌ساله

Influence of environmental factors on germination  
of Ground cherry (*Physalis divaricata*)

سید کریم موسوی<sup>۱\*</sup> و عبدالرضا احمدی<sup>۲</sup>

۱- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، خرم‌آباد

۲- دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

(تاریخ دریافت: دی ۱۳۸۵، تاریخ پذیرش: دی ۱۳۸۶)

### چکیده

تأثیر عصاره میوه علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله (*Physalis divaricata*) در تعامل با درجه حرارت، سرما‌دهی، خراش‌دهی، اسید سولفوریک و نیترات پتاسیم بر جوانه‌زنی بذر این علف‌هرز در قالب ارزیابی‌های آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. با کاهش یا افزایش دما فراتر از درجه حرارت بهینه ۳۰ درجه سانتی‌گراد، درصد جوانه‌زنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله کاهش یافت. دامنه جوانه‌زنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله بین دمای ۱۴/۸ و ۴۵/۹ درجه سانتی‌گراد بود. بر اساس معادله برآراش داده شده جوانه‌زنی بهینه (بیش از ۷۰ درصد) در حد فاصل دماهای  $\frac{24}{3}$  تا  $\frac{36}{4}$  درجه سانتی‌گراد اتفاق افتاد. تیمار بذور علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله با اسید سولفوریک با غلظت‌های ۳۰، ۲۰، ۱۰ و ۵ درصد سبب افزایش معنی‌دار جوانه‌زنی بذر شد. نیترات پتاسیم نیز موجب افزایش جوانه‌زنی بذر این علف‌هرز گردید. افزایش غلظت عصاره آبی میوه عروسک پشت پرده یک‌ساله بیش از ۳۰ درصد سبب کاهش معنی‌دار جوانه‌زنی بذر این علف‌هرز شد. متوسط

\* Corresponding author: skmousavi@gmail.com

جوانهزنی در حضور غلظت ۳۰ درصدی عصاره میوه ۴۳ درصد بود در حالی که با افزایش غلظت عصاره میوه به ۴۰ و ۵۰ درصد میزان جوانهزنی به ترتیب به ۱۰ و ۲ درصد تقلیل یافت. با افزایش غلظت عصاره میوه، زمان رسیدن به ۵۰٪ جوانهزنی طولانی تر شد. این موضوع گویایی به تأخیر افتادن جوانهزنی بذر در حضور غلظت‌های بالای موسیلاژ میوه این علف‌هرز است که به نظر می‌رسد متضمن جوانهزنی و رویش آن طی دوره طولانی از فصل رشد باشد.

**واژه‌های کلیدی:** علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله، جوانهزنی، دما، اسید سولفوریک، نیترات پتاسیم، سرماده‌ی، خراش‌دهی.

#### مقدمه

نیازمندی‌های حرارتی جوانهزنی نقش مهمی در تعیین توالی رویش گونه‌های گیاهی ایفا می‌کند. درجه حرارت بهینه جوانهزنی در بر دارنده دو مؤلفه میزان و سرعت جوانهزنی است از این رو ارزیابی سرعت جوانهزنی اهمیت زیادی دارد (Bradford, 2002; Carberry & Campbell, 1989). گستره‌ده بودن دامنه نیازمندی‌های محیطی برای جوانهزنی بذور راهکار بقای مهمی است که امکان جوانهزنی بخشی از بانک بذر خاک را تحت دامنه وسیعی از شرایط محیطی فراهم می‌آورد (Zhou *et al.*, 2005). نتایج آزمایش (Thomson & Witt 1987) نشان داد که بذر عروسک پشت پرده (*Physalis angulata*) در معرض نور یا در تاریکی در دماهای ثابت ۵ و ۱۰ درجه سانتی‌گراد قادر به جوانهزنی نبود. دماهای ثابت ۲۰ و ۳۰ درجه سانتی‌گراد در معرض نور به ترتیب سبب جوانهزنی ۲۰ و ۷۵ درصدی بذور این گونه شد. جوانهزنی *Physalis angulata* نیازمند نور نبود. در شرایط نور و تاریکی دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد در تمام یا بخشی از روز برای نیل به حداقل جوانهزنی ضروری بود. بذور گونه چندساله *Physalis virginiana* به درجه حرارت حساسیت بیشتری نشان دادند. بذور این گونه در دماهای ۵، ۱۰ یا ۲۰ درجه سانتی‌گراد در حضور نور یا تاریکی قادر به جوانهزنی نبودند و حداقل جوانهزنی در دمای متناسب ۱۰/۲۰ درجه سانتی‌گراد اتفاق افتاد. بیشترین جوانهزنی این گونه در دمای متناسب ۱۰/۳۰ درجه سانتی‌گراد به وقوع پیوست. دمای بالا در شرایط تاریکی سبب افزایش جوانهزنی

## تأثیر عوامل محیطی بر جوانهزنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یکساله، *Physalis divaricata*

عروسک پشت پرده (*Physalis angulata*) و تاجریزی سیاه شرقی شد (Thomson & witt, 1987). دامنه حرارتی ۲۸ تا ۳۳ درجه سانتی گراد را برای جوانهزنی بهینه تاجریزی سیاه شرقی (*Solanum ptycanthum*) گزارش دادند. تیمار سرماده‌ی در دمای ۵ درجه سانتی گراد به مدت ۳ هفته سبب افزایش جوانهزنی در دمای ۲۰ و ۲۵ درجه سانتی گراد شد. بذور تاجریزی در دمای ۱۵ درجه سانتی گراد صرف نظر از تیمار سرماده‌ی یا تیمار نوری قادر به جوانهزنی نبودند، در حالی که در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد جوانهزنی در حد ۹۲ درصد بود. توانایی تیمار سرماده‌ی در مرتفع ساختن نیازهای جوانهزنی برای علف‌هرز پیر گیاه (*Senecio vulgaris*) نیز گزارش شده است (Popay & Roberts, 1970).

جنس *Physalis* در ایران شامل دو گونه گیاه علفی یکساله و چندساله می‌شود. گونه‌ای یکساله *Ph. divaricata* معمولاً به صورت علف‌هرز در اراضی زراعی می‌روید و *Ph. alkekengi* معمولاً در مناطق جنگلی و نسبتاً مرطوب می‌روید. علاوه بر ایران در افغانستان، پاکستان، هندوستان و هیمالیا نیز پراکنده است (*Ph. divaricata*). عروسک پشت پرده (*Ph. divaricata*) علف‌هرز یکساله تابستانه‌ای است که در سطح مزارع محصولات زراعی تابستانه به ویژه حبوبات و صیفی‌کاری‌های استان لرستان شایع است (Mousavi et al., 2005).

مشاهدات مزرعه‌ای حاکی از وجود دو نوع کپسول بذر در علف‌هرز عروسک پشت پرده یکساله است. برخی کپسول‌های بذر حاوی ماده لرج لعاب‌داری (موسیلاژ) هستند در حالی که برخی دیگر یا به طور کامل فاقد آن هستند یا این که ماده لعاب‌دار با غلظت کمتری در آنها وجود دارد. کپسول‌های کروی حاوی بذر به مرور رطوبت خود را از دست می‌دهند و به صورت توده سخت چروکیده‌ای درمی‌آیند. پس از رسیدگی و خشک شدن میوه، تشخیص کپسول‌های حاوی موسیلاژ و کپسول‌های فاقد آن به سهولت امکان‌پذیر است؛ بدین نحو که کپسول‌های بدون موسیلاژ با فشار انگشت به راحتی خرد می‌شوند در حالی که کپسول‌های حاوی موسیلاژ کاملاً سفت و سخت هستند. بدین‌جهت است که این علف‌هرز از طریق جذب نور، آب، عناصر غذایی و فضای رقابت با گیاهان زراعی بر می‌خizد. رویش طولانی مدت طی فصل رشد، سطح برگ زیاد با شاخه‌دهی فراوان و تاج پوشش گسترده این علف‌هرز گویای

توانایی رقابت کنندگی بالای آن است. تولید بذر بسیار فراوان این علف‌هرز گویای توانایی تهاب‌جمی بالای آن است.

آگاهی جامع درباره شرایط محیطی مورد نیاز برای جوانهزنی و استقرار بذرهای علف‌هرز در خاک، پیش نیاز توسعه راهبردهای بیولوژیکی و تلفیقی مدیریت علف‌های هرز است. اطلاعاتی در زمینه شرایط مورد نیاز برای جوانهزنی عروسک پشت پرده یک‌ساله در دسترس نیست. تبیین اثرات درجه حرارت، خراش‌دهی مکانیکی و شیمیایی و سرماده‌ی روی جوانهزنی بذر علف‌هرز عروسک‌پشت‌پرده هدف این پژوهش است.

### روش بررسی

آزمایش‌های جوانهزنی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. فاکتور اول آزمایش شامل سطوح غلظت عصاره میوه علف‌هرز عروسک پشت‌پرده و فاکتور دوم آزمایش‌ها شامل سطوح هر یک از تیمارهای درجه حرارت، سرماده‌ی، خراش‌دهی، نیترات پتاسیم و اسید سولفوریک بود. کپسول‌های بذر علف‌هرز عروسک پشت‌پرده یک‌ساله در اوایل تابستان سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳ از سطح مزارع کشت‌های تابستانه شهرستان سلسله استان لرستان جمع‌آوری شد. کپسول‌های بذر تا پیش از آزمایش در داخل پاکت‌های کاغذی در دمای اتاق نگهداری شد.

آزمایش‌های جوانهزنی در داخل ظروف پتی ۹ سانتی‌متری حاوی یک برگ کاغذ و اتمن انجام شد. تعداد ۲۵ بذر پس از ضدغونه با محلول هیپوکلریت سدیم در هر ظرف پتی قرار داده شد. بدوز درون ظروف پتی حاوی کاغذ صافی پس از افزودن ۲ میلی‌لیتر از محلول آبی عصاره میوه یا آب مقطر، بسته به تیمار آزمایشی، در داخل انکوباتور در تاریکی قرار داده شد. در هر آزمایش پایش جوانهزنی به صورت روزانه (در دماه‌ای بالا هر ۸ ساعت) صورت گرفت، در هر نوبت سرکشی، دانه‌های جوانه‌زده شمارش و از پتی خارج می‌گردید. خروج ریشه‌چه از پوسته بذر نشانه جوانهزنی بود. پایش جوانهزنی به مدت ۳ هفتنه‌امه داشت. برای ارزیابی تأثیر غلظت موسیلاتر میوه عروسک پشت‌پرده بر جوانهزنی بذر آن از میوه‌های تازه برداشت شده در مرحله رسیدگی کامل عصاره‌گیری شد. برای تهیه عصاره، ابتدا

### تأثیر عوامل محیطی بر جوانه‌زنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله، *Physalis divaricata*

غشای نازک خارجی میوه جدا گردید، پس از آن کپسول‌های کروی حاوی بذر و ماده لعاب‌دار (موسیلاژ) با استفاده از محلول هیپوکلریت‌سدیم به مدت ۵ دقیقه ضداغونی و با آب مقطر شستشو داده شد (Gbehounou *et al.*, 2000). در مرحله بعد، از همزن برای له کردن میوه‌ها کمک گرفته شد، عصاره آبی سوب تهیه شده با استفاده از پمپ خلاء جدا گردید. در همه آزمایش‌ها بسته به غلظت عصاره مورد نظر از آب مقطر به نسبت حجمی برای رقیق‌سازی عصاره استفاده شد.

**آزمایش درجه حرارت:** آزمایش ارزیابی تأثیر درجه حرارت بر جوانه‌زنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار آنالیز شد. فاکتورهای آزمایش شامل درجه حرارت در ۶ سطح (۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰ و ۳۵ درجه سانتی‌گراد) و غلظت موسیلاژ میوه عروسک پشت پرده یک‌ساله در ۱۱ سطح (صفرا، ۲، ۵، ۷، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصد) بود (Buhler & Hoffman, 1999).

**آزمایش اسید سولفوریک:** آزمایش ارزیابی تأثیر تیمار اسید سولفوریک بر جوانه‌زنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل موسیلاژ میوه (در دو سطح بود و نبود موسیلاژ) و اسید سولفوریک با غلظت‌های صفر، ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصد بود. این آزمایش روی دو دسته بذر متعلق به کپسول‌های موسیلاژدار و بدون موسیلاژ صورت گرفت. در مورد کپسول‌های بدون موسیلاژ، پس از خرد کردن جداره کپسول با فشار انگشت، دانه‌ها از آن خارج می‌گردند. کپسول‌های موسیلاژدار که کاملاً سفت و سخت بودند به مدت ۲ روز در آب مقطر قرار داده شد و پس از نرم شدن پوسته کپسول بذور موجود در آن خارج گردید و بدون شستشو در حالی که آغشته به موسیلاژ درون کپسول بودند مورد آزمایش قرار گرفتند. تأثیر تیمار اسید سولفوریک بر جوانه‌زنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده در دمای ثابت ۲۵ درجه سانتی‌گراد مورد ارزیابی قرار گرفت (Buhler & Hoffman, 1999).

**آزمایش نیترات پتاسیم:** آزمایش ارزیابی تأثیر نیترات پتاسیم بر جوانه‌زنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل غلظت نیترات پتاسیم در ۸ سطح (صفرا، ۰/۰۵، ۰/۱، ۰/۲، ۰/۳، ۰/۰۵ و ۰/۱) بود.

۰/۵ و ۱ درصد) و غلظت موسیلاژ میوه عروسک پشت پرده در ۴ سطح (صفر، ۱۰، ۲۵ و ۵۰ درصد) بود. تأثیر تیمار نیترات پتاسیم بر جوانهزنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده در دمای ثابت ۲۵ درجه سانتی‌گراد مورد ارزیابی قرار گرفت (Buhler & Hoffman, 1999).

**آزمایش سرماده‌ی:** تیمارهای سرماده‌ی شامل قرارگیری بذور بدون موسیلاژ قرار داده شده در داخل چند لایه کاغذ صافی مرطوب به مدت صفر، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ شبانه روز در دمای ۲-۳ درجه سانتی‌گراد بود. پس از طی دوره‌های سرماده‌ی، جوانهزنی بذور در دمای ثابت ۲۵ درجه سانتی‌گراد مورد ارزیابی قرار گرفت (Buhler & Hoffman, 1999).

**آزمایش خراش‌دهی:** تیمارهای خراش‌دهی مشتمل بر بذور خراش داده شده، با سایش آرام به وسیله کاغذ سنباده به مدت یک دقیقه و بذرهای خراش داده نشده بود. Susko *et al.* (1999) تأثیر تیمار خراش‌دهی بر جوانهزنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده در دمای ثابت ۲۵ درجه سانتی‌گراد مورد ارزیابی قرار گرفت (Buhler & Hoffman, 1999). زمان رسیدن به ۵۰ درصد جوانهزنی بر اساس معادله سیگمویدی  $\{Y=a/(1+exp(-(x-x_{50})/b))\}$  برآش داده شده به داده‌های جوانهزنی محاسبه شد. که در آن  $a$  حداقل جوانهزنی و  $x_{50}$  زمان رسیدن به ۵۰ درصد جوانهزنی است. برای محاسبه میانگین زمان جوانهزنی (Mean Germination Time) از معادله ذیر استفاده شد:

$$MGT = \sum (n \times g) / N$$


که در آن  $n$  تعداد بذر جوانه‌زده در روز  $g$  و  $N$  تعداد کل بذور جوانه‌زده است (Benvenuti *et al.*, 2001). برای آنالیز داده‌های آزمایشی از نرم‌افزارهای JMP و MSTATC استفاده شد. مقایسه میانگین‌ها بر اساس آزمون دانکن در سطح ۱ درصد صورت گرفت.

## نتیجه و بحث

پاسخ جوانهزنی بذر به درجه حرارت و غلظت عصاره میوه: درصد جوانهزنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله به طور کاملاً معنی‌داری ( $P<0.0001$ ) تحت تأثیر درجه حرارت قرار گرفت. حداقل درصد جوانهزنی بذر این علف‌هرز در دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد

## تأثیر عوامل محیطی بر جوانهزنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یکساله، *Physalis divaricata*

اتفاق افتاد که با میزان جوانهزنی در دماهای ۲۵ و ۳۵ درجه سانتی‌گراد تفاوت معنی‌داری نداشت. با کاهش یا افزایش دما فراتر از درجه حرارت بهینه (۳۰ درجه سانتی‌گراد) درصد جوانه بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یکساله کاهش یافت (شکل ۱). بر اساس معادله برآورد شده، جوانهزنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یکساله به دمای بالاتر از ۱۴/۸ درجه سانتی‌گراد ولی کمتر از ۴۵/۹ درجه سانتی‌گراد نیاز داشت (این دماهای ریشه‌های معادله پلی‌نومیال درجه دو برآورد شده‌اند). جوانهزنی بهینه (بیش از ۷۰ درصد) در حد فاصل دماهای ۲۴/۳ تا ۳۶/۴ درجه سانتی‌گراد در تاریکی به دست آمد. در دماهای کمتر از این دامنه و بیشتر از آن جوانهزنی بذر این علف‌هرز کاهش یافت. Cooley & Smith (1973) و Steinhauer *et al.* (1955) درجه سانتی‌گراد برای بخشی از چرخه روزانه برای جوانهزنی بذور *Physalis subglabrata* ضروری است. Zhou *et al.* (2005) و Thullen & Keeley (1982) دامنه حرارتی بهینه برای جوانهزنی گونه‌های تاج‌بریزی را ۲۷ تا ۳۳ درجه سانتی‌گراد عنوان کردند. در نواحی معتدل، درجه حرارت مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر جوانهزنی بذور علف‌هرز است (Forcella, 1998).




شکل ۱- تأثیر درجه حرارت بر جوانهزنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یکساله.

داده‌ها میانگین غلظت‌های عصاره میوه است

**Fig. 1-** Effects of constant temperature on germination of ground cherry seeds. Data average over mucilage doses. Vertical bars represent standard errors of the means

غلظت عصاره میوه عروسک پشت پرده یک ساله به طور کاملاً معنی داری ( $P<0.0001$ ) جوانه زنی این علف هرز را تحت تأثیر قرار داد. بیشترین درصد جوانه زنی در تیمار شاهد بدون عصاره مشاهده شد، که البته با درصد جوانه زنی مربوط به غلظت های ۲ و ۵ درصدی عصاره تفاوت معنی داری نداشت. افزایش غلظت عصاره میوه عروسک پشت پرده یک ساله بیش از ۳۰ درصد سبب کاهش معنی دار جوانه زنی بذر این علف هرز شد. متوسط جوانه زنی در حضور غلظت ۳۰ درصد عصاره میوه ۴۳ درصد بود در حالی که با افزایش غلظت عصاره به ۴۰ و ۵۰ درصد میزان جوانه زنی به ترتیب به ۱۰ و ۲ درصد تقلیل یافت (شکل ۲).

برای توصیف تابعیت جوانه زنی از غلظت عصاره میوه از معادله سه پارامتری گومپertz استفاده شد. بر این اساس اختلاف کرانه های بالایی و پایینی تابعیت جوانه زنی بذر این علف هرز از غلظت عصاره آن حدود ۸۰ درصد بود.



شکل ۲- تأثیر غلظت عصاره میوه بر جوانه زنی بذر عروسک پشت پرده یک ساله. داده ها میانگین سطوح درجه حرارت است. به داده ها معادله گومپertz سه پارامتره داده شده است  
**Fig. 2-** Effects of mucilage concentration on germination of ground cherry seeds. Data averaged over temperature levels. Vertical bars represent standard errors of the means.

Gompertz, 3 parameters equation fitted to data

تأثیر عوامل محیطی بر جوانهزنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله، *Physalis divaricata*

اثر متقابل درجه حرارت و غلظت عصاره میوه بر درصد جوانهزنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله کاملاً معنی دار ( $P<0.0001$ ) بود. این موضوع گویای پاسخ متفاوت جوانهزنی بذر این علف‌هرز نسبت به غلظت عصاره در دماهای مختلف است. در دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد میزان جوانهزنی بذر عروسک پشت پرده یک‌ساله صرف نظر از غلظت عصاره میوه به طور کلی در سطح پایینی قرار داشت. در این دما متوسط میزان جوانهزنی بذر در تیمار شاهد آب مقطر فقط ۱۷ درصد بود و بین سطوح مختلف غلظت موسیلاژ میوه به لحاظ جوانهزنی بذر تفاوت معنی داری وجود نداشت. در دو دمای ۲۰ و ۴۰ درجه سانتی‌گراد پاسخ جوانهزنی بذر به غلظت عصاره تقریباً روند خطی داشت، به طوری که با افزایش غلظت عصاره میوه جوانهزنی بذر کاهش یافت. در دماهای بهینه ۲۵، ۳۰ و ۳۵ درجه سانتی‌گراد، افزایش غلظت عصاره در دامنه صفر تا ۲۵ درصد تأثیر معنی داری بر جوانهزنی بذر نداشت، اما با افزایش غلظت عصاره فراتر از ۳۰ درصد، میزان جوانهزنی بذر به شدت کاهش یافت (جدول ۱).

زمان رسیدن به ۵۰ درصد جوانهزنی: از جمله شاخص‌هایی که برای تعیین سرعت جوانهزنی مورد استفاده قرار می‌گیرد، زمان رسیدن به ۵۰ درصد جوانهزنی ( $T_{50}$ ) است. تابعیت این شاخص برای جوانهزنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله از غلظت عصاره میوه آن در شکل ۳ نشان داده شده است. با افزایش غلظت عصاره میوه زمان رسیدن به ۵۰ درصد جوانهزنی طولانی‌تر شد. این موضوع گویای به تأخیر افتادن جوانهزنی بذر در حضور غلظت‌های بالای عصاره میوه این علف‌هرز است که متضمن جوانهزنی و رویش آن طی دوره طولانی از فصل رشد و در سالیان متمادی است.

**جدول ۱- اثر متقابل درجه حرارت و غلظت عصاره میوه بر**


جوانه زنی بذر عروسک پشت پرده یک ساله

**Table 1-** Interactive effect of temperature and mucilage concentration on germination of Ground cherry seeds

Mucilage concentration %	Temperature °C					
	15	20	25	30	35	40
0	17.33	82.67	100.0	100.0	96.00	74.67
	KLM	ABCD	A	A	A	BCDE
2	5.333	85.33	94.67	100.0	92.00	86.67
	M	ABC	A	A	AB	AB
5	12.00	74.67	100.0	100.0	96.00 A	81.33
	LM	BCDE	A	A	ABCD	
7	5.333	62.67	96.00	97.33	85.33	82.00
	M	EFG	A	A	ABC	ABCD
10	0.0000	58.67	97.33	100.0	92.00	65.33
	M	EFG	A	A	AB	DEF
15	6.667	40.00	100.0	94.67	83.67	48.00
	M	HIJ	A	A	ABC	GHI
20	0.0000	28.00	92.67	100.0	85.00	58.67
	M	JKL	AB	A	ABC	EFG
25	0.0000	10.67	89.33	96.00	82.67	33.33
	M	M	AB	A	ABCD	IJK
30	0.0000	5.333	68.00	98.67	76.00	9.333
	M	M	CDEF	A	BCDE	M
40	0.0000	0.0000	1.333	5.333	52.00	1.333
	M	M	M	M	FGH	M
50	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	13.33	0.0000
	M	M	M	M	LM	M

Values followed by the same letter do not differ statistically according to Duncan test at 1%

تأثیر عوامل محیطی بر جوانه‌زنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یکساله، *Physalis divaricata*



شکل ۳- تأثیر غلظت عصاره پر زمان رسیدن به ۵۰ درصد جوانه‌زنی برای بذور عروسک پشت پرده.

پارامترها معادلات سیگموئید برآزش داده شده به داده‌های جوانه‌زنی در دمای بهینه

درجه سانتی‌گراد برای محاسبه T50 مورد استفاده قرار گرفته است


Fig. 3- Effects of the mucilage concentration on the time of 50% germination of ground cherry seeds.

The parameters of sigmoid equations fitted to germination data at 30°C used for T50

calculation. Vertical bars represent standard errors of the means


**میانگین زمان جوانه‌زنی:** این شاخص گویای تأخیر زمانی مورد نیاز برای جوانه‌زنی بذر است. تأثیرپذیری شاخص میانگین زمان جوانه‌زنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یکساله از دما در شکل ۴ نشان داده شده است. با افزایش دما در دامنه ۱۵ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد، میانگین زمان جوانه‌زنی بذر این علف‌هرز به شدت کاهش یافت (از ۹۲ ساعت به ۲۳ ساعت). کمترین میانگین زمان جوانه‌زنی (۸ ساعت) به تیمار جوانه‌زنی در دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد تعلق داشت (شکل ۴).

**تیمار اسید سولفوریک:** جوانه‌زنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یکساله به طور کاملاً معنی‌داری ( $P < 0.0001$ ) تحت تأثیر تیمار اسید سولفوریک قرار گرفت. تیمار خراش شیمیایی بذور علف‌هرز عروسک پشت پرده یکساله با استفاده از اسید سولفوریک با غلظت‌های ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصد در مقایسه با شاهد آب مقطر سبب افزایش معنی‌دار جوانه‌زنی بذر این علف‌هرز شد (شکل ۵).



شکل ۴- تأثیر درجه حرارت بر میانگین زمان جوانهزنی بذور عروسک پشت پرده یکساله. داده‌ها میانگین سطوح غلظت عصاره میوه هستند

Fig. 4- Effects of constant temperature on mean germination time of ground cherry seeds. Data averaged over mucilage doses. Vertical bars represent standard errors of the means




شکل ۵- تأثیر اسیدسولفوریک بر جوانهزنی بذور عروسک پشت پرده یکساله

Fig. 5- effects of sulfuric acid on germination of ground cherry seeds

## تأثیر عوامل محیطی بر جوانهزنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله، *Physalis divaricata*

فاکتور نوع کپسول میوه به طور کاملاً معنی‌داری جوانهزنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله را تحت تأثیر قرار داد ( $P<0.0001$ ). میانگین جوانهزنی بذور مربوط به کپسول‌های فاقد موسیلائز میوه (۸۰/۱۲ درصد) حدود ۱۱ درصد بیشتر از جوانهزنی بذور مربوط به کپسول‌های دارای موسیلائز میوه (۷۱/۹۶ درصد) بود. لازم به ذکر است که در این آزمایش بذور برای تیمار کپسول موسیلائزدار از بین کپسول‌های با طیف گسترده‌ای از موسیلائز میوه، از کم تا زیاد، انتخاب شدند. اثر متقابل نوع کپسول میوه و اسید سولفوریک بر جوانهزنی بذر عروسک پشت پرده یک‌ساله معنی‌دار (۰< $P<0.0001$ ) بود. در واقع جوانهزنی بذور بدون موسیلائز پاسخ معنی‌داری نسبت به غلظت اسید سولفوریک نشان نداد؛ در حالی که با افزایش غلظت اسید سولفوریک درصد جوانهزنی بذور مربوط به میوه‌های موسیلائزدار به طور معنی‌داری افزایش یافت (شکل ۶).



شکل ۶- تأثیر اسید سولفوریک بر جوانهزنی بذور عروسک پشت پرده یک‌ساله


متعلق به کپسول‌های موسیلائزدار و بدون موسیلائز

**Fig. 6-** Effect of sulfuric acid on germination of ground cherry seeds ensued from naked and mucilage-coated capsules

تیمار نیترات پتاسیم: جوانهزنی بذور علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله به طور کاملاً معنی‌داری ( $P<0.0001$ ) تحت تأثیر تیمار نیترات پتاسیم قرار گرفت. در تمام سطوح غلظت

نیترات‌پتاسیم، جوانهزنی بذر بیشتر از شاهد آب مقطر بود. حداقل جوانهزنی بذور در غلظت ۱/۰ درصدی نیترات‌پتاسیم اتفاق افتاد؛ که البته با میزان جوانهزنی بذور در حضور غلظت‌های ۰/۳ و ۰/۴ درصدی نیترات‌پتاسیم تفاوت معنی‌داری نداشت (شکل ۷).

Zhou *et al.* (2005) عنوان نمودند که نیترات‌پتاسیم قادر به برطرف‌سازی نیاز نوری برای جوانهزنی بذر تاجریزی سیاه‌شرقی در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد نبود، اما به میزان کمی سبب افزایش جوانهزنی بذور در معرض نور شد، به طوری که بذور قرار گرفته در معرض نیترات‌پتاسیم و نور در مقایسه با بذوری که فقط در معرض نور قرار گرفته بودند ۱۱ درصد بیشتر جوانه زدند. بر اساس پژوهش Jain & Singh (1989) *Scoparia dulcis* جوانهزنی بذر *Scoparia dulcis* بر اثر تیمار نیترات‌پتاسیم افزایش یافت.




شکل ۷- تأثیر نیترات‌پتاسیم بر جوانهزنی بذر عروسک پشت پرده یک‌ساله  
(داده‌ها میانگین غلظت‌های عصاره میوه است)

**Fig. 7-** Effect of potassium nitrate on germination of ground cherry seeds  
(Data representing the means of fruit extract)

غلظت عصاره میوه عروسک‌پشت پرده یک‌ساله به طور کاملاً معنی‌داری ( $P<0.0001$ ) جوانهزنی این علف‌هرز را تحت تأثیر قرار داد. بیشترین درصد جوانهزنی به میزان ۹۶/۵ درصد در تیمار شاهد بدون موسیلانز مشاهده شد، که البته با درصد جوانهزنی مربوط به غلظت ۱۰

### تأثیر عوامل محیطی بر جوانهزنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله، *Physalis divaricata*

در صدی عصاره میوه تفاوت معنی‌داری نداشت. افزایش غلظت عصاره میوه عروسک پشت پرده یک‌ساله فراتر از ۲۵ درصد سبب کاهش شدید جوانهزنی بذر این علف‌هرز شد (شکل ۸). متوسط جوانهزنی در حضور غلظت ۵۰ درصد عصاره میوه ۴۴ درصد بود.



شکل ۸- تأثیر غلظت عصاره میوه بر جوانهزنی بذر عروسک پشت پرده یک‌ساله. داده‌ها میانگین سطوح غلظت نیترات‌پتاسیم است. به داده‌ها معادله سه پارامتره گومپرتز برازش داده شده است

**Fig. 8-** Effect of mucilage concentration on germination of ground cherry seeds. Data averaged over sulfuric acid levels. Vertical bars represent standard errors of the means. Gompertz, 3 parameters equation fitted to data

اثر مقابل غلظت نیترات‌پتاسیم و عصاره میوه بر جوانهزنی بذر عروسک پشت پرده یک‌ساله معنی‌دار بود ( $P<0.0001$ ). این موضوع گویای تفاوت پاسخ جوانهزنی بذر این علف‌هرز به غلظت نیترات‌پتاسیم در حضور غلظت‌های مختلف عصاره میوه است. در شرایط بدون عصاره و در غلظت‌های ۱۰ و ۲۵ درصدی عصاره میوه، جوانهزنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده به طور معنی‌داری تحت تأثیر نیترات‌پتاسیم قرار نگرفت؛ اما در غلظت بالای موسیلاژ (غلظت ۵۰ درصدی) جوانهزنی بذر متاثر از غلظت نیترات‌پتاسیم بود (جدول ۲). شرایط شیمیایی موجود در محیط پیرامون بذر، عاملی تعیین‌کننده در جلوگیری یا تحریک جوانهزنی است. یون نیترات مهم‌ترین ماده شیمیایی خاک است که سبب افزایش

فعالیت جوانهزنی در بسیاری از گونه‌های گیاهی می‌شود. از ۸۵ گونه علف‌هرز مورد مطالعه Steinbuer & Grigsby (1957) نیمی از آن‌ها به حضور نیترات پاسخ مثبت نشان دادند. مشخص شده است که در بسیاری از حالات، افزایش فعالیت جوانهزنی تحت تأثیر نیترات، فقط با همراهی شرایط دیگر محیطی نظیر نور یا نوسانات حرارتی امکان‌پذیر است. Popay & Roberts (1970) گزارش دادند که رویش دانه‌رست‌های کیسه کشیش و پیرگیاه با تغییرات نیترات خاک، بیشتر از هر عامل دیگری ارتباط داشت.

جدول ۲- اثر متقابل نیترات‌پتاسیم و غلاظت عصاره میوه بر جوانهزنی بذر عروسک‌پشت‌پرده یک‌ساله

**Table 2-** Interactive effect of potassium nitrate and mucilage concentration on germination of Ground cherry seeds


potassium nitrate%	Mucilage concentration%				Mean
	0	10	25	50	
<b>0</b>	100.0 A	89.33 A	89.33 A	2.000 F	70.17 C
<b>0.05</b>	93.33 A	97.33 A	86.67 AB	38.67 DE	79.00 BC
<b>0.1</b>	98.67 A	96.00 A	94.67 A	78.67 AB	92.00 A
<b>0.2</b>	94.67 A	97.33 A	85.33 AB	42.67 CD	80.00 ABC
<b>0.3</b>	96.00 A	94.67 A	90.67 A	62.67 BC	86.00 AB
<b>0.4</b>	97.33 A	97.33 A	77.33 AB	74.67 AB	86.67 AB
<b>0.5</b>	97.33 A	90.67 A	89.33 A	36.00 DE	78.33 BC
<b>1</b>	94.67 A	97.33 A	88.00 A	17.33 EF	74.33 BC
<b>Mean</b>	96.50 A	95.00 AB	87.67 B	44.08 C	

Values followed by the same letter do not differ statistically according to Duncan test at 1%

**تیمار خراش‌دهی مکانیکی:** تأثیر تیمار خراش مکانیکی بر جوانهزنی بذر عروسک‌پشت پرده یک‌ساله معنی‌دار نبود. عدم پاسخ‌دهی جوانهزنی بذور علف‌هرز عروسک‌پشت پرده به تیمار خراش مکانیکی (شکل ۹) گویای این مطلب است که احتمالاً عدم جوانهزنی بذور این علف‌هرز به خود بذر مربوط نیست. ظاهرًاً به نظر می‌رسد وجود موسیلاتر میوه با غلاظت‌های متفاوت مخصوص خفتگی بذر این علف‌هرز طی دوره‌های زمانی متفاوت است که این امر ضامن

تأثیر عوامل محیطی بر جوانهزنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یکساله، *Physalis divaricata*

بقاء این علف‌هرز در دراز مدت و رویش آن در دوره طولانی طی فصل رشد است.




شکل ۹- جوانهزنی تجمعی بذور خراش داده شده و خراش داده نشده علف‌هرز عروسک پشت پرده یکساله

Fig. 9- Cumulative germination for the scarified and non-scarified seeds of ground cherry

تیمار سرماده‌ی: افزایش دوره سرماده‌ی به طور معنی‌داری ( $P=0.04$ ) سبب افزایش جوانهزنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یکساله شد. درصد تغییرات جوانهزنی بذور قرار گرفته تحت تیمار سرماده‌ی نسبت به شاهد بدون سرماده‌ی در شکل ۱۰ نشان داده شده است. حداقل افزایش جوانهزنی بر اثر تیمار سرماده‌ی ۶ روزه اتفاق افتاد؛ که البته با تیمارهای سرماده‌ی ۴، ۵ و ۷ روزه تفاوت معنی‌داری نداشت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سرماده‌ی در دماه‌ای کم که در شرایط طبیعی طی فصل زمستان و اوایل بهار اتفاق می‌افتد، سبب افزایش جوانهزنی بذور علف‌هرز عروسک پشت پرده می‌شود. مطالعه جنبه‌های مختلف اکولوژی بذر علف‌های هرز در شناخت راهبردهای بقاء و مدیریت آنها نقش بسزایی دارد. آگاهی جامع درباره شرایط محیطی مورد نیاز برای جوانهزنی

و استقرار بذرهای علف‌هرز در خاک، پیش نیاز توسعه راهبردهای بیولوژیکی و تلفیقی مدیریت علف‌های هرز است (Burki *et al.*, 1997; Siriwardana & Zimdahl, 1984).



شکل ۱۰- تأثیر دوره سرماده‌ی بر جوانه‌زنی بذر عروسک پشت پرده یک‌ساله. درصد افزایش جوانه‌زنی نسبت به تیمار شاهد بدون سرماده‌ی محاسبه شده است.

**Fig. 10-** Effect of chilling duration on germination of ground cherry seeds. Increase of germination showed in comparison to no-chilling treatment.

دست‌یابی به اطلاعاتی راجع به وضعیت خفتگی بذور علف‌های هرز و عوامل مؤثر بر شکستن خفتگی و شرایط بهینه جوانه‌زنی علف‌های هرز از جمله لوازم مدیریت علف‌های هرز است (Ghorbani *et al.*, 1999). دشواری مدیریت علف‌های هرزی نظری تا جریزی به تولید زیاد بذر (Zollinger, 2004; Kempen & Graf, 1981) و توانایی رویش آنها در تمام طول فصل رشد (Ogg & Dawson, 1984) نسبت داده شده است. بوته‌های دیر رویش یافته، پس از عملیات کترلی عادی، معمولاً به بذر می‌نشینند و نقش مهمی در افزایش جمعیت این گونه علف‌هرز ایفا می‌کند (Zhou *et al.* 2005). به نظر می‌رسد که علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله نیز از چنین ویژگی‌هایی برخوردار است.

## تأثیر عوامل محیطی بر جوانه‌زنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله، *Physalis divaricata*

نتایج این آزمایش مؤید مشاهدات مزرعه‌ای حاکی از امکان جوانه‌زنی و رویش علف‌هرز عروسک پشت پرده طی مدت طولانی از فصل رشد است. به نظر می‌رسد وجود ماده لعاب دار موجود در کپسول میوه علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله که دانه‌ها در داخل آن غوطه‌ور هستند به صورت مانع برای جوانه‌زنی یکباره بذور این علف‌هرز طی سال اول پس از تولید عمل می‌کند. همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، به نظر می‌رسد کپسول‌های مختلف روی هر بوته این علف‌هرز حاوی سطوح متفاوتی از موسیلاژ هستند (از فقدان تقریباً کامل آن تا وجود موسیلاژ با غلظت زیاد) که این ویژگی متضمن بقاء و جوانه‌زنی آن طی دوره طولانی مدتی است. کپسول‌های حاوی بذر پس از ریزیش بر اثر خاک‌ورزی وارد خاک می‌گردند و بدین ترتیب ذخیره بذر بسیار مطمئنی در خاک برای حفظ بقای این علف‌هرز پدید می‌آورند. با گذر زمان پوسته کپسول میوه به مرور بر اثر قرارگیری در معرض عواملی نظیر سایش طی عملیات خاک‌ورزی، فعالیت موجودات خاکزی، یخ‌بندان‌ها و دماهای بیش از حد نسبت به آب نفوذپذیر می‌گردد و به تدریج سطح موسیلاژی که مانع جوانه‌زنی بذر است کاهش می‌یابد، این شرایط سبب جوانه‌زنی تدریجی طی سالیان متتمادی می‌شود. احتمال می‌رود که هر چه مقدار ماده موسیلاژ بیشتر باشد، خفتگی بذرهای طولانی‌تر خواهد بود و شکست آن نیازمند قرارگیری کپسول‌ها طی مدت طولانی‌تری در معرض شرایط آب و هوایی و خاکی است. شاید بتوان گفت آلدگی علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله فعلًاً محدود به مناطق خاصی است اما ویژگی‌های رویشی و دشواری کنترل گویای امکان پراکنش گسترده آن در آینده‌ای نه چندان دور است. از این رو اجرای پروژه‌های بیشتر درباره بیولوژی، اکولوژی، توانایی تهاجم و روش‌های مدیریت این علف‌هرز ضروری است.

## سپاسگزاری

این پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی دانشگاه لرستان با عنوان "مطالعه تأثیر عوامل محیطی و کاربرد مواد شیمیایی بر جوانه‌زنی بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله" اجرا شده است؛ از همکاری مسئولین محترم دانشگاه کمال تشكیر را دارد. از همکاری دانش‌آموختگان رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد خانم‌ها مهندس جعفری، بهرامی، حسن‌پور،

سید کریم موسوی و عبدالرضا احمدی

فارابی، بازگیر و فرهادیان که در اجرای این طرح پژوهشی زحمات فراوانی متحمل شدند، نیز  
کمال تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

---

نشانی نگارنده‌گان: مهندس سید کریم موسوی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  
استان لرستان، صندوق پستی ۳۴۸، خیابان کشاورزی، خرم آباد، لرستان،  
ایران؛ مهندس عبدالرضا احمدی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، ایران.