

بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه مریم‌نخودی بلوچستانی (*Teucrium stocksianum* Boiss. subsp. *Stocksianum*)

فراز مجاب^{۱*}، کتایون جاویدنیا^۲، داراب یزدانی^۳، عبدالحسین رostaیان^۴

- ۱- استادیار فارماکوگنوزی، گروه مفردات پزشکی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
 - ۲- دانشیارشیمی دارویی، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 - ۳- مریب پژوهش بیماری‌شناسی گیاهی، عضو هیأت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
 - ۴- استاد شیمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
- آدرس مکاتبه: تهران، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۵۳، دانشکده داروسازی شهید بهشتی،
تلفن: ۸۷۷۳۵۲۱-۰۲۱، نمبر: ۸۷۹۵۰۰۸
پست الکترونیک: sfmojab@yahoo.com

چکیده

اسانس گیاه مریم‌نخودی بلوچستانی با نام علمی (*Teucrium stocksianum* Boiss. subsp. *stocksianum*) از خانواده نعناعیان در تیرماه ۱۳۷۵ از منطقه سیاهو در شمال بندرعباس جمع آوری و با روش تقطیر با آب استخراج شد. راندمان این عملیات ۵/۰ درصد بود. اسانس حاصل با استفاده از روش‌های کروماتوگرافی گازی تجزیه‌ای و متصل به طیف نگار جرمی بررسی شد. ضریب بازداری اجزای اسانسی محاسبه و همراه با طیف‌های جرمی‌شان با استاندارد مقایسه گردید. در مجموع بیست و نه ترکیب در این اسانس شناسایی شد. مواد عمده این اسانس عبارتند از: آلفا-پین (۱۴/۱۶٪)، بتا-پین (۳۶/۶۰٪) و بتا-کوبین (۵/۰۴٪).

گل واژگان: *Teucrium stocksianum*, مریم‌نخودی، نعناعیان، اسانس، GC/MS، آلفا-پین، بتا-پین، بتا-کوبین



مقدمه

بوده‌اند [۷] در مطالعه‌ای دیگر دو ایزومر نوری از شیرومول-۱۰ اپوکساید از اندام هوایی گیاه مذکور جاذشده است [۸]، همچنین پنج فلاؤن متوكسیله از اندام هوایی گیاه مذکور جداسازی و با فنون طیف‌سنجی مشخص شده‌اند [۹].

اسانس سایر گونه‌های توکریوم نیز مفصلأ بررسی شده است، به عنوان مثال در *T. arduini* و *T. chamaedrys* بتا کاریوفیلن و جرمакرن دی مواد عمدۀ بوده‌اند [۱۰]. در *T. botrys*, بتا کاریوفیلن، آلفا‌هومولن و ترانس- بتا‌بیزابولن، در *T. flavum* آلفاپین، بتا‌پین و بتا‌بیزابولن، در *T. scordium* آلفاپین، بتا‌پین و بتا‌بیزابولن، در *T. montanum* آلفاپین، بتا‌پین و بتا‌بیزابولن، در *T. polium* جرمакرن دی و بتا اودسمول و در بتا‌پین و جرمакرن دی مواد عمدۀ گزارش شده‌اند [۱۰]، گیاهان فوق همگی مربوط به منطقه صربستان و مونته نگرو می‌باشند. در اسانس گیاه *T. carolipaui* کادین، کادینول و ۳-هیدروکسی مورولن به عنوان مواد عمدۀ گزارش شده‌اند [۱۱].

تا آنجا که ما بررسی کردۀ‌ایم، تاکنون اسانس *Teucrimum stocksianum* subsp. *stocksianum* گیاه ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است.

(و)ش کار

اندام هوایی گیاه *Teucrimum stocksianum* Boiss. subsp. *stocksianum* در تیرماه ۱۳۷۵ از منطقه سیاهو در شمال بندرعباس در استان هرمزگان جمع‌آوری و در سایه خشک گردید. نمونه این گیاه توسط دکتر مظفریان شناسایی گردید و با شماره ۳۹۷۰۷ در هرbarیوم موسسه تحقیقات جنگلها و مرتع (TARI) واقع در آزادراه کرج نگهداری می‌شود. گیاه خشک‌شده آسیاب شد و اسانس آن به

Teucrimum stocksianum Boiss. گیاه

subsp. *stocksianum* از خانواده نعناعیان گیاهی است چوبی و کوتاه، پرشاخه، با انشعابات دوشاخه‌ای متقابل، که دم برگ‌های آن متفاوت هستند. ممکن است دارای کرک‌های کم و یا کرک‌های بلند (سفید یا نقره‌ای) باشد. برگ‌ها دارای فرم‌های متغیر و تقریباً بدون دمبرگ به طول ۵ تا ۲۰ و عرض ۳ تا ۹ میلی‌متر، پایین برگ‌ها کمی گرد است و یا آنکه باریک و کشیده هستند. کناره برگ به خصوص در قسمت بالا دارای ۳ تا ۵ دندانه است و این کناره‌ها به طرف بیرون برگشته‌اند. گلها به صورت خوش‌انتهایی، مجتمع، باریک و کشیده و یا تخم‌مرغی هستند. *Teucrimum stocksianum* subsp. *stocksianum* جنوب ایران، استان هرمزگان (بین حاجی‌آباد و بندرعباس، گهره حاجی‌آباد) و استان سیستان و بلوچستان (مکران: سرباز، بین بمپور و نیکشهر، بام پشت) گزارش کردۀ‌اند [۱]. *Teucrimum stocksianum* (بدون تعیین زیرگونه) به‌جز ایران در مناطق کوهستانی امارات متحده عربی نیز گزارش شده است [۲]. جنس توکریوم در ایران حاوی ۱۲ گونه، ۱۰ زیرگونه و یک واریته می‌باشد، برای گیاه *Teucrimum stocksianum* چهار زیرگونه *gabriellae*، *incanum*، *patulum*، *stocksianum* مشخص کردۀ‌اند [۳].

اثر ضد دیابت گیاه *Teucrimum stocksianum* روی موش [۴]، اثر آن روی زخم و ترشحات گوارشی در رت [۵] و نیز اثرش روی هپاتوتوكسیسیتۀ ناشی از پاراستامول در موش [۶] بررسی شده است. اسانس *T. stocksianum* (بدون تعیین زیرگونه) مربوط به کشور امارات نیز بررسی شده که در آن آلفاکادینول و دلتاکادین موارد عمدۀ



Analytical GC: Varian 3600 with a DB-1 column 30m x 0.25mm i.d., temperature programmed 50°C, 3°C/min to 230°C, Carrier gas N₂, Flow 14 ml/min, Injector temperature 220°C, FID temperature 250°C.

GC/MS: Finnigan TSQ 70 combined with Varian 3600, 60m DB-1 column, Carrier gas He, flow 8 ml/min.

یافته‌ها

اسانس حاصل از برگهای گیاه زردرنگ و با بوی مشخص و نافذ، به میزان ۵٪ درصد بود. اجزای شناسایی شده این اسانس در جدول شماره ۱ ذکر شده‌اند.

روش تقطیر با آب استخراج گردید. این اسانس با سولفات سدیم خشک آبگیری و در یک ظرف فلزی کوچک، در بخشال نگهداری شد. اسانس حاصل با روش‌های کروماتوگرافی گازی تجزیه‌ای (Analytical Gas Chromatography) و کروماتوگرافی گازی [Gas Chromatography/Mass Spectroscopy (GC/MS)] مورد بررسی قرار گرفت و اجزای مختلف موجود در آن به روش مقایسه طیف‌های جرمی تک تک اجزا با طیف‌های شاهد و نیز محاسبه ضریب بازداری مواد متشکله شناسایی و تعیین مقدار شدند [۱۲-۱۳]. مشخصات دستگاه‌های مورداستفاده:

جدول شماره ۱- ترکیبات شیمیایی شناسایی شده در اسانس گیاه

Teucrium stocksianum subsp. *stocksianum*

درصد	ضریب بازداری	ترکیبات
۳/۸۰	۸۳۶	۳- هگزن-۱-آل
۰/۰۴	۹۲۶	آلفا- توجن
۳۶/۶۰	۹۳۹	آلفا- پین
۱/۳۵	۹۵۱	کامفن
۰/۴۲	۹۵۴	۳- توجن ۲-آل
۰/۵۰	۹۶۱	۱- اکتن-۳-آل
۱/۶۵	۹۷۰	سایبین
۱۴/۱۶	۹۷۷	بتا- پین
۱/۲۰	۹۸۳	میرسن
۱/۸۰	۱۰۱۶	پارا- سیمن
۳/۳۶	۱۰۲۵	لیمونن
۰/۸۰	۱۰۰۵	گاما- ترپین
۰/۹۴	۱۰۸۱	لینالول
۰/۲۴	۱۰۹۹	۳- توجانون
۲/۱۰	۱۱۰۷	کامفولنال
۱/۲۱	۱۱۱۴	نوپینون
۱/۷۱	۱۱۵۹	بورنئول
۱/۱۷	۱۱۶۸	۴- ترپینثول
۲/۱۷	۱۱۷۹	میرتال
۱/۰۵	۱۲۰۰	ترانس- کاروئول
۱/۰۵	۱۲۲۰	کارون
۳/۰۴	۱۲۷۲	بورنیل استات

آلفا-کوبین	۱۳۵۲	۱/۱۰	ادامه جدول شماره ۱
آلفا-کوبائن	۱۲۸۵	۱/۶۲	
بتا- کوبین	۱۳۹۰	۵/۰۴	
آلفا- برگاموتن	۱۴۳۵	۲/۶۷	
بta- سلینن	۱۴۶۲	۱/۹۵	
آلفا- کورکومن	۱۴۶۹	۱/۵۳	

اسانس هیچ ترکیب فنیل پروپنی ردهایی نگردید. اسانس گیاه مذکور از نظر مواد عمدہ با اسانس گیاه روییده در امارات متحده عربی (که آلفاکادینول و دلتاکادینن هستند) تفاوت می‌نماید [۷]. آلفاپین و بتاپین که در اسانس گیاه ایرانی مواد عمدہ هستند، در اسانس سایر گونه‌ها مانند *T. flavum* و *T. polium* و *T. montanum*، *T. scordium* نیز ماده عمدہ محسوب می‌شوند [۱۰].

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان مراتب قدردانی و سپاسگزاری خود را از جناب آقای دکتر ولی‌ا... مظفریان عضو محترم هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع جهت جمع‌آوری و شناسایی گیاه مذکور اعلام می‌دارند.

بحث

در این مطالعه اسانس گیاه *Teucrium stocksianum* subsp. *stocksianum* برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت. در این اسانس ۲۹ ماده (تقریباً ۹۵ درصد اجزا) شناسایی شدند. مواد عمدہ این اسانس عبارتند از آلفاپین (۳۶/۶ درصد)، بتاپین (۱۴/۱۶ درصد) و بتاکوبین (۵/۰۴ درصد). عمدہ این اسانس از ترکیبات مونوتربنی حلقوی تشکیل شده است (۹ ترکیب برابر با ۶۰/۹ درصد). مونوتربنوفیدهای الکلی (۶ ترکیب برابر با ۶ درصد)، آلدیدی (۲ ترکیب برابر با ۴/۵ درصد)، کتنی (۳ ترکیب برابر با ۲/۵۵ درصد) و یک مونوتربن استاته (۳ درصد) هستند. شش ترکیب سزکوئیتربنی در این اسانس مجموعاً به میزان ۱۴ درصد شناسایی گردید. دو الکل خطی ۶ و ۸ کربنی نیز در این اسانس شناسایی گردیدند (۴/۳۵٪). در این

منابع

۱. قهرمان، احمد. فلور رنگی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. ۱۳۶۵، جلد ۹، صفحه ۱۱۰۹.
۲. Western, RR. The Flora of the United Arab Emirates, United Arab Emirates University, Al-Ain 1989.
۳. Rechinger KH. Flora Iranica. Akademische druck und verlagsanstalt. Austria. 1982; No. 150, pp 28-30.



hepatotoxicity in mice. *General Pharm.* 1995; 26: 297-301.

7. Al Yousuf MH, Bashir AK, Dobos A,

Veres K, Nagy G, Mathe I and Blunden G. The composition of the essential oil of *Teucrium stocksianum* from the United Arab Emirates. *J. Essent. Oil Res.* 2002; 14(1): 47-8.

8. Al Yousuf MH, Bashir AK, Crabb TA, Blunden G and Yang M. Shiromool 1,10-epoxides from *Teucrium stocksianum*. *Biochem. Syst. Ecol.* 1999; 27: 107-9.

9. Bashir AK. Methylated Flavones of *Teucrium stocksianum*. *J. Herbs Spices Med. Plants*. 1995; 3 (1): 17-24.

10. Koacevic NN, Lakusic BS and Ristic MS. Composition of the essential oils of seven *Teucrium* species from Serbia and Montenegro.

and Secretion in Rats. *Pharm. Biol.* 2002; 40 (3): 216- 20.

6. Rasheed RA. Effect of *Teucrium stocksianum* on paracetamol induced *J. Essent. Oil Res.* 2001; 13 (3): 163-5

11. Pala-Paul J, Perez-Alonso MJ, Velasco-Negueruela A, Garcia-Jimenez N, Jimenez RG and Vargas L. Composition of the essential oil of *Teucrium carolipaui* Pau grown in Spain. *J. Essent. Oil Res.* 2001; 13 (6): 452-3.

12. Davies NW. Gas chromatographic retention indices of monoterpenes and sesquiterpenes on methyl silicon and carbowax 20M phases. *J. Chromatog.* 1990; 503: 1-24.

13. Adams RP. Identification of Essential Oil Components by Gas Chromatography / Mass Spectroscopy. Allured Publishing Corporation, Illinoise. 1994.



