

بررسی اثرات بیولوژیکی عصاره برگ و ترکیب فنل گلیکوزید آربوتین (*Pyrus biossieriana* Buhse) گیاه تلکا

محمد آزادبخت^{۱*}، آندرو مارستون^۲، کورت هاستمن^۳، محمد رمضانی^۴

^۵ مریم جهرمی مقدم

- ۱- دانشیار فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 - ۲- دانشیار فارماکوگنوزی فیتوشیمی، اسیستیتو فارماکوگنوزی دانشکده علوم، دانشگاه لوزان (سوئیس)
 - ۳- استاد فارماکوگنوزی فیتوشیمی، اسیستیتو فارماکوگنوزی دانشکده علوم، دانشگاه لوزان (سوئیس)
 - ۴- دانشیار فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 - ۵- دکتر داروساز، دانشکده داروسازی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- *آدرس مکاتبه: ساری، صندوق پستی: ۸۶۱ - ۴۸۱۷۵، دانشکده داروسازی، تلفن: ۰۱۵۱ ۳۲۵۹۸۰۲
نمبر: ۰۱۵۱ ۳۲۵۴۰۶۰

پست الکترونیک: Azadbakhtm@yahoo.com

چکیده

گیاه تلکا (*Pyrus biossieriana* Buhse) در جنگلهای شمال ایران به فراوانی یافت می‌شود. دمکل، برگ‌ها و پوست برخی از گیاهان جنس *Pyrus* حاوی مقداری از یک فنل گلیکوزید به نام آربوتین می‌باشد. آربوتین در بسیاری از گیاهان از جمله تیره‌های *Compositae*, *Rosaceae*, *Saxifragaceae*, *Ericaceae* و ... یافت می‌شود. از آربوتین برای ضدغوفنی کردن مجاری ادراری و به عنوان آنتی‌اکسیدانت و ضدآفاتاب استفاده به عمل می‌آورند. این ماده دیورتیک و قاعده‌آور است. در این مطالعه، اثر ضدبacterی باسیلوس سوبتیلیس، ضد قارچ‌های کاندیدا آلبیکنس و کلاudosپریوم کوکومریکوم، *Aedes aegypti*, ضدلارو آنتی‌اکسیدانت و آنتی‌کولین استراز عصاره‌های متانولی، دی‌کلرومتانی و آربوتین مورد بررسی قرار گرفته و ترکیب فنل گلیکوزید آربوتین در آن شناسایی و تعیین مقدار گردید. اثرات بیولوژیکی به روش بیوآتوكرافی مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی آربوتین به روش‌های TLC و HPLC و تعیین مقدار آربوتین به روش‌های HPLC و اسپکتروفوتومتری انجام شد. نتایج نشان داد که از حلال دی‌کلرومتان ۴/۴۲ درصد و از حلال متانول ۲۲/۰۴ درصد عصاره خشک به دست آمد. عصاره متانولی دارای اثرات ضد قارچ، آنتی‌اکسیدانت و ضدلارو است. عصاره دی‌کلرومتانی نیز دارای اثرات ضدبacterی، آنتی‌اکسیدانت و آنتی‌کولین استراز و آربوتین دارای اثرات ضد قارچ و آنتی‌اکسیدانت است. در روش TLC یک ترکیب با $R_f = ۰/۴$ در عصاره متانولی برگ تلکا مشابه با آربوتین استاندارد بود. با روش HPLC وجود آربوتین در $Rt = ۵/۴۳$ در عصاره متانولی برگ گیاه تلکا شناسایی شد. میزان آربوتین در برگ گیاه تلکا به روش HPLC $۷/۰۰۹$ درصد و به روش اسپکتروفوتومتری $۷/۰۴۴۵$ درصد اندازه‌گیری شد. آربوتین در گیاهان اووا اورسی (۱۵ - ۴ درصد) و گونه‌های قره‌قاط (۷ - ۰/۴ درصد) وجود دارد. از آنجایی که گیاه اووا اورسی در ایران وجود ندارد، بنابراین گیاه تلکا با توجه به مقدار بالای آربوتین و همچنین فراوانی و پراکندگی زیاد آن در شمال ایران می‌تواند به عنوان منبع غنی آربوتین مورد استفاده قرار گیرد.

گل واژگان: تلکا، آربوتین، اثرات بیولوژیک، ضدبacterی، ضدقارچ، آنتیاکسیدانت، آنتیکولین استراز



در این تحقیق، با توجه به خصوصیات برجسته

فلل گلیکوزید آربوتین و موارد کاربردی آن در پزشکی و داروسازی، اثرات بیولوژیکی عصاره برگ یک گیاه بومی ایران به نام تلکا و آربوتین مورد بررسی قرار گرفته و ترکیب آربوتین در آن شناسایی و تعیین مقدار گردید.

مواد و روش‌ها

اتیل استات، هگزان، کلروفرم، دی‌کلرومتان، متانول، متیل‌تیازولیل تترازولیوم کلاراید (MTT)، نیستاتین، کلامفنیکل، دی‌فنیل - ۱ - پیکریل هیدرازیل (DPPH)، دی‌متیل سولفوکسید (DMSO) از شرکت مرک، باکتری پاسیلوس سوبتیلس (ATCC 6633) از شرکت سیگما، قارچ‌های کاندیدا آلبیکنس و *Aedes aegypti* کلادوسپریوم کوکومریکوم، تخم لارو uv صفحات TLC (سیلیکا ۶۰GF₂₅₄) شرکت مرک، دستگاه‌های HPLC (مدل Knauer uv) با شناساگر Zirbus (مدل آلمان).

تهیه گیاه و تایید علمی: در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ برگ‌های درخت تلکا از ارتفاعات ۱۲۰۰ متری جنگل‌های نکا در استان مازندران جمع‌آوری شد و نام علمی آن مورد تایید قرار گرفت. سپس نمونه هرbarیومی آن در واحد فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی ساری تهیه گردید.

روش تهیه عصاره

۴۰۰ گرم پودر برگ خشک شده در هوا و نیتروژن مایع گیاه تلکا سه بار و هر بار با ۲۰۰۰ میلی‌لیتر حلال دی‌کلرومتان در مدت ۲۴ ساعت در

مقدمه

Pyrus boissieriana Buhse درخت تلکا با نام علمی Rosaceae از خانواده درجنگل‌های شمال ایران از ارسباران و آستارا تا گرگان به فراوانی پراکنده است. ارتفاع این درخت ۵ متر و برگ آن تخم‌مرغی گرد با انتهایی کند است، ولی این انتها در برگ‌های جوان کمی کشیده است. روی برگ صاف و براق و دارای رنگ سبز روشن است. میوه آن کوچک، گرد و کمی گلابی شکل است [۱]. دمگل، برگ‌ها و پوست برخی از گیاهان جنس *Pyrus* حاوی مقادیری از یک فل گلیکوزید به نام آربوتین (Arbutin) می‌باشد [۲]. آربوتین در بعضی از گیاهان تیره‌های Ericaceae، Rosaceae، Saxifragaceae و ... یافت می‌شود [۳]. از گیاهان حاوی آربوتین برای ضدغوفونی کردن مجاری ادراری در عفونت‌های دستگاه ادراری استفاده می‌شود. آربوتین اثر آنتی‌اکسیدانت و ضدآفتات دارد. به عنوان عامل سفید کننده (Whitting agent) در فرمولاسیون اشکال دارویی موضعی محافظ در برابر تابش‌های شدید اشعه uv به کار برده می‌شود [۴]. آربوتین دیورتیک است. میوه‌های تازه جنس *Pyrus* در انسان در مصرف خوراکی فعالیت ضدتوموری و فعالیت ضدجهش ثانی در برابر باکتری سالمونلا تیفی موریوم نشان داده‌اند [۵]. مهمترین منبع سرشار شناخته شده از آربوتین در دنیا گیاه انگور خرس (*Arctostaphylos uva-ursi*) از خانواده Ericaceae می‌باشد که در ایران موجود نیست. طبق فارماکوپه ژاپن، میزان مشتقات هیدروکینون که آربوتین نیز از مشتقات هیدروکینون است، در این گیاه ناید کمتر از ۷ درصد باشد [۶]. از عصاره این گیاه به عنوان ضدغوفونی‌کننده مجاری ادراری در التهابات متوسط مجاری ادراری و صفراء، همچون سیستیت و دیس اوریا استفاده می‌شود [۷].



دمای معمولی و با تکان دادن (روی شیکر) خیسانده شد. در پایان روز سوم تفاله باقیمانده، با متانل و با

روش مشابه استخراج گردید. عصاره‌های دی‌کلرومتانی هر یک جداگانه با یکدیگر مخلوط شدند و تحت خلا در دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد توسط دستگاه تبخیرکننده در خلا دوار تا سر حد خشک شدن تغییظ شد. سپس هر یک از عصاره‌ها لیوفیلیز گردید.

بررسی اثرات بیولوژیکی هر یک از عصاره‌ها و آربوتین

جهت بررسی اثرات بیولوژیکی هر یک از عصاره‌ها و آربوتین از روش بیوآتوگرافی روی صفحات کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)، که روشی ساده و سریع است، استفاده شد.

۱۰۰ mg/ml از هر یک از عصاره‌ها و ۱۰ mg/ml محلول متانولی آربوتین روی صفحات TLC کاشته شد. برای عصاره‌های دی کلرومتانی از فاز متحرک اتیل‌استات - هگزان (۱:۱) و برای عصاره‌های متانولی و آربوتین از فاز متحرک کلروفرم - متانل - آب به نسبت ۶۵:۵ استفاده شد. پس از حرکت فاز متحرک به میزان ۱۵ سانتی‌متر، کروماتوگرام‌ها جهت برداشت کامل حلal خشک شدند [۸، ۹، ۱۰، ۱۱].

(الف) بررسی اثر ضدباکتری باسیلوس سوبتیلیس
 مایع تلقیح باکتری باسیلوس سوبتیلیس (تقریباً ۱۰^۷ سلول در میلی‌متر) در مالت آگار روی صفحات کروماتوگرافی پخش شد. پس از رسوب یافتن محیط کشت به صورت یک لایه نازک (تقریباً به ضخامت ۱ میلی‌متر)، صفحات در دمای ۳۲ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت انکوبه شدند. سپس محلول متیل تیازولیل تترازولیوم کلراید (MTT) روی صفحات اسپری شد. ترکیبات و فراکسیون‌های فعال به صورت لکه‌های سفید روی صفحات TLC مشخص شدند. از کلامفنیکل به عنوان کنترل مثبت استفاده گردید.

ب) بررسی اثرات ضد قارچ

برای بررسی اثر ضد کاندیدا آلبیکنس، مشابه روش بررسی اثر ضدباکتری عمل شد. ترکیبات و فراکسیون‌های فعال به صورت لکه‌های روشن روی صفحات با زمینه ارغوانی مشخص گشتند. از نیستاتین به عنوان ترکیب مرجع استفاده شد.

برای اثر ضدکلادوسپوریوم کوکومریکوم، پس از اسپری سوسپانسیون کونیدی قارچ، صفحات کروماتوگرافی به مدت سه روز در دمای معمولی (اطاق) در جعبه‌های پلی‌استیرن و در محیط مرطوب انکوبه گشتند. ترکیبات و فراکسیون‌های فعال به صورت لکه‌های روشن روی صفحه با زمینه تیره ظاهر شدند.

ج) بررسی اثر ضد لارو

برای اثر ضد لارو (*Aedes aegypti*)، عصاره‌های دی‌کلرومتانی و متانلی به میزان ۵۰ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و ترکیب آربوتین به میزان ۱۰ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر در حلال دی‌متیل‌سولفوكسید (DMSO) حل شدند. ۰/۱ میلی‌لیتر محلول مذکور به ۹/۹ میلی‌لیتر آب مقطر در یک لوله آزمایش مدرج اضافه گردید.

تخمهای لارو به مدت ۲۴ ساعت در ظرف حاوی آب رودخانه انکوبه شدند. پس از ۲۴ ساعت، ۲۰ لارو به هر یک از لوله‌های آزمایش اضافه گردید.

لوله‌ها در محیط تاریک و در دمای ۲۶ - ۲۸ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت انکوبه شدند. پس از ۲۴ ساعت، وضعیت مرگ لاروها مورد مشاهده قرار گرفت. هر یک از آزمایش‌ها دوبار تکرار شد. از روتون به عنوان ترکیب مرجع استفاده گردید.

د) بررسی اثر آنتی‌اکسیدانت

برای بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانت، محلول ۲ درصد ۲ و ۲ دی‌فنیل - ۱ - پیکریل هیدرازیل



سپس ۲۰ میکرولیتر عصاره گیاه تزریق گردید. جهت اطمینان در تزریق جداگانه، ۲۰ میکرولیتر محلول عصاره حاوی استاندارد آربوتین تزریق گردید.

جهت تعیین مقدار به روش HPLC، نمودار بیرلامبرت از تزریق‌های مقادیر استاندارد آربوتین تهیه شد و مقدار آربوتین با تزریق جداگانه عصاره و استفاده از نمودار مذکور به دست آمد. جهت تعیین مقدار به روش اسپکتروفتومتری از واکنش امرسون استفاده گردید [۱۲، ۱۳، ۱۴].

نتایج

از ۴۰۴ گرم برگ خشک گیاه تلکا به ترتیب ۱۷/۸۸ و ۸۹/۰۵ گرم عصاره‌های دی‌کلرومتانی و متانی به دست آمد. به عبارت دیگر میزان عصاره خشک دی‌کلرومتانی ۴/۴۲ درصد و متانی ۴۲/۰۴ درصد بود. نتایج بررسی اثرات بیولوژیکی عصاره‌ها و آربوتین در جدول شماره ۱ ارایه شده است.

در شناسایی آربوتین به روش TLC، ترکیبی با R_f مشابه با R_f آربوتین استاندارد (۰/۴)، و در روش HPLC، زمان بازداری (R.T.) آربوتین ۵/۴۳ ملاحظه شد. میزان آربوتین در برگ گیاه تلکا به روش HPLC ۷/۰۰۹ ارزیابی گردید ولی در روش اسپکتروفتومتری به میزان ۷/۰۴۴۵ به دست آمد.

بحث

بر اساس نتایج جدول شماره ۱، عصاره متانی برگ گیاه تلکا دارای اثرات ضدقارچ (ضدکاندیدا و کلادوسپوریوم)، آنتیاکسیدانت و ضدلارو است، ولی اثرات ضد باکتری و آنتی کولین استراز نداشته است. عصاره دی‌کلرومتانی دارای اثرات ضد باکتری (باسیلوس سوبتیلیس)، آنتیاکسیدانت و آنتیکولین استراز است. از

(DPPH) در متانول روی صفحات کروماتوگرافی اسپری شد. پس از حدود ۳۰ دقیقه، ترکیبات و فراکسیون‌های فعال به صورت لکه‌های روشن در روی صفحه با زمینه ارغوانی مشاهده گشتند. از بتاکاروتون به عنوان ترکیب مرکز استفاده شد. هر بررسی اثر آنتیکولین استراز

۱۰۰۰ آنژیم استیل کولین استراز در ۱۵۰ میلی‌لیتر بافر تریس - هیدروکلراید ۰/۰۵ مولار در pH ۷/۸ حل شد. ۱۵۰ میلی‌گرم آلبومین سرم گاوی به منظور پایدار کردن آنژیم در طی بیواسی به محلول اضافه شد و محلول استوک در ۴ درجه سانتی‌گراد نگهداری شد. صفحه TLC با محلول استوک آنژیم اسپری و خشک گردید. برای انکوبه کردن آنژیم، صفحه کروماتوگرافی در یک تانک پلاستیکی حاوی مقدار کمی آب قرار داده شد به طوری که آب نمی‌توانست به طور مستقیم با صفحه تماس داشته باشد اما محیط مرطوب می‌شد. روی تانک پوشانده شد و انکوباسیون در ۳۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۰ دقیقه انجام گردید. آنژیم تحت این شرایط به طور رضایت‌بخشی پایدار بود. ۱۰ میلی‌لیتر محلول ۰/۲۵ درصد ۱- نفتیل استرات در اتانول و ۴۰ میلی‌لیتر محلول ۰/۲۵ درصد فاست بلوسالت با هم مخلوط و روی صفحه TLC اسپری شد. ترکیبات و فراکسیون‌های فعال، در طی ۱- ۲ دقیقه لکه‌های ارغوانی ایجاد نمودند. از آتروپین به عنوان ترکیب مرکز استفاده شد.

شناسایی و تعیین مقدار آربوتین در برگ تلکا

برای شناسایی آربوتین در برگ گیاه تلکا از روش‌های TLC و HPLC استفاده شد. در روش TLC از فاز متحرک اتیل استرات - آب (۱۰/۵-۱۳/۰) و معرف برلین بلو (پتاسیم هگزاسیانوفرات و فریک کلراید) استفاده شد. در روش HPLC، زمان بازداری آربوتین در تزریق ۲۰ میکرولیتر محلول استاندارد آربوتین و سطح زیر منحنی آن تعیین شد.



ترکیبات متعددی در برگ گیاه تلکا دارای اثر آنتیاکسیدانت هستند که این ترکیبات هم در فرaksیون فعال، یکی از ترکیبات که عامل اثرات عصاره متأنی برگ گیاه تلکا است، ترکیب فل‌گلیکوزید آربوتین است. همچنین

طرفی آربوتین نیز دارای اثرات ضدقارچ و آنتیاکسیدانت بوده است. با توجه به این تحقیق (با توجه R_f ترکیبات فعال)، یکی از ترکیبات که عامل اثرات عصاره متأنی برگ گیاه تلکا است، ترکیب فل‌گلیکوزید آربوتین است. همچنین

جدول شماره ۱ - نتایج اثرات بیولوژیکی عصاره برگ گیاه تلکا و آربوتین

آنتیکولین استراز		ضد لارو		آنتیاکسیدانت		ضدباکتری باسیلوس		ضدقارچ کلادوسپوریو		ضد قارچ کاندیدا		ضدقارچ کاندیدا کلادوسپوریو		اثرات بیولوژیکی موردمطالعه	
اثر	R_f ترکیب	اثر	غذالت PPM	اثر	R_f ترکیب	اثر	R_f ترکیب	اثر	R_f ترکیب	اثر	R_f ترکیب	اثر	R_f ترکیب	نمونه	
-	-	+	۵۰۰	++	۰/۴۰ ۰/۲۵ ۰/۱۰	-	-	+	۰/۴۰	+	۰/۴۰	+	۰/۶۵	عصاره متأنی	
++	۰/۲	-	-	+	۰/۷۰ ۰/۶۰ ۰/۳	++	۰/۴۰۰/۲۰	-	-	-	-	-	-	عصاره دی‌کلرومتأنی	
-	-	-	-	+	۰/۴۰	-	-	+	۰/۴۰	+	۰/۴۰	+	۰/۴۰	آربوتین	

آربوتین دیورتیک است. میوه‌های تازه جنس Pyrus در انسان در مصرف خوراکی فعالیت

ضدتوموروی و یک فعالیت ضد جهش ثانی در برابر باکتری سالمونلا تیفی موریوم نشان داده‌اند [۵]. با توجه به خصوصیات برجسته این ماده و موارد کاربردی آن در پزشکی و داروسازی، گیاه تلکا می‌تواند به عنوان منبع ارزشمندی از آربوتین استفاده شود. میزان آربوتین موجود در برگ گیاه تلکا از برگ گیاه *Arctostaphylos uva-ursi* ۴-۱۵ درصد کمتر ولى از برگ گیاهان *Pyrus piraster* ۳/۳۸ درصد، *Pyrus amigdaliformis* ۴/۰۵ درصد و *Vaccinium vitis* ۷ درصد بیشتر است و می‌تواند به عنوان یک منبع غنی آربوتین معرفی گردد [۱۵، ۱۷، ۱۸]. تفاوت مقدار آربوتین به روش HPLC (معادل ۷/۰۰۹ درصد) و روش اسپکتروفتوometری (۷/۰۴۴۵ درصد) به این

قطبی (متانی) و هم در فرaksیون غیر قطبی (دی کلرومتأنی) موجود می‌باشد.

از آربوتین به منظور ضدعفونی کردن مجاری ادراری در عفونت‌های دستگاه ادراری استفاده می‌شود. عمل باکتریواستاتیک آن در ادرار قلیایی، مربوط به هیدروکینون گلوكورونید و هیدروکینون سولفات تشکیل شده در بدن از آربوتین است. حداقل اثرات ضدعفونی کننده آن ۴ - ۳ ساعت بعد از مصرف است [۱۶، ۱۵]. همچنین آربوتین اثر آنتیاکسیدانت و ضدآفتاب دارد و با مهار سنتز ملانین سبب سفیدکردن پوست می‌شود. بنابراین به عنوان عامل سفیدکننده در فرمولاسیون اشکال دارویی موضعی محافظ دربرابر تابش‌های شدید اشعه UV به کار برده می‌شود. آربوتین برای چشم و پوست حساسیت‌زا نمی‌باشد [۴].



می‌شوند، لذا میزان ۷/۰۰۹ درصد و تعیین مقدار آربوتین

به روش HPLC دقیق‌تر می‌باشد.

دلیل است که در روش اسپکتروفتوometری سایر مشتقات

هیدروکینونی موجود در برگ گیاه نیز تعیین مقدار

منابع

1. ثابتی حبیب‌الله. جنگل‌ها، درختان و درختچه‌های ایران. انتشارات دانشگاه یزد. ۱۳۷۳، صفحه ۵۶۱-۲.
2. Petricic J, Apostolski R and Srepel B. The leaf of the wild pear-tree as an arbutinic herb. *Farmacevtski Vestnik Ljubljana J.* 1981; 32: 107-10.
3. Lubsandorzhieva PB, Zhigzhitov BS, Dargaeva ZhG and Nagaslaeva LA. Chromatospectrophotometric determination of arbutin in the leaves of *Bergenia crassifolia* (L.). *Pharmaceutical Chemistry J.* 2000; 34: 261-4.
4. Couteau C, Coifard L. Photostability determination of arbutin, a vegetable whitening agent. *Farmaco J.* 2000; 55: 410-3.
5. Bilia AR, Rubio M, Alvarez M, Morelli I and Gonzalez M. New benzyl alcohol glycosides from *Pyrus bourgaeana*. *Planta Medica J.* 1994; 60: 569-71.
6. *The Japanese Pharmacopoeia*. 13th ed. Ministry of Health and welfare. Tokyo. 1997, p:525.
7. Blumental M. *The complete German commission E monographs*. American Botanical Council. Austin. 1998, pp: 224-5.
8. Hamburger M, Cordell GA. A direct bioautographic TLC assay for compounds possessing antibacterial activity. *J. Nat. Prod.* 1987; 50: 19-22.
9. Homas AL, Fuchs A. Direct bioautography on thin-layer chromatograms as a method for detecting fungitoxic substances. *J. Chromatogr.* 1970; 51: 327- 9.
10. Marston A, Maillard M, Hostettmann K. Search for antifungal, molluscicidal, and larvicidal compounds from African medicinal plants. *J. Ethnopharmacol.* 1993; 38: 215-23.
11. Marston A, Kissling J and Hostetmann K. A rapid TLC bioautographic method for the detection of acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibitors in plants. *Phytochemical Analysis*. 2002; 13: 51 -4.
12. Sticher O, Soldati F and Lehmann D. HPLC separation and quantitative determination of arbutin, methyl arbutin, hydroquinone and hydroquinone monomethylether in *Arctostaphylos*, *Bergenia*, *Calluna* and *Vaccinium* species. *Planta Medica J.* 1994; 60: 569-71.
13. Wagner H, Bladt S. *Plant drugs analysis*. 2nd ed. Springer – verlag. Berlin. 1996, pp: 247-53.
14. قاسمی دهکردی نصرالله، طالب امیرمهدي. استخراج، شناسایی و تعیین مقدار ترکیبات موجود در گیاهان دارویی شخص. انتشارات چوگان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. ۱۳۸۰، صفحات ۸۵-۸.
15. Stembergova A, Supcikova M and Leifetova I. Evaluation of phenolic substances in *Arctostaphylos uva ursi*, determination of arbutin, methylarbutin and hydroquinone in the leaves by HPLC. *Ceska-a-slovenska-farmacie*. 1985; 34: 179-82.
16. Harborne JB. *Phytochemical methods*. 3th ed. Chapman and Hall. 1998, pp: 46-7.
17. Schieber A, Keller P and Carle R. Determination of phenolic acids and flavonoids of apple and pear by HPLC. *J. Chromatography*. 2001; 910: 265-73.
18. Sun H, Wang X, Huang R and Yuan C. Determination of arbutin in the herbs of *Vaccinium vitis-idea* by HPLC. *Zhongguo-zhong-yao-za-zhi*. 1997; 22: p 555.

