

شناسایی ترکیبات روغن فرار گیاه *Zeravschania membranacea* و مقایسه آن با اسانس *Z. pastinacifolia* گیاه

نرگس یاسا^{۱*}، رضوان گلستانی^۲، غلامرضا بخشی خانیکی^۳

- ۱- استادیار، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 - ۲- کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور
 - ۳- استادیار، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور
- *آدرس مکاتبه: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، گروه فارماکوگنوزی، تلفن: ۰۲۱-۶۹۵۹۰۹۰، نمایر: ۶۴۶۱۱۷۸ (۰۲۱)
- پست الکترونیک: yasa@sina.tums.ac.ir

تاریخ تصویب: ۱۱/۱۱/۸۳

چکیده

مقدمه: اسانس‌ها مواد طبیعی موجود در گیاهان هستند که مواد تشکیل‌دهنده آنها به عواملی چون ژنتیک، آب و هوا و زیستگاه و غیره وابستگی دارد. گیاهان خانواده چتریان از نظر وجود اسانس عنی می‌باشند که به دلیل تنوع و تفاوت اثرات خود در پزشکی سنتی و جدید مصرف دارند.

هدف: مقایسه اسانس دو گیاه بومی ایران از جنس *Zeravschania* می‌باشد.

روش تحقیق: گیاه *Zeravschania membranacea* (Boiss.) M. Pimenov در تیرماه سال ۱۳۸۲ جمع‌آوری شده و اسانس قسمت‌های هوایی آن به روش تقطیر با آب تهیه گردید (v/w ۱/۰۰٪) که به رنگ زرد و با بوی قوی می‌باشد. یافته‌ها: در تجزیه اسانس به وسیله GC-MS ۳۵ ترکیب از ۴۰ جسم، که ۸۳/۲۵ درصد اسانس را تشکیل می‌دهد شناسایی شد که میزان مونوتربین‌های آن ۶۴/۴۴ درصد است (۱۹/۱۵ درصد مونوتربین‌های اکسیژن‌دار و ۴۵/۲۹ درصد مونوتربین‌های هیدروکربنی). میزان سزکوبی‌ترین‌ها ۷/۸ درصد، فنیل پروپانوئیدها ۷/۸ درصد و ترکیبات غیر تربینی اسانس به میزان ۸۱/۲۲ درصد است. بیشترین مواد موجود در اسانس، آلفا تربینیل استات (۶/۶ درصد)، کارواکرول (۵/۹۵ درصد)، تیمول (۷/۶۴ درصد)، آلفا اسیمن وا (۰/۰۸ درصد)، بتا بیسابولن (۲/۳ درصد)، ترانس متیل ایزو اوژنول (۷/۷۴ درصد) و تیموهیدروکینون دی متیل اتر (۷/۱۶ درصد) می‌باشند.

نتیجه‌گیری: به دلیل رویش *Z. membranacea* در تپه‌های شنی و *Z. pastinacifolia* در شب‌های آهکی و صخره‌ای محتویات اسانس دو گیاه تا اندازه‌های متفاوت می‌باشند.

گل واژگان: *Zeravschania membranacea* اسانس، چتریان



مقدمه

میکرون و گاز حامل هلیوم و دمای محل تزریق ۲۵۰ درجه سانتی گراد طی برنامه ریزی حرارتی، 50°C ($2/5^{\circ}\text{C}/\text{min}$), 5°C ($30\text{ min} - 265^{\circ}\text{C}$) استفاده شد.

دستگاه طیف سنج جرمی Trace MS Termoquest Finnigan Quadropol قادرت ۷۰ الکترون ولت به عنوان دتکتور مورد استفاده قرار گرفت. در ضمن مواد و حاللهای مختلف از کارخانه Merck خریداری شده است.

جمع آوری گیاه:

گیاه Z. *memberanacea* از ۵۰ کیلومتری زنجان به طرف میانه در تیرماه سال ۱۳۸۲ جمع آوری شده و نمونه موزای آن به شماره ۱۰۰۱ در هریاریوم آفای دکتر حسین آخانی در دانشکده علوم دانشگاه تهران نگهداری می شود. قسمت های هوایی این گیاه در سایه، خشک و با آسیاب پودر گردید. از ۳۰۰ گرم پودر گیاه با دستگاه کلونجر (Clevenger) به روش تقطیر با آب به مدت ۴ ساعت اسانس گیری شد. پس از جمع آوری اسانس از لوله نزولی و شستشوی لوله با حلال پستان، اسانس روی سولفات سدیم آبگیری و پس از تبخیر پستان برای تزریق به دستگاه آماده گردید. میزان اسانس حاصل ۰/۳ میلی لیتر، به رنگ زرد کمرنگ با بوی نافذ می باشد که مقدار آن ۱/۰ درصد گیاه خشک است. دمای محل تزریق، برنامه ریزی حرارتی و قدرت دتکتور برای تجزیه اسانس مطابق با مشخصات ذکر شده در شرح دستگاه GC / MS می باشد. اجزای اسانس از روی مقایسه طیف جرمی با کتابخانه وایلی (Wiley) و همچنین مقایسه اندیس بازداری (Retention Indices) اجسام جدا شده با ترکیبات استاندارد و طیف های جرمی موجود در منابع مختلف، مورد شناسایی قرار گرفته اند [۷].

بحث و نتایج

در این مبحث به بررسی ترکیبات مختلف حاصل از تجزیه اسانس Z. *membranacea* و مقایسه آن با Z. *pastinacifolia* می پردازیم [۶]. در اسانس گونه مورد مطالعه میزان مونوترپین ها $44/64$ درصد است که از این مقدار $15/19$ درصد مونوترپین های اکسیژن دار و $29/45$ درصد

اولين و بزرگترین خانواده شناخته شده از گیاهان گل دار که در اوخر قرن شانزدهم توسط گیاه شناسان مورد بررسی قرار گرفت تیره چتریان (Umbelliferae) یا Apiaceae می باشد. اين تیره دارای $455 - 300$ جنس و $3750 - 3000$ گونه است [۱]. از اين تعداد 112 جنس و حدوداً 330 گونه در ايران پراکنده است [۲]. بارزترین خصوصیات مورفولوژیکی اين خانواده ساختار میوه و تریتان سطح آن، وجود گل آذین چتری، حفره های روغنی و کانال های رزینی (Vitta) است. اين تیره حاوی مواد شیمیایی مختلف از جمله کومارین ها فلاونوئیدها، پلی استیلن ها و روغن های فرار گیاهی می باشد که خود اين ترکیبات شیمیایی هم دارای انوع مختلفی هستند [۳]. گونه های مختلف اين تیره دارای مصارف گوناگونی چون مصارف دارویی، آرایشی، خوارکی، سمی و ... می باشند که می توان به عنوان مثال رازیانه، زیره سیاه، باریجه، کرفس، گشنیز، شوید، هویج، گل پر، شوکران و ... را نام برد [۴]. برای اولين بار، آفای بوآسیه در سال ۱۸۷۳ در فلور شرق^۱ صفات مورفولوژی کمپلکس جنس *Peucedanum* را شرح داده است [۵]. آفای پروفسور پیمنوف^۲ نیز اين کمپلکس را در فلورا ایرانیکا^۳ به پنج جنس تقسیم کرده است [۲]. در این تقسیم بندی گونه های جنس *Zeravschania* که منحصر به اiran است مد نظر ما هستند. تنوع در عطر گونه های مختلف اين تیره ما را برابر آن داشت که اسانس گونه هایی از اين تیره را شناسایی کنیم. تاکنون از اسانس گونه Z. *memberanacea* گزارشی ارایه نشده است که در این مقاله به بررسی و مقایسه اسانس آن با گونه Z. *pastinacifolia* که قلاً مورد آزمایش قرار گرفته است می پردازیم [۶]. این دومین گزارش از اسانس جنس *Zeravschania* در دنیا می باشد.

مواد و روش ها

در این آزمایش از دستگاه GC مدل 2000 با ستون ۱ - DB به طول ۳۰ متر و قطر داخلی ۲۵۰

¹ Flora Orientalis

² M.G.pimenov

³ Flora Iranica

اسانس گیاه مورد مقایسه (*Z. pastinacifolia*) موجود نمی باشد (جدول شماره ۱). این دو گونه متعلق به یک جنس ولی در اقلیم‌های متفاوت رویش دارند. گونه *Z. pastinacifolia* در ارتفاعات کوهستانی و محیط صخره‌ای غنی از سنگ ریزه واقع در منطقه اوین تهران می‌روید ولی محل رویش *Z. membranacea* در تپه‌های ماهوری اطراف جاده زنجان – میانه در ارتفاع کم می‌باشد [۶]. احتمالاً تفاوت در ارتفاع و اقلیم‌های رویشی آنها سبب شده است که ترکیبات اسانس‌ها و درصد آنها با یکدیگر متفاوت باشند که در جداول شماره ۲ و ۳ با هم مقایسه شده‌اند.

مونوترپین‌های هیدروکربنی می‌باشند. بیشترین درصد ترکیبات مونوترپنی اسانس، آلفا ترپنیل استات (۷/۶ درصد)، کارواکرول (۵/۹۵ درصد)، تیمول (۴/۷۶ درصد)، آلفا اسیمن وا (۴/۰۸ درصد)، پارامتا یک – ان – ۸ – آل (۲/۶۶ درصد) می‌باشد. میزان سزکویی ترپن‌ها ۷ درصد است که بیشترین درصد ترکیبات آن را بتا بیسابولن (۳/۲۴ درصد) و سیس آزارون (۱/۴۴ درصد) تشکیل می‌دهد. میزان فنیل پروپانویید آن ۷/۸ درصد است که مهمترین ترکیب آن ترانس متیل ایزو اوژنول به میزان ۷/۷۴ درصد بوده و سایر ترکیبات غیرترپنی اسانس به میزان ۲۲/۸۱ درصد است ماده تیموهیدروکینون با مقدار ۱۶/۷ درصد بیشترین ترکیب موجود در اسانس است که در

جدول شماره ۱- ترکیبات شناسایی شده اسانس *Zeravshania membranacea* (Boiss.) Pimenov.

نام ترکیبات	درصد	اندیس بازداری
alpha-Pinene	۰/۶۱	۹۲۸
Camphene	۰/۱۰	۹۳۱
Sabinene	۰/۹۵	۹۰۵
beta-Pinene	۰/۳۲	۹۶۲
6 -Metyl-3,5-Heptadiene-2-one	۰/۹۲	۹۶۵
beta-Myrcene	۲/۹۰	۹۷۷
l-Phellandrene	۰/۱۷	۹۸۶
P-Cymene	۰/۲۶	۱۰۰۴
beta-Phellanderene	۱/۸۷	۱۰۱۲
d l-Limonene	۱/۸۷	۱۰۱۴
cis-Ocimene	۰/۹۸	۱۰۲۱
alpha-Ocimene Y	۴/۰۸	۱۰۳۶
gamma-Terpinene	۰/۲۰	۱۰۴۵
1-Nonanol	۰/۳۵	۱۰۶۱
alpha-Terpinolene	۰/۰۳	۱۰۷۴
Linalool	۷/۳۵	۱۰۹۴
n-Dodecane	۰/۱۵	۱۰۹۹
cis-Limonene oxide	۰/۱۲	۱۱۷۶
trans-Sabinene Hydrate	۰/۳۵	۱۲۱۶
Mw=139	۰/۹۵	۱۲۲۵
p-Menta-1-en-8-ol	۲/۶۶	۱۲۲۸
n-Decanal	۴/۴۰	۱۲۳۲
Linalyl acetate	۲/۰۱	۱۲۳۵
trans-Decanal	۰/۲۹	۱۲۵۵
Thymol	۴/۷۶	۱۲۸۸



ادامه جدول شماره ۱- ترکیبات شناسایی شده اسانس *Zeravschania membranacea* (Boiss.) Pimenov.

نام ترکیبات	درصد	اندیس بازداری
Carvacrol	۵/۹۵	۱۲۹۵
alpha-Terpenyl acetate	۷/۶	۱۳۳۵
Metyl eugenol	۰/۰۶	۱۳۴۰
Thymohydroquinone,dimethyl et	۱۶/۷	۱۳۵۴
MW=194	۲/۶۴	۱۳۶۴
MW=194	۳/۹۵	۱۳۷۰
MW=192	۹/۸۶	۱۳۹۴
trans-Methyl-iso eugenol	۷/۷۴	۱۴۲۲
beta-Bisabolene	۳/۲۴	۱۴۲۴
alpha-Humulene	۰/۶۹	۱۴۲۶
Farnesol	۰/۱۳	۱۴۲۸
cis-Asarone	۱/۴۴	۱۴۲۹
Iso-Caryophyllen	۰/۲۴	۱۴۳۳
Aremodendrene	۱/۲۶	۱۴۳۵
MW=252	۰/۳۵	۱۴۹۵
Hydrocarbon Monoterpenes	۲۹/۴۵	
Oxygenated Monoterpenes	۱۵/۱۹	
Hydrocarbon Sesquiterpenes	۷	
Phenylpropanoids	۷/۸	
Nonterpenes	۲۲/۸۱	
Known	۸۳/۲۵	

جدول شماره ۲- مقایسه میزان درصد ترکیبات موجود در اسانس‌ها

نام گیاه	مونوتربن	سزکوبین تربن	فیتل پروپانویید	غیر تربنی
<i>Z. membranacea</i>	۴۴/۶۴	۷	۷/۸	۲۲/۸۱
<i>Z. pastinacifolia</i>	۴/۳	۴۸/۹	۳۱/۶	۱۲/۹

جدول شماره ۳ - میزان درصد مواد مشترک اسانس‌ها در دو گیاه

نام ترکیبات	<i>Z. membranacea</i> گیاه	<i>Z. pastinacifolia</i> گیاه
آلفا - پین	۰/۶۱	۰/۴
بنا - پین	۰/۳۲	۰/۲
میرسن	۲/۹	۰/۱
فلاندرن	۰/۱۷	کم
لیمون	۱/۸۷	۰/۷
ترپین	۰/۲	کم
أُسیمن	۰/۹۸	۰/۳
بیساپولن	۳/۲۴	۳۷/۳
آزارون	۱/۴۴	۰/۴
متیل اوژنول	۷/۷۴	۰/۳

منابع

1. Pimenov MG, Leonov MV. The general of the Umbelliferae, The Royal Botanical Gardens, Kew, London. 1993.
2. Hedge IC, Lamond JM, Rechinger KH, Alava R, Chamberlain DF, Engstrand L, Herrnstadt I, Peev D, Pimenov MG, Snogerup S, Tamamschian SG. Umbelliferae. In: Flora Iranica (Rechinger KH, ed.), Academics Druck-u. Verlagsanstalt Graz, Austria. 1987; 162.
3. Hegnauer R. Chemical patterns and relationships of the Umbelliferae. In: The Biology and Chemistry of Umbelliferae. (Heywood VH. ed.). Academic Press. New York. 1971; pp: 267-277.
4. فقیر، مرضیه بیگم. تیره‌های متداول گیاهان گل‌دار. انتشارات دانشگاه گیلان. ۱۳۸۰.
5. Boissier E., Flora Orientalis. Genave, 1872; 2.
6. Yassa N, Akhani H. Essential Oils from Two Endemic Species of Apiaceae from Iran. Z. Naturforsch. 2003; 58c: 459-463.
7. Adams PR. Identification of Essential oil components by Gas Chromatography/Mass Spectroscopy, Allured publishing corporation, Illinois, USA, 1995.

