

## بررسی گیاهان دارویی مورد استفاده در طب سنتی ایران برای درمان فشار خون از طریق بررسی قدرت مهارکنندگی فعالیت ACE

سیدعلی ضیایی<sup>۱\*</sup>، شمسعلی رضازاده<sup>۲</sup>، آرزو دست پاک<sup>۳</sup>، آیدا شبستری<sup>۴</sup>، میترا تقیزاده<sup>۵</sup>، حسنعلی نقدی بادی<sup>۶</sup>

لیلا پورحسینی<sup>۷</sup>

- ۱- استادیار، گروه فارماکولوژی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
  - ۲- استادیار، گروه فارماکوگنوزی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
  - ۳- کارشناس ارشد، گروه فارماکولوژی و طب کاربردی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
  - ۴- دکتر داروساز، دانشکده داروسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
  - ۵- پژوهشیار گیاهشناسی، گروه فارماکوگنوزی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
  - ۶- استادیار پژوهش، گروه کشت و توسعه گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
  - ۷- کارشناس، گروه فارماکولوژی و طب کاربردی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
- \* آدرس مکاتبه: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر غربی، شماره ۹۷ صندوق پستی: ۱۴۴۶ - ۱۳۱۴۵، تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۶۲۱۷۹، ۰۲۱-۶۶۹۵۰۴۴۷، نمبر: ۰۲۱-۶۶۶۴۵۵۵۴  
پست الکترونیک: sazaii@gmail.com

تاریخ تصویب: ۸۵/۸/۲۹

تاریخ دریافت: ۸۵/۶/۱۳

### چکیده

مقدمه: آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE)، اگزوبیپیدازی است که باعث تبدیل آنژیوتانسین I به II می‌شود. آنژیوتانسین II سبب انقباض عروق و ترشح آلدسترون شده و با تعزیزه برادیکینین باعث بی‌اثر شدن آن می‌گردد. به این ترتیب ACE نقش مهمی در تنظیم فشار خون بازی می‌کند.

هدف: جستجو به دنبال داروهایی با اثرات ضد فشار خون در طب سنتی جهت پیدا کردن مهارکنندگان ACE از گونه‌های گیاهی مورد مصرف در طب سنتی ایران به عنوان درمان فشار خون و بیماری‌های وابسته

روش بررسی: در این مطالعه تعداد ۱۳۵ گیاه مورد مصرف در طب سنتی ایران از لحاظ خاصیت مهارکنندگی آنزیم ACE مورد بررسی قرار گرفتند. این نمونه‌ها براساس خاصیت مدری، مقوی قلب و کاهنده فشار خون انتخاب شدند. از یک گرم از گیاهان فوق با ۱۰ میلی‌لیتر آب یا آتانول ۹۶ درصد در حمام اولتراسوند عصاره‌گیری به عمل آمد. عصاره‌های آبی لیوفیلیزه شدند و عصاره‌های الکلی نیز در شرایط خلا تغليظ شدند. فعالیت آنزیم ACE با استفاده از دستگاه HPLC اندازه‌گیری گردید. عصاره‌هایی که توانستند بیش از ۵۰ درصد فعالیت آنزیم را در مقایسه با شاهد مهار کنند، به عنوان مهارکننده احتمالی درنظر گرفته شده و از لحاظ وجود تانن به علت ایجاد کمپلکس فلزی با بخش فعال مرکزی ACE و ایجاد تداخل مثبت در مهار فعالیت ACE آزمایش شدند تا جواب مثبت کاذب حذف شود.

نتایج: در مجموع از ۱۳۵ نمونه مورد بررسی ۵۲ نمونه (درصد) آنزیم را مهار کردند که در این میان ۴۰ نمونه فاقد تانن بودند. کل واژه‌گان: آنزیم مبدل آنژیوتانسین ACE، طب سنتی، فشار خون، HPLC



## مقدمه

منحصر به فرد در سراسر آن رشد می‌کنند که باعث ایجاد یک فلور کمنظیر در جهان شده است به طوری که نزدیک به ۸ هزار گونه گیاهی را شامل می‌شود و ذخیره‌ای عظیم و بالقوه از ترکیبات فعال بیولوژیک محسوب می‌گردد. یکی از بهترین بهره‌وری‌هایی که می‌توان از شرایط کمنظیر موجود نمود، انجام تحقیقات گستردۀ هر چه بیشتر در جنبه‌های داروسازی است. اولین و مهمترین سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان کاهی (داروهای مهار کننده ACE) را در میان کوهی (سلسله گیاهی) جست؟ از آنجایی که محافظه‌کارانه‌ترین برآورد نشان می‌دهد که حدود ۲۵۰,۰۰۰ گونه گیاهی گلدار روی زمین وجود دارد، یافتن راهی منطقی برای کشف داروهای جدید مهار کننده آنژیوتانسین از این منبع منحصر به فرد و البته تجدیدپذیر ضروری است. اتوفارماکولوژی از طریق مشورت با گیاه درمانگران، جمع‌آوری اطلاعات براساس استفاده‌های پژوهشی عمومی از گیاهان و یا از طریق بررسی‌های طب سنتی - بومی به دست می‌آید و حاصل سعی و خطای بشر در طول تاریخ بوده است. هرچه پیشینه فرهنگی و تاریخی کشوری بیشتر باشد این اطلاعات دقیق‌تر خواهد بود.

یان<sup>۱</sup> و همکارانش در سال ۱۹۸۱، ۲۷ گونه گیاهی را که در طب سنتی «کره» به عنوان درمان فشارخون یا بیماری‌های وابسته مصرف می‌شدند، به روش سنجش اسپکتروفوتومتریک بررسی کردند [۱۳]. در سال ۱۹۸۴ اینوکوچی<sup>۲</sup> و همکارانش ۶۵ گونه گیاهی مورد مصرف در درمان فشار خون بالا را در طب سنتی ژاپن و چین، به روش فلورومتریک را بررسی کردند [۱۴].

۵۴ گونه گیاهی مورد مصرف در طب سنتی به عنوان پایین آورنده فشار خون یا دیورتیک در جزیره Reunion در سال ۱۹۹۷ توسط اندرسون<sup>۳</sup> با دستگاه HPLC سنجیده شد [۱۵]. در سال ۱۹۹۸ ۷۵ گونه متعلق به ۴۲ خانواده از گیاهان طب سنتی هندوستان که در درمان فشار خون بالا مصرف داشتند توسط نیمن<sup>۴</sup> و همکاران آزمایش شد [۱۶].

از دهه ۱۹۸۰ میلادی آنژیم مدل آنژیوتانسین موفقیت بزرگی را به عنوان خط اول درمان برای بیماری‌های فشار خون بالا، نارسایی قلبی و نفروپاتی دیابتی کسب کرده است [۱]. آنژیم مدل آنژیوتانسین (دی پیتیدیل کربوکسی پیتیداز) که یک متالوپروتاز متصل به اتم روی است، آنژیم اصلی در سیستم رنین - آنژیوتانسین محسوب می‌شود [۲]. این آنژیم هیدرولیز باند پیتید ما قبل آخر انتهای کربوکسیلی بسیاری از پیتیدها را کاتالیز می‌کند، ولی بهترین سویسرا از آن آنژیوتانسین I و برادی کینین است [۳]. از آنجایی که ACE در هموستاز فشار خون و نگهداری آب و الکتروولیت‌ها نقش دارد، بنابراین هدف مهمی در درمان فشار خون و نارسایی قلبی محسوب می‌شود [۵,۶,۷].

برای نخستین بار Engel و همکارانش [۸,۹] نشان دادند که یک پیتید درسم نوعی افعی آمریکای جنوبی به نام *Bothrops jararaca* [۱۰] اثرات برادی کینین را از طریق مهار تبدیل آنژیوتانسین I تقویت کرده و فشار خون بالا را در انسان و حیوانات آزمایشگاهی پایین می‌آورد. علاقه به یافتن مهارکننده ACE با ستر کاپتوپریل توسط اندتی<sup>۱</sup> و همکارانش افزایش یافت [۱۱]. این مولکول برای بیشترین اثربخشی با قسمت فعال آنژیم ACE بر اساس مدل مشابه آنژیم ACE یعنی آنژیم کربوکسی پیتیداز A طراحی شد. بلاfaciale در طی چند سال بعد مواد گوناگونی با تغییر ساختمانی کاپتوپریل تهیه و به عنوان مهارکننده ACE معرفی شدند [۱۲]. اما این داروها هنوز هم به دلیل عدم اختصاصی بودن مهارکننده‌گی آنها مطلوب نیستند. از طرف دیگر وجود منابع گیاهی با خواص درمانی گوناگون سبب شد که مطالعات جهت یافتن داروهای جدید مهارکننده ACE با عوارض جانبی کمتر و اختصاصی بودن از لحاظ مهار جایگاه فعال، به سوی غربالگری گیاهان دارویی سنتی مناطق مختلف جهان سوق پیدا کند. روش‌های مختلف غربالگری و گیاهان مختلفی جهت بررسی مهارکننده آنژیم مدل آنژیوتانسین به کار گرفته شدند.

از آنجایی که کشور ما ایران از آب و هوای متنوع و شرایط جغرافیایی خاصی برخوردار است، گیاهان متعدد و بعضی مواد

<sup>1</sup> Yun

<sup>3</sup> Anderson

<sup>2</sup> Inokuchi

<sup>4</sup> Nyman


<sup>1</sup> Ondetti



دست آمده در ظروف شیشه‌ای، در دمای ۲۰- درجه و دور از نور تا زمان آزمایش نگهداری شدند. سوبسترا-  
Hip-His-Leu از شرکت سیگما خریداری و آنزیم ACE از عصاره ریه خرگوش استفاده شد.

### سنجهش فعالیت آنزیم و بررسی قدرت مهار کنندگی آنزیم

**ACE:** انکوباسیون آنزیم و سوبسترا طبق الگوریتم زیر انجام می‌گیرد:



ابتدا ۲۵ میکرولیتر از محلول آنزیم را به کمک سپلیر درون میکروتیوب‌های قرار داده شده در چاهک‌های ترمومیکسر ریختیم، سپس ۲۵ میکرولیتر محلول مهار کننده را اضافه کردیم تا مدت ۳ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد محلول‌های داخل میکروتیوب‌ها مخلوط شوند. سپس، ۲۵ میکرولیتر از محلول سوبسترا را به میکروتیوب‌ها اضافه کردیم بعد از ۳۵ دقیقه زمان انکوباسیون سریعاً ۵۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده را به میکروتیوب‌ها اضافه کردیم.

هر نمونه ۲ بار تکرار شد و یک بلانک نیز تعیین گردید. طرز تعیین بلانک به این صورت بود که بعد از اضافه کردن ۲۵ میکرولیتر آنزیم ابتدا ۵۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده را اضافه کرده و سپس ۲۵ میکرولیتر از همان نمونه مهار کننده را اضافه می‌کردیم و بعد از ۳ دقیقه انکوباسیون به همان ترتیب گفته شده، ۲۵ میکرولیتر سوبسترا را به میکروتیوب‌ها می‌افزودیم و اجازه می‌دادیم تا زمان انکوباسیون در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد میری شود.

برای تعیین کترول مثبت ۲۵ میکرولیتر آنزیم را با ۲۵ میکرولیتر بافر Hepes مخلوط کرده ۳ دقیقه انکوبه کردیم و طبق روش روش گفته شده به هر کدام از میکروتیوب‌ها ۲۵ میکرولیتر سوبسترا اضافه کردیم و بعد از خاتمه انکوباسیون ۵۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده را با حفظ زمان و ترتیب به میکروتیوب‌ها اضافه کردیم.

از استاندارد اسید هیپوریک (به عنوان استاندارد خارجی با غلط‌های مختلف) استفاده گردید.

پس از پایان انکوباسیون محلول‌های داخل میکروتیوب‌ها به داخل ویال‌های مخصوص دستگاه HPLC انتقال داده شد. سپس ویال‌ها به داخل سینی اتوسپلیر HPLC انتقال داده شدند.

اخیراً در سال ۱۹۹۹ سومانادان<sup>۱</sup> و همکاران ۷۳ گونه گیاهی موجود در طب سنتی هند و دانکن<sup>۲</sup> و همکارانش ۲۰ گونه گیاهی موجود در کشور zulu غرب‌الگری ۲۰ گونه فلور طبیعی ضد فشارخون کشور بزرگی هم در سال ۲۰۰۰ توسط براگا<sup>۳</sup> و همکاران صورت گرفت [۱۹].

## مواد و روش‌ها

**انتخاب گیاهان:** با توجه به کتاب‌های موجود و درمانگران سنتی (عطاری‌ها) ۱۳۵ نمونه از گیاهان مورد مصرف در طب سنتی ایران بر اساس خاصیت مدری، مقوی قلب و کاهنده فشارخون جهت بررسی خاصیت مهارکنندگی ACE توسط این گیاهان انتخاب شدند. از فروردین ۸۳ تا خرداد ۸۴ گیاهان انتخاب شده از مرکز فروش این نمونه‌ها در شهر تهران تهیه و یا از مزرعه پژوهشکده گیاهان دارویی موجود جمع‌آوری و در شرایط مناسب سریعاً خشک شدند و در هر باریوم دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد مطالعات تاگزونومیکی قرار گرفتند و نام علمی دقیق این نمونه‌ها با توجه به نمونه‌های رفرانس تعیین و به صورت شناسنامه برای هر یک تکمیل گردید (جدول شماره ۱).

**عصاره‌گیری:** نمونه‌های تعیین شده با توجه به بخش مورد استفاده و چنانچه اطلاعاتی از بخش مورد استفاده در دسترس نبود کل گیاه توسط آسیاب به صورت پودر درآمد، از الک با مش ۴۰ عبور داده شد و سپس ۱ گرم از گیاهان فوق داخل لوله‌های آزمایش در بسته ریخته شد و ۱۰ میلی‌لیتر آب مقطر یا اتانول ۹۶ درصد به طور جداگانه به آن افزوده و در حمام اولتراسونیک به مدت ۲ ساعت جهت عصاره‌گیری قرار گرفت. سپس محلول رویی صاف شد، (از گروهی از نمونه‌ها که با این روش عصاره مطلوب به دست نیامده بود به روش پرکولاسیون عصاره‌گیری انجام شد)، حلال آب عصاره‌های آبی به روش Freeze drying توسط دستگاه لیوفیلیزه جدا شده و عصاره‌های الکلی نیز در شرایط خلا توسط Rotary در دمای ۵۰ درجه تغییط شدند و سپس در دستگاه لیوفیلیزه قرار گرفتند عصاره‌های به

<sup>1</sup> Somanadhan  
<sup>3</sup> Braga

<sup>2</sup> Duncan



برای مقایسه میزان تانن موجود می‌توان همین روش را برای پودر مازوج درخت بلوط که حاوی تانن‌های مختلف به مقدار زیاد است به کار برد و آن را به عنوان شاهد + در نظر گرفت. حضور و میزان تانن را می‌توان با بررسی میزان کدورت و رسوب ایجاد شده در لوله‌های اول و دوم و یا تغییر رنگ لوله سوم به آبی - سبز در مقایسه با کنترل مثبت همان نمونه و بررسی آنها نسبت به کدورت و تغییر رنگ ایجاد شده در لوله‌های شاهد به دست آورد. جواب تست در صورتی که لوله اول و دوم کدورت و رسوبی نشان نمی‌داد و یا لوله سوم تغییر رنگی در طیف آبی سبز نداشت منفی بود. چنانچه لوله اول و دوم کدورت و رسوب داشت و لوله سوم تغییر رنگ نشان می‌داد (چه تغییر رنگ آبی - سیاه برای تانن‌های هیدرولیز شونده و چه تغییر رنگ سبز - قهوه‌ای برای تانن‌های کندانس شونده) جواب تست تانن مثبت در نظر گرفته می‌شد [۱۶، ۱۸].

## نتایج

بر اساس سطح زیر منحنی غلظت‌های مختلف اسید هیپوریک (به عنوان استاندارد خارجی)، میزان اسیدهیپوریک تولید شده در واکنش آنزیمی را محاسبه کرده و فعالیت آنزیم را به دست می‌آوریم. حداقل میزان قابل سنجش اسید هیپوریک ۵۰ پیکومول بود. غلظت آنزیم باید در محدوده‌ای باشد که بتوان قدرت مهارکنندگی آن را اندازه‌گیری نمود. و رقت مورد نظر از قسمت کیتیک درجه اول نمودار انتخاب شد که در آن قسمت غلظت‌های مختلف آنزیم رابطه مستقیم با میزان هیپوریک اسید تولید شده از سویسترا را دارد. کیتیک آنزیمی با اندازه‌گیری سرعت‌های واکنش در غلظت‌های مختلف سویسترا برسی شد. روش میکائیلیس - متون برای تعیین Km واکنش به کار گرفته شد و مقدار Km جهت تخمین غلظت سویسترا به کار برد شد. با توجه به Vmax مقدار Km= ۰/۷ به دست آمد و از روی Km میزان غلظت سویسترا معادل ۳/۵ mM جهت انجام آزمایش انتخاب شد. فعالیت آنزیمی در حدود ۳۵ دقیقه ثابت می‌شود و در واقع از این زمان به بعد واکنش از کیتیک درجه صفر تبعیت می‌کند. بنابراین ۳۵ زمان مطلوب انکوباسیون جهت انجام آزمایش‌ها بود.

**دستگاه HPLC :** HPLC مورد استفاده متعلق به شرکت KNAUER UV-Visible K-1001 مدل پمپ Maraton Auto sampler مدل K-2501، تزریق کننده Chromgate Perfectsill target N pH=۳ به ابعاد ۴×۳۵ mm میکرون بود. فاز متحرک شامل مخلوط KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> ۶:۱۰ میلی‌مولار و متانول pH=۳ HPLC grade بود که توسط اسید ارتوفسفریک ۵ میکرون با تثبیت می‌شد و پس از عبور از صافی غشایی ۰/۴۵ میکرون با سرعت ۱ میلی‌لیتر در دقیقه جریان پیدا می‌کرد. هر بار ۲۰ میکرولیتر از محلول حاصل از انکوباسیون به صورت خودکار به دستگاه تزریق می‌شد، در واقع هر نمونه ۲ بار همراه با بلاتک مربوط به خود، به دستگاه تزریق می‌شد. کل زمان کروماتوگرافی ۵/۵ دقیقه بود و پیک‌ها در طول موج ۲۲۸ نانومتر ردیابی می‌شدند. آندازه‌گیری درصد مهارکنندگی آنزیم: جهت محاسبه درصد

مهارکنندگی آنزیم توسط نمونه‌ها از فرمول زیر استفاده شد:

$$\text{Inhibition (\%)} = \left[ 1 - \frac{\text{Peak area (Hippuric acid Sample)} - \text{Peak area (Hippuric acid Blank)}}{\text{Peak area (Hippuric acid Control)}} \right] \times 100$$

تست تانن: عصاره‌هایی که توانستند بیشتر از ۵۰ درصد فعالیت آنزیم را در مقایسه با شاهد مهار کنند از لحاظ وجود تانن به علت ایجاد تداخل مثبت با ACE آزمایش شدند.

جهت تست تانن از روش زیر استفاده شد:

۲۰۰ mg از عصاره گیاهی تهیه شده در ۵ میلی‌لیتر آب مقطّر داغ (۹۰-۱۰۰ درجه سانتی‌گراد) حل و پس از سرد شدن ۳ تا ۴ قطره محلول NaCl ۱۰ درصد جهت رسوب ترکیبات غیرتاننی افزوده شد، بدین طریق هر جواب مثبت کاذب در آزمایش حذف گردید [۲۰]. محلول به دست آمده صاف و سپس ۴ لوله آزمایش برداشته و به هر لوله ۱ ml از محلول فیلتر شده اضافه گردید. محلول‌های زیر به لوله‌ها طبق روند پایین افزوده شد:

- ۱ ۴ تا ۵ قطره محلول ژلاتین ۱ درصد → (لوله اول)
- ۲ ۴ تا ۵ قطره محلول (ژلاتین ۱ درصد + ۱۰ NaCl) → (لوله دوم)

- ۳ ۳ تا ۴ قطره ۱۰ FeCl<sub>3</sub> درصد → (لوله سوم)
- ۴ کنترل مثبت (هیچ محلولی اضافه نمی‌شود) → (لوله چهارم)

جدول شماره ۱- مشخصات گیاهان شامل نام علمی، عمومی و تیره آنها، موارد مصرف، محل، تاریخ جمع آوری و اثر نسبت داده شده به آنها با ذکر منابع

ردیف	نام علمی	نام بومی	نام علمی	نام بومی	تیره	زمان و مکان	جمع آوری	مورد استفاده	قسمت	صرف سنتی (ماحد)	مقدار	صدفشار خون	مقدار قلب
1	<i>Achillea millefolium</i> L.	تریه کاپنی	Compositae	بومادران	بومادران	تایستان ۸۳۰	محو طه دانشگاه تهران	گل و برگ و ساقه	گل	۱-۳	۱-۶		
2	<i>Achillea santolina</i> L.	تریه کاپنی	Compositae	بومادران	بومادران	تایستان ۸۳۰ بازار تهران	تایستان ۸۳۰ و بهار ۴۸	تایستان ۸۳۰ بازار تازه	گل	۱-۳	۱-۷		
3	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	تریه سرخس	Polypodiaceae	پرسپاوش				تریه به صورت تازه	برگ و ساقه	۲-۵	۲		
4	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	تریه عرعر	Sinaroubaceae	درخت عرعر		تایستان ۸۳۰	محو طه دانشگاه تهران	میوه و دانه	میوه و دانه	۳-۸			
5	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	تریه عرعر	Sinaroubaceae	درخت عرعر		تایستان ۸۳۰	محو طه دانشگاه تهران	تریه و شاخه	تایستان ۸۳۰ بازار تهران	۳-۸			
6	<i>Alcea digitata</i> (Boiss.) Alef.	تریه پنیرک	Malvaceae	تریه		تایستان ۸۳۰ بازار تهران	تایستان ۸۳۰ بازار تهران	گل	گل	۲-۳			
7	<i>Alhagi persarum</i> Boiss. & Buhse.	تریه بروانه ساما	Papilionaceae	تریه بروانه ساما		تایستان ۸۳۰ بازار تهران	تایستان ۸۳۰ بازار تهران	مان	مان	۴			
8	<i>Allium cepa</i> L.	تریه لاله	Liliaceae	پیاز		تایستان ۸۳۰ بازار خشک نشده	تایستان ۸۳۰ بازار خشک نشده	غذه	غذه	۱-۳-۲-۱-۱	۱-۶-۲-۱-۱		
9	<i>Allium hirtifolium</i> Boiss.	تریه لاله	Liliaceae	موسیر		تایستان ۸۳۰ بازار خشک نشده	تایستان ۸۳۰ بازار خشک نشده	غذه	غذه	۴	۴		
10	<i>Allium porrum</i> L.	تریه لاله	Liliaceae	تریه		تایستان ۸۳۰ بازار تازه	تایستان ۸۳۰ بازار تازه	تریه به صورت تازه	تریه	۱-۸		۱-۳-۲-۱-۸	
11	<i>Allium sativum</i> L.	تریه لاله	Liliaceae	سیر		تایستان ۸۳۰ بازار تازه	تایستان ۸۳۰ بازار تازه	غذه	غذه	۱-۳-۲-۱-۷-۱	۱-۳-۷-۱-۷		
12	<i>Aloe vera</i> L.	تریه لاله	Liliaceae	صریز زرد		تایستان ۸۳۰ بازار تهران	تایستان ۸۳۰ بازار تهران	بهار ۳۰۰ بازار تازه	بهار ۳۰۰ بازار تازه	۷-۸			
13	<i>Aloe vera</i> L.	تریه لاله	Liliaceae	آلونه		تایستان ۸۳۰ بازار تازه	تایستان ۸۳۰ بازار تازه	صمغ	صمغ	۷-۸			
14	<i>Anethum graveolens</i> L.	تریه چمنی	Umbelliferae	شمرید		تایستان ۸۳۰ بازار تهران	تایستان ۸۳۰ بازار تهران	برگ و زل	برگ و زل	۷-۸	۱-۳-۲-۱-۸		



ادامه جدول شماره ۱ - مشخصات گیاهان شامل نام علمی، عمومی و تیره آنها، موارد مصرف، محل، تاریخ جمع اوری و اثر نسبت داده شده به آنها با ذکر منابع

ردیف	نام علمی	نام بوسی	زمان و مکان	جمع اوری	قامت	صرف سنتی (ماخذ)	مقدار قلب	مقدار خون	مقدار استفاده
15	<i>Apium graveolens</i> L.	کرنفس	بهار ۸۳ بازار تهران	تره جعفری	تره	۶-۸	۱-۲-۳-۶-۸	۹	۱-۲-۳-۶-۸
16	<i>Arcium lappa</i> L.	بابا آدم	بهار ۸۳ بازار تهران	تره کلنسی	تره	رشیده	۱-۳-۴-۶		
17	<i>Armeniacac vulgaris</i> L.	زرد الو	تابستان ۸۳ بازار تازه	تره گل سرخ	تره	برگ و ساقه	۱		
18	<i>Artemisia dracunculus</i> L.	ترخون	تایبستان ۸۳	تره کاسنی	تره	سرشاخه‌های هروئی	۱-۶		
19	<i>Asparagus officinalis</i> L.	مارچری	بهار ۸۳ بازار تهران	تره مارچری	تره	رشیده	۱-۳		
20	<i>Asperugo procumbens</i> L.	وارنیک بو	بهار ۸۳ بازار تهران	پادنجویی	تره گازیزان	سرشاخه‌های هوایی	۲	۲	۱-۳-۵-۶
21	<i>Avena sativa</i> L.	جو و سرمه	تایبستان ۸۳	تره گندم	تره	تمام گیاه	۳	۴	۱-۳
22	<i>Berberis integrifolia</i> Bge.	محوطه داشگاه تهران	محوطه داشگاه تهران	تره زرشک	تره زرشک	محیوه	۳	۳	
23	<i>Berberis vulgaris</i> L.	زرشک آسی	بهار ۸۳ بازار تهران	تره زرشک	تره زرشک	محیوه	۳	۳	
24	<i>Brassica Napus</i> L.	تابستان ۸۳	تابستان ۸۳	تره شب‌بر	شامگم	تنهیه به صورت تازه	دانه		۱-۵-۸
25	<i>Brassica oleracea</i> L.	کلم پیچ	تابستان ۸۳	تره شب بر	کلم	برگ کلم	۷	۳-۵-۸	
26	<i>Bunium persicum</i> (Boiss.) B. Fedtsch.	دانه	تابستان ۸۳ و بهار ۸۴	تره جعفری	تنهیه به صورت تازه	تنهیه به صورت تازه			۱-۳-۵-۸
27	<i>Calendula officinalis</i> L.	گل عجیشه	تابستان ۸۳ و بهار ۸۴	تره کاسنی	گل عجیشه	گل عجیشه	۱	۱	۱
28	<i>Camellia sinensis</i> L.	بهار	موسمه داشگاه تهران	تره چای	تره چای	تره چای	برگ	۱	۱



ادامه جدول شماره ۱ - مشخصات گیاهان شامل نام علمی، عمومی و تیره آنها، موارد مصرف، محل، تاریخ جمیع اورده و اثر نسبت داده شده به آنها با ذکر منابع

ردیف	نام علمی	تیره	نام و مکان	قسمت	مقدار قلب	مصرف سنتی (ماخذ)
			زمان و مکان	جمع اورده	مقدار	ضدقتار خون
29	<i>Camellia sinensis</i> L.	تیره چای Theaceae	چای سبز تایپستان ۸۳ بازار تهران	نام بوسی	برگ	۱
30	<i>Cannabis sativa</i> L.	تیره شاهدانه Cannabaceae	شاهدانه تایپستان ۸۳ بازار تهران	دانه	۲-۰	۹
31	<i>Capsicum annuum</i> L.	تیره سبز زمینی Solanaceae	فلال سبز تایپستان ۸۳	میوه	۱-۳	
32	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench	تیره گل سرخ Rosaceae	گیلاس تایپستان ۸۳	میوه	۳-۹	۱-۲-۳-۴-۱
33	<i>Cerasus vulgaris</i> Miller.	تیره گل سرخ Rosaceae	آبالو تایپستان ۸۳	میوه	۴-۹	۴
34	<i>Cerasus vulgaris</i> Miller	تیره گل سرخ Rosaceae	آبالو تایپستان ۸۳	میوه	۳-۹	۱-۳-۸
35	<i>Cichorium intybus</i> L.	تیره کاسنی Compositae	کاسنی تایپستان ۸۳ بازار تهران	برگ	۳-۸	۱-۲-۳-۴-۱-۸
36	<i>Cichorium intybus</i> L.	تیره کاسنی Compositae	کاسنی تایپستان ۸۳ به صورت تازه	رشیده	۳-۸	۰
37	<i>Cichorium intybus</i> L.	تیره کاسنی Compositae	کاسنی تایپستان ۸۳ بازار تهران	دانه	۲-۶-۸	۱-۲-۳-۴-۱-۸
38	<i>Citrullus vulgaris</i> Schard.	تیره کدو Cucurbitaceae	دانه تایپستان و زمستان ۸۳ بازار تهران	دانه	۱	۳
39	<i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle	تیره مرکبات Rutaceae	لیمو ترش تایپستان ۸۳ به صورت تازه	بوست میوه	۱-۷	۱-۲-۱
40	<i>Citrus aurantium</i> L.	تیره مرکبات Rutaceae	نارنج تایپستان ۸۳ بازار تهران	بوست میوه	۹	۲-۷
41	<i>Citrus aurantium</i> L.	تیره مرکبات Rutaceae	بیار نارنج تایپستان ۸۳ بازار تهران	گل	۲-۳	۲-۱
42	<i>Citrus Medica</i> L.	تیره مرکبات Rutaceae	بلانگ تایپستان ۸۳ بازار تهران	بیست میوه	۳	۲-۱



ادامه جدول شماره ۱ - مشخصات گیاهان شامل نام علمی، عمومی و تردد آنها، موارد مصرف، محل، تاریخ جمع‌آوری و اثر نسبت داده شده به آنها با ذکر منابع

ردیف	نام علمی	نام بوسم	تیره	زمان و مکان	قسمت	مصرف سنتی (ماخذ)	مقدار
				تایپستان ۸۳	ضدفشار خون	برگ و ساقه	نلب.
43	<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck		تیره مرکبات	تایپستان ۸۳	جمع‌آوری	برگ و ساقه	۱-۶
44	<i>Coriandrum sativum</i> L.		تیره حصری	تایپستان ۸۳ بازار تهران	تهیه به صورت تازه	۱	۳
45	<i>Crocus sativus</i> L.		تیره زینی	تایپستان ۸۳ بازار تهران	کالده گل	۷	۳-۷
46	<i>Cucumis melo</i> L.		تیره کدو	تایپستان ۸۳ بازار تهران	خریزه	۰	۱-۳-۵
47	<i>Cucumis sativus</i> L.		تیره کدو	تایپستان ۸۳	تایپستان	۱	۱-۳-۰
48	<i>Cucurbita pepo</i> Dc.		تیره کدو	تایپستان ۸۳ بازار تهران	خیار	میوه	۱
49	<i>Cucurbita sativus</i> L.		تیره کدو	تایپستان ۸۳ بازار تهران	خیار	دهنه	۱
50	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.		تیره گل سرخ	تایپستان ۸۳ بازار تهران	کدو	دانه	۱-۳-۰
51	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.		تیره گل سرخ	تایپستان ۸۳ بازار تهران	به دانه	دانه	۳
52	<i>Daucus carota</i> L.		تیره چمنی	تایپستان ۸۳ بازار تهران	پاپری	۵-۸	۹
53	<i>Dracocephalum moldavica</i> L.		تیره چمنی	تایپستان ۸۳ بازار تهران	زردک	میوه	۱
54	<i>Echium amoenum</i> Fisch. et Mey.		تیره نعناع	تایپستان ۸۳ بازار تهران	برگ	۱	۲-۳-۴-۵-۷
55	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.		تیره گازیان	تایپستان ۸۳ بازار تهران	گلبرگ‌های گل	۱	۲
56	<i>Equisetum arvense</i> L.		تیره دم اسب	تایپستان ۸۳ بازار تهران	سنجید	موهه	۲
			هرأی	تایپستان ۸۳ بازار تهران	سرشاخه‌ای	۰	۲



ادامه جدول شماره ۱ - مشخصات گیاهان شامل نام علمی، عمومی و تیره آنها با ذکر منابع

ردیف	نام علمی	نام بومی	زمان و مکان	جمع اورده	مصرف سنتی (ماخذ)	مقول قلب.	مقدار خورن	مورد استفاده	قسمت
57	<i>Faba vulgaris</i> Moench.		باقلا	تیره بروانه‌آساها Papilionaceae	تایپستان ۸۳	دانه (بیوه)	۷	۳	۳-۶
58	<i>Ficus carica</i> L.		انجیر	تیره توت Moraceae	تایپستان ۸۳	میوه	۷	۲	۱-۲-۳-۵-۷
59	<i>Foeniculum vulgare</i> Miller.		بادیان (رازانه)	تیره چعنفری Umbelliferae	تایپستان ۸۳	دانه	۱	۱	۱-۲-۳-۶
60	<i>Foeniculum vulgare</i> Miller.		بادیان (رازانه)	تیره چعنفری Umbelliferae	تایپستان ۸۳	رشیده	۹	۳-۶	۳-۶-۸
61	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.		شاه تره	تیره شاه تره Fumariaceae	تایپستان ۸۳	سرشاخه‌ای هوایی	۱	۱	
62	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.		شرین بیان	تیره بروانه‌آساها Papilionaceae	تایپستان ۸۳	رشیده	۹	۹	
63	<i>Helianthus annus</i> L.		آفتابگردان	تایپستان ۸۳	دانه	۹	۹		
64	<i>Helianthus annus</i> L.		آفتابگردان	تایپستان ۸۳	گل	۶	۶		
65	<i>Helianthus tuberosus</i> L.		نیچه به صورت تازه	پاییز ۸۳	غده	۹	۹		
66	<i>Hibiscus gossypifolius</i> Mill.		چای مکی (چای) ترش	تیره پنیرک Malvaceae	تیره کاسبریگ میوه و کاسبریگ	۲-۹	۲-۹		
67	<i>Humulus lupulus</i> L.	رازی	مجموعه گلها	تایپستان ۸۳		۱-۶			
68	<i>Hypericum perforatum</i> L.	علف چای (گل)	محوطه داشنگاه تهران	تایپستان ۸۳	سرشاخه‌ای گلدار	۱-۲-۳-۵			
69	<i>Hyssopus officinalis</i> L.	گیاه	گیاه	تایپستان ۸۳	گیاه	۱	۱		
70	<i>Juglans regia</i> L.	گردو	پرسنسته نارک اطراف	تایپستان ۸۳	سرشاخه‌ای گلدار	۰			
		منزه میوه گردو	نیچه به صورت تازه						



ادامه جدول شماره ۱ - مشخصات گیاهان شامل نام علمی، عمومی و تیره آنها، موارد مصرف، محل، تاریخ جمع‌آوری و اثر نسبت داده شده به آنها با ذکر منابع

ردیف	نام علمی	تیره	زمان و مکان جمع‌آوری	نام یومی	قسمت	مصرف سنتی (ماخذ)	مقدار قلب	مقدار استفاده
71	<i>Juglans regia</i> L.	تیره گردو	پرسنۀ مستخت داشلی	تایپستان ۸۳ بازار تهران	گردو	بوسته گردو	۰	۰
72	<i>Lactuca sativa</i> L.	تیره کاسنی	کاهر	تایپستان ۸۳ و پهار ۸۴ بازار تهران	گردو	دانه	۱	۳-۰-۶-۷
73	<i>Lallementia royleana</i> (Wall.)Bth	تیره نعناع	بالشگر	تایپستان ۸۳ بازار تهران	گردو	دانه	۲	۲-۱
74	<i>Laurus nobilis</i> L.	تیره برق برو	برگ	تایپستان ۸۳ بازار تهران	گردو	برگ	۱	۱
75	<i>Lavandula officinalis</i> Chaix.	تیره حنا	اسطخرودوس	تایپستان ۸۳	تمام گلدار	برگ	۰-۱	۳
76	<i>Lawsonia inermis</i> L.	لیثرازی	محرومۀ دانشگاه تهران	تایپستان ۸۳ بازار تهران	گردو	برگ	۳-۱-۷	۳
77	<i>Lepidium sativum</i> L.	تیره شب بو	برگ و ساقه	تایپستان ۸۳	تمام گلدار	برگ	۱-۱	۱-۲-۳-۶-۷
78	<i>Lippia citriodora</i> H. B. et K.	تیره شاه پسته	تهیه به صورت تازه	تایپستان ۸۳ بازار تهران	گردو	برگ	۲	۱-۱
79	<i>Lippia citriodora</i> H. B. et K.	تیره شاه پسته	به لیمو	تایپستان ۸۴	سرشارندهای هوایی	برگ	۱-۱	۱-۱
80	<i>Malus orientalis</i> Ugl.	تیره گل سرخ	به لیمو	تایپستان ۸۴	سرشارندهای هوایی	برگ	۲	۱-۱
81	<i>Malva syriaca</i> L.	Rosaceae	محوطه داشلگاه تهران	تایپستان ۸۳	تیره بصرت تازه	برگ	۱-۳-۶	۲-۵-۱
82	<i>Malva sylvestris</i> L.	Malvaceae	تیره پترک	تایپستان ۸۳ و پهار ۸۴ بازار تهران	پترک	گل	۱-۲-۳-۵-۱	۱-۲-۳-۵-۱
83	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Compositae	تیره کاسنی	تایپستان ۸۳ بازار تهران	برگ، کاسبرگ، ساقه	گل	۲-۱-۷	۱-۲-۵-۶-۷
84	<i>Medicago sativa</i> L.	Papilionaceae	تیره برویانه‌سایها	تایپستان ۸۳ بازار تهران	پونجه	دانه	۹	۹



ادامه جدول شماره ۱ - مشخصات گیاهان شامال نام علمی، عمومی و تیره آنها، موارد مصرف، محل، تاریخ جمع‌آوری و اثر نسبت داده شده به آنها با ذکر نمایع

ردیف	نام علمی	نام بومی	تیره	زمان و مکان جمع‌آوری	نام سمت	مورد استفاده	مقدار	مقوی قلب
85	<i>Mentha longijolia</i> (L.) Huds.		تیره نعناع	تایستان ۸۳ بازار تهران	تایستان ۸۳ بازار تهران	سرشاخه‌های هوایی	۱-۵	۱
86	<i>Mentha piperita</i> L.		تیره نعناع	تایستان ۸۳ و بهار ۸۴	تایستان ۸۳ و بهار ۸۴	برگ	۱	۳-۶
87	<i>Morus alba</i> L.		نعناع	تایستان ۸۳ محوله نهیه به صورت تازه	تایستان ۸۳ محوله نهیه به صورت تازه	برگ	۱	۳-۵-۷
88	<i>Morus nigra</i> L.		تیره نبوت	دانشکده داروسازی آزاد تایستان ۸۳ تهیه به	دانشکده داروسازی آزاد تایستان ۸۳ تهیه به	برگ	۲	۰
89	<i>Nigella sativa</i> L.		شاتوت	صورت تازه	صورت تازه	برگ	۱	۱-۳
90	<i>Ocimum Basilicum</i> L.		Ranunculaceae	سیاه دانه، سباه تخدمه	تایستان ۸۳ بازار تهران	دانه	۳-۴-۵	
91	<i>Olea europaea</i> L.		لابیات	تیره نعناع (نیم شرستی)	تایستان ۸۳ بازار تهران	دانه	۳-۶-۷	
92	<i>Origanum vulgare</i> L.		لابیات	ریحان	تایستان ۸۳ بازار تهران	برگ	۱	۱-۲-۶
93	<i>Papaver somniferum</i> L.		Oleaceae	تیره زترن تیره خشنده‌اش	تایستان ۸۳ بازار تهران	برگ	۱-۲-۳	۱
94	<i>Peganum harmala</i> L.		Papaveraceae	مرزن‌جوش	تایستان ۸۳ بازار تهران	درانه	۱-۲-۳	۱
95	<i>Pelargonium roseum</i> R. Br.		Zygophyllaceae	سرشاخه‌های هوایی شمعدانی	تایستان ۸۳ بازار تهران	درانه	۳-۹	۳-۹
96	<i>Persica vulgaris</i> Mill.		Rosaceae	تیره سرخ	تایستان ۸۳ تهیه به	برگ	۱	۱
97	<i>Petroselinum</i> Hoffm.	<i>horrense</i>	Umbelliferae	دروخت هلر صورت تازه	تایستان ۸۳ و بهار ۸۴	برگ و ساقه	۱	۲-۶-۶
98	<i>Petroselinum</i> Hoffm.		Umbelliferae	جعفری	تایستان ۸۳ بازار تهران	جعفری	۱	۲-۶-۶



ادامه جدول شماره ۱ - مشخصات گیاهان شامل نام علمی، عمومی و تیره آنها، موارد مصرف، محل، تاریخ جمع‌آوری و اثر نسبت داده شده به آنها با ذکر منابع

ردیف	نام علمی	تیره	زمان و مکان	جمع‌آوری	مورد استفاده	مصرف مستقیم (ماخذ)	مقوی قلب	مدر	ضدفشارخون	قسمت
99	<i>Pimpinella anisum</i> L.	تیره بعفتری	ایران	انیسون	تابستان ۸۳ بازار تهران	دانه	۱-۲-۵-۷	۱		
100	<i>Pistacia vera</i> L..	تیره پسته	پسته	پسته	پسته تبرویی میوه	دانه	۲			
101	<i>Pisum sativum</i> L.	تیره پسته	تابستان ۸۳ بازار تهران	تابستان ۸۳ بازار تهران	دانه	دانه	۱-۳-۷			
102	<i>Polygonatum orientale</i> Desf.	تیره لاله	تابستان ۸۳ بازار تهران	تابستان ۸۳ بازار تهران	ریشه	۱-۳	۱-۲-۷	۳-۶		
103	<i>Portulaca oleracea</i> L.	تیره خرفه	تابستان ۸۳ و بهار ۸۴	تابستان ۸۳ و بهار ۸۴	تابستان ۸۳ بازار تهران	دانه	۰-۱	۱-۳-۶-۷		
104	<i>Punica Granatum</i> L.	تیره اتار	تابستان ۸۳ بازار تهران	تابستان ۸۳ بازار تهران	گل	۰	۲-۵-۶-۷	۷		
105	<i>Pyrus communis</i> L..	تیره گل سرخ	تابستان ۸۳	تابستان ۸۳	میوه	۱	۱-۱	۱		
106	<i>Pyrus communis</i> L..	گلاری	تابستان ۸۳ و بهار ۸۴	تابستان ۸۳ و بهار ۸۴	برگ	۱	۱-۱	۱		
107	<i>Rheum ribes</i> L..	تیره گل سرخ	تابستان ۸۳ بازار تهران	تابستان ۸۳ بازار تهران	ساقه و گل	۱				
108	<i>Rhus coriaria</i> L..	تیره علف حفت پند	تابستان ۸۳ بازار تهران	تابستان ۸۳ بازار تهران	میوه	۹	۳			
109	<i>Rosa damascena</i> Mill.	تیره گل سرخ	تابستان و زمستان ۸۳ بازار تهران	تابستان و زمستان ۸۳ بازار تهران	گل محمدی	۰	۹	۳-۵-۱		
110	<i>Rosmarinus officinalis</i> L..	رزماری	تابستان ۸۳ تهیه به	تابستان ۸۳ تهیه به	برگ و ساقه	۱-۳-۴	۱			
111	<i>Rubia tinctorum</i> L..	(الکیل کوکمی)	صورت تازه	صورت تازه	رشیده	۱	۴			
112	<i>Rubus hyrcanus</i> Juz.	تیره گل سرخ	تابستان ۸۳	تابستان ۸۳	تمسک	برگ و ساقه	۱-۲-۳-۱-۷			



ادامه جدول شماره ۱ - مشخصات گیاهان شامل نام علمی، عمومی و تیره آنها، موارد مصرف، محل، تاریخ جمع آوری و اثر نسبت داده شده به آنها با ذکر منابع

ردیف	نام علمی	تیره	زمان و مکان جمع آوری	نام بوسی	قسمت	مقدار سستی (ماخذ)	مقدار خروج	مقدار نلب
113	<i>Ruta graveolens</i> L.	تیره مرکبات	Rutaceae	سداب	تایستان ۸۳ بازار تهران	برگ و ساقه	۲-۴	۱-۳-۷
114	<i>Salix babylonica</i> L.	تیره بید	Salicaceae	بلد مجنون	تایستان ۸۳	برگ و ساقه	۳-۶-۷	۳-۶
115	<i>Solanum Melongena</i> L.	تیره سبزپیش	Solanaceae	محوطه داشنگاه تهران	تایستان ۸۳ بازار تهران	برگ و ساقه	۱-۳-۶	۹
116	<i>Solanum nigrum</i> L.	تیره سبزپیش	Solanaceae	بازار تهران	بازار ۸۳ تهییه به صورت تازه	میوه	۱	
117	<i>Solanum tuberosum</i> L.	تیره سبزپیش	Solanaceae	تاج ریزی	تایستان ۸۳ بازار تهران	میوه	۹	
118	<i>Spinacia oleracea</i> L.	تیره اسفناج	Chenopodiaceae (Salsolaceae)	تابستان ۸۳	تابستان ۸۳	غذه	۹	
119	<i>Spinacia oleracea</i> L.	تیره اسفناج	Chenopodiaceae (Salsolaceae)	بهار ۸۳ بازار تهران	داده	برگ و ساقه	۲-۳-۶	
120	<i>Taraxacum officinale</i> Weber	تیره کاسنی	Compositae	بهار و تابستان ۸۳ و بهار دندهان ۸۳	تمام گیاه		۱-۵-۶	۹
121	<i>Teucrium polium</i> L.	تیره نعناع	Labiatae	کلپرده (مریم نخودی)	گل	۹	۹	
122	<i>Tribulus terrestris</i> L.	تیره اسفلد	Zygophyllaceae	تابستان ۸۳ و بهار ۸۳ بازار تهران	میوه		۱-۳	
123	<i>Trifolium pratense</i> L.	تیره زیوانه اسپاسها	Papilionaceae	تابستان ۸۳ و بهار ۸۳ بازار تهران	دانه		۳-۱	
124	<i>Trigonella Foenum-graecum</i> L.	تیره زیوانه اسپاسها	Papilionaceae	تابستان ۸۳ بازار تهران	برگ	۱-۱	۹	
125	<i>Trigonella Foenum-graecum</i> L.	تیره زیوانه اسپاسها	Papilionaceae	تابستان ۸۳ بازار تهران	دانه	۱-۱	۱	
126	<i>Urtica pilulifera</i> L.	تیره گزره	Urticaceae	تابستان ۸۳ بازار تهران	دانه	۲-۶		



ادامه جدول شماره ۱ - مشخصات گیاهان شامل نام علمی، عمومی و تیره آنها، موارد مصرف محل، تاریخ جمع‌آوری و اثر نسبت داده شده به آنها با ذکر منابع

ردیف	نام علمی	تیره	جمع‌آوری	مصرف سنتی (ماخذ)	مقدار	مقدار استفاده	نام و مکان
123	<i>Trifolium pratense</i> L.	تیره پروانه‌آساها Papilionaceae	تابستان ۸۳ و بهار ۸۴ بازار تهران	شتر فرمز	دانه	دانه	۳-۶
124	<i>Trigonella Foenum-graecum</i> L.	تیره بروانه‌آساها Papilionaceae	تابستان ۸۳ بازار تهران	شنبله	برگ	۱-۱	۹
125	<i>Trigonella Foenum-graecum</i> L.	تیره بروانه‌آساها Papilionaceae	تابستان ۸۳ بازار تهران	شنبله	دانه	۱-۱	۱
126	<i>Urtica pilulifera</i> L.	تیره کربه Urticaceae	تابستان ۸۳ بازار تهران	انجره	دانه	۲-۱	
127	<i>Trifolium pratense</i> L.	تیره بروانه‌آساها Papilionaceae	تابستان ۸۳ و بهار ۴۶ بازار تهران	شتر فرمز	دانه	۱-۲-۶	۱-۶
128	<i>Zea mays</i> L.	تیره گندم Gramineae	تابستان ۸۳ بازار تهران	کاکل ذرت	۴	۱-۲-۶	۳-۶
129	<i>Zingiber officinale</i> Rocs.	تیره زنجبل Zingiberaceae	تابستان ۸۳ بازار تهران	زنجبل	رشیه	۱-۷	
130	<i>Ziziphus vulgaris</i> Lam.	تیره عباب Rhamnaceae	تابستان ۸۳ بازار تهران	عباب	مویه	۲-۶	۳
131	<i>Ziziphus vulgaris</i> Lam.	تیره عباب	تابستان ۸۳	برگ و ساقه	۲-۶	۲	
132	<i>Ziziphus vulgaris</i> Lam.	تیره عباب	محوطه داشگاه تهران	عباب			

\*: منابع و کتب مورد استفاده برای انتخاب گیاهان مورجود در جدول عبارتند از:

- ۱- دکتر زرگری، ع.: «گیاهان دارویی» (۱۲۵).
- ۲- دکر امین، غ.: «دادارالترین گیاهان دارویی سنتی ایران» (۱۲۱).
- ۳- مؤمن حسینی، م.: «تحفه حکم» (۱۲۱).
- ۴- ولایی، ر.: «استودلا، ر.: «گیاهان دارویی» (۱۲۸).
- ۵- شیخ الرئيس ابوعلى سینا: «قانون در طب» (۱۲۹).
- ۶- دکر سجادی، ع.: «۵۰۰۰ نسخه گیاهی» (۱۳۰).
- ۷- زکریای رازی، م.: «الحاوی» (۱۳۱).
- ۸- زکریای رازی، م.: «الحاوی» (۱۳۲).
- ۹- درمانگران سنتی



ACE توسط گیاهان دارویی مورد مصرف در طب سنتی خلاصه شده است.

نمونه‌هایی که حدود ۵۰ درصد یا بیشتر اثر مهارکنندگی بر روی ACE داشتند از لحاظ حضور تانن آزمایش شدند و نتایج آزمایش تانن نیز برای این نمونه‌ها در جدول آمده است.

حساسیت آزمون با اندازه‌گیری  $IC_{50}$  مهار کننده رفرازنس (کاپتوپریل) و مقایسه آن با  $IC_{50}$  موجود در منابع به دست می‌آید.  $IC_{50}$  کاپتوپریل برابر با  $20 \text{ nM}$  بود و حدوداً با ارزش  $IC_{50}$  منابع که  $22 \text{ nM}$  است مطابقت دارد در جدول شماره ۲ نتایج آزمون بررسی اثر مهارکنندگی

جدول شماره ۲- نتایج آزمون سنجش مهار فعالیت ACE توسط نمونه‌ها و نتایج آزمون تانن نمونه‌های فعال

ردیف	نام علمی	تیره	درصد مهار آنزیم		حضور تانن
			عصاره اتانولی	عصاره آبی	
1	<i>Achillea millefolium</i> L.	Compositae	-	-	-
2	<i>Achillea santolina</i> L.	Compositae	-	-	-
3	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Polypodiaceae	-	-	-
4	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Simarubaceae	-	-	-
5	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Simarubaceae	-	۱	-
6	<i>Alhagi persarum</i> Boiss. & Buhse.	Papilionaceae	۶۳	-	-
7	<i>Alcea digitata</i> (Boiss.) Alef.	Malvaceae	-	۵۱	-
8	<i>Allium cepa</i> L.	Liliaceae	۵۲	۵۰	-
9	<i>Allium hirtifolium</i> Boiss.	Liliaceae	-	-	-
10	<i>Allium porrum</i> L.	Liliaceae	۵۲	۶۲	-
11	<i>Allium sativum</i> L.	Liliaceae	۷۶	۶۸	-
12	<i>Aloe vera</i> L.	Liliaceae	۱۰	۳	-
13	<i>Aloe vera</i> L.	Liliaceae	۳۹	۳۲	-
14	<i>Anethum graveolens</i> L.	Umbelliferae	-	-	-
15	<i>Apium graveolens</i> L.	Umbelliferae	-	-	-
16	<i>Arctium lappa</i> L.	Compositae	-	-	-
17	<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.	Rosaceae	-	-	-
18	<i>Artemisia dracunculus</i> L.	Compositae	۳۱	۵۰	+
19	<i>Asparagus officinalis</i> L.	Liliaceae	-	۶۸	+
20	<i>Asperugo procumbens</i> L.	Boraginaceae	-	۵۲	+
21	<i>Avena sativa</i> L.	Gramineae	۲	-	-
22	<i>Berberis integerrima</i> Bge.	Berberidaceae	-	۸۱	-
23	<i>Berberis vulgaris</i> L.	Berberidaceae	۶۵	۲۳	-
24	<i>Brassica Napus</i> L.	Cruciferae	-	-	-
25	<i>Brassica oleracea</i> L.	Cruciferae	-	-	-
26	<i>Bunium persicum</i> (Boiss.) B. Fedtsch.	Umbelliferae	-	۵۱	-
27	<i>Calendula officinalis</i> L.	Compositae	۳۳	۷۲	-
28	<i>Camellia sinensis</i> L.	Theaceae	-	-	-
29	<i>Camellia sinensis</i> L.	Theaceae	-	-	-
30	<i>Cannabis sativa</i> L.	Cannabaceae	۲	۱۸	-
31	<i>Capsicum annuum</i> L.	Solanaceae	-	۱	-
32	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench	Rosaceae	۷۷	۷۰	-
33	<i>Cerasus vulgaris</i> Miller.	Rosaceae	-	-	-



## ادامه جدول شماره ۲- نتایج آزمون سنجش مهار فعالیت ACE توسط نمونه‌ها و نتایج آزمون تانن نمونه‌های فعال

ردیف	نام علمی	تیره	درصد مهار آنزیم		حضور تانن
			عصاره اتانولی	عصاره آبی	
34	<i>Cerasus vulgaris</i> Miller	Rosaceae	-	۶۰	-
35	<i>Cichorium intybus</i> L.	Compositae	۷	۱۱	
36	<i>Cichorium intybus</i> L.	Compositae	۵۱	۶۲	+
37	<i>Cichorium intybus</i> L.	Compositae	۱۹	-	
38	<i>Citrullus vulgaris</i> Schard.	Cucurbitaceae	۱۹	-	
39	<i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle	Rutaceae	۶۷	۳۵	-
40	<i>Citrus aurantium</i> L.	Rutaceae	۲	-	
41	<i>Citrus aurantium</i> L.	Rutaceae	۶۰	۵۶	-
42	<i>Citrus Medica</i> L.	Rutaceae	-	-	
43	<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Rutaceae	-	۱۱	
44	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Umbelliferae	-	-	
45	<i>Crocus sativus</i> L.	Iridaceae	۶۴	۵۷	-
46	<i>Cucumis melo</i> L.	Cucurbitaceae	-	-	
47	<i>Cucumis sativus</i> L.	Cucurbitaceae	-	۱۳	
48	<i>Cucumis sativus</i> L.	Cucurbitaceae	۶۲	۱۳	-
49	<i>Cucurbita Pepo</i> L.	Cucurbitaceae	-	-	
50	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Rosaceae	-	-	
51	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Rosaceae	۴۲	۶۴	+
52	<i>Daucus Ccarota</i> L.	Umbelliferae	-	-	
53	<i>Dracocephalum Moldavica</i> L.	Labiatae	۱۶	-	
54	<i>Echium amoenum</i> Fisch. et Mey.	Boraginaceae	-	-	
55	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Elaeagnaceae	۱۰	۴۰	
56	<i>Equisetum arvense</i> L.	Equisetaceae	-	-	
57	<i>Faba vulgaris</i> Moench.	Papilionaceae	۵۰	-	+
58	<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae	۵۳	۷	-
59	<i>Foeniculum vulgare</i> Miller.	Umbelliferae	۵۶	۷	-
60	<i>Foeniculum vulgare</i> Miller.	Umbelliferae	۵۰	۶۱	-
61	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	Fumariaceae	-	-	
62	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Papilionaceae	-	۵۳	-
63	<i>Helianthus annus</i> L.	Compositae	۶۱	-	-
64	<i>Helianthus annus</i> L.	Compositae	-	-	
65	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Compositae	۷۱	-	-
66	<i>Hibiscus gossypifolius</i> Mill.	Malvaceae	-	۷۳	-
67	<i>Humulus Lupulus</i> L.	Cannabaceae	۱۱	۴۰	
68	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hypericaceae	-	۶۶	-
69	<i>Hyssopus officinalis</i> L.	Labiatae	-	-	
70	<i>Juglans regia</i> L.	Juglandaceae	-	۴۲	
71	<i>Juglans regia</i> L.	Juglandaceae	-	-	
72	<i>Lactuca sativa</i> L.	Compositae	۲۸	-	
73	<i>Lallemantia royleana</i> (Wall.) Bth	Labiatae	-	-	



## ادامه جدول شماره ۲- نتایج آزمون سنجش مهار فعالیت ACE توسط نمونه‌ها و نتایج آزمون تانن نمونه‌های فعال

ردیف	نام علمی	تیره	درصد مهار آنریم		حضور تانن
			عصاره اتانولی	عصاره آبی	
74	<i>Laurus nobilis</i> L.	Lauraceae	-	۵۱	+
75	<i>Lavandula officinalis</i> Chaix.	Labiatae	-	-	
76	<i>Lawsonia inermis</i> L.	Lythraceae	۰۰	۷۸	+
77	<i>Lepidium sativum</i> L.	Curciferae	۲۱	-	
78	<i>Lippia citriodora</i> H. B. et K.	Verbenaceae	-	-	
79	<i>Lippia citriodora</i> H. B. et K.	Verbenaceae	-	-	
80	<i>Malus orientalis</i> Ugl.	Rosaceae	-	۶۳	+
81	<i>Malva sylvestris</i> L.	Malvaceae	-	-	
82	<i>Malva sylvestris</i> L.	Malvaceae	-	۷۲	-
83	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Compositae	۰	۱	
84	<i>Medicago sativa</i> L.	Papilionaceae	-	۶۹	-
85	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	Labiatae	-	-	
86	<i>Mentha piperita</i> L.	Labiatae	-	-	
87	<i>Morus alba</i> L.	Moraceae	۲۶	۵۳	-
88	<i>Morus nigra</i> L.	Moraceae	۷	۵۰	-
89	<i>Nigella sativa</i> L.	Ranunculaceae	-	-	
90	<i>Ocimum Basilicum</i> L.	Labiatae	-	-	
91	<i>Olea europaea</i> L.	Oleaceae	-	-	
92	<i>Origanum vulgare</i> L.	Labiatae	-	-	
93	<i>Papaver somniferum</i> L.	Papaveraceae	۲۸	۷	
94	<i>Peganum harmala</i> L.	Zygophyllaceae	۷۲	۸۴	-
95	<i>Pelargonium roseum</i> R. Br.	Geraniaceae	-	-	
96	<i>Persica vulgaris</i> Miller.	Rosaceae	-	-	
97	<i>Petroselinum hortense</i> Hoffm.	Umbelliferae	۶۸	-	-
98	<i>Petroselinum hortense</i> Hoffm.	Umbelliferae	۱۸	-	
99	<i>Piminella anisum</i> L.	Umbelliferae	-	-	
100	<i>Pistacia vera</i> L.	Anacardiaceae	-	-	
101	<i>Pisum sativum</i> L.	Papilionaceae	-	-	
102	<i>Polygonatum orientale</i> Desf.	Liliaceae	-	-	
103	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Portulacaceae	۰	۳۲	
104	<i>Punica Granatum</i> L.	Punicaceae	۰۰	-	-
105	<i>Pyrus communis</i> L.	Rosaceae	-	-	
106	<i>Pyrus communis</i> L.	Rosaceae	-	-	
107	<i>Rheum ribes</i> L.	Polygonaceae	-	۴۰	
108	<i>Rhus Coriaria</i> L.	Anacardiaceae	-	-	
109	<i>Rosa damascena</i> Mill.	Rosaceae	-	-	
110	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Labiatae	-	-	
111	<i>Rubia tinctorum</i> L.	Rubiaceae	۳۲	۶۹	-



## ادامه جدول شماره ۲- نتایج آزمون سنجش مهار فعالیت ACE توسط نمونه‌ها و نتایج آزمون تانن نمونه‌های فعال

ردیف	نام علمی	تیره	درصد مهار آنزیم		حضور تانن
			عصاره اتانولی	عصاره آبی	
112	<i>Rubus hyrcanus</i> Juz.	Rosaceae	-	۶۰	-
113	<i>Ruta graveolens</i> L.	Rutaceae	-	-	
114	<i>Salix babylonica</i> L.	Salicaceae	-	-	
115	<i>Solanum Melongena</i> L.	Solanaceae	-	-	
116	<i>Solanum nigrum</i> L.	Solanaceae	۱۹	۵	
117	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Solanaceae	۴	-	
118	<i>Spinacia oleracea</i> L.	Chenopodiaceae	-	-	
119	<i>Spinacia oleracea</i> L.	Chenopodiaceae	۵۰	۶۴	-
120	<i>Taraxacum officinale</i> Weber	Compositae	-	۲۸	
121	<i>Teucrium polium</i> L.	Labiatae	-	۵۲	-
122	<i>Tribulus terrestris</i> L.	Zygophyllaceae	۵۶	۳۷	-
123	<i>Trifolium pratense</i> L.	Papilionacea	-	-	
124	<i>Trigonella Foenum-graecum</i> L.	Papilionacea	۵۵	۲۳	-
125	<i>Trigonella Foenum graecum</i> L.	Papilionaceae	-	-	
126	<i>Urtica pilulifera</i> L.	Urticaceae	-	۶۶	+
127	<i>Vaccinium Arctostaphylos</i> L.	Ericaceae	-	۵۱	-
128	<i>Valeriana officinalis</i> L.	Valerianaceae	-	۵۵	+
129	<i>Viola odorata</i> L.	Violaceae	۳	-	
130	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vitaceae	-	۳۵	
131	<i>Zataria multiflora</i> Boiss.	Labiatae	-	-	-
132	<i>Zea mays</i> L.	Gramineae	۶۰	۷۵	
133	<i>Zingiber officinale</i> Rocs.	Zingiberaceae	۳۱	۱۰	
134	<i>Ziziphus vulgaris</i> Lam.	Rhamnaceae	-	۶۸	+
135	<i>Ziziphus vulgaris</i> Lam.	Rhamnaceae	۵۰	۶۲	-

(۲۷ نمونه)

جدول شماره ۳ خلاصه‌ای از جداول شماره ۱ و ۲ است.

در این جدول نتایج به ۷ دسته از لحاظ خاصیت نسبت داده

شده به آنها تقسیم شدند.

گروه A: گیاهان با خاصیت کاهنده فشار خون، مدری و

مقوی قلب (۳۱ نمونه)

گروه F: گیاهان با خاصیت کاهنده فشار خون و مقوی

قلب (۶ نمونه)

گروه G: گیاهان با خاصیت مدری و مقوی قلب (۲۹

نمونه)

سه ستون آخر در جدول به ترتیب درصد مهارکنندگان

گروه B: گیاهان با خاصیت کاهنده فشار خون (۶ نمونه)

تمامی نمونه‌های کاهنده فشار خون، مدری و مقوی قلبی را به

گروه C: گیاهان با خاصیت مدری (۳۲ نمونه)

طور جداگانه بررسی کرده است.

گروه D: گیاهان با خاصیت مقوی قلب (۴ نمونه)

گروه E: گیاهان با خاصیت کاهنده فشار خون و مدری



جدول شماره ۳- خلاصه جداول شماره ۱ و ۲ درصد مهار کنندگان گونه‌های گیاهی بر طبق اثرات نسبت داده شده به آنها

گروه A کاهنده فشار		گروه B کاهنده فشار خون، مدری و مقوی قلب		گروه C مدر		گروه D مقوی قلب		گروه E کاهنده فشار		گروه F کاهنده فشار		گروه G مدری و مقوی خون و مدری قلب		گروه A ∪ B ∪ C ∪ D ∪ F ∪ G تمام مقوی قلبها تمام مدرها تمام فشار خونی‌ها	
تعداد کل (۱۳۵)	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
۳۱	۲۳	۶	۴	۳۲	۳	۲۴	۲۷	۳	۲۰	۲۹	۴	۲۶	۲۱	۵۲	۸۸
۵۰	۳۶	۷	۵	۷۳	۲	۹	۹	۹	۱۷	۱۷	۱	۱۷	۱۹	۲۷	۵۲
آبی	۷	۲۲	۲	۷۳	۳	۹	۰	۰	۰	۳۳	۱	۱۷	۰	۲۰	۱۳
در عصاره اتانولی	۱۰	۳۲	۲	۷۳	۹	۲۸	۰	۰	۱۰	۳۷	۲	۲۹	۰	۱۷	۲۴
گونه‌ای با مهار بیش از ۵۰ درصد	۱۰	۳۲	۲	۷۳	۹	۲۸	۰	۰	۱۰	۳۷	۲	۲۹	۰	۱۷	۲۴



## بحث و نتیجه گیری

سبب مهار بالای ACE شدند (۲۰ درصد) و ۳۴ نمونه از عصاره‌های اتانولی این گروه مهار کننده قوی ACE بوده‌اند (۲۹ درصد) و در بین ۷۰ نمونه‌ای که در گروه مقوی قلب قرار گرفته‌اند، ۱۳ نمونه از عصاره‌های آبی و ۱۷ نمونه از عصاره‌های الکلی که به ترتیب ۲۱ درصد و ۲۴ درصد را تشکیل می‌دادند، فعالیت آنزیم را با بیش از ۵۰ درصد مهار می‌کردند.

با توجه به آنچه گفته شد می‌توان به این نتیجه رسید که لزوماً خاصیت نسبت داده شده به یک گیاه در طب سنتی بیانگر اثر مطلق آن گیاه نیست، چنانکه با توجه به درصدهای ارایه شده، درمی‌یابیم که گیاهان موجود در سه گروه ضدفسار خون، مدر و مقوی قلب تقریباً به تعداد یکسان فعالیت ACE را مهار کرده‌اند. بررسی‌های آماری انجام شده بر روی تعداد مهارکنندگان موجود در این سه گروه نیز تصدیق کننده همین مطلب بوده، زیرا که بر طبق آزمون ANOVA اختلاف معنی‌داری بین این سه گروه از لحاظ تعداد مهارکنندگان وجود نداشت، همچنین t-test های انجام شده بین هر دو گروه به طور جداگانه نیز بیانگر معنی‌دار نبودن اختلاف میان آنها بود. مشابه همین نتایج در دیگر غربالگری‌های گیاهان دارویی هم مشاهده شده است [۱۵, ۱۶, ۱۷].

از میان نمونه گیاهان جمع‌آوری شده بیشترین تعداد در میان خانواده‌های Labiatae, Rosaceae, Compositae, Umbelliferae قرار داشت که در این ۴ خانواده بیشترین تعداد نمونه‌های مهار کننده در تیره Rosaceae و کمترین آنها در تیره Labiatae بود. از طرف دیگر مشخص شد که میان مهارکنندگی عصاره‌های آبی و اتانولی یک نمونه وابستگی وجود ندارد و عصاره‌های آبی و اتانولی یک نمونه می‌توانند با اختلاف زیاد و مستقل از یکدیگر سبب مهار فعالیت ACE شوند.

در میان گیاهان مورد آزمایش دو گیاه *Berberis integerrima* Bge. و *Peganum harmala* L. درصد مهارکنندگی فعالیت ACE را نشان دادند (بیش از ۸۰ درصد). که می‌توانند در مطالعات آتی به عنوان شاخص‌های برتر مهارکننده فعالیت ACE تحت عمل جداسازی و ایزوله کردن اجزا جهت یافتن جزء فعال قرار گیرند.

امروزه یافتن داروهایی با اثر مهار اختصاصی ACE و کاهش عوارض جانبی داروهای کنونی مانند سرفه، فقدان حس چشایی، راش‌های پوستی، نوتروپنی و ... مورد توجه قرار گرفته است. از این رو غربالگری گیاهان مورد مصرف در طب سنتی ایران به عنوان ضدفسار خون، مدر و مقوی قلب جهت بررسی مهارکنندگی فعالیت ACE هدف این تحقیق بوده است.

جدول شماره ۳ خلاصه‌ای از جداول شماره ۱ و ۲ است. از میان ۱۳۵ نمونه گیاهی متعلق به گروه‌های A تا G، ۵۲ نمونه، یعنی حدوداً ۳۹ درصد بر طبق شاخص قراردادی فعال بودند (عصاره‌های خام گیاهی که غلظتی معادل ۰/۲۳ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر در شرایط سنجش داشتند و ۵۰ درصد یا بیشتر ACE را مهار کردنده به عنوان شاخص قراردادی درنظر گرفته شدند). آزمایش‌های انجام شده در هندوستان حاکی از فعال بودند ۳۰/۱ درصد از نمونه‌های غربالگری شده و در بررسی دیگری ۲۱ درصد بوده است [۱۶, ۱۷]، در بزرگیل ۱۵/۸ درصد از نمونه‌ها سبب مهار ACE شدند [۱۹]، حدود ۴۰ درصد گیاهان فلور جزیره Reunion اثر مهار کنندگی بالایی روی ACE داشتند [۱۵]، از میان گونه‌های مورد مصرف در طب سنتی چین، هند و شیلی ۲۲/۶ درصد آنها اثر مهار کنندگی بر روی ACE نشان دادند [۲۰] و نتایج غربالگری گیاهان سنتی Zulu حاکی از فعال بودن ۶۵ درصد از نمونه‌ها بود [۱۸].

با نگاهی کلی به نتایج درمی‌یابیم که حدود ۲۸ درصد از عصاره‌های اتانولی و ۲۰ درصد از عصاره‌های آبی بیش از ۵۰ درصد اثر مهار کنندگی بر روی فعالیت ACE داشتند. طبق جدول شماره ۳ چنانچه در بین عصاره‌های آبی، تمام نمونه‌های پایین آورنده فشار خون را در کنار یکدیگر بررسی کنیم، از میان ۷۰ نمونه‌ای که خاصیت پایین آورنده‌گی فشار خون در طب سنتی به آنها نسبت داده شده، ۱۹ عصاره یعنی حدوداً ۲۷ درصد فعال بودند و این رقم برای عصاره‌های اتانولی، ۲۴ عصاره (۳۴ درصد) بوده است. با بررسی عصاره‌های آبی نمونه‌های آبی مدری بودند در می‌یابیم که ۲۴ عصاره از میان ۱۱۹ نمونه



جهاددانشگاهی و در قالب طرح تحقیقاتی شماره ۱۱-۷۷۷  
انجام شده است.

## تشکر و قدردانی

این پژوهش با حمایت معاونت پژوهش و فناوری

## منابع

1. Riordan JF. Angiotensin-I-Converting Enzyme and its relative. *Genome Biol.* 2003; 4: 225-229.
2. Makiko Kamata, Jianguo Hu, Hiroaki shibahara and Hachiro Nakagawa. Assay of testicular angiotensin-converting enzyme activity in human spermatozoa. *international Journal of andrology* 2001; 24: 225-231.
3. Herbet GBull, Nancy A Thornberry and Eugene H Cordes. Purification of Angiotensin-Converting Enzyme from Rabbit lung and Human Plasma by Affinity chromatography. *The Journal of Biological Chemistry* 1985; Vol 260, No 5: 2693-2972.
4. Michael W Pantoliano, Barton Holmquist and James F Riordan. Affinity chromatographic Purification of Angiotensin Converting Enzyme. *Biochemistry* 1984; 23: 1037-1042.
5. Johnston CI. Angiotensin Converting Enzyme inhibitors the balance sheet. *Med. J. Aust.* 1988; 148: 488-489.
6. Gavras H and Gavras I. Angiotensin Converting Enzyme inhibitors properties and side effects. *Hypertension suppl. II.* 1988; 11: 37-41.
7. Edwards CRW and Padfield PL. Angiotensin Converting enzyme inhibitors: past, present and bright future. *Lancet i:* 1985; 30-34.
8. Engel SL, Schaeffer TR, Gold BI, Rubin B. Inhibition of pressor effects of angiotensin I and augmentation of depressor effects of bradykinin by synthetic peptides. *Proc. Soc. Exp. Biol. Med.* 1977; 140: 1,240-4.
9. Bianchi A, Evans DB, Cobb M, Peschka MT, Schaeffer TR, Laffan R J. Inhibition by SQ 20881 of vasopressor response to angiotensin I in conscious animals. *Eur. J. pharmacol.* 1973; 23: 1, 90-6.
10. Antonaccio MJ, Cushman DW. Drugs inhibiting the rennin-angiotensin system. *Fed Proc.* 1981; 40 (8): 2275-84.
11. Ondetti MA, Rubin B, Cushman DW. Design of specific inhibitors of angiotensin-converting enzyme: new class of orally active antihypertensive agents. *Science.* 1977; (22) 196: 4288; 441-4.
12. Hayashi K, Nunami K, Sakai K, Ozaki y, Kato J, Kinashi K, Yoneda N. Studies on angiotensin converting enzyme inhibitors, II. Synthesis and angiotensin-converting enzyme inhibitory activates of carboxyethylcarbamyl - 1,2,3,4 - tetrahydroisoquinoline-3-Carboxylic acid derivatives. *Chem. pharm. Bull.* 1983; (31) 10: 3553-61.
13. Yun HS, Chung SH, Han BH. Screening of plant materials for the inhibitory activities against angiotensin converting enzyme. *Korean Journal of pharmacognosy* 1981; 12: 51-54.
14. Inokuchi JI, Okabe H, Yamauchi T, Nagamatsu A. Inhibitors of Angiotensin Converting Enzyme in crude Drug I. *chemical and pharmaceutical Bulletin* 1984; 32: 3615-3619.
15. Adsersen Ann, Adsersen Henning. Plants from Reunion Island with alleged antihypertensive and diuretic effects-an experimental and ethnobotanical evaluation. *Journal of Ethnopharmacology* 1997; 58: 189-206.
16. Nyman U, Joshi P, Madsen LB, Pedersen TB, Pinstrup M, Rajasekharan S, George V. and pushpangadan P. Ethnomedical information and invitro Screening for angiotensin-converting enzyme inhibition of plants utilized as traditional medicines in Gujarat, Rajasthan and Kerala (India). *Journal of Ethnopharmacology* 1998; 60: 247-263.



- 17.** Somanadhan Brinda, Varughese George, palpy pushpangadan Sreedharan Rajasekharan, Gudiksen lene, Wagner Smitt Ulla, Nyman U1F. An ethnopharmacological survey for potential angiotensin converting enzyme inhibitors from Indian medicinal plants. *Journal of Ethnopharmacology* 1999; 65: 103-112.
- Andrew C, Duncan Ann K, Jager and Johnnevan Staden. Screening of zulu medicinal plants for angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors. *Journal of Ethnopharmacology* 1999; 68: 63-70.
- 18.** Braga C, Wagner H, Lombardi JA & Bragade Oliviera A. Screening the Brazilian flora for antihypertensive plant species for in vitro angiotensin-I-converting enzyme inhibiting activity. *Phytomedicine*. 2000; 7 (3): 245-250.
- 19.** Hansen K. Invitro Screening for the Detection of angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors in selected Medicinal plants and Identification of the Active principles. Unpublished PhD. Thesis. Dept of pharmacognosy. The Royal School of pharmacy, Copenhagen, Denmark. 1995; 116.

Archive of SID

