

بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گل و برگ گیاه *Anthemis cotula L.* از استان گیلان

محمد باقر رضایی^{۱*}، کامکار جایمند^۱

۱- اعضاء هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

*آدرس مکاتبه: تهران، صندوق پستی: ۱۱۶ - ۱۳۱۸۵، تلفن و نمابر: ۰۲۱ - ۴۴۱۹۵۹۰۱ - ۵

پست الکترونیک: mrezaee@rifr.ac.ir

تاریخ تصویب: ۲۰/۰۲/۸۶

تاریخ دریافت: ۱۵/۰۹/۸۵

چکیده

مقدمه: جنس بابونه یا *Anthemis* از خانواده Asteraceae می‌باشند، که حدود ۱۳۰ گونه از جنس آن در جهان انتشار دارند، این جنس در ایران ۳۹ گونه گیاه علفی یک ساله و چند ساله دارد. طبق منابع روی این گونه تحقیقی صورت نگرفته است.

هدف: هدف از این مطالعه، بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گل و برگ گیاه *Anthemis cotula L.* از استان گیلان است.

روش بررسی: در این بررسی نمونه در اواسط خرداد ۱۳۸۴ از روبار در استان گیلان جمع‌آوری گردید. ترکیب‌های روغن‌های فرار از گل و برگ به روش تقطیر با آب، اسانس‌گیری و توسط دستگاه‌های کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) شناسایی شد.

نتایج: ترکیب‌های عمدۀ در گل عبارتند از: N-nonadecane (۱۰/۸ درصد)، α -farnesene (۹/۲ درصد) و (E,E)-cedrane (۶ درصد) و ترکیب‌های عمدۀ در برگ عبارتند از: 1-eicosane (۱۱ درصد)، benzyl salicylate (۸/۹ درصد) و aromadendrene (۷/۱ درصد) می‌باشد.

نتیجه‌گیری: بنابراین با توجه به تحقیق صورت گرفته و بررسی تحقیقین تفاوت در نوع و میزان ترکیب‌ها در گونه *Anthemis cotula L.* با سایر گونه‌ها وجود دارد.

گل واژگان: بابونه، اسانس، *Anthemis cotula L.*



مقدمه

تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ترکیب Anthemideae از خانواده گیاهی Asteraceae مشاهده شده است [۴]. در ادامه گزارش‌ها ترکیب‌های اسانس گل و برگ در گونه A. montana تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است [۶]. با بررسی ریشه گونه A. montana وجود ترکیب dehydroneryl isovalerate (Herisset et al. 1987) قرار گرفته است [۸، ۱۱]. همچنین با توجه به اهمیت گونه‌های این خانواده که بومی ایران هستند Bicchi, et al. با بررسی اسانس گونه‌های A. nobilis و A. ruthenica گزارش کرد که ترکیب‌های 2-methylidene 2-methyl-1,3-propane diol و 1,3-propanediol و 1,3-butanediol esterified Roman (Thomas ۲۰۰۳، ۰۴) به همراه ترکیب‌های angelic acid و isobutyric acid در اسانس گونه camomile را مشاهده نموده است [۱۷]. مطالعه دیگری نیز از طرف Nano و همکارانش روی اسانس گونه A. nobilis (که توسط آقای Lawrence نیز مجدداً مورد بررسی قرار گرفته است) انجام شده است که ترکیب‌های موجود در آن به نسبت بعضی از گونه‌های این خانواده متفاوت ذکر کرده است [۱۰]. در تحقیق دیگری ترکیب‌های اسانس گونه A. ruthenica با اسانس گونه Matricaria chamomilla مقایسه شد [۱۴] و تفاوت در میزان بازده و ترکیب‌ها مشاهده گردید. بررسی گونه‌های بومی به خصوص گونه‌های بابونه در شرایط مختلف آب و هوایی ایران و تعیین روش‌های مناسب کشت آن‌ها جهت افزایش میزان ماده موثره و تولید انبوه آن باید از اهداف بعدی محققین این رشته باشد تا از این طریق ماده اولیه مورد نیاز تولید کنندگان را فراهم شود. با توجه به ترکیب‌های موجود در گیاه می‌توان به مضرات آن نیز اشاره نمود، چای تهیه شده از گل‌های بابونه که حاوی مقدار زیادی دانه‌های گرده است، سبب ایجاد حساسیت‌های شدید جلدی، آنافیلاکسی و دیگر حالات آلرژی در افرادی که نسبت به گل‌های پیرتر و غیره حساسند، شده است. در حقیقت افرادی که نسبت به گیاهان خانواده کمپوزیتی حساسیت دارند، باید از

از آنجا که گیاهان دارویی در دنیا جهت تغذیه و درمان بیماری‌ها بسیار موثر و از اهمیت خاصی برخوردار است، توجه به ترکیب‌های موجود در گونه‌های دارویی و معطر به خصوص گونه‌های بومی کشور، مورد توجه محققین و پژوهشگران این رشته قرار گرفته است. هم اکنون کشور ما غنی از این گونه‌های مهم می‌باشد. در این راستا محققین اقدام به بررسی مناطق رویشی آن‌ها نموده و برحسب اولویت‌ها نسبت به شناسایی ترکیب‌های موجود در آن و بومی بودن گونه اقدام نموده‌اند. جنس بابونه یا Anthemis از خانواده Asteraceae می‌باشدند، که حدود ۱۳۰ گونه از جنس آن در جهان انتشار دارند، این جنس در ایران ۳۹ گونه گیاه علفی یک ساله و چند ساله دارد، که تعداد ۱۵ گونه آن انحصاری در ایران و دیگر گونه‌ها، علاوه بر ایران در عراق، افغانستان، پاکستان، آناتولی، آسیای مرکزی، لیبی، قبرس، سینا، سوریه، فلسطین، موارای قفقاز، تالش، ترکمنستان، لبنان و قفقاز نیز می‌رویند [۱]. بعضی از گونه‌های این خانواده عبارتند از Matricaria، Chrysanthemum، Anthemis، Pyrethrum، Matricaria chamomilla شناخته‌تر از دیگر گونه‌ها می‌باشد، ترکیب‌های عمده روغن فرار این گونه عبارتند از: آلفا - بیسابولول و کامازولین که در بعضی ترکیب‌ها گونه‌های این خانواده مشترک دارند. این رو ترکیب‌های شناسایی شده در گونه صورت می‌گیرد، از این رو ترکیب‌های شناسایی شده در آن از اهمیت، خاصی برای صنایع مختلف برخوردار است. طبق منابع موجود، ترکیب‌های شیمیایی موجود، در گونه فنولیک، ترپن‌ها، و سزکوئیتین‌ها هستند، که توسط Klimes و Teeddrogen (Pascual & Bicchi & Frattini ۱۹۹۶) نیز طبق تحقیقاتی که روی اسانس دو گونه از این جنس انجام داده‌اند تفاوت در میزان و نوع ترکیب را تایید نموده‌اند [۳، ۱۲]. اطلاعات شیمیایی در رابطه با کمیت و کیفیت ترکیب‌های اسانس گونه A. carpatica



د - تجزیه با دستگاه کروماتوگراف گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS)

دستگاه کروماتوگراف گازی الگوی Varian 3400 متصل به طیف سنج جرمی II Saturn با سیستم تله یونی^۱ و با انرژی یونیزاسیون ۷۰ الکترونولت. ستون مورد استفاده مانند ستون مورد استفاده در دستگاه GC است. درجه حرارت ۴۰ تا ۲۵۰ درجه سانتی گراد با سرعت افزایش ۴ درجه سانتی گراد در دقیقه، درجه حرارت محفظه تزریق ۲۶۰ درجه سانتی گراد و دمای ترانسفرلاین ۲۷۰ درجه سانتی گراد تنظیم گردیده است. شناسایی طیفها به کمک شاخص‌های بازداری آنها که با تزریق هیدروکربن‌های نرمال (C7-C25) تحت شرایط یکسان با تزریق انسان‌ها و توسط برنامه کامپیوتری نوشته شده به زبان بیسیک محاسبه گردیدند و مقایسه آنها با مقادیری که در منابع مختلف منتشر گردیده [۱۵، ۲۷] و نیز با استفاده از طیف‌های جرمی ترکیب‌های استاندارد، استفاده از اطلاعات موجود در کتابخانه ترپن‌ویدها Wiley در کامپیوتر دستگاه GC/MS تایید گردیدند. محاسبه‌های کمی (تعیین درصد هر ترکیب) به کمک داده پرداز ۲۰۰۰ FuroChrom به روش نرمال کردن سطح^۲ و نادیده گرفتن ضرایب پاسخ^۳ مربوط به طیف‌ها انجام شده است.

نتایج

همان‌طور که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌نمایید ترکیب‌های عمدی در گل عبارتند از: n-nonadecane (۱۰/۸ درصد)، cedrane (۹/۲ درصد) و (E,E)- α -farnesene (۶ درصد) و ترکیب‌های benzyl (۱۱ درصد)، 1-eicosane (۷/۱ درصد) و aromadendrene (۸/۹ درصد) و salicylate می‌باشند. با توجه به شناسایی صورت گرفته روی ترکیب‌های اندام مختلف گونه *Anthemis cotula* L. می‌توان مشاهده نمود که بعضی از ترکیب‌ها فقط در گونه‌های این خانواده مشاهده شده و مابقی خاص این گونه است.

صرف بابونه و دیگر فرآورده‌های گیاهی مربوط به این خانواده خودداری نمایند.

مواد و روش‌ها

الف - جمع‌آوری و شناسایی

در این بررسی گونه *Anthemis cotula* L. از استان گیلان بعد از رودبار و از ارتفاع ۳۰۰ متر، در اواسط خرداد ۱۳۸۴ جمع‌آوری گردیده، این گونه توسط کارشناس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع با کد ۸۹ (MPB) شناسایی شد.

ب - روش استخراج انسانس

پس از جمع‌آوری نمونه گل و برگ جدا و در دمای اطاق و به دور از نور خشک گردید، از نمونه‌ها به روش تقطیر با آب (طرح کلونجر) برای مدت ۳ ساعت، انسانس‌گیری به عمل آمد. میزان بازده انسانس براساس وزن خشک به ترتیب در گل و برگ ۰/۰۴ درصد و ۰/۰۸ درصد، محاسبه شد. انسانس‌ها تا زمان تجزیه در شیشه‌های غیر قابل نفوذ از هوا و نور در یخچال نگهداری شدند.

ج - دستگاه کروماتوگرافی گازی

کروماتوگراف گازی مدل GC-9A Shimadzu مجهر به دتکتور F.I.D. (یونیزاسیون توسط شعله هیدروژن) و داده‌پرداز EuroChrom 2000 از شرکت Knauer آلمان، ستون DB-1 که ستون نیمه قطبی است به طول ۶۰ متر، قطر داخلی ۰/۲۵ میلی‌متر و ضخامت لایه فاز ساکن برابر ۰/۲۵ میکرون است. برنامه‌ریزی حرارتی آون، از ۵۰ تا ۲۵۰ درجه سانتی گراد با سرعت افزایش دمای ۴ درجه سانتی گراد در دقیقه انجام گردید. گاز حامل هلیوم و فشار آن در ابتدای ستون برابر ۲/۵ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع تنظیم شده است. نسبت شکافت برابر ۱:۱۰۰، برای رقیق کردن نمونه استفاده گردید. دمای قسمت تزریق ۲۲۰ درجه سانتی گراد و دمای آشکارساز ۲۵۰ درجه سانتی گراد محاسبه گردیده است.

¹ Ion trap

² Area normalization method

³ Response factors



جدول شماره ۱- شناسایی ترکیب‌های اسانس گل بابونه بهاری (*Anthemis cotula L.*)

ردیف	نام ترکیب	شاخص بازداری	گل	برگ
۱	بنا - پین	۹۷۸	--	۰/۶
۲	ان - اکاتانال	۹۹۷	--	۱/۲
۳	پارا - سیمن	۱۰۲۷	--	۱/۱
۴	ترانس - سبینین هیدرات	۱۰۹۷	۱/۱	۴/۴
۵	۱۰۳۶- پارا - متاترین	۱۱۰۸	--	۲/۳
۶	پینوکامفنول	۱۱۶۸	۰/۲	۱/۰
۷	ایزو - پینوکامفنول	۱۱۸۰	--	۰/۸
۸	-۲ - دکانون	۱۱۹۳	۰/۱	۱/۳
۹	میرتول	۱۱۹۶	۰/۶	۰/۶
۱۰	ترانس - دی هیدرو کارون	۱۲۰۰	--	۱/۱
۱۱	ترانس - سایین هیدرات استات	۱۲۵۴	۰/۴	۱/۰
۱۲	بورنیل استات	۱۲۸۷	--	۰/۶
۱۳	سیس - دی هیدرو - آلفا - تریپنیل استات	۱۳۱۵	--	۱/۳
۱۴	ترانس کارویل استات	۱۳۴۰	۱/۱	--
۱۵	کارواکرول استات	۱۳۷۱	۳/۰	۱/۵
۱۶	دودکانال	۱۴۰۶	۱/۶	۱/۰
۱۷	بنا - سدرن	۱۴۱۶	--	۱/۱
۱۸	کاما - المن	۱۴۳۴	--	۰/۷
۱۹	آرومادندرن	۱۴۳۸	۷/۱	۰/۵
۲۰	سدرن	۱۴۴۲	--	۹/۲
۲۱	آلfa - آکورادین	۱۴۶۶	۱/۵	۳/۱
۲۲	گاما - مورولن	۱۴۷۹	۱/۱	۱/۴
۲۳	جرماکرین - دی	۱۴۸۵	--	۲/۳
۲۴	(ایی - ایی) - آلفا - فارنسن	۱۵۰۴	۰/۴	۶/۰
۲۵	متیل پتانات	۱۵۱۷	۰/۵	۱/۳
۲۷	بنا - کالاکورن	۱۵۶۶	۰/۷	۰/۹
۲۸	کاریوفیلن الكل	۱۵۷۳	۰/۹	۰/۴
۲۹	سپاتولنول	۱۵۷۷	۰/۳	۰/۷
۳۰	گلوبولول	۱۵۸۳	۰/۹	۰/۳
۳۱	-۲ - فنیل اتیل تیگلات	۱۵۸۷	۱/۱	۲/۲
۳۲	ویریدیفلورول	۱۵۹۳	۰/۵	۱/۵
۳۳	ان - هگزادکان	۱۶۰۱	۰/۵	۰/۳
۳۴	هومولن اپوکسید ۱۱	۱۶۰۷	۰/۹	۰/۶
۳۵	اپی - سدرول	۱۶۲۰	۰/۹	۱/۵
۳۶	گاما - اوسمول	۱۶۳۱	۰/۶	۰/۷



ادامه جدول شماره ۱- شناسایی ترکیب‌های اسانس گل بابونه بهاری (*Anthemis cotula L.*)

ردیف	نام ترکیب	شاخص بازداری	گل	برگ
۳۷	بنا - آکورنول	۱۶۳۹	۱/۱	۰/۴
۳۸	آلفا - کادینول	۱۶۵۴	۱/۲	۱/۹
۳۹	دی هیدرو - اوسمول	۱۶۶۲	۱/۵	۰/۸
۴۰	آر - تورمرون	۱۶۶۹	۱/۴	--
۴۱	آکورنون	۱۶۸۷	۰/۹	۰/۴
۴۲	ان - هپتادکان	۱۷۰۰	۳/۶	۰/۷
۴۳	(ایی، ایی) - فارنسول	۱۷۲۵	۱/۱	۱/۴
۴۴	(زد)- نوسبیفرول	۱۷۲۸	۱/۰	۰/۸
۴۵	(ایی، زد) - فارنسول	۱۷۴۶	--	۱/۴
۴۶	بنزیل بنزوآت	۱۷۶۰	۰/۷	--
۴۷	ان - پنتادکانول	۱۷۷۵	۳/۶	۵/۹
۴۸	آکورون	۱۸۲۲	--	۱/۵
۴۹	سیکلوپنتادکانولید	۱۸۳۷	--	۰/۹
۵۰	آلفا - چینوپودیئول	۱۸۵۳	۰/۶	--
۵۱	بنزیل سالیسیلات	۱۸۶۱	۱/۴	۸/۹
۵۲	ان - هگزادکانول	۱۸۶۸	۲/۰	--
۵۳	ان - نونادکان	۱۹۰۱	۱۰/۸	۵/۵
۵۴	سیکلوهگزادکانولید	۱۹۳۲	۱/۰	۲/۸
۵۵	۱-ایکوسان	۱۹۷۹	۵/۶	۱۱/۰
۵۶	ایزوپروپیل هگزادکانوآت	۲۰۲۸	--	۲/۱
۵۷	ان - هنیکوسان	۲۰۹۹	--	۲/۵
۵۸	متیل اوکتادکانوآت	۲۱۳۲	--	۱/۹
۵۹	۲-فنیل اتیل آترانیلات	۲۱۳۷	--	۴/۰
۶۰	اینسنسول	۲۱۶۲	--	۰/۹
۶۱	اینسنسول استات	۲۱۷۸	۰/۷	۰/۵
۶۲	(زد) - متیل کومونات	۲۲۳۵	--	۱/۴
۶۳	۴ - اپی - آبیت ال	۲۳۴۰	۲/۷	۲/۷
۶۴	دهیدرو آبیت ال	۲۳۶۰	۳/۵	--
۶۵	سیس - فرروگینثول استات	۲۴۰۸	۲/۱	۰/۹

توسط محققین این رشته گزارش شده است [۱۸،۹]. در این تحقیق ترکیب‌های اسانس همان طوری که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌نمایید گل گونه *Anthemis cotula L.* دارای ترکیب‌های عمدۀ n-nonadecane (۱۰/۸ درصد)،

بحث و نتیجه‌گیری

طبق منابع موجود، گونه‌های *Anthemis cotula L.* از جمله گونه *Anthemis cotula L.* دارای ترکیب‌های مهمی از جمله: فلاونوئیدی، اسیدهای پلی فنولیک و ترپن‌ها هستند که



۱۹۹۴ از منطقه Sara در یوگوسلاوی سابق که به روش تقطیر با آب اسانس‌گیری و سپس تجزیه نمونه اسانس توسط دستگاه‌های GC و GC/MS صورت پذیرفته بود [۵]. ترکیب‌های عمدۀ را شامل: α -thujone (۴۰/۲ درصد)، β -thujone (۱۳/۳ درصد)، yomogi alcohol (۱۸/۵ درصد) و terpinen-4-ol (۹/۷ درصد)، که این ترکیب‌ها درصد ۸۴/۹ از کل اسانس را تشکیل می‌دادند [۵]. همچنین روی تجزیه اسانس *Anthemis montana* Bulatovic نمود و ترکیب‌های عمدۀ را α -thujone (۴۶/۹ درصد)، β -trans-chrysanthemyl acetate (۱۶ درصد)، و thujone (۱۱/۳ درصد)، که ۷۴/۲ درصد از کل اسانس را تشکیل می‌دادند، اعلام کرد [۶]. بنابراین با توجه به تحقیق صورت گرفته و بررسی تحقیقات دیگر محققین، تفاوت در نوع و میزان ترکیب‌ها در گونه *Anthemis cotula* L. با سایر گونه‌ها وجود دارد.

۹/۲ درصد) و (E,E)- α -farnesene (۶ درصد) و ترکیب‌های عمدۀ در برگ شامل: 1-eicosane (۱۱ درصد)، aromadendrene (۸/۹ benzyl salicylate درصد) است، که طی مراحل اسانس‌گیری به روش تقطیر با آب و با توجه به تجزیه دستگاهی نمونه‌ها به دست آمده است. رضایی و همکاران، ۲۰۰۶ در طی گزارش خود، *Anthemis altissima* L. var. spathulenol altissima (۱۸/۷ درصد)، caryophyllene oxide (۹/۳ درصد)، ۱-eicosene (۷ درصد) و sabinene (۷/۲ درصد) و در برگ (۱۸/۲ درصد) اعلام داشته‌اند [۱۳]. همچنین در گزارشی که توسط Bulatovic روی اسانس سرشاره‌های گل دار گونه *Anthemis carpatica* در سال

منابع

- 1.Mozaffarian V. A Dictionary of Iranian Plant Names, Farhang Mo'aser publication, 1998. 7816: pp: 560.
- 2.Adams RP. Identification of essential oils by Ion trap Mass Spectroscopy. Academic Press, San Diego, CA.1989.
- 3.Bicchi C and Frattini, C. Considerations and remarks on the Analysis of *Anthemis nobilis* L. essential oil by capillary Gas chromatography and "Hypbenated" Techniques. *J. chromatogr.* 1987; 411: 237-249.
- 4.Bruno M, Diaz JG and Herz W. Germacranoïdes from *Anthemis cupaniana*. *Phytochemistry*, 1991; 10: 3458-3460 (1991).
- 5.Bulatovic VM, Menkovic NR, Vajs VE, Milosavljevic SM and Djokovic DD. Essential oil of *Anthemis carpatica*, *J. Essent. Oil Res.* 1997; 9: 397 - 400.
- 6.Bulatovic VM, Menkovic NR, Vajs VE, Milosavljevic SM and Djokovic DD. Essential oil of *Anthemis montana*, *J. Essent. Oil Res.* 1998; 10: 223-226.
- 7.Davies NW. Gas Chromatographic Retention Index of Monoterpens and Sesquiterpenes on Methyl silicone and Carbowax 20 M phases. *J. Chromatogr.* 1990; 503: 1-24.
- 8.Herisset A. Chaumont JP and Paris R. *Les Flavonoïdes de la camomille Romane (Anthemis nobilis L.)*, variete Simple. *Plant. Med. Phytother.* 1973; 3: 234-240.
- 9.Klimes J. Lamparsky D and Scholz E. vorkommen neuer bifunktioneller Ester im Romisch-Kamillenol (*Anthemis nobilis* L.). *Helv. Chem. Acta*, 1981; 64: 2338.
- 10.Lawrence BM. Essential oils 1981-1987. Allured publishing Corp., Carol stream, IL.1989.
- 11.Nahrstedt A, Wray V, Grotjahn L, Fikenscher LH and Hegnauer R. New acylated cyanogenic diglycosides from fruits of *Anthemis cairica*. *Planta Med.* 1983; 49: 143-148.



- 12.**Pascual TJ, Caballero E, Caballero C, Anaya J and Gonzalez MS. Alipbatic esters of *Chamamelum fuscatum* Essential oil. *Phytochemistry*, 1983; 22: 1757-1759.
- 13.**Rezaee MB, Jaimand K and Assareh MH. Chemical Constituents of the leaf and flower Oils from *Anthemis altissima* L. var. altissima from Iran, *Journal of essential oil Research*, 2006; Vol. 18, No. 2, pp: 152-153.
- 14.**Savin K, Ivanic R and Miric M. *Anthemis ruthenica* M.B., Composition of its volatile oil. *Acta Pharm. Yugoslav.*, 1981; 31: 243-247.
- 15.**Shibamoto T. Retention Indices in Essential oil Analysis. In: Capillary Gas Chromatography in Essential oil analysis. Edits., P.Sandra and C.Bicchi, 1987; 259-274, Dr. Alfred Huethig Verlag, Heidelberg.
- 16.**Teeddrogen MW. Ein Handbuch fur die praxis auf wissenschaftlicher Grundlage. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart. 1989.
- 17.**Thomas AF. The occurrence of some diesters in *Roman camomille* oil. *Helv. Chim. Acta*, 1981; 64: 2397-2400.
- 18.**Wichtl M. Teeddrogen, Ein Handbuch fur die praxis auf wissenschaftlicher Grundlage. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart. 1989.