

بررسی اثر تغییرات فصلی بر روی ترکیبات روغن پوست نارنگی رقم Page

بهزاد بابازاده درجزی^۱، عبدالحسین رostائیان^۲، رحیم تقیزاد فرید^۳، بهروز گلعن^۴

۱- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی تولیدات گیاهی، رودهن

۲- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده شیمی، گروه شیمی آلی، تهران

۳- دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، کرج

۴- وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر

* آدرس مکاتبه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی تولیدات گیاهی،

رودهن، صندوق پستی: ۹۷۴۳ (۰۲۱) ۳۳۰۰ ۵۷۲۷۶۶۵، نمبر: (۰۲۱)

پست الکترونیک: babazade@riau.ac.ir, babazadeh.b@gmail.com

تاریخ تصویب: ۸۹/۴/۱۴

تاریخ دریافت: ۸۸/۷/۱۴

چکیده

مقدمه: به نظر می‌رسد که زمان برداشت بر روی میزان ترکیبات طعم‌دهنده روغن پوست میوه (آلدئیدها، الكل‌ها و استرهای) تأثیر داشته باشد.

هدف: هدف کار حاضر، مطالعه ترکیبات طعم‌دهنده پوست نارنگی و مطالعه تغییرات آنها در طی یک فصل می‌باشد.

روش بررسی: ۱۰ عدد میوه بالغ در اوخر آذرماه و اوخر بهمن ماه سال ۱۳۸۷ برداشت شدند و روغن پوست آنها با فشار مکانیکی و توسط شستشو با هگزان نرمال استخراج شدند و سپس به وسیله دستگاه GC و GC/MS آنالیز شدند.

نتایج: در اوخر آذرماه مقدار آلدئیدها، الكل‌ها و استرهای روغن پوست میوه به ترتیب ۱/۳۴، ۱/۸۷، ۰/۱۷ و در اوخر بهمن ماه مقدار آنها به ترتیب ۰/۴۶، ۱/۰۶، ۰/۰۴ بود

نتیجه گیری: ترکیبات اکسیژن‌دار به خصوص linalool و decanal با برداشت دیرهنگام میوه، کاهش چشم‌گیری را در غلظت نسبی نشان دادند، اگرچه غلظت لیمونن افزایش متقابل نشان داد.

گل واژگان: ترکیبات اکسیژن‌دار، روغن پوست میوه، فشار مکانیکی



مقدمه

طعم بسیاری از میوه‌ها در اثر عدم آگاهی از زمان برداشت به موقع، به حد متوسط یا حتی پایین‌تر تنزل یافته است و این امر باعث نگرانی صنعت تجارت میوه شده است. به نظر می‌رسد که طعم و مزه در وهله اول از طریق ژنتیک و سپس به وسیله تأثیرات محیطی و زمان برداشت کنترل می‌شود [۱]. روغن پوست نارنگی ماده خام مهمی است که کاربرد فراوانی داشته و از نظر تجاری بسیار با ارزش است. این ماده در صنعت داروسازی، دندانپزشکی، چشم‌پزشکی، زنان و زایمان و پوست و زیبایی به کار می‌رود. در حقیقت این ماده رسماً در فهرست کتاب‌های راهنمای دارویی بسیاری از کشورها از جمله ایران آمده است [۲]. روغن پوست نارنگی همچنین در صنایع غذایی، شیرینی‌پزی به عنوان طعم‌دهنده نوشیدنی‌ها، چای‌ها، تافی‌های شکلاتی، آبنبات‌ها، بستنی‌ها و نوشابه‌ها به کار می‌رود [۳]. فواید آروماترایپی آن عبارتند از ایجاد خوشحالی و روحیه شاد در انسان می‌باشد [۲]. لینالول و دکانال جزء ترکیبات طعم‌دهنده روغن پوست نارنگی هستند. نرال، ژرانيال، اكتانال، دودکانال نیز جزء ترکیبات طعم‌دهنده روغن پوست نارنگی به شمار می‌روند [۴]. براساس شاخص‌های بین‌المللی، کیفیت روغن پوست نارنگی را بر اساس میزان ترکیبات اکسیژنه و علی‌الخصوص دکانال و لینالول محاسبه می‌کنند [۴]. الدهیدها والکل‌ها به ویژه دکانال و لینالول باعث جذب حشرات گرده افسان مخصوصاً زنبور عسل شده و بالاخره باعث گرده افسانی گیاهان می‌شوند [۲]. یکی از مواردی که امروزه باید در رابطه با افزایش کیفیت روغن اسانس دار پوست نارنگی در نظر گرفت، شناخت زمان درست برای برداشت میوه‌ها است که حداقل مقدار ترکیبات طعم‌دهنده در آنها وجود داشته باشد. هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر زمان برداشت بر روی میزان ترکیبات طعم‌دهنده (آلدئیدها، الکل‌ها، استرها) روغن پوست میوه می‌باشد.

مواد و روش‌ها

موقعیت جغرافیایی محل اجرای تحقیق

این تحقیق در طی سال ۱۳۸۷ در ایستگاه مرکزی موسسه تحقیقات مرکبات کشور واقع در شهر رامسر انجام شد. خاک محل آزمایش دارای بافت لوئی رسی است که pH عصاره آشیاع آن ۶/۹۴ بوده و EC عصاره آشیاع آن ۱/۱۷ میلی‌موس بر سانتی‌متر می‌باشد. عملیات آزمایشگاهی مربوط به استخراج و اندازه‌گیری روغن اسانس دار در پژوهشکده گیاهان دارویی وابسته به جهاددانشگاهی واقع در کیلومتر ۲۰ جاده تهران- قزوین صورت گرفت.

طرح آماری آزمایش

این تحقیق در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. آزمایش در سال ۱۳۸۷ و در ۳ تکرار انجام شد. در این تحقیق از نارنگی Page به عنوان پیوندک و از یوزو به عنوان پایه استفاده شد.

تهیه نمونه پوست میوه

برای تهیه پوست میوه، در ۲ مرحله، یکی در اوخر آذرماه سال ۱۳۸۷ و دیگری در اوخر بهمن ماه سال ۱۳۸۷، ۱۰ عدد میوه بالغ را به طور تصادفی از جهات مختلف درخت برداشت نمودیم و سپس پوست آنها را برای آزمایش جدا کردیم.

تکنیک استخراج روغن اسانس دار از پوست میوه
در حدود ۱۵۰ گرم پوست میوه را با ترازوی دیجیتال جهت آزمایش وزن کردیم. استخراج روغن در آزمایشگاه و با فشردن پوست میوه‌ها با دست انجام گردید. روغن روی یک شیشه ساعت جمع گردید و سپس به لوله آزمایش انتقال داده شد تا سانتریفوژ شود و سپس به وسیله دستگاه GC/MS و GC مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

روش کروماتوگرافی گازی (GC)

برای آنالیز ترکیبات موجود در اسانس پوست میوه‌ها، از



شناسایی ترکیبات

برای شناسایی ترکیبات از کتابخانه وایلی، NIST نصب شده بر روی سیستم کامپیوتر و همچنین از روش منطبق نمودن پیکهایمان با رفرنس آدامز [۵] و رفرنس‌های دیگر [۶] استفاده کردیم.

نتیجه‌گیری

آنالیز GC/MS ترکیبات روغن اسانس‌دار نارنگی Page به ما اجازه داد که ۵۹ ترکیب را در برداشت اول (واخر آذرماه) و ۳۲ ترکیب را در برداشت دوم (واخر بهمن‌ماه) شناسایی کنیم که این ترکیبات شامل آلدئیدها، الکل‌ها، استرها، کتون‌ها و مونوترپن‌ها و سزکوویی ترپن‌ها و اسیدها بودند که در زیربه آنها اشاره شده است (جدول شماره ۱).

دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل Agilent 6890N مجهز به ستون از نوع HP-5ms به ضخامت ۰/۲۵ میکرومتر و طول ۳۰ متر و قطر داخلی ۰/۲۵ میلی‌متر استفاده شد. دتکتور دستگاه GC از نوع FID بود. دمای ستون روی ۵۰ تا ۱۸۵ درجه سانتی‌گراد برنامه‌ریزی شد. دما به مدت ۳ دقیقه در ۵۰ درجه سانتی‌گراد نگه داشته شد و سپس تا ۱۸۵ درجه سانتی‌گراد با سرعت ۳ درجه سانتی‌گراد افزایش یافت و به مدت ۱ دقیقه در ۱۸۵ درجه سانتی‌گراد نگه داشته شد. از گاز هلیوم با سرعت ۰/۸ میلی‌متر در دقیقه استفاده به عمل آمد.

روش کروماتوگرافی و طیف‌سنجه جرمی (GC/MS)

برای شناسایی ترکیبات موجود در اسانس پوست میوه از دستگاه GC/MS مدل Agilent 6890N استفاده به عمل آمد. ستون از نوع HP-5ms و برنامه دمایی آن مشابه به شرایط به کار رفته در GC بود.

جدول شماره ۱- ترکیبات شناسایی شده در روغن اسانس‌دار میوه‌های برداشت شده در واخر آذرماه و واخر بهمن (برای ۱۵۰ گرم پوست میوه)

Peak No	Component	Mega 5 Ms	برداشت مرحله اول (واخر آذرماه)		برداشت مرحله دوم (واخر بهمن‌ماه)	
			میانگین	SD	میانگین	SD
۱	α - Pinene	935	0.31	0.01	0.52	0.02
۲	camphene	951	0.01	0	0	0
۳	sabinene	975	0.19	0.01	0.26	0.01
۴	β- Pinene	979	0.01	0	0	0
۵	myrcene	991	1.93	0.03	2.12	0.01
۶	octanal	1003	0.12	0	0.06	0.01
۷	α - phellandrene	1006	0.03	0.005	0.00	0
۸	δ - ۳ - carene	1012	0.03	0.01	0.04	0.005
۹	limonene	1036	87.45	0.49	93.48	0.09
۱۰	(Z) β - ocimene	1049	0.77	0.04	0.63	0.05
۱۱	1,8 – cineole	1070	0.01	0.005	0	0
۱۲	terpinolene	1091	0.02	0.01	0.01	0
۱۳	linalool	1100	1.24	0.08	0.92	0.01
۱۴	cis – limonene oxide	1137	0.01	0.005	0	0
۱۵	trans-limonene oxide	1141	0.01	0.005	0	0
۱۶	citronellal	1154	0.07	0.01	0.02	0
۱۷	terpinen-4-ol	1182	0.01	0	0	0
۱۸	α - terpineol	1195	0.1	0.02	0.07	0.05
۱۹	decanal	1205	0.58	0.01	0.28	0.01
۲۰	3-cyclohexene – 1 acetaldehyde	1223	0.11	0.005	0.03	0
۲۱	citronellol	1229	0.04	0.01	0	0
۲۲	neral	1244	0.03	0.01	0	0
۲۳	carvone	1250	0.06	0.01	0	0
۲۴	linalyl acetate	1255	0.01	0.005	0	0



ادامه جدول شماره ۱- ترکیبات شناسایی شده در روغن اسانس دار میوه های برداشت شده در اوخر آذرماه و اوخر بهمن (برای ۱۵۰ گرم پوست میوه)

Peak No	Component	Mega 5 Ms	برداشت مرحله اول (اوخر آذرماه)		برداشت مرحله دوم (اوخر بهمن ماه)	
			میانگین	SD	میانگین	SD
۲۵	geranal	1275	0.04	0.01	0	0
۲۶	3,5,5 – trimethyl cyclohex-2-en-1-one	1278	0.11	0.01	0	0
۲۷	Peril aldehyde	1282	0.04	0.005	0.02	0
۲۸	Peril alcohol	1296	0.05	0.01	0	0
۲۹	P-Menth-1-en-9-ol	1301	0.02	0	0	0
۳۰	Undecanal	1307	0.03	0	0	0
۳۱	(E) 2,4-decadieneal	1322	0.09	0.02	0	0
۳۲	δ- elemene	1344	0.48	0.05	0.14	0.01
۳۳	1-P-menthen-8-yl acetate	1353	0.03	0.01	0.008	0.005
۳۴	β - patchulene	1377	0.01	0.005	0	0
۳۵	α - copaene	1385	0.1	0.02	0.04	0
۳۶	5-dodecen-1-al	1392	0.02	0.01	0	0
۳۷	β - elemene	1399	0.27	0.04	0.09	0
۳۸	dodecanal	1409	0.21	0.02	0.05	0.005
۳۹	limonene-10-yl acetate	1414	0.1	0.01	0.03	0.005
۴۰	P-Menth-1-en-9-yl acetate	1425	0.03	0.005	0	0
۴۱	(Z)- β -caryophyllene	1431	0.03	0.005	0.01	0.005
۴۲	γ - elemene	1440	0.13	0.01	0.03	0
۴۳	α - guaiene	1447	0.012	0.02	0	0
۴۴	(Z)- β - farnesene	1458	0.17	0.06	0.03	0.01
۴۵	α - humulene	1466	0.18	0.01	0.05	0
۴۶	α - amorphene	1486	0.03	0.02	0	0
۴۷	germacrene D	1493	0.82	0.07	0.18	0.01
۴۸	bicyclogermacrene	1499	0.03	0.01	0	0
۴۹	valencene	1504	0	0	0.008	0.001
۵۰	α - muurolene	1508	0.12	0.02	0.008	0.005
۵۱	δ - guaiene	1516	0.08	0.01	0.02	0.005
۵۲	γ - cadinene	1527	0.02	0.01	0	0
۵۳	δ - cadinene	1532	0.2	0.01	0.06	0.005
۵۴	elemol	1559	0.28	0.05	0.06	0
۵۵	(E) – nerolidol	1567	0.09	0.04	0	0
۵۶	germacrene B	1572	0.03	0.01	0.01	0.005
۵۷	germacrene D – 4 – ol	1588	0.03	0.005	0.01	0
۵۸	1,2 – benzendicarboxilic acid	1601	0.12	0.02	0.00	0
۵۹	13-tetradecen-2-yn-1-ol	1634	0.009	0	0	0
۶۰	tetrahydroxy cyclopentadienone	1641	0.005	0	0	0

(برداشت دیرهنگام)، مقدار آنها به شدت کاهش یافته بود (جدول شماره ۲). دکانال در بین ترکیبات آلدهیدی بیشترین میزان را در روغن پوست میوه داشت (شکل شماره ۱). نتایج نشان داد که دکانال با لینالول در سطح ۱ درصد (از لحاظ آماری) ارتباط مستقیم و با الفا پینن، میرسن، لیمونن در سطح ۱ درصد ارتباط معکوس داشت (جدول شماره ۳).

آلدئیدها

در میوه های برداشت شده در مرحله اول، ۱۱ آلدئید و در میوه های برداشت شده در مرحله دوم، ۶ آلدئید شناسایی شدند. این ترکیبات شامل decanal, citronellal, octanal, perill, geranal, neral, 3-cyclohexen-1-acetaldehyde, (E)2,4-, 5-dodecen-1-al, dodecanal, aldehyde undecanal, decadieneal بودند که در برداشت مرحله دوم



الكل‌ها

كه در برداشت مرحله دوم (برداشت ديرهنگام) مقدار آنها به شدت کاهش یافته بود. لینالول در بین ترکیبات الکلی بیشترین میزان را داشت (جدول شماره ۲ و شکل شماره ۱). نتایج نشان داد که لینالول با با آلفا پین، میرسن، لیمونن در سطح ۱ درصد (از لحظ آماری) ارتباط معکوس داشت (جدول شماره .۳)

در میوه‌های برداشت شده در مرحله اول، ۱۲ الكل و در میوه‌های برداشت شده در مرحله دوم، ۴ الكل شناسایی شدند. این ترکیبات شامل terpinen-4-ol، linalool، 1,8-cineol، cis-carveol، perill alcohol، citronelol، α-terpineol، (E) nerolidol، elemol، P-menth-1-en-9-ol 13-tetradecen-2-yn-1-ol، Germacrene D-4-ol بودند


جدول شماره ۲ - اثر زمان برداشت بر روی ترکیبات طعم‌دهنده روغن پوست میوه نارنگی

Compounds	برداشت مرحله اول (اواخر بهمن‌ماه)		برداشت مرحله دوم (اواخر آذرماه)	
	Mean	St. err.	mean	St. err.
Oxygenated compounds				
a) Aldehyds				
1) octanal	0.12	0.00	0.06	0.01
2) citronellal	0.07	0.01	0.02	0
3) decanal	0.58	0.01	0.28	0.01
4) 3-cyclohexen-1-acetaldehyde	0.11	0.005	0.03	0
5) neral	0.03	0.01	0	0
6) geranial	0.04	0.01	0	0
7) perill aldehyde	0.04	0.005	0.02	0
8) undecanal	0.03	0.00	0	0
9) (E) 2,4-decadieneal	0.09	0.02	0	0
10) 5-dodecen-1-al	0.02	0.01	0	0
11) dodecanal	0.21	0.02	0.05	0.005
Total	1.34	0.10	0.46	0.02
b) Alcohols				
1) 1,8 -cineol	0.01	0.005	0	0
2) linalool	1.24	0.08	0.92	0.01
3) Terpinene-4-ol	0.01	0.00	0	0
4) α- terpineol	0.10	0.02	0.07	0.005
5) citronellol	0.04	0.01	0	0
6) cis-carveol	0.009	0.0005	0	0
7) perill alcohol	0.05	0.01	0	0
8) p-menth-1-en-9-ol	0.02	0.00	0	0
9) elemol	0.28	0.05	0.06	0
10) (E) nerolidol	0.09	0.04	0	0
11) Germacrene D-4 -ol	0.03	0.005	0.01	0
12-tetradecen-2-yn-1-ol	0.009	0.00	0	0
total	1.87	0.22	1.06	0.01
c) Esters				
1) linalyl acetate	0.01	0.005	0	0
2) 1-p-menthen-8-yl acetate	0.03	0.01	0.008	0.0005
3) Limonene-10-yl acetate	0.10	0.01	0.03	0.005
4) p-menth-1-en-9-yl acetate	0.03	0.005	0.009	0.0005
total	0.17	0.03	0.04	0.006
d) ketone				
1) carvone	0.06	0.01	0	0
2) 3,5-trimethyl cyclohex-2-en-1-one	0.11	0.01	0	0
3) Tetrahydroxy cyclopentadienone	0.005	0.00	0	0
total	0.17	0.02	0	0
Total oxygenated compounds	3.55	0.37	0	0
Monoterpenes				
1) α-pinene	0.31	0.01	0.52	0.02
2) camphene	0.01	0.00	0	0



ادامه جدول شماره ۲- اثر زمان برداشت بر روی ترکیبات طعم‌دهنده روغن پوست میوه نارنگی

Compounds	برداشت مرحله اول (اواخر آذرماه)		برداشت مرحله دوم (اواخر بهمنماه)	
	Mean	St. err	mean	St. err.
3) sabinene	0.19	0.01	0.26	0.01
4) β -pinene	0.01	0.00	0	0
5) myrcene	1.93	0.03	2.12	0.01
6) α -phellandrene	0.03	0.005	0	0
7) δ -3-carene	0.03	0.01	0.04	0.005
8) limonene	87.45	0.49	93.48	0.09
9) (Z)- β -ocimene	0.77	0.04	0.63	0.05
10) terpinolene	0.02	0.01	0.01	0
11)cis-limonene oxide	0.01	0.005	0	0
12)trans limonene oxide	0.01	0.005	0	0
total	90.78	0.61	97.06	0.18
sesquiterpenes				
1) δ - elemene	0.48	0.05	0.14	0.01
2) β -patchulene	0.01	0.005	0	0
3) α -copaene	0.10	0.02	0.04	0
4) β -elemene	0.27	0.04	0.09	0
5) (Z)- β -caryophyllene	0.03	0.005	0.01	0.005
6) γ -elemene	0.13	0.01	0.03	0
7) α -guaiene	0.12	0.02	0	0
8) (Z)- β - farnesene	0.17	0.06	0.03	0.01
9) α -humulene	0.18	0.01	0.05	0
10) α -amorphen	0.03	0.02	0	0
11) Germacrene D	0.82	0.07	0.18	0.01
12)bicyclogermacrene	0.03	0.01	0	0
13) valencene	0.005	0.00	0.008	0.001
14) α -muurolene	0.12	0.02	0.02	0.005
15) δ -guaiene	0.08	0.01	0.01	0.005
16) γ -cadinene	0.02	0.01	0	0
17) δ -cadinene	0.20	0.01	0.06	0.005
18) germacrene B	0.03	0.01	0.01	0.004
total	2.81	0.38	0.67	0.05
Total terpens	93.59	0.99	97.73	0.23
Acids				
1,2-Benzendicarboxilic acid	0.12	0.02	0	0



شکل شماره ۱- کروماتوگرام GC حاصل از تجزیه روغن اسانس‌دار پوست میوه‌های برداشت شده در آذرماه



جدول شماره ۳- برسی همبستگی ترکیبات در پوست میوه‌های برداشت شده در اوخر آذرماه

	α -pinene	Sabinene	Myrcene	limonene	Z- β -ocimene	linalool	decanal	β -elemene	α -Humulene	Germacrene D	δ -cadinene	δ -cadinene
Sabinene	0.005											
Myrcene	0.872**	0.221										
limonene	0.391	0.168	0.628**									
Z- β -ocimene	-0.335	0.152	-0.380	-0.662**								
linalool	-0.759**	-0.105	-0.738**	-0.632**	0.283							
decanal	-0.771**	-0.139	-0.797**	-0.766**	0.350	0.883**						
δ -elemene	-0.466*	0.013	-0.509*	-0.820**	0.628**	0.762**	0.751**					
β -elemene	-0.641**	-0.215	-0.711**	-0.772**	0.400	0.824**	0.861**	0.837**				
Dodecanal	-0.434*	0.089	-0.124	0.027	0.098	0.449*	0.236	0.438*	0.369			
α -Humulene	-0.340	0.087	-0.111	-0.001	0.058	0.357	0.176	0.427*	0.340	0.927**		
Germacrene D	-0.438*	-0.065	-0.542**	-0.878**	0.650**	0.744**	0.740**	0.971**	0.845**	0.376		
δ -cadinene	-0.578**	-0.083	-0.765**	-0.886**	0.452*	0.776**	0.875**	0.804**	0.811**	0.032	0.070	0.826**
elemol	-0.318	-0.242	-0.514*	-0.835**	0.493*	0.518**	0.662**	0.813**	0.791**	0.176	0.234	0.837**
												0.741**

a بدن معنی است که بین دو ترکیب، درصد همبستگی وجود دارد (یعنی بین دو ترکیب در سطح ۱ درصد همبستگی وجود دارد)

** بدن معنی است که بین دو ترکیب، ۹ درصد همبستگی وجود دارد (یعنی بین دو ترکیب در سطح ۵ درصد همبستگی وجود دارد)

* بدن معنی است که بین دو ترکیب، همبستگی معکوس وجود دارد

علاوه بر این، بدن معنی است که بین دو ترکیب، همبستگی معکوس وجود دارد.



استرها

سزکوئی ترپن شناسایی شدند. ترکیبات ۸-elemene GermacreneD در بین سزکوئی ترپن‌ها بیشترین میزان را در روغن پوست میوه داشتند (جدول شماره ۲ و شکل شماره ۱) نتایج نشان داد که این دو ترکیب در سطح ۱ درصد (از لحاظ آماری) ارتباط مستقیم با یکدیگر داشتند به طوری که افزایش در یکی باعث افزایش در دیگری می‌شود (جدول شماره ۳) ترکیباتی که در مرحله دوم برداشت (برداشت دیرهنگام) از بین α -guaiene، β -patchulene، شامل γ -cadinene، bicyclogermacrene، α -amorphen رفته بودند، α -amorphen (جدول شماره ۲).

در میوه‌های برداشت شده در مرحله اول، ۴ استر و در میوه‌های برداشت شده در مرحله دوم ۳ استر شناسایی شدند. این ترکیبات شامل α -linalyl acetate، α -limonene-10-yl acetate، α -p-menth-1-en-9-yl acetate، α -acetate بودند که در برداشت مرحله دوم (برداشت دیرهنگام) میزان آنها به شدت کاهش یافته بود (جدول شماره ۲). میزان بیشترین میزان را در بین استرها بیشترین میزان را داشت (جدول شماره ۲ و شکل شماره ۱).

کتون‌ها

در میوه‌های برداشت شده در مرحله اول، ۳ کتون و در میوه‌های برداشت شده در مرحله دوم هیچ‌گونه کتون یافت نشد این ترکیبات شامل ۳,۵,۵-trimethyl cyclohex-2-en-1-one، carvone، tetrahydroxy cyclopentadienone بودند در بین کتون‌ها ۳, 5, 5-trimethyl cyclohex-2-en-1-one بیشترین میزان را داشت (جدول شماره ۲ و شکل شماره ۱).

مونوترپن‌ها

در میوه‌های برداشت شده در مرحله اول، ۱۲ مونوترپن و در میوه‌های برداشت شده در مرحله دوم، ۷ مونوترپن شناسایی شدند. در بین مونوترپن‌ها myrcene، α -limonene بیشترین میزان را داشتند (شکل شماره ۱) و میزان آنها در برداشت مرحله دوم افزایش چشمگیری را به مرحله نمایش گذاشتند (جدول شماره ۲) نتایج نشان داد که لیمونن با میرسن در سطح ۱ درصد (از لحاظ آماری) ارتباط مستقیم دارد (جدول شماره ۳) ترکیباتی که در برداشت مرحله دوم از بین رفته بودند شامل cis-limonene، α -phellandrene، β -pinene، camphene trans-limonene oxide، oxide بودند (جدول شماره ۲).

سزکوئی ترپن‌ها

در میوه‌های برداشت شده در مرحله اول، ۱۸ سزکوئی ترپن و در میوه‌های برداشت شده در مرحله دوم، ۱۳

بحث

کیفیت اسانس در مرکبات دارای مکانیسم بیوسنتزی پیچیده‌ای است که ارتباط تنگاتنگی با زمان برداشت میوه [۷] دارد. در عین حال به جایگاه تولید اسانس، آنتوژنی بافت‌های تولیدکننده اسانس [۸]، ژن‌های سنتزکننده ترکیبات اکسیژن‌دار [۹]، پایه مورد استفاده [۱۰]، آب و هوا [۷]، روش استخراج روغن اسانس‌دار و عوامل دیگر بستگی دارد.

افزایش در مقدار دکانال، هنگامی که میوه‌ها در مرحله اول برداشت شدند، نشان داد که یا سنتز دکانال در این مرحله افزایش یافته است یا اینکه طی یک کارکرد تخصصی، پیش ماده‌های تشکیل دهنده دکانال احیاء شده است.

با توجه به این موضوع که برای سنتز ترپن‌ها، نیاز به مقدار زیادی استات است، ما را بر آن داشت که باور کنیم که کارکرد و وظیفه خاص و مهمی به عهده این مولکول جالب و جذاب است و اینکه این مولکول ذخیره شده در مرحله برداشت اول، بهتر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

نتایج نشان داد که ترکیبات اکسیژن‌دار به خصوص لینالول با برداشت دیرهنگام میوه، کاهش چشمگیری را در غلظت نسبی نشان دادند ولیکن غلظت لیمونن افزایش نشان داد که این نتایج با نتایج آتاوی^۱ و همکاران [۱۱] کاملاً مشابه بود. ما

¹ Attaway

[۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸]. همچنین این تحقیقات نشان داده است که اسید ایندول استیک (IAA) درونزا باعث تحریک مسیر ترپن‌ها (مولوئنیک اسید) و همچنین باعث تحریک ژن‌ها و آنزیم‌های این مسیر می‌شود. به نظر می‌رسد این هورمون‌ها بر روی زمان برداشت میوه و بالاخره سنتز آلدهیدها و الکل‌ها و استرها تاثیر داشته باشد. اثر مثبت جیبرلن درونزا بر روی کیفیت انسانس [۱۹] شاید به دلیل فعال کردن آنزیم‌های درونزا مثل آلفا امیلاز در میوه باشد از طرف دیگر جیبرلن درونزا می‌تواند اثر بازدارندگی ابسایزیک اسید را در سنتز ترپن‌وئیدها برطرف نماید زیرا این هورمون می‌تواند به صورت رقابتی با ابسایزیک اسید وارد عمل شود.


به نظر می‌رسد دمای فصلی می‌تواند باعث افزایش کیفیت انسانس شود [۲۰] شاید این موضوع به این دلیل باشد که برخی آنزیم‌های داخل گیاه در دمای خاصی شروع به فعالیت می‌کنند که آنها نیز باعث سنتز ترپن‌وئیدها می‌شوند. در زمان‌های برداشت مختلف دمای هوا متفاوت می‌باشد که آن قطعاً بر روی کیفیت انسانس بی‌تأثیر نیست. وجود تفاوت در درصد ترکیبات اکسیژن‌دار در دو زمان برداشت متفاوت می‌تواند ناشی از پدیده اپی ژنتیک در بروز بیان ژن خاص در گیاه باشد که عوامل محیطی مثل نور دما رطوبت می‌تواند آن ژن خاص را در گیاه تحریک کنند مثلاً علت افزایش لینالول شاید به دلیل تحریک ژن خاص برای تبدیل پیش‌سازهای لینالول (ژرانیول) به لینالول در اثر شرایط آب و هوایی متفاوت در زمان‌های مختلف باشد یا در اثر تغییر در فعالیت آنزیم‌ها و تبدیل GPP به لینالول در مسیر MEP (در پلاستید) مربوط شود.

باور نداریم که کاهش لینالول ناشی از تبدیل آن به لیمونن باشد چرا که بروز تفاوت در ساختار کربنی این دو ترکیب، چنین قابلیت تبدیلی را غیرمحتمل می‌نماید اما باید گفت که میوه مركبات حاوی آنزیم‌هایی برای تبدیل این ترکیبات به یکدیگر می‌باشد همچنین میوه مركبات حاوی آنزیم‌هایی برای سنتز لینالول و تبدیل آن به آلفاتریپیشول و لیمونن است [۱]. پیشرفت‌های آنزیمی به طور واضح تأیید کردند که هر یک از ترکیبات طعم‌دهنده در صورت وجود آنزیم مربوطه می‌تواند به ترکیبات ترپنی دیگر در گیاه تبدیل شوند [۱۲] (شکل شماره ۲).

نتایج نشان داد که دکانال با لینالول همبستگی مثبت دارد به طوری که وقتی دکانال افزایش می‌یابد لینالول نیز افزایش می‌یابد به نظر می‌رسد ژن‌های تولید کننده دکانال با ژن‌های تولید کننده لینالول همبستگی مثبت دارند به طوری که اگر بتوان از لحاظ ژنتیکی ژن‌های تولید کننده دکانال را در گیاه شناسایی و تحریک کنیم ژن‌های تولید کننده لینالول نیز تحریک می‌شود (جدول شماره ۳).

تحقیقات ما نشان داد که آلدئیدها و استرها در طعم و عطر میوه مركبات نقش دارند و با رسیدن بیش از حد میوه (برداشت دیرهنگام)، میزان آنها کاهش می‌یابد که این نتیجه با نتایج آتاوی و همکاران [۱۱] کاملاً مشابه و با نتایج کسترسون و هندریکسون [۱۳]، کسترسون و همکاران [۱۴] کاملاً متفاوت بود. شاید علت این تفاوت به خاطر نوع رقم، شرایط محیطی و روش استخراج انسانس یا عوامل دیگر باشد.

تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که هورمون‌ها مخصوصاً اکسین و جیبرلن ارتباط مثبت با کیفیت انسانس دارند



شکل شماره ۲- ترپن‌وئیدهای کلیدی و تبدیل آنها به یکدیگر (برگرفته شده از [۱۲])



جمع‌بندی

با نگاهی به مسیر بیوستتر ترکیبات اکسیژن‌دار (آلدئیدها و الكلل‌ها) در گیاهان عالی و با توجه به اینکه گرانیل پیروفسفات (GPP) به عنوان یک واسطه کلیدی بین موالونیک اسید و ترکیبات اکسیژن‌دار، عمل می‌کند و با پذیرفتن این موضوع که

در مسیر بیوستتر ترکیبات اکسیژن‌دار آنزیم‌های خاص (ایزوپتیل پیروفسفات ایزومراز و گرانیل پیروفسفات سیتاز) دخالت دارند این احتمال می‌رود که وقتی میوه‌ها دیرهنگام برداشت می‌شوند، یا میزان گرانیل پیروفسفات کاهش می‌یابد یا اینکه میزان فعالیت آنزیم‌های بیوستتری کاهش می‌یابد.



آلدئیدها
الكللها (لينالول)

در پایان پیشنهاد می‌شود در رابطه با اثر زمان برداشت بر روی درصد ترکیبات روغن پوست میوه تحقیقات بیشتری انجام شود.

تشکر و قدردانی

از زحمات خانم زهره کدخدای از پژوهشکده گیاهان دارویی وابسته به جهاددانشگاهی (ACECR) که اینجانب را در امر تزریق نمونه‌ها به دستگاه GC و GC/MS یاری نمودند بدین‌وسیله قدردانی و تشکر می‌شود.

از آنجایی که میزان ترکیبات اکسیژن‌دار به خصوص آلدئیدها یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کیفیت بالای روغن در پوست مرکبات می‌باشد، زمان برداشت میوه می‌تواند در این رابطه تاثیر بسزایی بر کیفیت روغن بگذارد، پس باید در انتخاب صحیح زمان برداشت دقت بیشتری شود. همچنین باید گفت اگر یک ترکیب خاص در روغن به عنوان طعم‌دهنده خوراکی مطرح باشد تخمین صحیح زمان برداشت یک کار با ارزش بوده و ارزش تامل را دارد.

منابع

1. Kenee Michael. Fruit quality and its biological basis. 2002, Chapter 4, pp: 89 – 106.
2. Babazadeh Darjazi B. The effects of rootstock on the volatile flavour components of Page mandarin juice and peel. Ph.D of science Thesis. Islamic Azad University. Science and Research Branch. 2009.
3. Nagy S, Shaw P, Veldhuis MK. Citrus science and technology. 1977, volum 2, chapter 6, pp: 290 - 304.
4. Buettner A, Mestres M, Fischer A, Guasch J, Schieberle P. Evaluation of the most odour-active compounds in the peel oil of clementine's (*citrus reticulata* blanco cv. Clementine). *Eur. Food Res Technol.* 2003; 216: 11 - 14.
5. Adams RP. Identification of essential oil components by gas chromatography/ mass spectrometry. Allured Publishing Corporation, Carol Stream, IL. 2001.
6. McLafferty FW, Stauffer DB. The Wiley/Nbs registry of mass spectral data. New York: Wily. 1989.
7. Scora RW, Torrisi S. Relation of taxonomic, climatic, and tissue maturity factors to the essential oil constituents in leaves and fruits in the Aurantioideae. *Amer. Soc. Hort. Sci.* 1966; 88: 262 – 271.
8. Scora RW, Bitters WP. Studies on the ontogeny of the rind oils of *Poncirus trifoliata*. *Lloydia*. 1967; 30 (2): 182 - 188.



- 9.** Sekiya J, Kajiwara T, Hatanaka A. Seasonal changes in activities of enzymes responsible for the formation of C6-aldehydes and C6-alcohols in tea leaves and the effects of environmental temperatures on the enzyme activities. *Plant and Cell Physiol.* 1984; 25 (2): 269 - 80.
- 10.** Verzera A, Trozzi A, Gazea F, Cicciarello G, Cotroneo A. Effect of rootstock on the Composition of bergamot (*Citrus bergamia* Risso et Poiteau) essential oil. *J. Agricultur and Food Chem.* 2003; 51: 206 - 10.
- 11.** Attaway JA, Pieringer AP, Barabas LJ. The origin of citrus flavor components. *Phytochem.* 1967; 6: 25 - 32.
- 12.** Sells CS. A Fragrant introduction to terpenoid chemistry. The royal society of chemistry. Thomas Graham house, Science Park, Milton Road, Combridge, UK. 2003, pp: 410.
- 13.** Kesterson JW, Hendrickson R. The composition of Valencia orange oil as related to fruit maturity, *Am. Perf. Cosmetics* 1962; 77 (12): 21 - 4.
- 14.** Kesterson JW, Hendrickson R, Seiler RR, Huffman CE, Brent JA, Griffiths JT. Nootkaton content of expressed Duncan grapefruit oil as related to fruit maturity. *Am Perf Cosmetics*. 1965; 80 (12): 29 - 31.
- 15.** Koseva - Kovacheva D, Staev D. Effect of some growth regulators and hydrogen peroxide on the content and quality of Peppermint oil. *Resteniedni dni U Nauki.* 1978; 15: 21 - 25.
- 16.** Ansari SH, Qadry JS, Jain VK. Effect of plant hormones on the growth and chemical composition of volatile oil of cymbopogon jawarancusa (schutt). *Ind. J. Forestry* 1988; 11: 143 - 5.
- 17.** Pazoki A, Fahimi H, Shaker H. The effect of IAA and NAA on essential oil composition in tarragon (*Artemisia dracunculus* L.). *Pajouhesh & Sazandegi.* 2007; 74: 124 - 8.
- 18.** El-Keltawi NE, Barham IH, El-Naggar AI, Rekaby AF. Investigations on the responses of cumin plants to certain horticultural agro-chemicals. Influences of Gibberellic acid (GA₃) on foliage growth, fruit yield, essential oil and chemical compositions. *Egyptian Journal of Horticulture* 2000; 27 (4): 439 - 58.
- 19.** Coggins CW, Scora RW, Lewis LN, Knapp JCF. Gibberellin delayed senescence and essential oil changes in the navel orange rind. *Journal of Agricultural and Food Chem.* 1969; 17: 807 -9.
- 20.** Herath HMW, Iruthayathas EE, Ormrod DP. Temperature effects on essential oil composition of citronella selections. *Economic Botany* 1979; 33 (4): 425 - 30.

