

پاسخ‌های فیتوشیمیایی و مرفوفیزیولوژیکی گیاه استویا (*Stevia rebaudiana Bertoni*) به
بسترها مختلف کشت و تلقیح قارچ مایکوریزا (*Glomus intraradices N.C. Schenck &*)
(G.S. Sm.

علی مهرآفرین^۱، علیرضا اطمینان^{۲*}، اردشیر قادری^۱، محمد رضا دهقانی مشکانی^۱، مرضیه گلرخان^۳

- ۱- مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
۲- استادیار، گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
۳- دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
*آدرس مکاتبه: کرمانشاه، میدان فردوسی، انتهای شهرک متخصصین، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی امام خمینی (ره)
کد پستی: ۶۷۱۸۹۹۷۵۵۱
تلفن و نمابر: ۰۸۳ (۱۷۲۴۳۱۸۱-۶)
پست الکترونیک: Aletminan55@yahoo.com

تاریخ تصویب: ۹۷/۵/۲۷

تاریخ دریافت: ۹۶/۲/۲۶

چکیده

مقدمه: ترکیب بستر کشت و ریزسازوارهای موجود در آن تأثیر بسیار مهمی در استقرار، عملکرد رشدی و فیتوشیمیایی گیاهان دارویی دارد.

هدف: تعیین تأثیر بسترها مختلف کشت و تلقیح قارچ مایکوریزا بر تغییرات محتواهای استویویزید، ریبادیویزیدها و خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی در گیاه دارویی استویا بود.

روش بررسی: این تحقیق به صورت آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح بلوك‌های کامل تصادفی با ۱۰ تیمار و ۴ تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل تیمارهای تلقیح و عدم تلقیح قارچ مایکوریزا (*Glomus intraradices*) و فاکتور دوم شامل ترکیب تیمارهای مختلف از پیت ماس، کوکوپیت، پرلیت و خاک به عنوان بسترها کاشت بود.

نتایج: تلقیح قارچ مایکوریزا به طور معنی‌داری موجب افزایش ارتفاع بوته، تعداد ساقه فرعی، قطر ساقه، قطر ریشه، تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک ریشه و میزان استویویزید، ریبادیویزید A و C شد. بسترها مختلف کشت نیز تأثیر معنی‌داری بر ارتفاع بوته، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر برگ، وزن تر و خشک ریشه و میزان استویویزید، ریبادیویزید A و C داشت.

نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد ترکیب بستر کشت پیت ماس + کوکوپیت + خاک (۱:۱:۲) همراه با تلقیح قارچ مایکوریزا بیشترین تأثیر مثبت را در میان تیمارهای اعمال شده بر وزن خشک برگ و قندهای گلوکوزیدی در گیاه استویا داشته است.

گل واژگان: استویویزید، پیت ماس، ریبادیویزید، کوکوپیت، گلیکوزید



برگ‌های گیاهان ریزازدیادی شده نازک بوده و به دلیل سازمان‌دهی ضعیف کلروپلاست‌های دارای مقادیر کم کلروفیل می‌باشند. همچنین فعالیت آنزیم فتوستترزی رو بیسکو و عملکرد روزنده‌ها در برگ‌های گیاهچه‌های حاصل از *in vitro* پائین است و این عوامل منجر به کاهش کارایی فتوستترزی در گیاهچه‌های منتقل شده به *ex vitro* می‌شود. مقاومت گیاهان باززایی شده تحت شرایط *in vitro* نسبت به پاتوژن‌های بیماری‌زا ضعیف است که به دلیل بیوسنتر ناچیز فیتوآلکسین‌ها می‌باشد. علاوه بر این گیاهان باززایی شده اغلب ارتباطات آوندی ضعیفی را نشان می‌دهند که بر جذب آب از ریشه‌ها و انتقال آن به بافت‌های اندام هوایی اثر می‌گذارد [۸-۱۰]. این گیاهچه‌ها هنگامی که به *ex vitro* منتقل می‌شوند در معرض انواع تنفس‌های غیرزیستی (تغییرات دمایی، نور زیاد و رطوبت بالا و ...) و تنفس‌های زیستی مانند میکروفلور خاک قرار می‌گیرند، به همین دلیل نیاز به فرآیند سازگاری برای استقرار موفق و بقای گیاهچه‌ها می‌باشد [۱۱].

تلقیح ریشه گیاهچه‌های حاصل از کشت بافت با قارچ‌های مایکوریزا نقش مفیدی در سازگاری آنها به شرایط *ex vitro* دارد [۱۲]. برخی گزارش‌ها نشان دادند که تلقیح قارچ مایکوریزا موجب بهبود جذب عناصر غذایی در گیاهچه‌های کشت بافتی موز، گواوا (*Psidium guajava* L.) و *Tapeinocchilos ananassae* شد که این عامل موجب رشد بهتر و بقای گیاهچه‌ها تحت شرایط *ex vitro* شد [۱۳-۱۵]. همچنین تلقیح دو گونه قارچ مایکوریزا (*Glomus mosseae*) و *Acaulospora laevis* موجب افزایش وزن تر، وزن خشک، میزان پروتئین و کلروفیل در گیاهچه‌های کشت بافتی شیرین‌بیان در شرایط *ex vitro* شد. همچنین تلقیح قارچ *Glomus mosseae* موجب بقای ۱۰۰ درصدی گیاهچه‌های شیرین‌بیان در شرایط *ex vitro* شد [۱۳]. همچنین تلقیح گونه‌های مختلف قارچ مایکوریزا در گیاه پروانش نیز موجب افزایش بقاء گیاهچه‌ها پس از انتقال به محیط *ex vitro* شد. به طوری که تحت شرایط بدون تلقیح قارچ مایکوریزا ۴۲ درصد از گیاهچه‌ها در محیط *ex vitro* زنده مانند اما بسته به گونه قارچ مایکوریزا مورد استفاده، بقاء گیاهچه‌های پروانش بین

مقدمه

استویا (*Stevia rebaudiana* Bertoni) گیاهی علفی چندساله متعلق به خانواده *Asteraceae* است [۱]. برگ‌های بیضوی استویا به دلیل حضور مخلوط پیچیده‌ای از گلیکوزیدها است. گلیکوزیدهای عمده برگ استویا شامل استویوزید (۹/۱ درصد)، ریبادیوزید A (۳/۸ درصد)، ریبادیوزید C (۰/۶ درصد) و دولکوزید (۰/۳ درصد) است [۲]. گلیکوزیدها ترکیباتی اغلب درشت مولکول و دارای گروه‌های مختلفی هستند. این ترکیبات همگی دارای یک یا چند قند روی اسکلت مرکزی هستند. این اسکلت مرکزی یک گروه چربی دوست است که روی آن قند مونوساکارید قرار می‌گیرد. اسکلت اصلی گلوكوزیدهای استویا که گلوکز روی آن متصل می‌شود، مولکول استویول است که شبیه اسکلت انت-کائورن برای سنتز جیبریلین است. بنابراین ساخت اسکلت اصلی از مسیر ترپنوتئیدها صورت می‌پذیرد و یک دی‌ترپن است. استویوزید دارای ۳ مولکول گلوکز متصل به مولکول استویول است و ریبادیوزید A با یک گلوکز بیشتر از استویوزید ساخته می‌شود. ساختار ریبادیوزید C مشابه ریبادیوزید A است با این تفاوت که یک مولکول قند رامنوز با مولکول قند گلوکز جایگزین می‌شود [۴، ۳]. استفاده اصلی این گیاه در مواد غذایی به عنوان شیرین کننده و قند رژیمی است. تاکنون گزارشی مبنی بر عوارض جانبی مصرف قند استویا گزارش نشده است. بنابراین می‌تواند جایگزین بسیار مناسبی برای تغذیه نامطلوب و مشکلات ناشی از مصرف قند بویژه برای بیماران مبتلا به دیابت و چاقی باشد [۶، ۵].

یکی از محدودیت‌های تکنیک کشت بافت برای باززایی گیاهان در سطح انبوه و تجاری، استقرار و رشد گیاهچه‌ها پس از انتقال از محیط *in vitro* به *ex vitro* می‌باشد. تحت شرایط *in vitro* گیاهچه‌ها در محیطی بسته بدون تبادلات گازی، با رطوبت بالا و شدت نور کم رشد کرده و از قندهای محیط کشت به عنوان منبع کرین و انرژی استفاده می‌کنند [۷]. بنابراین این گیاهان از نظر فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی با گیاهان رشد یافته در مزرعه تفاوت دارند به طوری که

تهیه مایه تلقيح قارچ

مایه تلقيح شامل خاک دارای اسپور، هيـف و ميسـليـوم قارـچ مـايـكـورـيزـا بـودـ کـه طـبـق روـش اـرـاهـه شـدـه توـسـط موـكـرـجـيـ و هـمـكـارـانـ (۲۰۰۲) تـكـثـيرـ شـدـ. بـدـيـنـ صـورـتـ کـه قـارـچـ مـايـكـورـيزـا درـ مـجاـوـرـتـ رـيـشـهـ گـيـاهـ ذـرـتـ درـ گـلـدانـ ۶ـ كـيلـوـگـرمـيـ کـه حـاوـيـ سـهـ قـسـمـتـ مـاسـهـ وـ يـكـ قـسـمـتـ خـاـكـ باـ باـفـتـ لـوـمـ بـودـ، تـحـتـ شـرـايـطـ نـورـ طـبـيعـيـ وـ دـمـاـيـ ۲۸ـ وـ ۱۶ـ (روـزـ / شبـ) درـجهـ سـانـتـيـگـرادـ وـ فـتوـپـرـيـوـدـ ۱۴ـ ساعـتـ روـشـنـايـيـ وـ ۱۰ـ ساعـتـ خـامـوشـيـ درـ گـلـخـانـهـ تـكـثـيرـ يـافتـ. پـسـ اـزـ يـكـ دـورـهـ کـشتـ شـشـ مـاهـهـ، اـنـدـامـ هوـايـ ذـرـتـ شـدـ وـ قـسـمـتـهـاـيـ زـيـرـزمـينـيـ بـراـيـ مـدـتـ دـوـ مـاهـ درـ دـمـاـيـ ۵ـ درـجهـ سـانـتـيـگـرادـ نـگـهـدارـيـ شـدـنـدـ [۱۹ـ].

تهـيـهـ گـيـاهـچـهـهـاـيـ کـشتـ باـفـتـيـ

ساـقـهـهـاـيـ گـهـدارـ جـوـانـ گـيـاهـ استـوـياـ بـهـ طـوـلـ ۱/۵ـ تـاـ ۲ـ سـانـتـيـمـترـ اـزـ گـيـاهـانـ رـشـدـ يـافـتـهـ درـ گـلـخـانـهـ جـمـعـآـورـيـ شـدـنـدـ وـ پـسـ اـزـ اـنـتـقـالـ بـهـ آـزـمـاـيشـگـاهـ تـحـتـ تـاـيـيـرـ تـيـمـارـهـاـيـ مـخـتـلـفـ ستـرونـسـازـيـ قـرـارـ گـرفـتـ. اـبـتـداـ نـمـونـهـهاـ بـهـ مـدـتـ ۳۰ـ ثـانـيـهـ درـ اـتـاـنـوـلـ ۷۰ـ درـصـدـ پـيـشـ سـتـرونـسـازـيـ شـدـنـدـ وـ سـپـسـ توـسـطـ آـبـ مـقـطـرـ کـامـلاـ شـتـشـتـوـ دـادـهـ شـدـنـدـ. سـتـرونـسـازـيـ نـمـونـهـهاـ باـ استـفادـهـ اـزـ سـدـيـمـ هيـبـوـكـلـرـاـيدـ ۲/۵ـ درـصـدـ بـهـ مـدـتـ پـنـجـ دـقـيقـهـ اـنجـامـ شـدـ وـ پـسـ اـزـ آـنـ رـيـزـنـمـونـهـاـ سـهـ بـارـ بـاـ آـبـ مـقـطـرـ اـسـتـرـيـلـ شـتـشـتـوـ دـادـهـ شـدـنـدـ. هـرـ رـيـزـنـمـونـهـ درـ مـرـحـلـهـ پـرـآـورـيـ بـهـ شـيـشـهـهـاـيـ کـوـچـکـ حـاوـيـ ۱۰ـ مـيـلـيـلـيـتـ MSـ پـاـيهـ حـاوـيـ ۰/۲ـ مـيـلـيـگـرمـ بـرـ لـيـتـ هـورـمـونـ اـسـيدـ جـبـرـلـيـكـ (GA₃)ـ مـنـتـقلـ شـدـنـدـ. پـسـ اـزـ ۴ـ هـفـتـهـ رـيـزـنـمـونـهـاـيـ دـارـايـ سـاقـهـهـاـيـ مـنـاسـبـ بـهـ مـحـيـطـ کـشتـ رـيـشـهـزـايـيـ اـنـتـقـالـ يـافـتـنـدـ. مـحـيـطـ کـشتـ رـيـشـهـزـايـيـ شـاملـ مـحـيـطـ کـشتـ يـكـ دـوـمـ MSـ دـارـايـ ۰/۲ـ مـيـلـيـگـرمـ بـرـ لـيـتـ هـورـمـونـ اـيـنـدـولـ بوـتـريـكـ اـسـيدـ وـ ۲ـ مـيـلـيـگـرمـ بـرـ لـيـتـ زـغـالـ فـعالـ بـودـ. pHـ ۵ـ مـحـيـطـ کـشتـ درـ ۵/۸ـ تـنـظـيمـ شـدـ وـ ۰/۷ـ درـصـدـ آـكـارـ اـزـ قـبـلـ اـتـوكـلـاوـ شـدـهـ نـيـزـ بـهـ آـنـ اـضـافـهـ شـدـ. رـيـزـنـمـونـهـاـ درـ اـتـاقـ رـشـدـ وـ فـتوـپـرـيـوـدـ ۱۶ـ ساعـتـ روـشـنـايـيـ باـ دـمـاـيـ ۲۵±۱ـ درـجهـ سـانـتـيـگـرادـ وـ ۸ـ ساعـتـ تـاريـكيـ باـ دـمـاـيـ ۱۹±۱ـ درـجهـ سـانـتـيـگـرادـ بـهـ مـدـتـ ۵ـ هـفـتـهـ نـگـهـدارـيـ شـدـنـدـ.

تاـ ۹۵ـ درـصـدـ گـزارـشـ شـدـ. عـلاـوهـ بـرـ اـيـنـ وزـنـ خـشـكـ، مـيزـانـ كـلـروفـيلـ وـ پـروـتـئـينـ گـيـاهـچـهـهـاـيـ تـلـقـيـحـ يـافـتـهـ بـاـ قـارـچـ مـايـكـورـيزـاـ نـيـزـ اـفـزـيـشـ معـنـيـ دـارـيـ دـاشـتـ [۱۶ـ].

ازـ سـوـيـ دـيـگـرـ بـسـتـرـ منـاسـبـ کـشتـ نـيـزـ مـىـ تـوانـدـ درـ فـرـآـيـندـ سـازـگـارـيـ گـيـاهـچـهـهـاـيـ کـشتـ باـفـتـيـ تعـيـينـ کـنـنـدـهـ باـشـدـ. گـزارـشـ شـدـهـ اـسـتـ کـهـ وـرـمـيـ كـولـيـتـ بـهـ عنـوانـ بـسـتـرـ کـشتـ کـارـابـيـ کـمـيـ درـ سـازـگـارـيـ گـيـاهـچـهـهـاـيـ سـيـبـ وـ *Sinningia speciosa*ـ دـاردـ [۱۷ـ]. کـارـبـرـدـ نـسـبـتـهـاـيـ مـتـفـاـوتـ پـيـتـ مـاسـ، وـرـمـيـ كـولـيـتـ وـ پـرـليـتـ درـ بـسـتـرـ کـشتـ گـيـاهـچـهـهـاـيـ چـايـ طـيـ فـرـآـيـندـ سـازـگـارـيـ مـوجـبـ اـفـرـايـشـ استـقـرـارـ وـ رـشـدـ گـيـاهـچـهـهـاـيـ چـايـ شـدـ. بـيـشـتـرـينـ مـيزـانـ بـقاـ وـ رـشـدـ گـيـاهـچـهـهـاـيـ چـايـ درـ بـسـتـرـ کـشتـ حـاوـيـ ۵۰ـ درـصـدـ پـيـتـ مـاسـ، ۲۵ـ درـصـدـ وـرـمـيـ كـولـيـتـ وـ ۲۵ـ درـصـدـ پـرـليـتـ مشـاهـدـهـ شـدـ کـهـ عـلـتـ آـنـ فـراـهـمـيـ بـيـشـتـرـ آـبـ، اـكـسيـنـ وـ عـناـصرـ غـذـائـيـ توـسـطـ اـيـنـ مـخـلـوطـ بـرـايـ رـشـدـ رـيـشـهـ وـ اـنـدـامـ هوـايـيـ گـيـاهـچـهـهـاـيـ چـايـ گـزارـشـ شـدـ [۱۸ـ]. بـنـابـرـاـينـ اـيـنـ تـحـقـيقـ باـ هـدـفـ بـرـرسـيـ تـأـيـيـنـ بـسـتـرـهـاـيـ مـخـتـلـفـ کـشتـ وـ تـلـقـيـحـ قـارـچـ مـايـكـورـيزـاـ بـرـ خـصـوصـيـاتـ مـورـفـوـزيـولـوـژـيـكـيـ وـ تـغـيـيرـاتـ مـيزـانـ استـوـبـوزـيـدـ وـ رـيـبـادـيـوـزـيـدـ درـ گـيـاهـانـ استـوـيـاـيـ حـاـصـلـ اـزـ کـشتـ باـفـتـ طـيـ مـرـحـلـهـ سـازـگـارـيـ انـجـامـ شـدـ.

مواد و روشـها

اـيـنـ آـزـمـاـيشـ بـهـ صـورـتـ فـاكـتـورـيلـ درـ قـالـبـ طـرـحـ بـلـوكـهـاـيـ کـاملـ تـصـادـفـيـ باـ ۴ـ تـكـرارـ درـ گـلـخـانـهـ تـحـقـيقـاتـيـ پـژـوهـشـكـدـهـ گـيـاهـانـ دـارـوـيـيـ جـهـادـ دـانـشـگـاهـيـ درـ سـالـ ۱۳۹۵ـ اـنجـامـ شـدـ. تـيـمـارـهـاـيـ آـزـمـاـيشـ شـاملـ تـلـقـيـحـ وـ عـدـمـ تـلـقـيـحـ قـارـچـ مـايـكـورـيزـاـ (Glomus intraradices)ـ وـ ۵ـ تـرـكـيـبـ مـخـتـلـفـ اـزـ پـيـتـ مـاسـ، کـوكـوـپـيـتـ، پـرـليـتـ وـ خـاـكـ بـهـ عنـوانـ بـسـتـرـ بـودـ. تـرـكـيـبـاتـ وـ تـيـمـارـهـاـيـ مـخـتـلـفـ بـسـتـرـ کـشتـ شـاملـ پـيـتـ مـاسـ، پـيـتـ مـاسـ +ـ کـوكـوـپـيـتـ (۱:۱ـ)، پـيـتـ مـاسـ +ـ خـاـكـ (۳:۱ـ)، پـيـتـ مـاسـ +ـ کـوكـوـپـيـتـ +ـ خـاـكـ (۲:۱ـ)ـ وـ کـوكـوـپـيـتـ +ـ پـرـليـتـ +ـ خـاـكـ (۲:۱ـ)ـ بـودـ.

بود. فاز متحرک شامل آب - استونیتریل (۲۰ - ۸۰) با سرعت جریان ۱ میلی لیتر بر دقیقه بود. سنجش گلوکوزیدها در طول موج ۲۱۰ نانومتر انجام شد [۲۰]. میزان استویویزید، ریبادیویزید و C طبق فرمولهای زیر محاسبه شدند:

$$\text{Rebaudioside A \%} = [\text{Ws/W}] \times [\text{Aa/As}] \times 100$$

$$\text{Stevioside \%} = [\text{Ws/W}] \times \text{Astv} \times [0.83/\text{As}] \times 100$$

$$\text{Rebaudioside C \%} = [\text{Ws/W}] \times \text{Ac} \times [0.98/\text{As}] \times 100$$

W_s = مقدار وزن استاندارد Rebaudioside A (بر حسب میلی گرم) در محلول استاندارد.

W = مقدار وزن نمونه گیاه (بر حسب میلی گرم)

Rebaudioside A = سطح زیر بیک استاندارد As

=Aa سطح زیر یک Rebaudioside A نمونه مجهول

نامہ نہ Stevioside سک سطح ز = Astv

Rebaudioside C \leq Rebust \equiv Ac

Digitized by srujanika@gmail.com

تجزیه و تحلیل آماری

محاسبات آماری داده‌های حاصل از این آزمایش با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SAS و SPSS انجام شد و میانگین‌ها بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن مقایسه شدند. همچنین برای رسم نمودارها از نرم‌افزار اکسل (Excel) استفاده شد.

شناخت

ارتفاع بوته

اثر ساده تلقیح قارچ مایکوریزا و بسترهاي مختلف كشت
 اثر (P) و اثر متقابل آنها ($P \leq 0.05$) تأثیر معنی داري بر
 ارتفاع بوته داشتند (جدول شماره ۱). بیشترین ارتفاع بوته در
 بستر کشت پیت ماس + کوکوپیت + خاک با تلقیح قارچ
 مایکوریزا (۲۵/۷۴ سانتی متر) مشاهده شد و کمترین میزان آن
 در بستر کشت پیت ماس + کوکوپیت بدون تلقیح قارچ
 مایکوریزا (۱۷/۷۳ سانتی متر) حاصل شد (شکل شماره ۱).

استقرار گیاهچه‌ها و اعمال تیمارها

گیاهچه‌های حاصل از کشت بافت بعد از استقرار تحت تأثیر پنج ترکیب مختلف بستر کاشت و تلقیح قارچ مایکوریزا به گلخانه منتقل شدند. ۳۰ عدد گلدان‌های یک شکل و هم اندازه (قطر دهانه بالا و پائین و ارتفاع گلدان‌ها به ترتیب ۲۰، ۱۵ و ۱۸ سانتی‌متر بود) در دو گروه تلقیح و عدم تلقیح قارچ مایکوریزا فراهم شدند. تیمارهای بستر کشت شامل P: پیت ماس، P+C: پیت ماس + کوکوپیت، P+C+S: پیت ماس + کوکوپیت + خاک، P+PR+S: پیت ماس + پرلیت + خاک، P+S: پیت ماس + خاک بودند. بسترهای مختلف کاشت قبل از استفاده اتوکلاوه شده و به میزان ۳ کیلوگرم درون گلدان‌ها ریخته شدند. همچنین ۱۰ گرم مایه تلقیح قارچ در گروه تلقیح قارچ مایکوریزا به بسترهای کشت اضافه شد. گیاهچه‌ها در گلخانه تحت دمای ۱۸/۲۵ درجه سانتینی‌گراد (روز / شب) و ۱۶ ساعت روشنایی رشد کردند. پس از ۴ هفته بوته‌های استوپیا از گلدان‌ها خارج شده و به آزمایشگاه منتقل شدند و پس از اندازه‌گیری صفات مورفوژیولوژیکی، بوته‌ها به مدت یک هفته در شرایط سایه خشک شدند.

سنجهش میزان گلوکوزیدها

سنجهش گلوكوزيدهای گیاه استويا طبق روش Kailasam (۲۰۱۱) با کمی تغییر انجام شد. جهت استخراج ۰/۱ گرم از پودر خشک گیاهی توزین شد و درون ویالهای ۲۰ میلی لیتری ریخته شد و ۱۰ میلی لیتر استونیتریل ۸۰ درصد به آن اضافه و توسط شیکر لوله تکان داده شد. سپس عملیات استخراج با قرار دادن مخلوط درون اولتراسونیک به مدت ۶۰ ثانیه انجام شد و در پایان به مدت چهار دقیقه با سرعت ۵۰۰۰ دور بر دقیقه سانتریفیوژ شد و محلول رویی به نسبت ۱ به ۵ با استونیتریل ۸۰ درصد رقیق شد و برای آنالیز با دستگاه HPLC KNAUER مدل HPLC مورد استفاده قرار گرفت. دستگاه HPLC (K2501) و دتکتور UV-Vis (K2501) مجهز به ستون NH_2 (طول ستون ۲۵ سانتی متر و قطر داخلی ۰/۴۶ سانتی متر) است.

جدول شماره ۱- تجزیه واریانس اثرات ساده و متقابل قارچ مایکوریزا و بستر مختلف کشت بر برخی صفات مورد بررسی استویا


میانگین مربuat									
وزن تر برگ	وزن خشک ساقه	وزن تر ساقه	تعداد برگ	قطر ساقه	تعداد ساقه فرعی	ارتفاع بوته	درجه آزادی D.f.	منابع تغییرات (S.O.V)	
۰/۲۱ ns	۰/۱۰۱ ns	۰/۰۵۶ ns	۱۹/۲۳ ns	۰/۰۱۴ ns	۰/۱۹ ns	۶/۸۹ ns	۳	بلوک	
۷/۳۴ **	۱/۱۰۲ **	۰/۰۵ ns	۲۷/۸/۹ **	۰/۸۴۱ **	۰/۸ *	۲۶/۴۲ **	۱	قارچ مایکوریزا	
۱/۲۷ *	۰/۳۹ **	۱/۳۸ **	۳۶/۲ ns	۰/۰۷ ns	۰/۳۷ ns	۲۵/۶۹ **	۴	بستر کشت	
۰/۶۱ ns	۰/۲۱۹ *	۰/۲۳۵ ns	۴۰/۴ ns	۰/۰۹۲ ns	۰/۱۴۳ ns	۱۱/۹۸ *	۴	قارچ مایکوریزا × بستر کشت	
۰/۳۴	۰/۰۵۸	۰/۱۸۵	۱۵/۶	۰/۰۳۶	۰/۱۷۵	۳/۰۲	۲۷	خطای آزمایشی	
۲۲/۶	۱۴/۲۴	۱۶/۸۶	۱۷/۴۴	۱۲/۸۳	۱۹/۷۲	۸/۲۲		ضریب تغییرات (CV%)	

ns, **: به ترتیب غیر معنی دار بودن و معنی دار بودن در سطوح احتمال ۵ و ۱ درصد.

ادامه جدول شماره ۱

میانگین مربuat									
میزان C	میزان A	میزان ریبادیوزید	میزان ریبادیوزید	وزن خشک ریشه	وزن تر ریشه	وزن خشک برگ	قطر ریشه	درجه آزادی D.f.	منابع تغییرات (S.O.V)
۰/۰۲۶ ns	۰/۲۷ ns	۰/۰۰۸ ns	۰/۰۹۸ ns	۰/۲۱۷ ns	۰/۰۷۴ ns	۰/۲۱ ns	۳	بلوک	
۴/۱۳ **	۲۸/۹۸ **	۱۵/۱ **	۰/۵۲ **	۰/۵۰ ns	۰/۷۹ **	۲/۶۸ **	۱	قارچ مایکوریزا	
۳/۴۶ **	۵/۰۴ **	۲/۴۶ **	۰/۱۹ *	۱/۲۵ **	۰/۰۹ ns	۰/۱۸ ns	۴	بستر کشت	
۱/۲۵ **	۸/۶۴ **	۰/۸۲۵ **	۰/۰۹ ns	۰/۲۱ ns	۰/۰۷ ns	۰/۷۷ **	۴	قارچ مایکوریزا × بستر کشت	
۰/۰۱۹	۰/۳۰۸	۰/۱۸۹	۰/۰۵۹	۰/۱۹	۰/۰۸	۰/۱۲	۲۷	خطای آزمایشی	
۱۴/۰۶	۲۰/۶۳	۱۵/۰۶	۱۶/۳۶	۱۸/۹	۱۹/۹	۱۹/۹		ضریب تغییرات (CV%)	

ns, **: به ترتیب غیر معنی دار بودن و معنی دار بودن در سطوح احتمال ۵ و ۱ درصد.



شکل شماره ۱- اثر متقابل تلقیح قارچ مایکوریزا و بسترهای مختلف کشت بر ارتفاع بوته استویا. P: پست ماس، P+C: پست ماس + کوکوپیت، P+C+S: پست ماس + کوکوپیت + خاک، P+PR+S: پست ماس + پرلیت + خاک، P+S: پست ماس + خاک

میزان این صفات نداشت (جدول شماره ۱). تلقیح قارچ مایکوریزا به ترتیب موجب افزایش ۱۴ و ۲۱/۶ درصدی تعداد ساقه فرعی و قطر ساقه در گیاه استویا نسبت به عدم تلقیح آن شد (شکل شماره ۲).

تعداد ساقه فرعی و قطر ساقه تلقیح قارچ مایکوریزا تأثیر معنی داری بر تعداد ساقه فرعی (P) و قطر ساقه (P ≤ ۰/۰۱) داشت اما بسترهای مختلف کشت و اثر متقابل آن با تلقیح قارچ مایکوریزا تأثیر معنی داری بر

مايكوريزا تأثير معنی داری ($P \leq 0.01$) بر وزن خشک برگ داشت در حالی که بسترهای مختلف کشت تأثير معنی داری بر آن نداشتند. اثر متقابل تلقیح قارچ مايكوريزا و بسترهای مختلف کشت نیز تأثير معنی داری ($P \leq 0.01$) بر وزن خشک برگ داشت (جدول شماره‌های ۱، ۲ و ۳). تلقیح قارچ مايكوريزا در بسترهای مختلف کشت به غیر از بستر کشت پیت‌ماس + پرلیت + خاک، موجب افزایش وزن خشک برگ استویا شد. بیشترین میزان وزن خشک برگ با تلقیح قارچ مايكوريزا در بستر کشت‌های پیت‌ماس ($2/3$ گرم) و پیت‌ماس + خاک ($2/25$ گرم) مشاهده شد و کمترین میزان آن در بستر کشت پیت‌ماس + خاک بدون تلقیح مايكوريزا ($0/99$ گرم) به دست آمد (شکل شماره ۳).

قطر ریشه، وزن تر و خشک ریشه

تلقیح قارچ مايكوريزا تأثير معنی داری ($P \leq 0.01$) بر قطر ریشه و وزن خشک ریشه داشت. بسترهای مختلف کشت نیز تأثير معنی داری بر وزن تر ($P \leq 0.01$) و خشک ($P \leq 0.05$) ریشه داشتند (جدول شماره ۱). استفاده از قارچ مايكوريزا در بسترهای مختلف کشت موجب افزایش 14 درصدی قطر ریشه و وزن خشک ریشه نسبت به عدم تلقیح قارچ شد (جدول شماره ۲). بیشترین وزن تر و خشک ریشه در بستر کاشت پیت‌ماس + کوکوپیت (به ترتیب $2/85$ و $1/61$ گرم) به دست آمد و کمترین میزان آن در بستر کشت پیت‌ماس + خاک (به ترتیب $1/97$ و $1/23$ گرم) مشاهده شد (جدول شماره ۳).

میزان استویوزید و ریبادیوزید A و C

اثرات ساده و متقابل تلقیح قارچ مايكوريزا و بسترهای مختلف کشت تأثير معنی داری ($P \leq 0.01$) بر میزان استویوزید و ریبادیوزید A و C داشتند (جدول شماره ۱). تلقیح قارچ مايكوريزا موجب افزایش معنی دار میزان استویوزید در بسترهای مختلف کشت به غیر از بستر کشت پیت‌ماس شد. بیشترین میزان استویوزید با تلقیح مايكوريزا در بستر کشت پیت‌ماس + کوکوپیت + خاک مشاهده شد و کمترین میزان آن در بستر کاشت پیت‌ماس + پرلیت + خاک بدون تلقیح قارچ

تعداد برگ

تلقیح قارچ مايكوريزا در سطح احتمال 1 درصد تأثير معنی داری بر تعداد برگ گیاهچه‌های استویا داشت. در حالی که بسترهای مختلف کشت و اثر متقابل تلقیح قارچ مايكوريزا در بسترهای مختلف کشت تأثير معنی داری بر تعداد برگ استویا نداشتند. تعداد برگ تحت تأثیر تلقیح قارچ مايكوريزا در مقایسه با عدم تلقیح قارچ سبب افزایش 26 درصدی آن شد.

وزن تر و خشک ساقه


اگرچه استفاده از بسترهای کشت مختلف نیز تأثير معنی داری ($P \leq 0.01$) بر وزن تر و خشک ساقه داشت ولی تلقیح قارچ مايكوريزا تنها تأثیر معنی داری ($P \leq 0.01$) بر وزن خشک ساقه داشت. همچنین اثر متقابل آنها فقط بر وزن خشک ساقه تأثیر معنی داری ($P \leq 0.05$) داشت (جدول شماره ۱). بیشترین میزان وزن تر ساقه در بستر کاشت پیت‌ماس ($3/09$ گرم) حاصل شد که تفاوت معنی داری با بسترهای کشت پیت‌ماس + کوکوپیت ($2/72$ گرم) و پیت‌ماس + پرلیت + خاک ($2/68$ گرم) نداشت و کمترین میزان آن در بسترهای پیت‌ماس + کوکوپیت + خاک ($2/2$ گرم) و پیت‌ماس + خاک ($2/06$ گرم) مشاهده شد (جدول شماره ۳). تلقیح قارچ مايكوريزا در بسترهای کشت پیت‌ماس + خاک و پیت‌ماس + کوکوپیت + خاک موجب افزایش معنی دار وزن خشک ساقه شد و در سایر بسترهای کشت، تفاوت معنی دار در وزن خشک ساقه مشاهده نشد. بیشترین وزن خشک در بستر کاشت پیت‌ماس و تلقیح قارچ مايكوريزا ($2/05$ گرم) مشاهده شد و کمترین میزان آن در بستر کاشت پیت‌ماس + خاک و عدم تلقیح قارچ مايكوريزا ($1/12$ گرم) به دست آمد (شکل شماره ۲).

وزن تر و خشک برگ

تلقیح قارچ مايكوريزا تأثیر معنی داری ($P \leq 0.01$) بر وزن تر بوته داشت و موجب افزایش $39/8$ درصدی وزن تر بوته شد. بسترهای مختلف کشت تأثیر معنی داری ($P \leq 0.05$) بر وزن تر برگ داشتند و بیشترین میزان آن در بستر کشت پیت‌ماس ($3/09$ گرم) مشاهده شد و سایر بسترهای کشت تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. همچنین تلقیح قارچ

ریبادیوزید C تحت شرایط تلچیح مایکوریزا در بستر کاشت پیت ماس (۲/۹۸ درصد) حاصل شد و کمترین میزان آن در تیمارهای پیت ماس + پرلیت + خاک و پیت ماس + خاک تحت شرایط بدون تلچیح مایکوریزا (۰/۳۴ درصد) به دست آمد (شکل شماره ۶).

مایکوریزا حاصل شد (شکل شماره ۴). بیشترین میزان ریبادیوزید A تحت شرایط تلچیح مایکوریز در بسترها کشت پیت ماس + کوکوپیت + خاک (۵/۴۸ درصد) و پیت ماس + خاک (۴/۹۵ درصد) مشاهده شد و کمترین میزان آن در تیمار پیت ماس + پرلیت + خاک بدون تلچیح مایکوریزا (۱/۳۵ گرم) به دست آمد (شکل شماره ۵). همچنین بیشترین میزان



شکل شماره ۲- اثر متقابل تلچیح قارچ مایکوریزا و بسترها م مختلف کشت بر وزن خشک ساقه استویا. P: پیت ماس، P+C: پیت ماس + کوکوپیت، P+C+S: پیت ماس + کوکوپیت + خاک، P+PR+S: پیت ماس + پرلیت + خاک، P+S: پیت ماس + خاک

جدول شماره ۲- مقایسه میانگین اثر تلچیح قارچ مایکوریزا بر برخی از صفات مورفوژیولوژیکی استویا

وزن خشک ریشه (گرم)	قطر ریشه (میلی متر)	وزن تر برگ (گرم)	تعداد برگ	قطر ساقه (میلی متر)	تعداد ساقه فرعی (میلی متر)	مایکوریزا
۱/۳۷ ^b	۱/۲۸ ^b	۲/۱۶ ^b	۲۰/۰۳ ^b	۱/۳۴ ^b	۱/۹۸ ^b	عدم تلچیح قارچ
۱/۶ ^a	۱/۰۵ ^a	۳/۰۲ ^a	۲۵/۳۱ ^a	۱/۶۳ ^a	۲/۲۶ ^a	تلچیح قارچ


میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون مطابق آزمون دانکن در سطح احتمال ۵ درصد تفاوت معنی دار ندارند.

جدول شماره ۳- مقایسه میانگین اثر بسترها م مختلف کشت بر برخی از صفات مورفوژیولوژیکی استویا


	وزن خشک ریشه (گرم)	وزن تر ساقه (گرم)	وزن تر برگ (گرم)	بستر کشت
۱/۶ ^a	۲/۵۸ ^a	۳/۲۲ ^a	۳/۰۹ ^a	پیت ماس
۱/۶۱ ^a	۲/۸۵ ^a	۲/۱۲ ^b	۲/۷۷ ^a	پیت ماس + کوکوپیت
۱/۰۱ ^a	۲/۰۲ ^b	۲/۴۸ ^b	۲/۲۱ ^b	پیت ماس + کوکوپیت + خاک
۱/۴۷ ^{ab}	۲/۰۸ ^b	۲/۵۶ ^b	۲/۶۸ ^a	پیت ماس + پرلیت + خاک
۱/۲۳ ^b	۱/۹۷ ^b	۲/۵۴ ^b	۲/۰۶ ^b	پیت ماس + خاک

میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون مطابق آزمون دانکن در سطح احتمال ۵ درصد تفاوت معنی دار ندارند.







شکل شماره ۳- اثر متقابل تزریق قارچ مایکوریزا و بسترهای مختلف کشت بر وزن خشک برگ استویا. P: پیت ماس، P+C: پیت ماس + کوکوپیت، P+C+S: پیت ماس + کوکوپیت + خاک، P+PR+S: پیت ماس + پرلیت + خاک، P+S: پیت ماس + خاک



شکل شماره ۴- اثر متقابل تزریق قارچ مایکوریزا و بسترهای مختلف کشت بر میزان استویوژید برگ استویا. P: پیت ماس، P+C: پیت ماس + کوکوپیت، P+C+S: پیت ماس + کوکوپیت + خاک، P+PR+S: پیت ماس + پرلیت + خاک، P+S: پیت ماس + خاک



شکل شماره ۵- اثر متقابل تزریق قارچ مایکوریزا و بسترهای مختلف کشت بر میزان ریبادیوژید A در برگ استویا. P: پیت ماس، P+C: پیت ماس + کوکوپیت، P+C+S: پیت ماس + کوکوپیت + خاک، P+PR+S: پیت ماس + پرلیت + خاک، P+S: پیت ماس + خاک



شکل شماره ۶- اثر متقابل تلچیق قارچ مایکوریزا و بسترهای مختلف کشت بر میزان ریبادیوزید C در برگ استویا. P: پیت ماس، P+C: پیت ماس + کوکوپیت، P+CS: پیت ماس + کوکوپیت + خاک، P+PR+S: پیت ماس + پرلیت + خاک، P+S: پیت ماس + خاک

[۸]. علاوه بر این تلچیق قارچ مایکوریزا می‌تواند از ریشه گیاهان در برابر حمله میکروارگانیسم‌های بیماریزای خاک حفاظت کند [۱۶]. نقش مؤثر دیگر قارچ‌های مایکوریزا، تأثیر آنها بر میزان هورمون‌های گیاهی بویژه IAA است. افزایش مقدار IAA، جیبرولین و سیتوکینین در گیاه *G. fasciculatum* همزیست با *Prosopis juliflora* شده است [۲۳]. به این ترتیب تلچیق قارچ مایکوریزا موجب بهبود ویژگی‌های رویشی و مورفوفیزیولوژیکی گیاهان می‌شود، به طوری که Karthikeyan و همکاران (۲۰۰۸) نشان دادند که همزیستی گیاه پروانش با قارچ *G. mosseae* موجب افزایش ارتفاع گیاه شده است [۲۴] و علاوه بر این، گزارش‌های بسیاری در مورد اثر تلچیق قارچ‌ها بر بهبود شاخص‌هایی نظیر وزن تر و خشک اندام هوایی گیاهان وجود دارد [۲۵].

تغییرات کمی و کیفی در تولید متابولیت‌های ثانویه در برخی از گیاهان در شرایط هم‌زیستی با قارچ‌های مایکوریزا گزارش شده است. چنانکه قارچ‌های اندو‌مایکوریزا با افزایش فعالیت‌های آنزیمی متفاوت سبب تغییرات فیزیولوژیکی در گیاهان و متابولیت‌های ثانویه‌ی آنها می‌شوند [۲۶]. تحقیقات نشان داده است که تلچیق قارچ‌های مایکوریزا میزان فتوسترن گیاه میزان را از طریق افزایش مقدار فسفر در کلروپلاست افزایش می‌دهند و این قارچ‌ها نقش مهمی در کاهش اثرات تنفسهای محیطی دارند. همچنین قارچ‌های مایکوریزا موجب بیان ژن پروتئین‌های آکواپورین مستقر در واکوئل سلول‌های دارای هیف قارچ می‌گردند و از این طریق اثر مثبتی در جذب آب تحت شرایط تنفس خشکی دارند [۲۲]

بحث

بررسی نتایج حاصل از برهم کنش قارچ مایکوریزا و بسترهای مختلف کشت بر گیاه‌چهای کشت بافتی استویا نشان داد که قارچ مایکوریزا بخصوص در بسترهای مناسب کشت، اثر مثبتی بر خصوصیات رشدی و فیتوشیمیایی بوته‌های استویا داشتند. قارچ مایکوریزا سبب افزایش ارتفاع بوته، تعداد ساقه فرعی، تعداد برگ، قطر ساقه و ریشه، وزن تر و خشک ساقه، برگ و ریشه، میزان استویویزید و ریبادیوزید A و C شد. این نتایج با یافته‌های سایر محققین مطابقت داشت [۱۲، ۱۳، ۱۶]. قارچ‌های مایکوریزا از طریق نفوذ اندام هیف خود به درون منافذ ریز خاک، موجب توسعه سیستم ریشه گیاه میزان می‌شوند [۲۱] و با توسعه سیستم ریشه، جذب آب و عناصر معدنی نظری فسفر در خارج از منطقه ریزوسفر افزایش می‌یابد. تحقیقات نشان داده است که تلچیق قارچ‌های مایکوریزا میزان فتوسترن گیاه میزان را از طریق افزایش مقدار فسفر در کلروپلاست افزایش می‌دهند و این قارچ‌ها نقش مهمی در کاهش اثرات تنفسهای محیطی دارند. همچنین قارچ‌های مایکوریزا موجب بیان ژن پروتئین‌های آکواپورین مستقر در واکوئل سلول‌های دارای هیف قارچ می‌گردند و از این طریق اثر مثبتی در جذب آب تحت شرایط تنفس خشکی دارند [۲۲]



گیاهچه‌ها در بستر کشت حاوی ۵۰ درصد پیت ماس، ۲۵ درصد ورمیکولیت و ۲۵ درصد پرلیت مشاهده شد که علت آن به فراهمی بیشتر آب، اکسیژن و عناصر غذایی توسط این مخلوط برای رشد ریشه و اندام هوایی گیاهچه‌های چای نسبت داده‌اند [۱۸]. بیشترین میزان وزن تر ساقه، وزن تر برگ، وزن تر ریشه و وزن خشک ریشه تحت شرایط تلقیح یا عدم تلقیح قارچ مایکوریزا در بستر کاشت پیت ماس به دست آمد و افزودن کوکوپیت، پرلیت و خاک به آن موجب کاهش میزان این صفات شد. یافته‌های سایر محققین این نتایج را تأیید کرد [۳۶-۳۸]. تحت شرایط بدون تلقیح قارچ مایکوریزا، بیشترین میزان ارتفاع بوته و وزن خشک برگ در بستر کاشت پیت ماس + پرلیت + خاک حاصل شد. پرلیت یک ترکیب مهم در مخلوط بستر کشت است، البته زمانی که با پیت ماس مخلوط شود. افزودن پرلیت به پیت ماس موجب نگهداری هوای بیشتر در پیت ماس می‌شود و علاوه بر این مقدار آب نگهداری شده در پیت ماس افزایش می‌یابد [۱۸]. بیشترین وزن خشک ساقه، میزان استویوزید و ریبادیوزید A و C در بستر کاشت پیت ماس مشاهده شد. به نظر می‌رسد در بستر کشت پیت ماس به دلیل فراهمی بیشتر ماده آلی و عناصر غذایی، میزان قندهای گلیکوزیدی گیاه استویا افزایش یافته است.

تحت شرایط تلقیح قارچ مایکوریزا، بیشترین ارتفاع بوته در بستر کشت پیت ماس + کوکوپیت + خاک مشاهده شد و بیشترین میزان وزن خشک ساقه و برگ نیز در تیمار کشت پیت ماس حاصل شد. اما از نظر آماری تفاوت معنی‌داری با بستر کشت پیت ماس + کوکوپیت + خاک نداشت. بیشترین میزان ریبادیوزید A و استویوزید در بستر کشت پیت ماس + کوکوپیت + خاک مشاهده شد و بیشترین میزان ریبادیوزید C در بستر کشت پیت ماس به دست آمد. تلقیح قارچ مایکوریزا به دلیل توسعه سیستم امکان دسترسی به عناصر غذایی بیشتر را فراهم می‌کند و با کاهش اثرات تنفس‌های محیطی و تحريكی بیوسنتر هورمون‌های گیاهی موجب رشد بیشتر و افزایش متابولیت‌های ثانویه می‌شوند [۱۸، ۲۸، ۳۹]. بنابراین تلقیح قارچ مایکوریزا در بستر کشت پیت ماس + کوکوپیت + خاک ممکن است به دلیل فراهمی بیشتر آب، اکسیژن و عناصر

Euphorbia pekinensis بعد از تلقیح با قارچ مایکوریزا افزایش می‌یابد، همچنین بررسی سیتوپلاسمی نشان داده است که فعالیت آنزیم‌های PAL (فنیل آلانین آمونیا لیاز) و DXR (رداکتو ایزوومراز) در 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate بافت گیاهی تلقیح شده با قارچ مایکوریزا افزایش می‌یابد [۲۷]. سیگنال‌های مختلف و مسیرهای سیگنالی فراوانی در یک هم زیستی مایکوریزایی، بیان ژن‌های کد کننده متابولیت‌های ثانویه را کنترل می‌کنند. قارچ‌های مایکوریزا آربسکولار ابناشتنگی میکورادیسین را از مسیری غیر از مسیر موالونات یعنی در مسیر MEP القا می‌کنند. در این مسیر cDNA دو آنزیم مهم کد کننده 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate (DXS) و 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate (DXR) رداکتو ایزوومراز (DXR) دیده شده که القا شدیدی در سطح رونویسی این دو آنزیم در گیاهان مایکوریزای اتفاق می‌افتد [۲۸].

یکی از مهم‌ترین آثار مرحله سازگاری بر گیاهان انتقال یافته به محیط *ex vitro* قرار گرفتن گیاهان تحت تش رطوبتی است. گزارش‌های متعدد نشان دادند که قارچ‌های مایکوریزا موجب بهبود هدایت هیدرولیکی ریشه در پتانسیل‌های پایین آب و درنهایت بهبود پتانسیل آب گیاهچه‌ها می‌شود [۲۹-۳۱]. همچنین قارچ‌های مایکوریزا قدرت بقای گیاهچه‌های حاصل از *in vitro* را از طریق گسترش سیستم ریشه، افزایش شدت فتوستز و ظرفیت هدایت آب، افزایش جذب عناصر غذایی و کاهش تش‌های محیطی در طول دوره سازگاری افزایش می‌دهند [۳۲، ۱۲، ۱۳]. در این راستا اثر مثبت چند گونه از قارچ‌های مایکوریزا بر رشد و ارتفاع گیاهچه‌های *Vitis vinifera* در طول دوره سازگاری (*ex vitro*) گزارش شده است [۲۲].

به طور کلی نتایج نشان داد بسترها مختلف کشت سبب بهبود ارتفاع بوته، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر برگ، وزن تر و خشک ریشه، میزان استویوزید و ریبادیوزید A و C شد که با یافته‌های سایر محققین تطابق داشت [۱۸، ۳۳، ۳۴، ۳۵]. بستر مناسب کشت عامل تعیین کننده در بقا، رشد و سازگاری گیاهچه‌های کشت بافتی می‌باشد. در تحقیقی مشخص شد که کاربرد نسبت‌های متفاوت پیت ماس، ورمیکولیت و پرلیت در بستر کشت بوته‌های چای طی فرآیند سازگاری موجب افزایش بقا و رشد گیاهچه‌های چای شد. بیشترین میزان بقا و رشد

تلقیح قارچ مایکوریزا بر خصوصیات رشدی و فیتوشیمیایی گیاه استویا اثر معنی داری داشته است. همچنین با توجه به اهمیت وزن خشک برگ بوته و میزان قندهای گلوكوزیدی در گیاه استویا، بستر کشت پیت ماس + کوکوپیت + خاک (۱:۱:۲) همراه با تلقیح قارچ مایکوریزا بهترین تیمار بود.

غذایی یا تولید مواد محرک رشد گیاهی موجب بهبود ویژگی کمی و کیفی گیاهچه های استویا شده است.

نتیجه گیری

نتایج این تحقیق نشان داد که بسترهای مختلف کشت و

منابع

1. Lemus-Mondaca R, Vega-Galvez A, Zura-Bravo L and Ah-Hen K. *Stevia rebaudiana* Bertoni, source of a high-potency natural sweetener: A comprehensive review on the biochemical, nutritional and functional aspects. *Food Chem.* 2012; 132: 1121–32.
2. Abdullateef R.A and Osman M. Studies on effects of pruning on vegetative traits in *Stevia rebaudiana* Bertoni (Compositae). *International J. Biol.* 2012; 4 (1): 146.
3. Gupta E, Purwar S, Sundaram S, Tripathi P and Rai G. Stevioside and Rebaudioside A – Predominant Ent-KaureneDiterpene Glycosides of Therapeutic Potential: a Review. *Czech J. Food Sci.* 2016; 34(4): 281 - 299.
4. Brahmachari G, Mandal L.C, Roy R, Mondal S and Brahmachari AK. Stevioside and Related Compounds – Molecules of Pharmaceutical Promise: A Critical Overview. *Archiv der Pharmazie Chemistry in Life Sciences* 2011; 1: 5-19.
5. Saad A, Khan F.A, Hayee A and Nazir MS. A Review on Potential Toxicity of Artificial Sweetners vs Safety of Stevia: A Natural Bio-Sweetner. *J. Biology, Agriculture and Healthcare* 2014; 4 (15): 137- 147.
6. Goyal S.K, Samsher and Goyal R.K. Stevia (*Stevia rebaudiana*) a bio-sweetener: a review. *International Journal of Food Sciences and Nutrition* 2010; 61 (1): 1 - 10.
7. Kumar K and Rao I.U. Morphophysiological Problems in Acclimatization of Micropropagated Plants in - Ex Vitro Conditions- A Reviews. *Journal of Ornamental and Horticultural Plants* 2012; 2 (4): 271-283.
8. Kapoor R, Sharma D and Bhatnagar AK. Arbuscular mycorrhizae in micropropagation systems and their potential applications. *Scientia Horticulturae* 2008; 116: 227-239.
9. Rasmia S.S.D. Morphology, physiology and anatomy in vitro affected acclimatization ex vitro date palm plantlets: A Review. *International Journal of Chemical, Environmental & Biological Sciences* 2015; 3(2): 183- 190.
10. Pospisilova J, Ticha I, Kadlec P, Haisel D and Plzakova S. Acclimatization of micropropagated plants to ex vitro conditions. *Biologia Plantarum* 1999; 42 (4): 481-497.
11. Chandra Sh, Kumar V, Bandopadhyay R and Chandra R. Acclimatization of tissue cultured plantlets: from laboratory to land. *Biotechnology Letters* 2010; 32: 1199 - 1205.
12. Azcon-Aguilar C, Cantos M, Troncoso A, Barea J.M. Beneficial effect of arbuscular mycorrhizas on acclimatization of micropropagated cassava plantlets. *Scientia Horticulture* 1997; 72: 63- 71.
13. Yadav K, Aggarwal A and Singh N. Arbuscular Mycorrhizal Fungi Induced Acclimatization and Growth Enhancement of *Glycyrrhiza glabra* L.: A Potential Medicinal Plant. *Agriculture Res.* 2013; 2 (1): 43 - 47.



- 14.** De Oliveira J.R.G, De Lima Morais T.A, De Melo N.F and Yano-Melo A.M. Acclimatization of *Tapeinochilos ananassae* plantlets in association with arbuscular mycorrhizal fungi. *Pesquisa Agropecuária Brasileira* 2011; 46 (9): 1099-1104.
- 15.** Estrada-Luna A.A, Davies F.T and Egilla J.N. Mycorrhizal fungi enhancement of growth and gas exchange of micropropagated guava plantlets (*Psidium guajava* L.) during ex vitro acclimatization and plant establishment. *Mycorrhiza* 2000; 10: 1-8.
- 16.** Rahmatzadeh S and Kazemtabar S.K. Biochemical and antioxidant changes in regenerated periwinkle plantlets due to mycorrhizal colonization during acclimatization. *International J. Agriculture and Crop Sci.* 2013; 5 (4): 1535-1540.
- 17.** Rodrigues P.H.V, Lima A.M.L.P, Ambrosano G.M.B and Dutra M.F.B. Acclimatization of micropropagated *Heliconia bihai* (Heliconiaceae) plants. *Scientia Agricola* 2005; 62 (3): 299-301.
- 18.** Azadi Gonbad R, Siavash Moghaddam S, Sinniah U.R, Abdul Aziz M and Safarpour M. Determination of Potting Media for Effective Acclimatization in Micropropagated Plants of Tea Clone Iran. *International Journal of Forest, Soil and Erosion* 2013; 3 (1): 40-44.
- 19.** Mukerji K.G., Manoharachary C. and Chamola B.P. Techniques in Mycorrhizal Studies. Kluwer Academic Publisher. Springer Netherlands. 2002, 554 p. DOI: 10.1007/978-94-017-3209-3
- 20.** Kailasam S. Quantification of stevioside and rebaudioside A in *Stevia rebaudiana* Bertoni leaves using the Agilent 1260 Infinity LC. Application Note. Food Testing & Agriculture. Agilent Technologies, Inc. Bangalore, India. 2011; P. 1-4. <https://www.agilent.com/cs/library/applications/5990-9524EN.pdf>
- 21.** Karandashov V and Bucher M. Symbiotic phosphate transport in arbuscular mycorrhizas. *Trends Plant Sci.* 2005; 10: 22 - 29.
- 22.** Krishna H, Singh S.K and Sharma R.R. Biochemical changes in micropropagated grape (*Vitis vinifera* L.) plantlets due to arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) inoculated during ex vitro acclimatization. *Scientia Horticulturae* 2005; 106: 554-567.
- 23.** Selvaraj T and Chellappan P. Arbuscular mycorrhizae: a diverse personality. *J. Central European Agriculture* 2006; 7: 349-358.
- 24.** Karthikeyan B, Abdul Jaleel C and Changxing Z. The effect of AM fungi and phosphorous level on the biomass yield and ajmalicine production in *Catharanthus roseus*. *Eurasian J. Biosciences* 2008; 2: 26- 33.
- 25.** Morone-Fortunato I and Avato P. Plant development and synthesis of essential oils in micropropagated and mycorrhiza inoculated plants of *Origanum vulgare* L. ssp. *Hirtum* (Link) Ietswaart. *Plant Cell Tissue and Organ Culture* 2008; 93: 139-149.
- 26.** Mathur N. and Vyas A. Changes in isozyme patterns of peroxidase and polyphenol oxidase by VAM fungi in roots of *Ziziphus* species. *Plant Physiology* 1995; 4: 498-500.
- 27.** Yuan Z.L., Dai C. and Chen L. Regulation and accumulation of secondary metabolites in plant-fungus symbiotic system. *African J. Biotechnol.* 2010; 6: 1266-1271.
- 28.** Walter M.H., Fester T. and Strack D. Arbuscular mycorrhizal fungi induce the non-mevalonate methylerythritol phosphate pathway of isoprenoid biosynthesis correlated with accumulation of the 'yellow pigment' and other apocarotenoids. *Plant J.* 2000; 21: 571-578.
- 29.** Birhane E, Sterck F.J, Fetene M, Bongers F and Kuyper T.W. Arbuscular mycorrhizal fungi enhance photosynthesis, water use efficiency, and growth of frankincense seedlings under pulsed water availability conditions. *Oecologia* 2012; 169 (4): 895 - 904.
- 30.** Porcel R and Ruiz-Lozano J.M. Arbuscular mycorrhizal influence on leaf water potential,

- solute accumulation, and oxidative stress in soybean plants subjected to drought stress. *J. Experimental Botany* 2004; 55 (403): 1743-1750.
- 31.** Bagheri V, Shamshiri M.H, Shirani H and Roosta H.R. Nutrient Uptake and Distribution in Mycorrhizal Pistachio Seedlings under Drought Stress. *J. Agricultural Science and Technol.* 2012; 14: 1591-1604.
- 32.** Hazarika B.N and Bora A. Use of Bio-agents in Acclimatizing Micropropagated Plants- a Review. *Agricultural Reviews* 2006; 27 (2): 152 -156.
- 33.** Yahya M.F, Hassan N.H, Abdullah N, Abd. Rahman S.S, Ismail H, Abdullah M.Z, Mohd Ariff F.F, Ngah M.L, Koter R, Khalid R, Abdullah R, Zakaria N and Zakaria N. Acclimatization of *Eurycoma longifolia* (Tongkat Ali) Plantlets to Ex Vitro Conditions. *J. Trop. Resour. Sustain. Sci.* 2015; 3: 129-131.
- 34.** Sardoei A.S and Rahbarian P. Effect of different media on chlorophyll and carotenoids of ornamental plants under system mist. *European Journal of Experimental Biol.* 2014; 4 (2): 366-369.
- 35.** Sardoei A.S, Shahmoradzadeh Fahraji S and Ghasemi H. Effects of different growing media on growth and flowering of zinnia (*zinnia elegans*). *International J. Advanced Biological and Biomedical Res.* 2014; 2 (6): 1894-1899.
- 36.** Arenas M, Vavrina C.S, Cornell J.A, Hanlon E.A and Hochmuth G.J. Coir as an Alternative to Peat in Media for Tomato Transplant Production. *Horticulture Science* 2002; 37 (2): 309 - 312.
- 37.** Rahimi Z, Aboutalebi A and Hasanzadeh H. Effect of various culture media on tomato transplant production. *International Research Journal of Applied and Basic Sciences* 2013; 4 (2): 326-328.
- 38.** Pestrepo A.P, Medina E, Perez-Espinosa A, Agullo E, Bustamsnte M.A, Mininni C, Bernal M.P and Moral R. Substitution of Peat in Horticultural Seedlings: Suitability of Digestate-Derived Compost from Cattle Manure and Maize Silage Codigestion. *Communications in Soil Science and Plant Analysis* 2013; 44: 668-677.
- 39.** Smith S.E and Read D. Mycorrhizal Symbiosis. Third Edition. Academic press. USA. 2008, 800 p. Hardcover ISBN: 9780123705266.

