

القای استخوانسازی در کشت سلولهای استرومایی مغز استخوان‌رت توسط دگراماتازون

مهدی نیکبخت^{*} Ph.D., محمد اکبری[†] Ph.D., علیقلی سبحانی[‡] Ph.D., حسن مرزبان[‡] Ph.D.
بهروز نیکنفس^{*} Ph.D.

^{*} دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، گروه علوم تشریح

[†] دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه علوم تشریح

[‡] آدرس مکاتبه: تهران، صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۷۳۱۳، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه علوم تشریح

چکیده

*** هدف:** استاده از هورمون دگراماتازون برای القای استخوانسازی (Osteogenic Differentiation) در سلولهای استرومایی مغز استخوان رت و ایجاد ندول استخوانی در محیط کشت *In Vitro*

**** مواد و روشها:** سلولهای مغز استخوان از رنای نر بالغ (۴ تا ۶ هفتگی) نژاد Spruge-Dawely به دست آمد و به مدت ۷ روز در کشت اولیه رشد داده شد. سپس سلولهای استرومایی مغز استخوان پاساژ داده شده و به مدت ۲۰ روز کشت ثانویه انجام شد. محیط کشت استفاده شده از نوع Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) بود که توسط ۱۵ درصد سرم جنبن گاوی (FCS: Fetal Calf Serum) آنتی بیوتیکها و اسید آسکوریک تکمیل شد. در گروههای آزمایش به محیط فرق الذکر، ۱۰-۸ مول به دگراماتازون (DEX: Dexametjapsme) تنهایی یا همراه با ۱۰ میلی مول استاگلبروففات سدیم (Na-βGP: Na-βGlycerophosphate) اضافه شد. کشتها به طور روزانه توسط میکروسکوپ فاز متضاد بررسی شد. برای تشخیص دقیق سلولها از رنگ آمیزی تولوئیدین بلور و کربزیل ویولت استفاده شد و رنگ آمیزی با Alizarin Red S برای مشخص نمودن ندولهای معدنی شده به کار رفت.

***** یافته‌ها:** در کشتهای اولیه، سلولهای استرومایی تا روز پنجم شکل کلونی دادند و تا انتهای روز هفت، کلونیها بهم متصل شدند. در کشتهای ثانویه فاقد Dex، کلونیهای سلولهای استرومایی شکل شده در روز دوم پس از سه تا پنج روز بهم متصل شدند ولی در حضور Dex کلونی‌های سلولی به مرحله تلاقي ترسیدند و جزایر مجزایی از سلولها را شکل دادند. در روز هشتم در مرکز این جزایر، تجمعات سلولهای چند سطحی مشاهده شد که با گذشت زمان، وسعت آن افزایش یافت. در روز ۱۱ تا ۱۱ ساختمانهای ندول شکل مه بعدی مشاهده گردید.

****** نتیجه‌گیری:** حضور Dex و Na-βGP به طور همزمان در محیط کشت منجر به شکل ندول استخوانی می‌شود. از این سیستم کشت می‌توان برای مطالعات دیگر از قبیل بررسی تأثیرات هورمونی بر روی روند استخوانسازی بهره‌مند شد.

كل واژگان: دگراماتازون، مغز استخوان، استخوانسازی، کشت، رت، (MSCs) Mesenchymal Stem Cells

مقدمه

برای بازسازی مجده استخوانها^۱ و ترمیم شکستگیهای استخوانی نیاز به منبعی از سلولهای استثوابلاست است که یکی از مهمترین منابع تأمین کننده این سلولها، مغز استخوان (BM)^۲ است (۳، ۴).

مغز استخوان از اجزای متعددی تشکیل شده که عبارتند از عناصر خونی، سلولهای آندوتیبال و سلولهای استرومایی (۴، ۵). سلولهای استرومایی جمعیتی از سلولهای شبه فیبروبلاست هستند که اصل‌الاحصار سلولهای ریشه مراتشیسی (MSCs) چند استعدادی گفته می‌شوند و تحت تأثیر فاکتورهای مناسب قادر هستند به سلولهای پرورزیتور مراتشیسی تمایز یابند (۱، ۴، ۷، ۶، ۹، ۸، ۷، ۶، ۱۰).

تاکنون فاکتورهای متعددی شناخته شده‌اند که دارای تأثیرات تنظیمی روی فعالیت سلولهای استثوابلاست و پیش‌سازهای آنها هستند. گلوکوکورتیکوئیدها و پروتئینهای شبک دهنده استخوان (BMPs)^۳ از جمله عواملی هستند که بیان شانگرهای فتوپیک استثوابلاست را در استثوابلاستهای نابالغ و پیش‌سازهای آنها القا می‌نمایند (۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶).

مکانیمهایی که توسط آنها گلوکوکورتیکوئیدها روی استخوانسازی تأثیر می‌گذارند، کما کان تحت بررسی است؛ بهر حال گلوکوکورتیکوئیدها بیان ژنی را در تسايز سلولها تنظیم می‌نمایند (۴). نشان مطالعات هدفی *in vitro* و *in vivo* در این است که سلولهای استخوان برای هورمونهای گلوکوکورتیکوئید بوده و این هورمونها بر روی تزايد و تسايز سلولهای استوئیک تأثیر می‌گذارند (۲) که این تأثیر بسته به گونه‌های مختلف حیوانی و همچنین مقدار هورمون مورد استفاده متفاوت است (۵).

تجارب *in vitro* سلولهای استثوابلاست پرورزیتور کالواریای جنینی رت نشان داده است که مجاورت این سلولها با مقدار معنی از دگراماتازون قدرت بالاتر (Dex) (نوعی گلوکوکورتیکوئید مصنوعی) با تأثیر به کورتیزول؛ ساعت‌القای تسايز در این سلولها شده و در نهایت ندول استخوانی تشکیل می‌شود (۵، ۷، ۶، ۸).

با توجه به تأثیرات نظمی گلوکوکورتیکوئیدها روی سلولهای استوئیک و پیش‌سازهای آنها، در این تحقیق سعی بر آن است که از خاصیت القاکنندگی هورمون دگراماتازون برای القای تسايز سلولهای ریشه مراتشیسی مغز استخوان، برای تشکیل ندول استخوانی در محیط کشت استفاده شود. نتایج حاصل از این تحقیق برای بررسی مراحل استخوانسازی در محیط کشت قابل استفاده است.

همچنین می‌توان از سلولهای استثوابلاست و ندولهای استخوانی حاصل از آنها برای موارد بالینی مانند ترمیم خایعات استخوانی پیش‌گفتند شد.

مواد و روشها

جمعیت مورد مطالعه

در این پژوهه، نمونه‌های مغز استخوان از استخوان ران

- ۱. رت‌های نر بالغ (سن ۴ تا ۶ هفتگی به وزن ۱۰۰-۱۲۰ گرم) نژاد Spruce-Dawely به دست آمد (۱۱، ۱۲، ۱۳). در مجموع از ۲۴ سررت در ۴ گروه شش تایی (دو گروه شاهد و دو گروه آزمایش) استفاده شد.
- ۲- ۱- گروه شاهد شماره ۱: کشت اولیه سلولهای مغز استخوان، سپس کشت ثانویه سلول‌های استرومایی بدون استفاده از Dex و Na-β-GP
- ۲- ۲- گروه شاهد شماره ۲: کشت اولیه سلولهای مغز استخوان، سپس کشت ثانویه سلول‌های استرومایی با اضافه کردن ۱۰ میلی‌مول Na-β-GP
- ۳- ۱- گروه آزمایش شماره ۱: کشت اولیه سلولهای مغز استخوان، سپس کشت ثانویه سلول‌های استرومایی با اضافه نمودن ۱۰ مول Dex
- ۳- ۲- گروه آزمایش شماره ۲: کشت اولیه سلولهای مغز استخوان، سپس کشت ثانویه سلول‌های استرومایی با اضافه کردن ۱۰ میلی‌مول Na-β-GP و ۱۰ مول Dex به طور همزمان (۱۷، ۱۸).


تهیه سلولهای مغز استخوان

حیوانها با استفاده از کلروform (Over dose) کشته شده و استخوانهای ران آنها در شرایط استریل خارج و باقیهای نرم آنها بدقت جدا شد. سپس چهار مرتبه و هر بار به مدت ۱۰ دقیقه در HBSS^۴ که محیط غلظت بالایی از آنتی‌بیوتیکها بود، شستشو داده شد. برای تخلیه مغز استخوان، استهای پروگریمال و دیستال استخوانها، توسط استخوانی طریق قطع شد و مغز استخوان توسط سرنگ ۱۰ میلی‌لتری (محتوی ۱۰ میلی‌لتر محیط کشت) و از طریق سورزن نمره ۲۰ به داخل فلاسک پلاستیکی ۷۵ سانتی‌متر مربعی (۲۵۰ میلی‌لتری) تخلیه شد. برای تهیه سوسپانسیون سلولی، سلولها به وسیله طریق سورزن نمره ۲۰ چند مرتبه آسپیره شدند (۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۷).

کشت اولیه سلولهای مغز استخوان

بعد از تهیه سوسپانسیون سلولی از مغز استخوان، سلولها به مدت یک هفته در فلاسک DMEM (DMEM) در یک انسفر مرتروب (محتوی ۱۰ میلی‌لتر محیط ۵ درصد دی اکسید کربن و رطوبت نسبی ۱۰۰ درصد و درجه حرارت ۳۷ سانتی‌گراد) انکوبه شدند. به این محیط کشت ۱۵ درصد سرم جنین گاوی (FCS) و ۵۰ میکروگرم در میلی‌لتر آسید آسکوربیک و آنتی‌بیوتیکها اضافه شد. آنتی‌بیوتیکهای مورد استفاده شامل: ۱۰۰ میکروگرم در میلی‌لتر پنی‌سیلن G، ۵۰ میکروگرم در میلی‌لتر جستاماپین سولفات و ۳ درصد سبک و گرم در میلی‌لتر فونجیزون بود (۱۹).


1. Bone remodeling
2. Bone Marrow
3. Bone Morphogenic Proteins
4. Hanks Balanced Salt Solution



شکل ۱b: کلونی سلولهای استرومایی مغز استخوان


به سلول گرد نکتهای (↑) توجه کنید (رنگ آمیزی کربیزیل و بیوت). میکروسکوپ فاز منضاد، بزرگنمایی $\times 120$.

کلونیهای سلولی در کشت اولیه تا انتهای روز هفتم بهم متصل شدند (شکل ۲).



شکل ۲: کشت اولیه سلولهای استرومایی در روز هفتم

کلونیهای سلولی بهم متصل شده و یک لایه سلولی را در سطح کشت تشکیل داده‌اند (میکروسکوپ فاز منضاد) شکل ۲b: رنگ آمیزی تولوئیدین بلو، بزرگنمایی $\times 60$.



شکل ۲b: رنگ آمیزی کربیزیل و بیوت بزرگنمایی $\times 120$.

1. Ethylenediamine Tetraacetic Acid

* کشت ثانویه سلولهای استرومایی مغز استخوان بعد از گذشت یک هفته از کشت اولیه، سلولهای استرومایی مغز استخوان با استفاده از تریپسین $0.25\text{ mg}/\text{ml}$ در صد هسراه با ۱ میلی مول EDTA^۱ از سطح کشت جدا شد (۱). سه سلولها توسط همایش‌نامه شمارش شده و در فلاسک پلاستیکی 25 ml سانتی‌متر مربعی ($50\text{ ml}/\text{lتری}$) در تراکمی برابر با 4×10^7 سلول در DMEM سانتی‌متر مربع (1×10^5 سلول در هر فلاسک) در محیط کشت FCS، اسید آسکوربیک و آنتی‌بیوتیکها (به میزانی برابر با مقادیر استفاده شده در کشت اولیه) بود، به مدت ۲۰ روز کشت داده شد. در گروههای آزمایش به محیط فوق الذکر، 10^{-8} مول Dex به تهابی با هسراه با 10^{-6} میلی مول Na β -GP اضافه شد.

بررسی کشتها


۱- کشت‌های اولیه و ثانویه هر روز روزانه با میکروسکوپ فاز منضاد بررسی شدند. برای تشخیص دقیق سلولها، برخی از کشتها به طور در جا توسط الکل 70% در صد ثبت شده و با تولوئیدین بلو یا کربیزیل و بیوت 1% در صد رنگ آمیزی شدند.

۲- برای تشخیص ندولهای معدنی شده کشت‌های ثانویه در روز 15 و 20 به طور در جا توسط الکل 70% در صد ثبت شده و توسط یک درصد، رنگ آمیزی شدند.


یافته‌ها

* نتایج حاصل از کشت اولیه

سلولهای استرومایی مغز استخوان در کشت اولیه پس از سه روز به سطح کشت چسبیده و در روز پنجم، کلونی شبه فیبرولاستی را تشکیل دادند. اشکال سلولهای استرومایی در محیط کشت از فرم دوکی شکل فیبرولاست تا سلولهای چند سطحی متغیر بود. سلولهای گرد نکهای که از اجزای خونساز مغز استخوان است نیز در محیط کشت مشاهده شد (شکل ۱).




شکل ۱a: کشت اولیه سلولهای استرومایی مغز استخوان رت در روز سوم توجه کنید، که شکل این سلولها از فرم دوکی شکل تا چند سطحی متغیر است (رنگ آمیزی کربیزیل و بیوت، میکروسکوپ فاز منضاد، بزرگنمایی $\times 120$).




شکل ۵: کشت ثانویه سلولهای استرومایی در حضور Dex¹⁰ در روز هشتم به تجمعات ساوهای چند سطحی در مرکز گلوبنی توانسته شد (میکروسکوپ فاز متفاصل) شکل ۵۰: بزرگنمایی $\times 120$

* نتایج حاصل از کشت ثانویه سلولهای استرومایی تریپلنه شده حاصل از کشت اویه پس از گذشت یک روز به سطح کشت چیدند. در نمونه‌های شاهد، گلوبنی سلولی که در روز دوم تشکیل شده بود، در روز سوم تا پنجم بهم پیوستند (شکل ۳).




شکل ۳: کشت ثانویه سلولهای استرومایی در روز پنجم (نمونه شاهد، رنگ آمیزی کربیزلوپلات، میکروسکوپ فاز متفاصل، بزرگنمایی $\times 120$)

گلوبنی سلولی در نمونه‌هایی که در حضور Dex به تهایی با همراه با Na- β GP کشت داده شدند به مرحله تلاقی ترسیدند. این کشتهای جزایر مجزا یا بهم متصل شده‌ای از سلولها را تشکیل دادند که به بیزان و سبی روی سطح فلاسک پراکنده شده بودند (شکل ۴).




شکل ۴: بزرگنمایی $\times 25$

ساختمانهای ندولی شکل سه بعدی که در ظاهر گذر بودند، ۲ تا ۳ روز بعد در کشتهای مشاهده شدند که هر دو ماده Dex و Na- β GP به طور همزمان ستاده شده بود (شکل ۶).



شکل ۴: کشت ثانویه ساوهای استرومایی در روز پنجم در حضور Dex توکه کشید که گلوبنی سلولی بهم متصل شده‌اند (رنگ آمیزی کربیزلوپلات، میکروسکوپ فاز متفاصل، بزرگنمایی $\times 120$)

در روز هشتم تجمعات متراکمی از سلولهای چند سطحی در مرکز این جزایر مشهود بود ولی در انواع دیگر کشتهای ثانویه مشاهده شد. این تجمعات در یک صفحه کانونی متراکم شدند از صفحه چند لایه سلول مجاور قرار گرفته بود و با گذشت زمان، اندازه آن افزایش پافت (شکل ۵)




شکل ۶: ندولهای استندوانی تشکیل شده در مسحیط کشت در روز چهاردهم (رنگ آمیزی Alizarin Red S، میکروسکوپ فاز متفاصل) شکل ۶: بزرگنمایی $\times 25$

با گذشت زمان، تعداد آنها افزایش یافت. مطالعات قبلی ثان داده است که استفاده از هورمونهای گلوكورونیکیدی در محیط کشت سلولهای مغز استخوان، باعث افزایش فعالیتهای متابولیک مانند افزایش سنتز آکالین ففاتاز و کلارن نوع ۱ در *MSCs* می‌شود که شانه تمایز این سلولها به سلولهای استئوبلاست است (۱۸، ۱۹). بنابراین به نظر می‌رسد که این سلولهای چند سطحی، سلولهای شبه استئوبلاست حاصل از تمایز سلولهای استرومایی باشند. ۲ تا ۳ روز بعد از این مرحله، ساختهای این ندولی شکل سه بعدی که در زیر میکرو-کوب فاز متضاد کدر به نظر می‌رسید، در کشت‌های مورد آزمایش مشاهده شد، که شانده ندن معدنی شدن ندولهای تشکیل شده بود. رنگ آمیزی با Alizarin Red S معدنی کرد که معدنی شدن ندولها ابتدا در مرکز اتفاق می‌افتد و سپس به طرف محیط گسترش می‌باید. نکته قابل تأمل، این است که ندولهای معدنی شده فقط در کشتهای مشاهده شد، که به طور همزمان هر دو ماده α -GP و β -GP به آنها اضافه شده بود. تجارت قبلي (۲۱) شان داده است. که α -GP (نوعی ففات ارگانیک) منع القوهای از یونهای ففات را در محیط کشت فراهم آورده و موجب معدنی شدن ندولها می‌شود؛ همچنین در حضور α -GP استئوبلاستها فعالتر شده، کلارن پیشری سنتز می‌نمایند (۲۱).

یافته‌های ما با یافته‌های Tibone و Bernard (۲۲) و Howlett و همکارانش (۲۳ و ۲۴) که تشکیل پلاکهای معدنی شده (نه ندولهای شبه استخوانی) را در کشت سلولهای مغز استخوان توصیف کرده‌اند و همچنین با یافته‌های Luria و همکارانش که معتقد بودند برای تشکیل ندول استخوانی در محیط کشت حضور گلیه سلولهای مغز استخوان لازم است و سلولهای استرومایی به تهایی قادر به تمایز یافتن به سلولهای استئوبلاست نیستند (۲۵)، مغایرت دارد. لازم به توضیح است که روش کار در این تحقیق با روشن تحقیق محققین دیگر تفاوتی نداشته و اختلاف تنها در نوع محیط کشت مورد استفاده است. به طوری که در این بررسی از محیط کشت DMEM استفاده شد در حالی که محیط کشت مورد استفاده توسط محققین α -MEM بوده است. بنابراین چنین به نظر می‌رسد که سلولهای استرومایی برای رشد و تمایز خود نیاز به اجزای دیگر مغز استخوان به عنوان سلولهای تعذیبه کننده^۱ داشته باشند.

علاوه بر موارد فوق الذکر، تأثیر سرم (FCS) در کشت‌ها ناید نادیده گرفته شود. با توجه به اینکه FCS محتوی هورمونها و فاکتورهای رشدی فراوانی است که در تمایز سلولها دخالت دارند (۲۶)، افزودن Dex به عنوان یک مکمل به محیط کشت می‌تواند تأثیر آنها را در تمایز سلولها تشدید نماید.

با استناد به نتایج این مطالعه و با توجه به شیوع ضایعات استخوانی، به نظر می‌رسد که تحقیق حاضر زمینه ساز مطالعات و تحقیقات گسترده‌تری پاشد که در موارد بالینی بتواند نیازهای مربوطه را بر طرف سازد. برای تکمیل این مطالعه، پیشنهاد می‌گردد که روش‌های ارزیابی دیگری مانند روش‌های هیستوشیمی و بررسیهای فرا ساختمانی به کار می‌رود.



شکل ۶: بزرگنمایی ۱۰۰×

رنگ آمیزی در جا با Alizarin Red S شان داد که این ندولهای کدر با پستی معدنی شده باشند. با گذشت زمان در نتیجه رسوب مواد معدنی، ندولها متراکم شدند. رنگ آمیزی ابتدا در میکر ندولها ظاهر شد و سپس با گذشت زمان به طرف محیط ندولها گسترش یافت.

بحث

در این تحقیق سلولهای استرومایی مغز استخوان در کشت اولیه پس از گذشت ۳ روز به سطح کشت چسبیده و در روز پنجم کلونیهای سلولی شبه فیروپلاستی، تشکیل دادند که در انتهای روز هفتم این کلونیها به هم متصل شدند. در مطالعات قبلی با استفاده از محیط کشت α -MEM زمان لازم برای تشکیل کلونی شبه فیروپلاستی هر هفت روز گزارش شده بود (۱۹) که احتمالاً علت این امر مربوط به نوع محیط کشت مورد استفاده است؛ زیرا محیط‌های پایه محتوی مواد تغذیه‌ای مختلفی هستند که روی سرعت تقسیم سلولهای استئوبلاستیک تأثیر می‌گذارند (۲۰).

نتایج حاصل از کشت ثانویه شان داد که کلونیهای سلولهای استرومایی در نمونه‌های شاهد بعد از ۳ تا ۵ روز بهم می‌پیوندند در حالی که در نمونه‌های آزمایش که Dex در مقداری فیزیولژیک (۱۰⁻۸ مول) به محیط کشت اضافه شد، کلونیهای سلولی به مرحله تلاقی نرسیدند و جزایر مجزایی از سلولها را شان دادند. این مسئله شان می‌دهد که Dex در این شرایط باعث مهار تزايد سلولهای استرومایی می‌شود. مطالعات قبلی که با *MSCs* انسانی صورت گرفته بود، شان می‌داد که افزودن Dex در مقداری فیزیولژیک باعث تحریک تزايد سلولهای استرومایی است (۲۱) که علت آن می‌تواند مربوط به عملکرد گونه‌های مورد آزمایش در پاسخ دهنده به Dex باشد.

در روز هشتم، نمونه‌های آزمایشی که حاوی Dex بود، در مراکز جزایر سلولی، تجمعاتی از سلولهای چند سطحی مشاهده شد که

References

- Phoebe Leboy, Jn N Beresford, Carole Devlin Maureen E Owen: Dexamethasone induction of osteoblast mRNA in rat marrow stromal cell cultures. *J Cell Physiol* 1991; 146: 370-378
- Owen M: Lineage of osteogenic cells and their relationship to the stromal system, WA peack (ed). in: *Bone and Mineral/3*, 1985
- Friedenstein AJ: Precursor cells of mechanocytes. *INT REV Cytol* 1976; 47: 327-359
- Neelam Jaiswal, Stephen E, Haynesworth, Arnold I, Caplan and Scott, Bruder: Osteogenic Differentiation of Purified, Culture-Expanded Human Mesenchymal Stem cells In Vitro. *J Cell Biochem*, 1977; 64: 295-312
- Caplan AI: Mesenchymal Stem cells. *J Orthop Res* 1993; 9: 641-650
- Caplan AI: Porous ceramic vehicles for rat-marrow-derived osteogenic cell delivery: effects of pretreatment with fibronectin or laminin. *J Oral Implantol* 1993; 19: 106-115
- Dennis JE, Haynesworth SE, Young RG, Caplan AI: Osteogenesis in marrow- derived mesenchymal cell porous ceramic composites transplanted subcutaneously: effect of fibronectin and laminin on cell retention and rate of osteogenic expression. *Cell Transplant* 1992; 1: 23-32
- Lenon DP, Haynesworth SE, Young RG, Dennis JE, Caplan AI: A chemically defined medium supports in vitro proliferation and maintains the osteochondral potential of rat marrow- derived mesenchymal stem cells. *Exp Cell Res* 1995; 219: 211-222
- Francis J, Hughes, Christopher AG, Mc Culloch: Stimulation of the differentiation of osteogenic rat bone marrow stromal cells by osteoblast cultures. *Lab Invest* 1991; 64: 617-622
- Kassugai S, Todescan R, Nagata T, Yao KL: Expression of bone matrix proteins associated with mineralized tissue formation by adult rat bone marrow cells in vitro: inductive effects of dexamethasone on the osteoblastic phenotype. *J Cell Physiol* 1991; 147, 111-120
- Benyahu D, kletter Y, Zipori D, Wientroub S: Bone marrow - derived stromal cell line expressing Osteoblastic phenotype in vitro and osteogenic capacity in vivo. *J Cell Physiol* 1989; 140: 1-7
- Celeste AJ, Iannazzi JA, Taylor RC, Hewick RM, RM, Rosen V, Wange: Identification transforming growth factor β family members present in bone-inductive protein purified from bovine bone. *Proc Natl Acad Sci, USA* 87, 1990; 9843-9847
- Chen TI, Bates RL, Dudle A, Hammonds RG, Jr, Amento EP: Bone Morphogenic Protein-2 b Stimulation of growth and osteogenic Phenotypes in rat osteoclast-like cells: Comparison with TGF- β . *J Bone Miner* 1991; Res 6: 1387-1393
- Hiraki Y, Inoue H, Shigeno C, Sanma Y, Bentz H, Rosen DM, Asada A, Ausvki F: Bone morphogenic proteinis (BMP-2 and BMP-3) promote growth and expression of the differentiated Phenotype of rabbit chondrocytes and osteoblastic MC3T3-E1 cells in vitro. *J Bone Miner Res* 6, 1991; 1373-1385
- Ktagiri T, Yamaguchi A, Ikeda T, Yoshiki S, Wozney JM, Rosen V, Wang EA, Tanaka H, Omura S, Uda T: The nonosteogenic mous pluripotent cell line, C3H10T1L2, is induced to differentiate into osteoblastic cells by recombinant human bone morphogenic protein -2. *Biochem Biophys Res Commun* 1990; 172: 295-299
- Yamaguchi A, Katugiri T, Ikeda T, Wozney JM, Rosen V, Wang EA, Kahu AJ, Suda T, Yoshiki S: Recombinant human bone morphogenic protein -2 stimulates osteoblast maturation and inhibits myogenic differentiation in vitro. *J Cell Biol* 1991; 113: 681-687
- Green S, Chambon P: A superfamily of potentially oncogenic hormone receptors. *Nature* 1986; 324: 615-617
- Bellows CG, Aubin JE, Heersche JNM: Physiological concentrations of glucocorticoids stimulate formation of bone nodules from isolated rat calvaria cells in vitro. *Endocrinology* 1987; 121: 1985-1992
- Maniatopoulos C, Sodek J, Melcher AH: Bone formation in vitro by stromal cells obtained from bone marrow of young adult rats cell tissue. *Res* 1988; 254: 317-330
- Lennon DP, Haynesworth SE, Young RG, Dennis JE: Caplan proliferation and maintains the osteochondral potential of rat marrow- derived mesenchymal stem cells. *Exp Cell Res* 219: 211-222
- Tenenbaum HC: Role of organic phosphate in mineralization of bone in vitro. *J Dentale Res* 1981; 60: 1586-1589
- Tibone KW, Bernard GW: A new in vitro model of intramembranous osteogenesis from adult bone marrow stem cells. in: Dixon AD, Sarnot BG (eds). Factors and mechanisms influencing bone growth.



Alan R. Liss Inc, New York, 1982, pp 107-123
23. Howlett CR, Owen M, Cave J, Williamson M, Bab I, Maybees, Trifitjt: In vitro mineralization and alkaline phosphatase activity in cultures of rabbit bone marrow cells. Calsif Tissue Int 39 1984; suppl 2: S 67
24. Howlett CR, cave J, Williamson M, Farmer J, Alisy Bab I, Owen ME: Mineralizatoin in in vitro cultures of rabbit marrow stromal cells. Clin Orthop 1986; 213:

251-263
25. Luria EA, Owen ME, Friedenstain AJ, Morris JE, Kuznetsow SA: Bone Formation in organ cultures of bone marrow. Cell Tissue Re 1987; 248: 449-454
26. Qu Q, Perala M, Heape A, Kapanen J, Dahlund J, Salo HK, Vaananen, Harkonen P: Estrogen enhances differentiation of osteoblasts in mouse bone marrow culture. Bone 1998; 22: 201-209

