

# مطالعه گلیکوکونزروگه‌های سطح سلول و ترکیبیهای ماده خارج سلولی در روند تکامل قرنیه

محمد رضا عرب<sup>\*</sup><sup>†</sup>, طاهره طلائی خوزانی<sup>\*</sup><sup>‡</sup>, علیرضا فاضل<sup>\*</sup><sup>Ph.D.</sup>

<sup>\*</sup> دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده پزشکی، گروه علوم تشریح

<sup>†</sup> دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پزشکی، گروه علوم تشریح

<sup>‡</sup> دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه علوم تشریح

<sup>\*</sup> آدرس مکاتبه: زاهدان، صندوق پستی ۹۸۱۳۵-۳۹۶، دانشکده علوم پزشکی، گروه علوم تشریح

## چکیده

**\* هدف:** شناسایی قندهای انتهاهی سطح سلول و ترکیبیهای ماتریکس خارج سلولی در طی روند تکامل قرنیه  
**\* مواد و روشهای:** پنجاه رت باردار انتخاب شده و زمان مشاهده پلاک واژینال به عنوان روز صفر بارداری در نظر گرفته شد. نمونه‌های جنبی از روز یازدهم تا بیست و نوزادان یک تا پانزده روزه جمع آوری شدند. بلوکهای پارافینی تهیه شده با ضخامت ۵ تا ۶ میکرومتر بریده شدند و سپس مقاطع با روشهای هیستوشیمی (آلین بلودر HMs) مختلف به همراه روش تغییر بحرانی غلظت یون متیزیم و تری کروم ماسون) و لکبینی (PNA, BSA1-B4, S/PNA) و رنگ آمیزی شدند. سه مقاطع برآسانس شدت رنگ آمیزی و به صورت مجزا رتبه‌بندی شدند. برای مطالعه آماری از تست Mann-whithney استفاده شد.

**\* یافته‌ها:** واکنش‌های لکبینی حضور قندهای انتهاهی Gal/GalNac و D-Gal در قرنیه در حال تکامل نشان داد. کاربرد آنزیم سیالیداز تأثیری در واکنش قرنیه به لکبین PNA ایجاد نکرد. مطالعات هیستوشیمی وجود غلظتها متفاوتی از اسید هیالورونیک، کندررواپتین سولفات، ترکیبیهای قندهای خشی، گلیکوز آمینو گلیکانهای اسیدی کربوکسیله و سولفاته و عناصر رشته‌ای ماتریکس مثل رشته‌های کلائز را در قرنیه نشان داد. افزایش ضخامت رشته‌های کلائز در قرنیه از خلف به قدام بود. با وجود اختلاف شدت رنگ آمیزی میان اجزای ماتریکس خارج سلولی، مطالعات آماری تنها برای ترکیبیهای قندهای خشی اختلاف معنی داری را بین روزهای بررسی نشان داد ( $P < 0.05$ ).

**\* نتیجه‌گیری:** به نظر می‌رسد در قرنیه زمان ظهور ترکیبیهای قندهای سطح سلول و ترکیبیهای ماده خارج سلولی و همین طور میزان آنها از یک الگوی مکانی زمانی تبعیت می‌کند که مجموعه تغییرات هماهنگ فوق زمینه ساز ریخت زائی و وقایع ریخت شناختی مربوط به آن در طی تمایز قرنیه است.

گل واژگان: قرنیه، قندهای انتهاهی، گلیکوکونزروگه، ماتریکس خارج سلولی، گلیکوز آمینو گلیکان

## مقدمه

قرنیه یکی از محیطهای شفاف و غیر عروقی کره چشم است که از اکندرم سطحی مشاً می‌گیرد (۱، ۲). قرنیه پس از تمايز عدسي شکل می‌گیرد؛ بدین ترتیب که اپتیلیوم قرنیه، استرومای اولیه‌ای را ترشح می‌کند که محتوی کلاژن و گلیکوز‌آمینوگلیکان است. سلولهای سینه عصبی در فضای میان حباب عدسي (LV<sup>۱</sup>) و استرومای اولیه، اندوتلیوم قرنیه را به وجود می‌آورند. این اندوتلیوم هیالورونان را به داخل استرومای اولیه، ترشح می‌کند که موجب اتساع آن شده و استرومای اولیه را برای ورود سلولهای مهاجر سینه عصبی آماده می‌سازد. اندوتلیوم پس از استقرار رشته‌های عصبی در قرنیه، تحت تأثیر تیروکسین ترشح شده از غده تیروئید، آنزیم هیالورونیداز را مستر و ترشح می‌کند که مسئول تراکم و شفافت قرنیه است (۳، ۴).

گلیکوز‌آمینوگلیکانها و اجزای رشته‌ای ماتریکس خارج سلولی نقش بسیار با اهمیتی در سازمان‌بندی استرومای قرنیه و چگونگی تمايز کراتومیتها دارند (۳). اجزای ماتریکس خارج سلولی نه تنها وظیفه حمایت از سلولها را به عهده دارند؛ بلکه برای انجام اعمال اختصاصی آنها بیشتر بسیار ضروری هستند (۵) و در تعديل میان کنشهای سلولی به هنگام مورفوژن بافتی دخالت دارند (۵، ۶). یکی از مکانیسمهای هستوژن بافتی، تماس فیزیکی میان سلولها در طی تکامل جنبشی است. واسطه این تماس فیزیکی ترکیبات فندی سطح سلول و مخصوصاً قندهای انتهایی آنها مثل فوکوز و گالاكتوز و اسید سیالیک است (۶، ۷). سلولهای جنبشی به هنگام تمايزهای بافتی، تغییراتی در قندهای انتهایی گلیکولپیدها و گلبکر پروتئنهای خود به وجود می‌آورند که این تغییرات همزمان با حادثه تکاملی ویژه‌ای در اعضا همراه است (۸). با وجود تحقیقات فراوانی که ناکنون برای شناسایی اجزای ماتریکس خارج سلولی و گلیکوکوتزوجه‌های سطح سلول صورت گرفته است؛ هنوز اطلاعات ما در این زمینه مهم بسیار محدود است (۹، ۱۰، ۱۱). آنچه موضوع را جالب توجه می‌کند تغییرهایی است که پس از فرآیندهای پاتولوژیک در ماتریکس خارج سلولی و قندهای انتهایی سطح سلول در بیماریهای چشمی به وجود می‌آید، به طوری که افزایش کندرایتین سولفات و کاهش اسید هیالورونیک در بیماری گلکزوم اولیه با زاویه باز<sup>۲</sup> نشان داده شده است. همچنین کاهش میزان آبیانی در بیماریهای قرنیه از به هم خوردن اجزای ماتریکس خارج سلولی است (۱۲). از آنجاکه لکتینها موادی با دقت و حساسیت بالا برای شناسایی قندهای انتهایی هستند، در این مطالعه توزیع طبیعی گلیکوکوتزوجه‌ها و اجزای ماتریکس خارج سلولی در روند تکامل قرنیه برسی شد. بدون شک تعیین توزیع طبیعی این ترکیبهای راه را برای درک حالات غیر طبیعی چشم و بیماریهای آن هموار می‌نماید.

## مواد و روشهای آماری

پنجاه سرت برای جفت‌گیری انتخاب شدند و زمان مشاهده پلاک واژینال به عنوان روز صفر بارداری در نظر گرفته شد. رتها در شرایط استاندارد از نظر دسترسی به آب و مواد غذایی، نور و تاریکی

(۱۲) ساعت روشناختی، (۱۲) ساعت تاریکی) و درجه حرارت (۲۲-۲۴° سانتی‌گراد و رطوبت قرار گرفتند. پس از بیهوشی عمیق نمونه‌های جنبشی از روز یازدهم تا بیست پس از جدا شدن از جفت و پرده‌های جنبشی جمع آوری شدند. در نوزادان یک تا پانزده روزه، چشم به دقت از سر و گردن جدا شد. نمونه‌ها در B<sub>4</sub>G و کارنوی و بوئن ثبت شدند و سپس مطابق روش معمول در بافت شناسی پاساژ داده شدند. مقاطع ۵-۶ میکرومتری باروروشهای همانوکسیلن التوزین، پاسام-آلسین بلو در pH=۲/۵، آلسین بلو در pH=۱، آلسین بلودر pH=۵/۸ به روش تغییر بحرانی غلظت متیزیوم، تولوئیدین بلو در بافر وونول با pH=۴/۵ و تری کروم ماسون رنگ آمیزی شدند.

**\* لکتین هیستوشیمی**  
لکتینهای PNA<sup>۳</sup> و B4-B<sub>4</sub>-BSA<sup>۴</sup> (سیگما) در بافر فسفات با غلظت ۱٪ مولار به میزان ۱۰ میکروگرم در میلی‌لیتر رقیق شدند. مقاطع پس از آبدهی و حذف پریگمان کلرید چبوه برای خشی کردن پراکسیداز درون بافتی به مدت ۵-۱۰ دقیقه در محلول آب اکسیژن یک درصد در متابول و سپس در انافق مرطوب به مدت دو ساعت در مجاورت لکتین فوق قرار گرفتند. پس از آن در محلول بافر فسفات که محتوی ۱/۳ درصد DAB<sup>۵</sup> و ۲٪ درصد آب اکسیژن بود قرار گرفتند. برای توقف واکنش DAB مقاطع ۱-۱۰ دقیقه در آب جاری شسته و برای رنگ آمیزی زمینه از آلسین بلو با pH=۲/۵ استفاده شد (۱۵، ۱۶، ۱۷).

**\* روش هضم آنزیمی سیالیداز و لکتین PNA**  
آنزیم سیالیداز (سیگما) در pH=۵ به میزان ۱٪ واحد در میلی‌لیتر رقیق شد. مقاطع به مدت ۱۸-۲۴ ساعت در الکرباتور ۳۷° سانتی‌گراد در مجاورت آنزیم قرار گرفتند و سپس مطابق روش اشاره شده در معرض لکتین PNA قرار گرفتند (۱۶).

**\* روشهای آماری**  
مقاطع رنگ آمیزی شده براساس شدت رنگ آمیزی به صورت مجزا رتبه‌بندی (جدول ۱) و سپس جداول مربوط به هر رنگ آمیزی تهیه و توسط آزمون Mann-whithney تجزیه و تحلیل شدند.

جدول ۱: رتبه‌بندی شدت رنگ آمیزی

رتبه	شدت رنگ آمیزی
-	رنگ دیده شد
- +	شدت رنگ بسیار کم
+	شدت رنگ کم
++	شدت رنگ متوسط
+++	شدت رنگ زیاد

1. Lens Vesicle


2. Primary open angle glaucoma

3. Peanut agglutinin

4. Banderia simplicifolia isolectin-B4

5. Diaminabenzidine


دی ساکارید Gal/Gal NAC در سطح رأسی اپیتلیوم قرنیه در روز بیستم جنبی به کمک لکتین PAN نشان داد که کاربرد آنژیم سپالیداز تأثیری در واکنش قرنیه به لکتین PAN ندارد؛ هر چند سپتوس وریدی اسکلرا به این لکتین باشد کمی پاسخ داد (فتو میکرو گراف ۲ و ۳).



شکل ۲: شمعونه روز نوزدهم جنبی؛ سپتوس وریدی اسکلرا (بینکان خود) وجود باشد حم به تعجب پس از خاربرد آنژیم سپالیداز پاسخ نشان داده است. (S/PNA) (ابزرگنمایی ۲۲۵)

اپیتلیوم قدامی تنهایای PAN از خود واکنش نشان داده و علاوه بر اپیتلیوم قدامی، استرومای قرنیه نیز در روز بیستم جنبی به لکتین از خود واکنش نشان داد (فتو میکرو گراف ۴).

100



شکل ۴: شمعونه روز بیستم جنبی؛ واکنش متشر و ضعیفی به لکتین BSA1-B4 در سریس استرومای قرنیه نشان داده شده است. (ابزرگنمایی ۱۰۰)


رنگ آمیزیهای هیستوشیمی وجود مقادیر متفاوتی از ترکیبها ماقریکس خارج سلولی مثل اسید هیالورونیک، کندر واپتین سولفات، ترکیبها قندی خشی، گلیکوز آمینو گلبکانهای سولفاته و کربوکسیله را در قرنیه نشان داد (جدول ۲).

با وجود تفاوت شدت رنگ آمیزی برای این ترکیبها، آنالیزهای آماری، تفاوت معنی دار در روزهای پرسی بررسی (Mann-whithney,  $P < 0.05$ ) نمودار ۱، جدول ۱). همچنین با وجود گروههای کربوکسیل و سولفات


## یافته ها

نکمال قرنیه از اکتودرم سطحی پس از شکل حباب عدسی آغاز می شود. سلولهای مهاجر سطحی عصبی در زیر این اپیتلیوم سطحی به صورت سلولهای دوکی شکل به نظر می رسد که در ایندا فواصل سلولی نسبتاً زیادی آنها را از هم دیگر جدا می کند.

به تدریج با کنار هم قوارگرفن این سلولها و کاهش فضاهای بین سلولی، استرومای قرنیه تشکیل می شود. با تشکیل استرومای قرنیه، اندوتلیوم قرنیه تیز از سلولهای مهاجر سطحی عصبی شکل می گیرد و به این ترتیب لایه های بیرون و دست تشكیل می شوند؛ به طوری که در روزهای پانزدهم تا هجدهم جنبی ساختمان میکروسکوپی قرنیه تکمیل می شود و با افزایش سن، ضخامت این لایه ها افزایش یافته و ماهیت اپیتلیوم قدامی به سنگفرشی مطبق غیر کراتینیه تغییر می نماید (فتو میکرو گراف ۱-۶) در حالی که در روز دوازدهم جنبی، سطح رأسی اکتودرم سطحی پیش ساز قرنیه به لکتین BSA1-B4 واکنش نشان می دهد و حضور قند انتهایی D-Gal در گلیکوکوتزوگهای آن مشخص می شود (فتو میکرو گراف ۱).




شکل ۱: شمعونه روز دوازدهم جنبی؛ واکنش سطح رأسی اکتودرم سطحی به لکتین BSA1-B4 (بینکان خود) نشان داده شده است. (ابزرگنمایی ۲۰۰)



شکل ۲: شمعونه روز بیستم جنبی؛ واکنش اپیتلیوم قدامی قرنیه و کبیسه مالتحمهای (بینکان خود) به لکتین PNA نشان داده شده است. (ابزرگنمایی ۲۲۵)

بخش‌های قدام و خلف قرنیه از نظر گلیکوز‌آمینوگلیکانها با هم متفاوت هستند (فتویکروگراف ۶).



شکل ۶: نمونه روز اول پس از شولد؛ ماهیت دو گانه شرکیهای استرومای قرنیه در این رنگ‌آمیزی کاملاً مشخص است (L=lens, C=cornea, R=retina) (بزرگنمایی ۱۰۰×).

## بحث


میزان ترکیهای ماتریکس خارج سلولی و زمان سنتز و ترشح آنها دارای اهمیت فوق العاده‌ای در روند کنترل شکل‌زایی در جنبه‌ی است. اسید هیالورونیک از اولین ترکیهایی است که در روند ریخت زایی چشم و اعضای دیگر مثل پوست و عروق خونی، سنتز و ترشح می‌شود. پس از آن، کندر واپیشن سولفات در ماتریکس خارج سلولی ظاهر شده و غشای پایه از اولین بخش‌هایی است که اجزای ماتریکس خارج سلولی در آن ظاهر می‌شود. کپسول عدسی و غشای پروخ در این زمینه دارای اهمیت اساسی برای تمایز صلبیه و قرنیه هستند (۲۰، ۱۸، ۶). وجود اسید هیالورونیک در قرنیه زمینه را برای ورود سلولهای ستیغ عصبی و تمایز آنها به کراتوتیها آماده می‌کند؛ چراکه این مولکول با خاصیت جذب آب به عنوان یک پستر هیدرودینامیکی عمل می‌کند و سبب مهاجرت و استقرار سلولهای ستیغ عصبی در قرنیه می‌شود، از طرف دیگر؛ کندر واپیشن سولفات مولکولی مهاری است که توقف سلولهای ستیغ عصبی و کثار هم قرار گرفتن آنها را پس از رسیدن به قرنیه سبب می‌شود، مطالعه حاضر وجود هر دو ماده فوق را در قرنیه نشان داد. به نظر می‌رسد که با وجود بینانهای کربوکسیل و سولفات در گلیکوز‌آمینوگلیکانهای قرنیه، این بینانها آنقدر به هم نزدیک نیستند که بتوانند با رنگ بازی، آبی تولوئیدین ماتکرومازی به وجود آورند.

دخالت گلیکوکوتز و گهای در فرآیند اتصال سلولها به هم، مهاجرتهای سلولی و هجین شکل‌گیری جام بینانی نشان داده شده و از طرف دیگر تغییر قندهای انتهایی این ترکیها در جریان ریخت زایی بافتی در چشم، قلب و گنادها مورد تأیید قرار گرفته است (۸، ۱۵، ۱۶، ۱۹، ۲۰). مطالعه حاضر ضمن تأکید بر نقش احتمالی این ترکیها در روند ریخت زایی بافتی، توزیع متفاوتی از این قندها روز دوازدهم جنبه‌ی ظاهر شده و با افزایش سن، نه تنها در اکتودرم سطحی بلکه در استرومای قرنیه نیز ردیابی شد؛ در حالی که دی‌ساکارید

در گلیکوز-آمینوگلیکانهای قرنیه در تمام روزهای بررسی، هیچ گونه واکنش ماتکرومازی در ترکیهای ماتریکس خارج سلولی مشاهده نشد.

جدول ۶: درجه بندی لامها بر اساس شدت رنگ آمیزی


ترکیبات	اسید	گلیکورامینو	گلیکورامینو	ترکیبات	مواد
قدی خشی	هیالورونیک	کلیکان کربوکسیل	هیالورونیک	هیالورونیک	روزها
+	++	+	+	+	E15-E17
++	++	+	-	+	E18-PN5
++	++	+	-	++	PN6-PN9
++	++	++	-	-	PN10-PN15



نمودار ۶: مقایسه شدت رنگ آمیزی برای ترکیبات قدی خشی در قرنیه

104

رشته‌های کلارن با رنگ‌آمیزی به روش تریکروماسون از روز نوزدهم جنبی به بعد در قرنیه مشاهده شد. با افزایش سن جنبی، قطر رشته‌های کلارن نیز افزوده شد و این روند از طرف اندوتبلوم قرنیه به طرف اپیتلیوم قدامی بوده و میزان واکنش در محل لیمیوس از سایر قسمتهای قرنیه بیشتر بود (فتویکروگراف ۵).



شکل ۷: نمونه روز دوازدهم جنبی؛ واکنش ضعیفی از استرومای قرنیه بروای اسید هیالورونیک در قرنیه نشان داده شده است. (بزرگنمایی ۲۰۰×).

همچنین در رنگ‌آمیزی پاس - آلسین بلور نیز به نظر می‌رسد

مهی بر عهده دارند (۳، ۲۱). اجزای تشکیل دهنده کره چشم دارای مثنا جنینی متفاوتی هستند که طی مکانیسم بسیار حساس و پیچیده‌ای به وجود می‌آیند که در این میان نقش اجزای ماتریکس خارج سلولی و گلیکوکوتزوفیک‌های سطح سلول بسیار بالاهمیت است. به نظر می‌رسد تغییرات ماده خارج سلولی و همچنین قندهای انتهایی سطح سلول از یک الگوی ویژه زمانی - مکانی تبعیت می‌کنند که این تغییرات زمینه‌ساز وقایع ریخت شناسی هنگام تمایزهای بافتی هستند. به نظر می‌رسد می‌توان پیشنهاد کرد که با مطالعه گلیکوکوتزوفیک‌ها و ماده خارج سلولی در تاشهاریهای مادرزادی و مقایسه آن با موارد طبیعی تکامل بتوان به نقش و اهمیت پیشتر این ترکیبها در مسیر تکامل پی برد.

## تقدیر و تشکر

نویسنده‌گان مقاله بدینوسیله مرتب سپاس خود را از معاونت محترم پژوهشی و ریاست داشتگاه پژوهشی مشهد که بودجه مالی این طرح پژوهشی را تأمین نمودند، ابزار می‌دارند، همچنین از سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به خاطر سفارش لکبها و رازین‌های مربوطه تشکر می‌گردد. به علاوه از خدمات پرسنل خانه حیوانات بیمارستان فائم (عج)، گروه علوم تحریری، ژنتیک و کتابخانه داشتگاه پژوهشی و سرکار خانم مجده تشکر و قدردانی می‌نماییم.

## References

1. Williams PL, Warwick R, DYson M, Bannister LH: Gray's Anatomy, 37ed Norwich, England, 1989, pp 201-204
2. Azuma N, Hirkata A, Hida T, Koshakan S: Histochemical and immunohistochemical studies on keratan sulfate in the anterior segment of the developing human eye. *Exp Eye Res* 1994; 58: 277-860
3. Bard J, Robbins SG, Wilson DJ: Immunolocalization of Integrins in the human retina. *Invest Ophthal Mol Vis Sci* 1994; 35(9): 3466-3472
4. Gilbert SF: Developmental biology. 5ed, Sianauer Associated Inc 1997; pp 279, 283, 672, 690
5. Lodish H, Baltimore D, Breck A, Zipursky SL: Molecular cell Biology. 3ed, Scientific American 1995; pp 1123-1200
- 6-Gullberg D, Ekblom P: Extracellular matrix and its receptor during development. *Int J Dev Biol* 1995; 39: 845-854
7. Snow DM, Watanabe M, Letourneau PC: A chondroitin sulfate proteoglycan may influence the direction of retinal ganglion cell outgrowth. *Development* 1991; 113: 1473-1485
8. Fazel AR, Schulte BA: Glycoconjugate unique to migrating primordial germ cell differs with genera.

فرینیه دیده شد و پس از کاربرد آنزیم سیالیداز در سینوس وریدی اسکلرا نیز ردیابی شد که نشان دهنده نقش احتمالی این دی‌ساکارید در روند تمایز فرینیه و سینوس وریدی اسکلرا است. مطالعه آماری در این تحقیق با وجود اختلاف میان تمام اجزای ماتریکس خارج سلولی، تها برای ترکیبها فندی خشی اختلاف معنی‌داری را بین روزهای پانزدهم تا هفدهم جنینی با روزهای ششم تا نهم پس از تولد نشان داد  $P<0.05$  (نمودار ۱).

به نظر می‌رسد میزان سنتز، زمان سنتز و الگوی توزیع اجزای ماتریکس خارج سلولی به هنگام ریخت زایی بافتی توسط میان کشتهای دقیق سلول - سلول و سلول - ماده خارج سلولی تنظیم می‌شود تا مجموعه این مواد به صورت بک مجموعه منظم در خدمت ریخت زایی باشند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه فرآیند افزایش قطر رشته‌های کلازن از خلف به قدام است، لذا می‌توان تصور کرد ترکیبها فندی خشی نقش با اهمیتی در تشکیل فیرهای کلازن و کنار هم قرار گرفتن رشته‌ها داشته باشند. وجود این مواد توسط محققین دیگر نیز گزارش شده است (۲۱) مطالعه Bard و همکاران نیز وجود عناصر رشته‌ای ماده خارج سلولی مثل کلازن تیپهای I-IV و هپارین سولفات و کندرواپتین سولفات را در فرینیه نشان داده است. محققین فوق نیز بر این نکته تأکید دارند که تمام این مواد در چگونگی آرایش رشته‌های کلازن و تمایز کرانتوسیتها نقش

- Anatom Rec 1990; 228: 177-184
9. Vandenbrule FA, Fernandes PL, Buicau C: Differential expression of galectin-1and galectin-3 during first trimester of human embryogenesis. *Dev Dyn* 1997; 1209: 1399-1405
10. Griffith CM, Willey MJ: Distribution of cell surface glycoconjugate during secondary neurolation in the chick embryo. *Anat Rec* 1990; 26: 81-90
11. Knepper PA, Groossens W, Hvizzd M, Palmberg PF: Glycosaminoglycans of the human Trabecular meshwork in primary open glucoma. *Invest Ophthalmol Visual Sci* 1996; 37 (7): 1360-1364
12. Yue BYJ: The extracellular matrix and its modulation in the trabecular meshwork. *Sur Ophthalmol* 1996; 40(5): 379-387
13. Ljibimov AV, Burgson RE, Butkowski RJ: Extracellular martix alteration in human corneas with bullous keratopathy. *Invest ophthalmol Visual Sci* 1996; 37 (6): 997-1007
14. Drury RAB: Carleton's histological techniques. 5ed Oxford Univ Press, 1980, pp 36-57
15. Fazel AR, schulte BA, Thompson RP, Spicer SS: Presence of a unique glycoconjugate on the surface of rat primordial germ cells during migration. *Cell*

Differentiation 1987; 21: 199-211

16. Fazel AR, Sumida M, schulte BA, Thompson RP: Lectin histochemistry of the embryonic heart: Fucose speacific lectin binding sites in deveoping rats and chicks. AM J Anat 1989; 184: 76-84  
17. Bland M: An introduction to medical statistics. Oxford medical publication, 1995, pp 60, 212, 250  
18. Berm RB, Robbins SG, Wilson DJ: Immunolocalization of integrins in the human retina. Invest Ophthalmol Visual Sci 1994; 35(9): 3466-3472

19. Alles AJ, Fazel AR, Spicer SS: Distribution of glycoconjugate in the optic Vesicle and optic cup. Anat Embryol 1990; 182: 611-670  
20. Buse B, Seifert H: Glycoconjugate expression during early mouse oculogenesis. Histochem J 1998; 30: 819-826  
21. Morris-kay G, Tuckelt F: Immunohistochemical localization of chondritin sulfate proteoglycans and the effects of chondroitinase ABC in 9-11 day rat embrvos. Development 1989; 106: 787-798

