

## بررسی فراساختار سلولهای اینترستیشیال کاخال در بیماری هیرشپرونگ

نغمه احمدیان کیا<sup>\*</sup>, یوسف صادقی<sup>†</sup>, M.Sc., Ph.D.

محمد بیات<sup>‡</sup>, حسین حقیر<sup>‡</sup>, Ph.D.

<sup>\*</sup>دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی

<sup>†</sup>آدرس مکاتبه: تهران، صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۴۲۱۹، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

<sup>‡</sup>دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی

### چکیده

دریافت مقاله: ۸۲/۸/۱۰، پذیرش مقاله: ۸۲/۸/۲۸، ۸۱/۵/۲۸

\* هدف: بررسی موقعیت آناتومیک و فراساختار ICC (Interstitial Cells of Cajal) در کولون بیماران مبتلا به بیماری هیرشپرونگ Hirschsprung's Disease

\* مواد و روشها: نمونه‌ها از قسمت‌های سالم و بیمار کولون ۱۰ کودک زیر ۱۰ سال که تحت عمل جراحی جهت درمان بیماری هیرشپرونگ قرار گرفته و قسمت دیستال کولون آنها برداشته شده بود تهیه شد. با آماده سازی نمونه‌ها برای مطالعه با میکروسکوپ الکترونی برشهای خیلی نازک تهیه گردید. سپس موقعیت و مورفولوژی ICC در قسمت مبتلا با قسمت سالم مقایسه شد.

\* یافته‌ها: در قسمت مبتلا ICC در موقعیت بینیانی بین Smooth Muscle Cells و انتهای‌های عصبی مشاهده نشد، در حالی که فراساختار آنها در قسمت مبتلا با قسمت سالم تفاوت عمده‌ای نداشت.

«نتیجه‌گیری: فقدان ICC در موقعیت بینیانی در قسمتها در قسمتها مبتلا با توجه به نقش مهاری آنها در عملکرد لایه عضلانی لوله گوارش می‌تواند توجیه کننده وجود اسپاسم در قسمت هبتلا باشد.

کل واژگان: سلولهای اینترستیشیال کاخال، بیماری هیرشپرونگ، سیستم عصبی روده

## مقدمه

اختلالات حرکتی لوله گوارش شایع هستند، و به دلیل اطلاعات محدود از فیزیوپاتولوژی و اتیولوژی آنها درمان علیقی آنها نظریاً محدود است و در مانهای علمی با هزینه‌های بالا تنها گزینه موجود برای این بیماران است (۱). بیماری هیرشرونگ (Hirschsprung's Disease; HD) که در آن گانگلیون‌های سیستم عصبی روده (سیستم مهاری) در قسمت مبتلای کولون وجود ندارد و همین امر سبب ایجاد اسپاسم شدید در این ناحیه از کولون شده و انتقال مواد در جاز اختلال می‌گردد. گفته می‌شود تعداد سلولهای اینترستیشیال کاخال نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای دارد (۲). سلولهای اینترستیشیال کاخال (Interstitial Cells of Cajal; ICC) اولین بار توسط Ramon Cajal در تحت عنوان سلولهای عصبی اولیه در اعصابی که (بروزه روده) بوسیله سیستم عصبی خودکار (Autonomic Nervous System; ANS) معرفی شد. مطالعات بعدی نشان داد که ICC انه نورومن است و نه نوروگلی. امروز ICC را به عنوان نوع خاصی از سلولهای اینترستیشیال در جذار لوله گوارش معرفی می‌کنند که به لحاظ ویژگی‌های فراساختاری شباهت‌هایی با سلولهای عضلانی دارند و بیشترین تراکم آنها مجاور شبکه‌های عصبی مشاهده می‌شود (۳). و به نظر می‌رسد نقش مهمی در کنترل حرکات روده ایفا می‌کنند (۵). نقش واقعی این سلولها هنوز دقیقاً مشخص نیست اما شواهدی مبنی بر عملکرد ICC با عنوان ضربان سازهای لوله گوارش و حد واسطه‌های مهاری بین سیستم عصبی روده‌ای و سلولهای عضلانی صاف مطرح گردیده است (۶، ۷).

با مشاهده موارد فوق، سلولهای اینترستیشیال کاخال ممکن است در پاتوفیزیولوژی اختلالات حرکتی روده‌ای نقش داشته باشند. در همین خصوص اختلال در توزیع این سلولها در تنگی هیرشرونگی شده دریچه پیلو معده نوزادان (۸)، شبه انداد نامعلوم مزمن روده (۹) و بیماری هیرشرونگ (۱۰) بررسی شده است.

از آنجاکه مشاهده و شناسایی سلولهای اینترستیشیال کاخال به وسیله میکروسکوب نوری یا مشکلاتی همراه است محققان برای مطالعه این سلولها از روشهای ایمونوهیستوشیمی و میکروسکوپی الکترونی استفاده می‌کنند. مرور بر مطالعات انجام شده نشان داد که در سالهای اخیر در کشورهای مختلف تحقیقاتی از زوایایی مختلف روی سلولهای اینترستیشیال کاخال در بیماری هیرشرونگ بوسیله میکروسکوب الکترونی انجام شده است که از جمله می‌توان به تحقیقات زیر اشاره نمود:

و همکاران فراساختار سلولهای اینترستیشیال کاخال را در کولون مبتلا و سالم یک بیمار بررسی کردند (۲). آنها در قسمت مبتلا دسته‌های ICC اکثرچه کرده اند که در زیر مخاط و در مجاورت داخلی ترین سلولهای عضلانی صاف مشاهده شده که دارای فیلامنتهای بنایی‌بندی و لی فیلامنتهای ضخیم مشاهده شده. سلولهای اینترستیشیال کاخال دارای تیغه پایه (Basal Lamina) کامل و کاوتولهای (Caveolae) اندکی بودند.

Watanabe و همکاران سلولهای دوکی شکل PGP9.5 بث را در ایلیوم بدون گانگلیون در نوع خاصی از موشهای صحرایی که بطور مادرزادی بدون گانگلیون بودند، بررسی کردند (۱۱). آنها مشاهده کردند که این سلولها دارای هسته هتروکروماتین بزرگ و پروفایلهای باریک سیتوپلاسمی بودند. ICC از طریق این پروفایلهای با سلولهای عضلانی صاف مجاور ارتباط داشتند، ارگانلهای این سلولها با سلولهای ICC یکسان بود و اتصالات باز با سایر سلولهای عضلانی صاف داشتند. Wedel و همکاران فراساختار فاسیکل‌های عصبی و اختلالاتی را در تیغه پایه در ده بیمار مبتلا به هیرشرونگ بررسی کردند (۱۲). آنها هیرشرونگی فاسیکل‌های عصبی و مولنی لامپاسیون تیغه پایه احاطه کنده زوائد گلبال و پری نوروسایتها و سلولهای عضلانی صاف را مشاهده کردند.


با مشاهده موارد فوق در تحقیق حاضر موقعیت آناتومیکی و فراساختار ICC در کولون طبیعی و مبتلا هیرشرونگ در کودکان ایرانی مراجعت کننده به دو بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سالهای ۱۳۷۸-۸۰ مطالعه شد.

## مواد و روشها

از ده کودک ایرانی مبتلا به هیرشرونگ که تشخیص بالینی و رادیوبلوژیک و گاهی تشخیص بر اساس بیوسی کولون هم داشتند با دامنه سنی ۲ تا ۱۰ سال و طی سالهای ۱۳۷۸-۸۰ در بیمارستان‌های آیت الله طالقانی و مقدم تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تحت عمل جراحی پیوتو و قرار گرفته بودند با رعایت اصول اخلاق پزشکی، نمونه‌های کولون تهیه و به شرح زیر برای مطالعه با میکروسکوب الکترونی انقلابی (Transmission Electron Microscopy; TEM) آماده شدند.


از قسمت‌های سالم و مبتلا کولون چندین نوار باریک در جهت حلقوی یعنی عمود بر محور طولی کولون برداشته شده، پرشاها درون پشمی دیش محتوی محلول بافر فشارات ( $pH = 7.4$ ) و در زیر استریو میکروسکوب باریکتر شده و حتی امکان لایه نخاطی حذف شد. نمونه‌های تهیه شده از قسمت سالم و مبتلا در مورد هر بیمار سطرور جداگانه برای فیکاسیون اولیه در وبالهای محتوی محلول فیکاتیور کارنوفسکی به مدت ۲ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد قرار گرفته، سپس جهت فیکاتیون ثانویه از محلول تراواکسید اسیموم ۱درصد در همان دما استفاده و بعد از آبگیری در محلول‌های اتانول با غلظت‌های بالا رونده، نمونه‌ها به کمک Propylen oxide توسط رزین اسپر اینفیتره و میس در همان رزین بلوک بندی شد. به منظور پلیمریزه شدن، رزین بلوک‌ها به مدت ۴۸ ساعت در oven (درجه حرارت ۶۰ درجه سانتی‌گراد) قرار داده شد.

اصلاح (Triming) و برش‌گیری با دستگاه اولترا میکروتوم Leica (Triming) ابتدا برشهای نیمه نازک (Semi thin) با ضخامت ۱-۲ $\mu m$  انجام شد. ابتدا برشهای نیمه نازک (Semi thin) با ضخامت ۱-۲ $\mu m$  تهیه، روی لام با محلول تولوئیدین بلورنگ آمیزی و با میکروسکوب نوری بررسی شدند. با مشاهده جایگاه موردنظر که شامل ضخامت لایه عضلانی جدار کولون بود در برشهای تهیه شده، بعد از اصلاح ثانویه



میکروگراف ۱: نمایی از ارگانهای سینتوپلاسمی ICC به همراه اتصالاتی از نوع تماس غشایی DB-نژدیک بین ICC با استطلاعی از ICC مجاور، هست.N. متونکتری M. اجسام متراکم DB کاوتولهای C. ریتیکولوم اندوپلاسمیک خشن RER. ریتیکولوم آندوپلاسمیک صاف SER. در کولون سالم. بزرگنمایی  $\times 14000$ .

میکروگراف ۲: نمایی از ارگانهای غشایی نژدیک نیز ICCs عمده‌تاً اتصالاتی از نوع تماس‌های غشایی نژدیک نیز داشته‌اند به این صورت که نواحی از غشای دو سلول، مجاور یکدیگر قرار می‌گیرند. این نوع تماس‌ها بین زویده‌های متعدد ICCs (میکروگراف ۳) و نیز بین ICC و تنه‌های عصبی و سلولهای عضلانی صاف مشاهده شدند.



میکروگراف ۲: نمایی از شبکه انورباخ در کولون مبتلا. ICC در اطراف شبکه دیده ننمود. بزرگنمایی  $\times 74000$ .

معمولاً از یک طرف چنین ارتباطی را با نهادهای عصبی و از سوی دیگر با سلولهای عضلانی صاف داشته‌اند؛ یعنی در موقعیت بینایی غصب و عضله واقع شده بودند. گاهی تماس‌های غشایی بین ICC و سلولهای عضلانی صاف به صورت اتصالاتی از نوع

بودند.


به این صورت که بر جستگی از سلول عضلانی صاف به داخل فروزشگی ICO مجاور گشته می‌شد. در بافت‌های مبتلا در ده نمونه که از قسم مبتلای کولون بیماران نهیه شده بود ICO به تعداد کمتری نسبت به نمونه‌های سالم روده مشاهده شده و در اطراف شبکه‌های عصبی دیده شد و ارتباط‌های وسیع و موقعیت بینایی که این سلولها در بافت‌های سالم داشته‌اند در نمونه‌های مبتلا وجود نداشت (میکروگراف ۳).

(نمونه‌ها، بر شهای خبلی نازک (ultrathin) با خصامت ۷۰-۹۰ nm تهیه و روی گردیدهای مسی mesh ۲۰۰ قرار گرفت. پس از رنگ آمیزی دوبل با اورانیل استات و سیترات سرب، گردیدهای حاوی نمونه‌ها در داخل میکروسکوپ الکترونی انقالی مدل EM900 زایس فرار گرفته و در بزرگنمایی‌های مختلف آنها مشاهده و از نواحی صورت نظر عکبرداری و در نهایت تفسیر شدند).

تشخیص قطعی بیماری بر اساس اظهار نظر پاتولوژیت مبنی بر آگانگلوبنیک بودن ناحیه بود و نمونه‌هایی که توسط پاتولوژیت گانگلوبنیک گزارش شد از مطالعه حذف گردید.

## یافته‌ها

در بافت‌های سالم ICC همراه با شبکه‌های عصبی زیر مخاطی (Sub-Arbach Plexus; AP) و آنورباخ (Mucosal Plexus; SMP) مشاهده شد. جسم سلولی و استطلاعه آنها نیز وارد گپول شبکه‌های عصبی نمی‌شدند (میکروگراف ۱).



میکروگراف ۳: موقعیت ICC همراه با شبکه عصبی آنورباخ AP. عضله حلقوی CM. عضله طولی LM. سلول شوان S. استطلاعه ICC ↑ در کولون سالم این سلولها و حتی استطلاعه‌های آنها وارد گپول شبکه‌های عصبی نمی‌شود. در این نوع ICC جسم سلولی طویل و دوکی شکل، هسته‌ها بیضی شکل و بزرگ با حاشیه صاف یا در قسم‌های دندانه دار با زوایده طویل و منشعب هستند. بزرگنمایی  $\times 34000$ .

ICCs دارای جسم سلولی طویل و دوکی شکل با زوایده طویل و منشعب، هسته‌های بیضی شکل و بزرگ با حاشیه صاف یا دندانه دار بودند.

اغلب هتروکروماتین متراکم نیز روی غشا داخلی هسته ICC دیده شد (میکروگراف ۲).

میترپلاسم نازکی که اطراف هسته را احاطه کرده بود حاوی سیسترن‌هایی از ریتیکولوم اندوپلاسمیک صاف و خشن؛ متونکتری و اجسام متراکم بود. کاوتولهای در قسم‌های مختلف غشای سلول مشاهده می‌شد. در مواردی در کار ICC فیبرهای الاستین مشاهده گردید.

اتصالاتی از نوع (Gap Junction; GJ) بین استطلاعه‌های ICC با یکدیگر و با سلول عضلانی مشاهده شد.

و پایانه‌های عصبی واقع شده بودند. چنین موقعیت ICC می‌تواند تاکیدی بر این فرضیه باشد که ICC‌ها بعنوان واسطه‌های انتقال عصبی در چدار روده عمل می‌کند. فرضیه برای اولین بار در سال ۲۰۰۰ توسط Ward مطرح شد و به نظر ایشان ICC نقش مهاری می‌بینست عصبی روده را چندین برابر می‌کند (۷). موقعیت بینایی و ارتباطات وسیع ICC با شبکه‌های عصبی و سلولهای عضلانی صاف بنابر آنجه که در تحقیق حاضر مشاهده شد احتمالاً می‌تواند نقش مهاری این سلولها را در حرکات خودکاری روده‌ای فراهم سازد.

در این تحقیق مجاورت ICCs با فیرهای الاستین در برخی موارد مشاهده شد. طبق نظریه محققین ممکن است ICC مشابه سلولهای عضلانی صاف دیواره آثربوت تحت تاثیر کشش یا اتساع دیوار تغییر و الاستین تولید کنند که این مساله می‌تواند تأثیری بر فرضیه مکانو ریپتوري ICC باشد که برخی محققان از جمله Ward مطرح کردند (۷).

در مطالعه حاضر مورفولوژی ICC در نمونه‌های سالم بینایی برای مطالعه آنها در شرایط پاتولوژیک قرار گرفت. مقایسه فرا ساختار ICC در نمونه‌های سالم با نمونه‌های مبتلا نشان می‌دهد که نمای کلی سلول، هسته و کروماتین هسته‌ای مشابه است. در مطالعه تصاویر مربوط به قسمت‌های مبتلا در اکثر موارد ICC در اطراف شبکه‌های عصبی مشاهده شد و آن موقعیت بینایی و ارتباط وسیعی که ICC در بافت‌های سالم دارند در موارد مبتلا دیده نشد که با نتایج تحقیقات Vander Winden و همکاران (۲) همخوانی دارد. محققین عقیده دارند که فقدان چنین ارتباطی در چدار کولون بیماران مبتلا به هیرشبرونگ باعث حذف اثر مهاری ICC شده و احتمالاً در هر روز انسیسم این ناجه مؤثر است (۲). انجام تحقیقات بیشتر در زمینه فیزیولوژی سلولهای ICC در کولون مبتلا و بررسی این سلولها در محیط ایزووله نظیر محیط کشت برای سرمهی فعالیت بیوالکتریکی آنها بینشناه می‌شود.

### تقدیر و تشکر

این مقاله بخشی از نتایج طرح تحقیقاتی شماره ۳۵۴ مصوب حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که در مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی دانشگاه متبرع اجرا شده است. نویسنده‌گان بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و کارشناسان محترم امور پژوهشی دانشگاه قدردانی می‌نمایند. ضمناً از زحمات پرستن محترم واحد میکروسکوپ الکترونی IBB دانشگاه تهران، واحد میکروسکوپ الکترونی شرکت دارو پخش و واحد میکروسکوپ الکترونی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه متبرع سپاسگزاری می‌گردد.

\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

### References

- Huizinga JD, Thuneberg L, Vanderwinden JM, Rumessen JJ: Interstitial cells of Cajal as targets for pharmacological intervention in gastrointestinal motor disorders. Elsevier Trends J. 1997; 18: 333-403
- Vanderwinden JM, Rumessen JJ, Liu H, Descamps D, Delaet MH, Vanderhaeghen JJ: Interstitial cells of cajal in human colon and in Hirschsprung disease. Gastroenterol 1996; 111: 901-910

بعضی از ویژگیهای ICC نظیر وجود هسته بیضی شکل بزرگ، هتروکروماتین متراکم روی غشای داخلی هسته، سیتوپلاسم نازک دور هسته، کاوتولوها و تیغه پایه ناکامل که در نمونه‌های سالم مشاهده شدند، در شرایط پاتولوژیک نیز قابل مشاهده بودند اما متراکم کلی ارگانلها کاهش یافته بود (میکروگراف ۴).



میکروگراف ۴. نمایی از فراساختار ICC در کولون مبتلا. بعضی از ویژگیهای ICC نظیر وجود هسته بیضی شکل بزرگ، هتروکروماتین متراکم روی غشای داخلی هسته، سیتوپلاسم نازک دور هسته، کاوتولوها و تیغه پایه ناکامل در شرایط پاتولوژیک هم حفظ شده است اما متراکم کلی ارگانلها کاهش یافته است. بزرگنمایی × ۲۰۰۰.

### بحث

در تحقیق حاضر با استفاده از میکروسکوپ الکترونی انتقالی ICC در نواحی سالم و مبتلا کولون در بیماران مبتلا به بیماری هیرشبرونگ مورد مطالعه قرار گرفت.

در نمونه‌های مربوط به قسمت‌های سالم کولون ICC به همراه شبکه عصبی زیر مخاطی و شبکه عصبی آنوربانخ مشاهده شد که الگوی پراکنده‌گی آن مشابه به نتایج مطالعاتی است که سایر محققین با استفاده از تکنیک‌های استاندارد انجام داده‌اند (۱، ۳)، شناسایی ICC بر اساس معیارهای Huizinga و همکاران (۴) و Fausson Pellegrini و همکاران مطرح نموده‌اند انجام شد.

هسته بیضی یا دوکی شکل بزرگ با هتروکروماتین متراکم روی سطح داخلی غشای آن، نوار نازکی از سیتوپلاسم در اطراف هسته، سیترن‌هایی از ریکولوم انولی‌اسمیک صاف و خشن اجسام متراکم، کاوتولوها سطحی و تیغه پایه با رشد متغیر از جمله ویژگیهای فراساختاری ICC در این مطالعه بودند که بر شاهنهای آنها با سلول عضلانی صاف صحه گذاشت (۱۴). در تحقیق حاضر ICC‌ها در اکثر نمونه‌های قسمت سالم در موقعیت بینایی بین سلولهای عضلانی صاف

\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

3. Rumessen JJ: Identification of Intrstitial cells of cajal significance for studies at humans small intestine and colon. Danish Medical Bulletin. 1994; 41: 275-293
4. Thuneberg L: One hundred years of Intrstitial cells of cajal. Microscopy Research Technology 1999; 47: 223-238
5. Hagger R, Finlayson C, Kahn F, De Oliver R, Chimellil Kumar D: A deficiency of Intrstitial cells of cajal in Chagasic megacolon. Journal of the Autonomic nervous system. 2000; 80: 108-111
6. Sanders KM: A case for Intrstitial cells of cajal as pacemakers and mediators of neurotransmission in the gastrointestinal tract. Gastroenterology, 1996; 111: 492-515
7. Ward SM: Intrstitial cells of cajal in enteric neurotransmission. Gut, 2000; 47: 40-43
8. Langer JC, Berezin I, Daniel ED: Hypertrophic pyloric stenosis: Ultrastructural abnormalities of enetric nerves and the Intrstitial cells of cajal. Journal of Pediatric surugery. 1995; 30: 1535-1543
9. Isozaki K, Hirota S, Miyagawa JJ: Deficiency of c\_kit+ cells in patients with a myopathy from of chronic idiopathic intestinal pseudo\_ obstruction. American Journal Gastroenterol, 1997; 92: 332-334
10. Yamataka A, Kato Y, Tibboel D: A lack of intestinal pacemaker ( c\_kit in aganglionic bowel of patients with Hirschprungs disease. Journal of Pediatric Surgery. 1999; 30: 441-444
11. Watanabe Y, Ito T, Lino S: Unique spindle cells in the involved ileal segment of rats with congenital aganialionosis. Journal of Pediatric Surgery, 1997; 32: 1229-1233
12. Wedel T, Holschneider AM, Krammer HJ: Ultrastructure features of nerve fascicles and basal lamina abnormalities in Hirschprungs disease. European Journal of Surgery, 1999; 9: 75-82
13. Fausson Pellegrini MS, Thuneberg L: Guide to the identification of interstitial cells of cajal. Microscopy Research Technol: 1999; 47: 248-266
14. Kimuro T, Seki K: Fine structural study of interstitial cells associated with the deep muscular plexus of the rat small intestine, with special refrence to the intestinal pacemaker cells. Cell Tissue Research, 1995; 282: 129-134

