

علل مرگ و میر نوزادان بستری شده در بیمارستان شهدای تجریش در سال های ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۶

دکتر مینو فلاحتی^{*}، نسیم جودکی^۱، دکتر مکیمه محسنی بندپی^۲

۱. استادیار، بخش نوزادان، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۲. کارورز، گروه کودکان، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۳. دستیار، گروه کودکان، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

سابقه و هدف: مرگ و میر نوزادان یکی از شاخص‌های اصلی در سیستم‌های مراقبت بهداشتی است. ۶۰٪ از مرگ و میر این گروه سنی مربوط به نوزادان نارس می‌باشد. با اینکه مرگ و میر نوزادان نارس در سال‌های اخیر کاهش یافته است، ولی همچنان به عنوان یک معصل بهداشتی در جوامع و همچنین در مدیریت سلامت مطرح است. در این مطالعه، علل مرگ نوزادان در مقطع زمانی سه ساله در بیمارستان شهدای تجریش بررسی شده است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه در قالب Routine Database Study و با استفاده از داده‌های ثبت شده در پرونده‌های بالینی نوزادان با سن کمتر از ۳۰ روز که از سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۶ در بیمارستان شهدای تجریش بستری و فوت شده بودند، انجام گرفته است. به منظور انجام مطالعه، پرونده بالینی تمام نوزادان نارس فوت شده در دوره زمانی یاد شده استخراج گردید. برای نشان دادن اطلاعات از نسبت (Proportion) و میرایی تناسبی (Proportionate Mortality) استفاده شد.

یافته‌ها: از کل نوزادان بستری در این مرکز، ۶۰ نوزاد در مقطع زمانی یاد شده فوت نموده‌اند که ۴۴٪ آنها مؤمنت، ۵۵٪ مذکور و وضعیت جنسی ۱٪ نامشخص بود. ۵۹٪ نوزادان، حاصل زایمان و ۴۱٪ حاصل زایمان طبیعی بوده‌اند. ۶۳٪ نوزادان آپکار کمتر از ۷ داشتند. ۲۷٪ از نوزادان، وزن کمتر از ۱۰۰۰ گرم، ۵۰٪ وزن ۱۴۹۹-۱۴۰۰ گرم، ۱٪ وزن ۱۹۹۹-۱۵۰۰ گرم، ۱٪ وزن ۲۴۹۹-۲۰۰۰ گرم و ۵٪ بیش از ۲۵۰۰ گرم وزن داشتند. سن حاملگی بیشتر موارد فوت شده، مربوط به نوزادان ۲۱ الی ۳۱ هفته بود. ۲۴٪ آنها در همین مرکز متولد شده و ۷۶٪ از سایر مرکز اعزام شده بودند. بیشترین علت مرگ نوزادان مربوط به سندرم دیسترس تنفسی و پس از آن به ترتیب سپسیس، تاهنجاری‌های مادرزادی، آسفیکسی، اختلالات متابولیک، خونریزی ریوی و انتروكولیت نکروزان بوده است. در ۱۲٪ موارد مرگ بین ساعات ۱۲ نیمه شب تا ۶ صبح رخ داده است.

نتیجه‌گیری: با توجه به بیشترین موارد مرگ نوزادان در ساعات نیمه شب و همچنین در موارد با زایمان‌های سازارین، به منظور بررسی ارتباط احتمالی بین موارد فوق الذکر و مرگ نوزادان، مطالعات تکمیلی و با استفاده از نمونه‌های بیشتر پیشنهاد می‌شود. با توجه به میزان وقوع بیشتر مرگ نوزادان در ساعات نیمه شب، مراقبت‌های بیشتر پرستاری (افزایش نیروهای پرستاری شب کار) ضروری می‌نماید. با توجه به کاهش میزان مرگ در زایمان‌های واژنیال و تأثیر آن بر بقای نوزاد، پرهیز از زایمان‌های سازارین بی مورد را می‌توان مورد تأکید قرار داد.

واژگان کلیدی: مرگ و میر، نوزاد، سندرم دیسترس تنفسی، سپسیس

مقدمه

افزایش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد (۴). با این وجود و به کمک مراقبت‌های ویژه نوزادان نارس، میزان مرگ این گروه از نوزادان کاهش بسیار داشته است (۵)، به نحوی که در سال ۱۹۶۰ احتمال مرگ نوزادان با وزن هنگام تولد ۱۰۰۰ گرم، ۹۵٪ بوده و امروزه احتمال مرگ نوزادان نارس با وزن مشابه، کمتر از ۱۰٪ می‌باشد. هر چند باید توجه نمود که با وجود کاهش میزان مرگ و میر نوزادان نارس، معلومیت‌های ناشی از نارسی نوزادان افزایش یافته است (۶).

تولد پیش از موعد وضعیتی است که نوزاد قبل از سن حاملگی ۳۷ هفته به دنیا بیاید (۱). با اینکه میزان دقیق تولد پیش از موعد نوزادان به درستی مشخص نیست (۲)، ولی برآورد می‌گردد که حدوداً ۱۵٪ از نوزادان به صورت نارس به دنیا می‌آیند (۳). در دهه‌های اخیر میزان تولد نوزادان نارس

*نویسنده مسئول مکاتبات: دکتر مینو فلاحتی؛ تهران، تجریش، خیابان شهرداری، بیمارستان شهدای تجریش، بخش نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. پست الکترونیک: minou_fallahi@sbmu.ac.ir

علل مرگ و میر نوزادان بستری شده

نوزادان (۲۶ نوزاد، ۴۳/۳٪) سندرم دیسترس تنفسی گزارش شده بود (جدول ۲).

جدول ۱- توزیع نوزادان فوت شده در بیمارستان شهدای تجریش از سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۶ بر اساس وزن

وزن نوزادان	فراوانی	نسبت
%۲۷	۱۷	<۱۰۰
%۵۰	۳۰	۱۰۰-۱۴۹۹
%۸	۵	۱۵۰۰-۱۹۹۹
%۸	۵	۲۴۹۹-۲۰۰۰
%۵	۳	≥۲۵۰۰
%۱۰	۶۰	جمع

جدول ۲- توزیع نوزادان فوت شده در بیمارستان شهدای تجریش از سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۶ بر اساس علت فوت

علل مرگ	فراوانی	نسبت
سندرم دیسترس تنفسی	۲۶	%۴۳/۳
سپسیس	۱۲	%۲۰
ناهنجریهای مادرزادی	۵	%۸/۳۳
آسفیکسی	۵	%۸/۳۳
اختلالات متابولیک	۳	%۵
انتروکولیت نکروزی	۲	%۳/۳
خونریزی ریوی	۷	%۱۱/۶
جمع	۶۰	%۱۰۰

۳ نوزاد (۰.۵٪) در ساعت ۶ الی ۱۱:۵۹ قبل از ظهر، ۲ نوزاد (۰.۳٪) در ساعت ۱۲ الی ۱۷:۵۹ بعد از ظهر، ۶ نوزاد (۰.۱٪) در ساعت ۱۸ الی ۲۳:۵۹ بعد از ظهر، و ۴۹ نوزاد (۰.۸۲٪) از ساعت ۱۲ الی ۵:۵۹ بامداد فوت نموده بودند. هنگام فوت ۵ نوزاد (۰.۸/۵٪) کمتر از یک روز، ۱۳ نوزاد (۰.۲۱/۵٪) یک روز، ۷ نوزاد (۰.۱۱/۵٪) دو روز، ۵ نوزاد (۰.۸/۵٪) سه روز، ۵ نوزاد (۰.۸/۵٪) بیش از ۳۵ سال بوده است. چهار روز و ۲۵ نوزاد (۰.۴۱/۵٪) بیش از چهار روز سن داشتند. سن مادران نوزادان نارس فوت شده در ۳ مورد (۰.۵٪) کمتر از ۱۸ سال، در ۵۰ مورد (۰.۸۴٪) ۱۸ الی ۳۵ سال، و در ۷ مورد (۰.۱۱٪) بیش از ۳۵ سال بوده است. ۳۲ نوزاد (۰.۵۳٪) سورفاکتانت دریافت کرده بودند و در ۵۳ نوزاد (۰.۸۸٪) قبل از مرگ و در طی بستری و در ۷ نوزاد (۰.۱۲٪) هنگام CPR، انتوباسیون صورت گرفته بود.

بحث

در این مطالعه، بیشترین موارد مرگ و میر (۷۷٪) نوزادان مربوط به نوزادان نارس و کموزن (کمتر از ۱۵۰۰ گرم) بود و فراوانی مرگ نوزادان دارای آپگار پایین و سن حاملگی کمتر، بیشتر از سایر موارد مورد مطالعه بود. در مقایسه به عمل آمده در یک مطالعه انجام شده در بنگلادش در سال ۲۰۰۵، علت

با توجه به اهمیت مرگ و میر نوزادان به عنوان یکی از معیارهای سیستم مراقبت های بهداشتی و درمانی و تأثیر آن بر شاخص های بهداشتی و با توجه به این که تقریباً ۶۰٪ مرگ نوزادان مربوط به نوزادان نارس است (۷)، در این مطالعه علل مرگ و میر نوزادان در بیمارستان شهدای تجریش مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها

این مطالعه در قالب Routine Data Base Study و با استفاده از داده های ثبت شده در پرونده های بالینی نوزادان با سن کمتر از ۳۰ روز که از نیمه دوم سال ۱۳۸۶ تا نیمه اول سال ۱۳۸۶ در بیمارستان شهدای تجریش بستری و فوت شده بودند، انجام شد. به منظور انجام مطالعه، پرونده بالینی تمام نوزادان نارس فوت شده در دوره زمانی یادشده استخراج گردید و به منظور نشان دادن اطلاعات از نسبت (Proportion) و میرایی تناسبی (Proportionate Mortality) استفاده شده است.

یافته ها

از کل نوزادان بستری شده در بخش های نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)، ۶۰ نوزاد در فاصله سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ در بیمارستان شهدای تجریش فوت کرده بودند. ۲۶ نفر (۰.۴۴٪) مؤنث و ۳۳ نفر (۰.۵۵٪) مذکر بودند. همچنین وضعیت یک نوزاد به لحاظ جنسی نامشخص بود. ۵۱ نوزاد (۰.۸۵٪) حاصل بارداری یک قلو، ۷ نوزاد (۰.۱۲٪) حاصل بارداری دوقلو، ۲ نوزاد (۰.۳٪) حاصل بارداری سه قلو و بیشتر بوده اند.

۳۵ نوزاد (۰.۵۹٪) به روش سزارین و ۲۵ نوزاد (۰.۴۱٪) به روش زایمان واژتال به دنیا آمده بودند. ۱۵ نوزاد (۰.۲۴٪) از بدو تولد در بیمارستان شهدای تجریش بوده و ۴۵ نوزاد (۰.۷۶٪) به این بیمارستان ارجاع داده شده بودند. توزیع نوزادان فوت شده بر اساس وزن در جدول ۱ نشان داده شده است. آپگار ۳۸ نوزاد (۰.۶۳٪)، کمتر از ۷ و در ۲۲ نوزاد (۰.۳۷٪)، ۸ و بالاتر بوده است. در ۳۹ مورد (۰.۶۵٪)، نوزادان حاصل حاملگی سوم و کمتر و ۲۱ مورد (۰.۳۵٪)، حاصل حاملگی چهارم و بیشتر بودند. بیشترین علت مرگ نوزادان (۰.۴۳٪) مربوط به سندرم دیسترس تنفسی (RDS) و کمترین علت (۰.۳٪)، مربوط به آنتروکولیت نکروزی (neonatal necrotizing enterocolitis; NEC) بوده است. سن حاملگی در ۹ مورد (۰.۱۵٪) کمتر از ۲۸ هفته، ۳۹ مورد (۰.۶۵٪) بین ۲۸ تا ۳۱ هفته، ۷ مورد (۰.۱۱/۵٪) بین ۳۲ تا ۳۴ هفته و ۵ مورد (۰.۸/۵٪) بیش از ۳۵ هفته بود. بیشترین علت فوت

نبود امکانات مراقبت‌های ویژه، به بیمارستان شهدای تجریش ارجاع شده‌اند، این یافته با توجه به مشکلات فراوان موجود در اعظام بیماران بدحال (انتقال در شرایط نامناسب و امکانات ناکافی)، عدم امکان اعزام سریع و به موقع به علت کمبودن تخت‌های موجود، منطقی به نظر می‌رسد. این موضوع اهمیت تأسیس بخش‌های NICU را در مجاورت بخش‌های زنان و مراکز زایمان به منظور عدم نیاز به ارجاع نوزادان پرخطر به سایر مراکز، نشان می‌دهد. از سوی دیگر اغلب موارد مرگ (۸۲٪) در ساعات نیمه شب و بامداد رخ داده است که این نتیجه نیز با توجه به تعداد کم پرستاران شیفت شب قابل پیش‌بینی می‌باشد. با توجه به اینکه ۵۸٪ موارد مرگ در زایمان‌های سزارین رخ داده است، با توجه به اثرات حمایتی زایمان واژینال در جهت کاهش شدت سندروم دیسترس تنفسی، این نتیجه نیز منطقی می‌باشد. این موضوع، اهمیت زایمان‌های واژینال و اثرات مطلوب آن در پیشرفت بقای نوزادان و پرهیز از زایمان‌های سزارین بی‌مورد را نشان می‌دهد. لازم به یادآوری است که سندروم دیسترس تنفسی، به عنوان بیشترین علت مرگ در نوزادان حاصل از زایمان سزارین، شایعتر و شدیدتر می‌باشد.

نتیجه‌گیری

با توجه به میزان وقوع بیشتر مرگ نوزادان در ساعات نیمه شب، افزایش مراقبت‌های پرستاری (اقزایش نیروهای پرستاری شب‌کار) ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به کمبودن میزان مرگ در زایمان‌های واژینال و تأثیر آن بر بقای نوزادان، بر پرهیز از زایمان‌های سزارین بی‌مورد می‌توان تأکید کرد.

با توجه به فراوانی بالای مرگ نوزادان دارای آپکار پایین و سن حاملگی کمتر، مراقبت‌های بیشتر در جهت پیشگیری از زایمان پرهترم به عنوان مهمترین علت مرگ و میر نوزادان می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای در کاهش مرگ و میر نوزادی مؤثر باشد. البته سایر اقدامات همچون پیشگیری و درمان‌های مناسب آنتی‌بیوتیکی، تأسیس بخش‌های NICU در مجاور بخش‌های زنان و زایمان به منظور عدم نیاز به ارجاع نوزادان پرخطر، مراقبت‌های بیشتر پرستاری بخصوص در شیفت شب و تأکید بیشتر در انجام زایمان واژینال از اهم مواردی هستند که در مرگ و میر نوزادی را می‌توانند کاهش دهند.

عمده مرگ نوزادی به ترتیب نارسی و وزن کم هنگام تولد (۳۰٪)، زایمان سخت (۱۶٪)، و زایمان در شرایط نامساعد (۱۶٪) بود (۱۱). در ۳۴٪ موارد، علت مرگ نامشخص اعلام شده بود. علت عمده مرگ در پژوهش اخیر، نارسی و عوارض ناشی از آن بوده که با مطالعه حاضر هماهنگ می‌باشد. در مطالعه انجام‌شده در ایالات متحده امریکا، که علت مرگ و میر نوزادان را در طی سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۰ مقایسه کرده است، مهمترین علت مرگ در طی این ۲۰ سال ابتدا نارسی و وزن کم هنگام تولد، سپس ناهنجاری‌های ارشی، پس از آن عفونت‌ها و ناسازگاری‌های خونی و در نهایت اسفیکسی به عنوان علت چهارم مرگ مطرح شده است (۱۲). این بررسی تقریباً با مطالعه حاضر تطبیق دارد.

در مطالعه دیگری که در سال ۲۰۰۶ در هندوستان انجام شد، ۵۰٪ موارد مرگ نوزادان، در طی ۳ روز اول تولد و ۷۱٪ در طی اولین هفته تولد رخ داده بود (۱۳). در مطالعه حاضر نیز ۴۱٪ مرگ‌ها در ۴ روز اول عمر بوده است. در مطالعه انجام‌شده در هند اولین علت مرگ اسفیکسی و ترومای زایمان بوده و پس از آن نارسی، که این عدم تطابق می‌تواند ناشی از آن باشد که این مطالعه درباره مرگ و میرهای نوزادی در مناطق روسیایی بوده و احتمالاً زایمان در شرایط نامناسب و در منزل می‌تواند توجیه‌کننده آن باشد.

سورفاکتانت به عنوان یک داروی مهم در سال‌های اخیر جهت کاهش مرگ و میر نوزادان نارس مطرح می‌باشد. اما در این مطالعه ۵۳٪ مرگ‌ها در نوزادان تحت درمان با سورفاکتانت اتفاق افتداده است. این یافته حاکی از آن است که و خامت حال عمومی بیماران دریافت‌کننده سورفاکتانت نسبت به نوزادان دیگر بیشتر بوده است و این نوزادان، نیازمند مراقبت‌های جدی‌تری می‌باشند. به طور کلی به نظر می‌رسد اقدامات پیشگیری‌کننده (پیشگیری از تولد نوزاد نارس، تریق کورتیکواسترویید به مادر قبل از زایمان) و مداخلات درمانی مناسب (استفاده به موقع از دستگاه تهییه مکانیکی، تزریق سورفاکتانت)، نقش مؤثری در کاهش مرگ و میر نوزادی خواهد داشت و با توجه به این که سپسیس دومین علت مرگ نوزادان نارس می‌باشد، اقدامات مناسب به منظور پیشگیری و درمان‌های مناسب آنتی‌بیوتیکی، برای نجات جان این گروه پرخطر ضروری می‌باشد.

با توجه به این که بیشتر موارد مرگ و میر در نوزادانی اتفاق افتاده است که زایمان آنها در مراکز دیگر انجام شده و به علت

REFERENCES

1. Behrman R E, Kliegman RM. Nelson textbook of pediatrics. McGraw – Hill, 2008.
2. Philip AGS. The evalution of neonatology. Pediatrics 2005;58:799-815

3. Arias E, MacDorman MF, Strobino DM, Guyer B. Annual summary of vital statistics-2002. Pediatrics 2003;112(6):1215-30.
4. Hall RT. Prevention of Premature Birth: Do pediatricians have a role. Pediatrics 2000;105(5):1137-40.
5. Ingelfinger JR. Prematurity and legacy of Intrauterine Stress. NEJM 2007;356(20):2093-95.
6. Fanaroff, Martin. Neonatal and Perinatal Medicine. 8th ed. Elsevier; 2006. Figure 2-3, p.22.
7. Fanaroff, Martin. Neonatal and Perinatal Medicine. 8th ed. Elsevier; 2006. p.20.
8. McCormick MC. The contributions of low birth to infant mortality and childhood mortality. NEJM 1985; 312(2): 82-90.
9. Arias E, MacDorman MF, Strobino DM, Guyer B. Annual summary of vital statistics-2002. Pediatrics 2003;112(6 Pt 1):1215-30.
10. Guyer B, MacDorman MF, Martin JA, Peters KD, Strobino DM. Annual summary of vital statistics-1997. Pediatrics 1998;102(6):1333-49.
11. Chowdhury ME, Akhter HH, Chongsuvivatwong V, Geater AF. Neonatal Mortality in Rural Bangladeshi: An Exploratory Study. J Health Popul Nutr 2005;23(1):16-24.
12. Carmichael SL, Iyasu S, Hatfield-Timajchy K. Cause-Specific Trends in Neonatal Mortality among Black and White Infants, United States, 1980–1995. Maternal Child Health J 1998;2(2):67-76.
13. Baqui AH, Darmstadt GL, Williams EK, Kumar V, Kiran TU , Panwar D, et al. Rates, timing and causes of neonatal deaths in rural India: implications for neonatal health programmes. Bull World Health Organ 2006;84(9):706-13.