

بررسی اثر پاکسازی سیستم روتاری هیرو با تیپر ۶٪ و ۴٪ در حذف انتروکوک

فکالیس از کانال ریشه

دکتر علی کنگلو^{*}، دکتر مهسا اسکندری نژاد^{**}، دکتر زهره آهنگری^{***}

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به نفوذ عمیق باکتری‌ها بخصوص انتروکوک فکالیس درون توبول‌های عاجی در بیماری‌های پالپی، تفاوت در میزان تیپرینگ آماده‌سازی فضای کانال حین درمان اندو، منجر به تفاوت در برداشت میزان عاج از دیواره کانال ریشه می‌شود. در نتیجه احتمالاً کانال‌های آماده‌سازی شده با تیپرهای بیشتر نسبت به کانال‌های اینسترومنت شده با تیپر کمتر، محتوای میکروبی کمتری خواهد داشت. از طرفی با توجه به شیوع بالای شکستگی ریشه در دندان‌های با تیپرینگ بیشتر، هدف از این مطالعه بررسی تیپرهای مختلف فایل روتاری هیرو (۶٪ در مقابل ۴٪) در میزان پاکسازی کانال ریشه می‌باشد که آیا تیپرینگ بیشتر فضای کانال که بالطبع باعث تضعیف ریشه خواهد شد، باکتری بیشتری را نیز حذف می‌کند.

مواد و روشها: در این مطالعه نیمه تجربی-آزمایشگاهی، ۶۰ دندان تک کانال انسانی به دو گروه مساوی مورد آزمایش ۲۷ عددی و یک گروه کنترل ۶ عددی تقسیم شدند و تعداد ۱۰ دندان تک ریشه دیگر برای صحبت تایید مراحل آماده‌سازی (۵ نمونه کنترل مثبت و ۵ نمونه کنترل منفی) انتخاب شدند. تمام دندان‌ها پیش از اتوکلاو با فایل شماره ۲۰ و گیتس گلیدن شماره ۲ و ۳ به صورت اولیه آماده‌سازی شدند. آماده‌سازی با انتروکوک فکالیس بعد از استریلیزاسیون صورت گرفت. میزان آلدگی باقیمانده در نمونه‌های عاجی تهیه شده از کانال ریشه‌ها براساس نوع سیستم فایل روتاری استفاده شده (هیرو با تیپر ۶٪ و تیپر ۴٪) با سایز آپیکالی برایر (#۳۰)، بعد از ۲۴ ساعت کشت در محیط اختصاصی بایل اسکولین بررسی گردید.

یافته‌ها: در گروه روتاری هیرو با تیپر ۶٪ (۲) نمونه و در گروه روتاری هیرو با تیپر ۴٪، (۶) نمونه پاکسازی کامل را نشان دادند که با استفاده از آزمون ناپارامتری Mann-Whitney تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های مورد آزمایش با تیپرینگ مختلف مشاهده نشد ($P > 0.05$).

نتیجه‌گیری: از لحاظ حذف انتروکوک فکالیس از کانال ریشه سیستم روتاری هیرو با تیپر ۶٪ با سایز آپیکال یکسان به یک میزان موثرند. در نتیجه، گشادسازی بیشتر فضای کانال باعث پاکسازی بهتر آن نمی‌شود.

کلید واژگان: باکتری انتروکوک فکالیس، فایل‌های روتاری اندودنتیک، آماده‌سازی فضای کانال

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۲/۷ تاریخ اصلاح نهایی: ۱۳۸۹/۳/۲۲ تاریخ تأیید مقاله: ۱۳۸۹/۳/۲۴

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره ۲۸، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۹، ۲۱۴-۲۱۸

مقدمه

باکتریایی کانال ریشه و یا حذف باکتری از کانال ریشه عفونی می‌باشد^(۱). حذف میکروارگانیسم‌ها به طور اساسی توسط دبریدمان مکانیکی و شستشو دهنده‌های آنتی‌میکروبیال و داروی بین جلسات (dressing) داخل کانال به دست می‌آید که از این میان دبریدمان مکانیکی

باکتری‌ها و محصولات‌شان نقش اساسی در پاتوژنز بیماری‌های پالپی و پری رادیکولار دارند^(۱) که در بین آنها انتروکوک فکالیس از جمله باکتری‌های مقاوم است که از دندان‌های اندو شده شکست خورده به طور شایع جدا شده می‌شود^(۲). هدف درمان اندو باید جلوگیری از عفونت

* دانشیار گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

** نویسنده مسئول: دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. E-mail:mahsa6161@yahoo.com

*** دانشیار گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

(وایتكس، شرکت شیمیایی شمین، تهران، ایران) به مدت ۱۰ دقیقه قرار گرفته و در نهایت توسط آب مقطر استریل به مدت ۱۰ دقیقه شستشو داده شدند(۱۳). تمامی نمونه‌های دندانی به طور جدگانه در داخل میکروتیوب‌های ۲mL Brain-heart infusion حاوی آبگوشت عصاره مغز و قلب (broth) BHI قرار گرفته سپس در داخل اتوکلاو به مدت ۲۰ دقیقه در حرارت 121°C و فشار ۱۵ psi استریل شدند(۱۴). به منظور حصول اطمینان از استریلیزاسیون به مدت ۲۴ ساعت در شرایط هوایی و در حرارت 37°C انکوبه شدند. بعد از تایید این مراحل جهت ایجاد عفونت استاندارد در همه نمونه‌ها، انتروکوکوس فکالیس ATCC 29212، به میزان مساوی (0.05CC) به داخل کanal‌های دندان‌ها تزریق شد. آنگاه هر نمونه به طور جدگانه در داخل میکروتیوب خود که محتوی آبگوشت آن توسط سرنگ خارج می‌شد، قرار داده می‌شد(۱۵). سپس، تمامی میکروتیوب‌ها داخل دستگاه انکوباتور در دمای 37°C تحت شرایط هوایی به مدت ۷۲ ساعت جهت رشد باکتری مورد نظر نگهداری شدند. برای بررسی صحت آلدوهسازی نمونه‌ها از 70 نمونه دندانی ، 5 عدد به عنوان کنترل مثبت و 5 عدد به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شدند. بعد از اتمام دوره انکوباسیون 60 نمونه باقی مانده به 2 گروه مورد آزمایش 27 عددی و یک گروه کنترل ($n=6$) تقسیم شدند. در گروه اول، نمونه‌های دندانی بر طبق سیستم روتاری هیرو (Hero) (ساخت شرکت میکرومگا فرانسه) با سیستم Endo IT تا نهایت شماره 30 با تیپر $\frac{1}{4}\%$ تا طول کارکرد آمددهسازی شدند.

در گروه دوم، نمونه‌های دندانی بر طبق سیستم روتاری هیرو (Hero) با سیستم Endo IT تا نهایت شماره 30 با تیپر $\frac{1}{6}\%$ تا طول کارکرد آمددهسازی شدند.

گروه سوم که شامل 6 نمونه به عنوان گروه کنترل بود فقط با هیپوکلریت سدیم $\frac{2}{5}\%$:٪ شستشو داده شد. بلاfaciale بعد از اتمام پاکسازی هر کanal، جهت برداشت نمونه کافی از داخل کanal از پیزوریمر شماره 1 (ساخت کارخانه Maillefer سوئیس) استفاده شد. دبری‌های روی پیزوریمر به داخل میکروتیوب‌های حاوی BHI استریل سریعاً منتقل شده و در داخل انکوباتور به مدت 48 ساعت نگهداری شدند. بعد از این مدت، در محیط اختصاصی بایل اسکولین کشت صورت گرفت. پس از 24 ساعت رشد، میزان رشد باکتری برآساس شدت به سه گروه بالاتر از 10^5 و زیر 10^5 و یا منفی (عدم رشد) تقسیم شده و نتایج به

(instrumentation) نقش بخصوصی در این زمینه دارد (۵). از لحاظ تئوری تفاوت در میزان تیپرینگ وسائل مختلف آماده‌سازی کanal منجر به تفاوت توانایی آنها در برداشت عاج از دیواره کanal ریشه و توبول‌های عاجی می‌شود. در نتیجه احتمالاً کanal‌های آماده‌سازی شده با تیپرهای بیشتر نسبت به کanal‌های اینسترومنت شده با تیپر کمتر، محتوای میکروبی کمتری خواهد داشت(۶،۷). اما این پیش‌فرض در مطالعه Aydin که دو تیپر مختلف $\frac{4}{9}\%$ و $\frac{9}{9}\%$ را بررسی کرد مورد تایید قرار نگرفت و هر دو در پاکسازی کanal به یک میزان موثر بودند(۸). مطالعه Usman Najia نیز نشان داد که پاکسازی آپیکال مهمتر از میزان تیپرینگ کanal است(۷). از طرفی از طرفی با برداشت هرچه بیشتر ساختار دندان در حین درمان اندو، دندان ضعیفتر خواهد شد و مقاومت آن در مقابل شکستگی‌های ریشه کاهش پیدا خواهد کرد(۹-۱۱). همانطور که در مطالعه Rundquist (سال ۹۹؟) نشان داده شد با افزایش تیپرینگ داخل کanal حین شکلدهی و پاکسازی استرس وارد به دندان در هنگام مضغ افزایش می‌یابد و باعث شکستگی به خصوص در قسمت سرویکال می‌شود(۱۱). از این رو در مطالعه حاضر به مقایسه اثر پاکسازی فایل روتاری هیرو با تیپر 6% با فایل روتاری هیرو با تیپر 4% با سایز آپیکال یکسان می‌پردازیم تا بررسی کنیم که آیا تیپرینگ بیشتر فضای کanal که بالطبع باعث تضعیف ریشه خواهد شد، باکتری بیشتری نیز حذف می‌کند.

مواد و روشها

در این مطالعه نیمه تجربی-آزمایشگاهی، 70 نمونه دندان تک ریشه و تک کanal انسانی تقریباً یکسان به صورت غیراحتمالی آسان انتخاب گردیده و اختصاص نمونه‌ها به گروه‌ها تصادفی بود. سپس، تاج آنها از ناحیه CEJ به طور عمود بر محور طولی قطع شد. به منظور کاهش متغیرهای مداخله‌گر، تمام کanal‌های ریشه با دریل‌های گیتس گلیدن شماره‌های دو، سه (ساخت کارخانه Maillefer سوئیس) به صورت پاسیو و سپس تا سپس تا فایل شماره 20 دستی (ساخت کارخانه Maillefer سوئیس) تا طول کارکرد به صورت اولیه پاکسازی شدند(۱۲،۸).

این نمونه‌ها، ابتدا در $17\% \text{ EDTA}$ (ethylene diamine) (ساخت کارخانه Vericom tetraacetic acid کشور کره) به مدت 10 دقیقه و به دنبال آن در هیپوکلریت سدیم $25\% /5$

یکسان بوده و تا سایز ۳۰ پاکسازی شدند و فقط تپرینگ این دو فایل با هم تفاوت داشت که باعث حذف متفاوت عاج از دیوارهای کanal ریشه می‌شود و در واقع نشان می‌دهد که اگر سایز آپیکال یکسان نگه داشته شود، با وجود تپرینگ‌های مختلف آماده‌سازی، در میزان کاهش باکتری تفاوت ایجاد نخواهد گردید.

نتایج مطالعه اخیر با نتایج مطالعه Rollison (۲۰۰۲) همخوانی دارد(۱۲) که نتایج آنها نشان داد که با تپر آماده‌سازی کمتر اما سایز آماده‌سازی آپیکال بیشتر (سایز آپیکال ۵۰ و تپر کanal ۲٪) در مقابل (سایز آپیکال ۳۵ و تپر کanal ۴٪) میزان باکتری بیشتری را حذف می‌شود و تپرینگ اهمیت کمتری در حذف باکتری دارد. در نتایج مطالعه‌ای که Aydin و همکاران (۲۰۰۷) جهت بررسی میزان کاهش باکتری داخل کanal با استفاده از دو سیستم اینسترومتبیشن با تپرهای مختلف هیرو ۴٪ در مقابل پروتپر ۹٪ با سایز آپیکال یکسان انجام دادند مشخص گردید که هر دو تکنیک علی‌رغم تپرینگ متفاوت، به یک میزان باکتری را کاهش می‌دهند و نیازی به گشاد کردن بیشتر کanal و تضعیف آن وجود ندارد(۸). مطالعه Usman (۲۰۰۴) نشان داد که برای پاکسازی بهتر کanal، سایز آماده‌سازی آپیکال مهم‌تر از میزان تپرینگ کanal است و با افزایش سایز آماده‌سازی آپیکال از فایل روتاری GT شماره ۲۰ به GT شماره ۴۰ باکتری کمتری داخل کanal ریشه باقی می‌ماند(۷). نتایج این مطالعات نیز نشان می‌دهد که تپرینگ بیشتر سیستم کanal باعث پاکسازی بهتر نمی‌شود. با این حال گشادسازی بیشتر کanal طبق مطالعه‌ای که Zandbiglari (۲۰۰۶) انجام داد مشکلاتی برای دندان نیز ایجاد می‌کند(۱۰). در مطالعه او عنوان شده است که دندان‌ها طی آماده‌سازی با وسایل با تپر بزرگتر به طور معنی‌داری ضعیف شده و بیشتر دچار شکستگی می‌شوند. همچنین، مطالعه Rundquist (۲۰۰۶) نیز نشان داد که افزایش تپرینگ کanal شکستگی عمودی ریشه در این دندان‌ها را بیشتر می‌کند(۱۱). بنابراین دندان‌ها باید توسط ترکیبی از گشادسازی آپیکال مطلوب و حداقل گشادسازی کرونال موردنیاز برای پاکسازی موثر کanal‌ها، آماده‌سازی شوند و یک شکل مخروطی با تپرینگ ملایم ایجاد شود.

نتیجه‌گیری

تکنیک آماده‌سازی کanal با تپرینگ بیشتر میزان باکتری

صورت کیفی رتبه‌ای اعلام گردید(۱۹-۸،۱۶). برای مقایسه بین گروه‌ها با توجه به رتبه‌ای بودن وضعیت رشد باکتری از آزمون ناپارامتری Mann-Whitney استفاده شدو برای تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار SPSS 17 استفاده گردید.

یافته‌ها

تمامی نمونه‌های کنترل مثبت به دنبال کشت در محیط بایل اسکولین، رشد کامل انتروکوک فکالیس را نشان دادند و هیچ کدام از نمونه‌های کنترل منفی آلوودگی و رشد میکروارگانیسم را نشان ندادند که تأییدی بر صحت مراحل آلووده‌سازی و استریلیزاسیون می‌باشد. در هر ۳ گروه، میزان رشد کامل باکتری و رشد نسبی باکتری و عدم رشد باکتری به صورت کیفی رتبه‌ای در جدول ۱ آورده شده است (جدول ۱). طبق داده‌های ذکر شده تفاوت معنی‌دار بین گروه کنترل و گروه‌های مورد آزمایش وجود دارد و نشان دهنده این است که پاکسازی و شکل‌دهی مکانیکی با وسایل روتاری هیرو به طور معنی‌داری باعث کاهش میزان باکتری داخل کanal می‌شود($P<0.05$). از نظر وضعیت رشد باکتری انتروکوک فکالیس بین دو سیستم روتاری هیرو با تپرهای مختلف (دو گروه مورد آزمایش) اختلاف معنی‌دار آماری دیده نشد ($P=0.242$) و وضعیت رشد باکتری از نظر عدم رشد، رشد کامل، رشد نسبی در هر دو سیستم مورد مطالعه شbahat بسیاری دارد.

بحث

حذف میکروارگانیسم‌ها از سیستم کanal ریشه لازمه درمان ریشه موفق است که از این میان حذف انتروکوک فکالیس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا این باکتری گرم مثبت بی‌هوای اختیاری به طور شایع از دندان‌های اندو شده دارای ضایعه پری‌رادیکولار جدا شده است(۲۰). اینسترومتبیشن مکانیکی اگر به طور موثری به کار رود نقش مهمی در پاکسازی کanal ریشه دارد(۴).

به طور معمول انتظار می‌رفت که برداشت بیشتر دیواره عاج کanal (هیرو با تپر ۶٪) باید باعث حذف باکتری بیشتری نسبت به برداشت کمتر دیواره عاج (هیرو با تپر ۴٪) می‌شد اما در این مطالعه این پیش فرض مورد تایید قرار نگرفت. یکی از دلایل احتمالی این مساله می‌تواند به این علت باشد که در این مطالعه سایز آماده‌سازی آپیکال در هر دو گروه

جدول ۱- توزیع وضعیت رشد باکتری انتروکوک فکالیس بر حسب نوع سیستم

جمع	عدم رشد باکتری	رشد نسبی باکتری (کمتر از 10^5)	رشد کامل باکتری (بیشتر از 10^5)	سیستم
۲۷	۲	۱۰	۱۵	فایل روتاری هیروباتیپر ٪۴
٪۱۰۰	٪۷/۴	٪۳۷	٪۵۵/۶	درصد
۲۷	۶	۹	۱۲	فایل روتاری هیروباتیپر ٪۶
٪۱۰۰	٪۲۲/۲	٪۳۳/۳	٪۴۴/۴	درصد
۶	-	-	۶	تعداد
٪۱۰۰	-	-	٪۱۰۰	درصد
۶۰	۸	۱۹	۳۳	تعداد
٪۱۰۰	٪۱۲/۳	٪۳۱/۷	٪۵۵	درصد
جمع				گروه کنترل

دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد و هزینه آن توسط این مرکز تامین شده است که بدین وسیله از همکاری ایشان تشکر و قدردانی می‌شود. همچنین، از بخش میکروبیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی که نهایت همکاری و صمیمت را در طول انجام این طرح داشتند، قدردانی می‌گردد.

بیشتری از کanal در مقایسه با تکنیک آماده‌سازی با تیپرینگ کمتر، حذف نمی‌کند و هر دو تیپرینگ کanal (۴٪ و ۶٪) با سایز آپیکال یکسان منجر به حذف باکتری به یک میزان شدند. در نتیجه نیازی به گشاد کردن کanal و تضعیف غیرضروری ریشه وجود ندارد.

تشریف و قدردانی

این طرح تحقیقاتی مصوب مرکز تحقیقات دانشگاه

References

1. Kakehashi S, Stanley HR, Fitzgerald RJ: The Effects of Surgical Exposures of Dental Pulp in Germ-Free and Conventional Laboratory Rats. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1965;20:340-349.
 2. Rocas IN, Siqueira JF, Jr., Santos KR: Association of Enterococcus faecalis with different forms of periradicular diseases. *J Endod* 2004;30:315-320.
 3. Sjogren U, Figdor D, Persson S, Sundqvist G: Influence of infection at the time of root filling on the outcome of endodontic treatment of teeth with apical periodontitis. *Int Endod J* 1997;30:297-306.
 4. Shuping GB, Orstavik D, Sigurdsson A, Trope M: Reduction of intracanal bacteria using nickel-titanium rotary instrumentation and various medications. *J Endod* 2000;26:751-755.
 5. Siqueira JF, Jr., Rocas IN, Favieri A, Lima KC: Chemomechanical reduction of the bacterial population in the root canal after instrumentation and irrigation with 1%, 2.5%, and 5.25% sodium hypochlorite. *J Endod* 2000;26:331-334.
 6. Coldero LG, McHugh S, MacKenzie D, Saunders WP: Reduction in intracanal bacteria during root canal preparation with and without apical enlargement. *Int Endod J* 2002;35:437-446.
 7. Usman N, Baumgartner JC, Marshall JG: Influence of instrument size on root canal debridement. *J Endod* 2004;30:110-112.

8. Aydin C, Tunca YM, Senses Z, Baysallar M, Kayaoglu G, Orstavik D: Bacterial reduction by extensive versus conservative root canal instrumentation in vitro. *Acta Odontol Scand* 2007;65:167-170.
9. Wilcox LR, Roskelley C, Sutton T: The relationship of root canal enlargement to finger-spreader induced vertical root fracture. *J Endod* 1997;23:533-534.
10. Zandbiglari T, Davids H, Schafer E: Influence of instrument taper on the resistance to fracture of endodontically treated roots. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2006;101:126-131.
11. Rundquist BD, Versluis A: How does canal taper affect root stresses? *Int Endod J* 2006;39:226-237.
12. Rollison S, Barnett F, Stevens RH: Efficacy of bacterial removal from instrumented root canals in vitro related to instrumentation technique and size. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2002; 94:366-371.
13. Dametto FR, Ferraz CC, Gomes BP, Zaia AA, Teixeira FB, de Souza-Filho FJ: In vitro assessment of the immediate and prolonged antimicrobial action of chlorhexidine gel as an endodontic irrigant against Enterococcus faecalis. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2005;99:768-772.
14. Shabahang S, Torabinejad M: Effect of MTAD on Enterococcus faecalis-contaminated root canals of extracted human teeth. *J Endod* 2003;29:576-579.
15. Krause TA, Liewehr FR, Hahn CL: The antimicrobial effect of MTAD, sodium hypochlorite, doxycycline, and citric acid on Enterococcus faecalis. *J Endod* 2007;33:28-30.
16. Andreasen JO, Andreasen FM, Andersson L: Textbook and color atlas of traumatic injuries to the teeth. 4th Ed. Oxford, UK; Ames, Iowa: Blackwell Munksgaard. 2007;Chap1:68.
17. Van Houte J, Green DB: Relationship between the concentration of bacteria in saliva and the colonization of teeth in humans. *Infect Immun* 1974;9:624-630.
18. Robson MC, Heggers JP: Delayed wound closure based on bacterial counts. *J Surg Oncol* 1970;2:379-383.
19. Borriell SB, Murray PR, Funke G: Topley and Tilson's microbiology and microbial infections. 10th Ed. Hodder Arnold 2005;Chap18:540.
20. Sundqvist G, Figdor D, Persson S, Sjogren U: Microbiologic analysis of teeth with failed endodontic treatment and the outcome of conservative re-treatment. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 1998;85:86-93.