

پیج خوردنگی بندناف و ارتباط آن با عوارض حین زایمان

دکتر طاهره اشرف‌گنجویی*: استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر عطاناژ طبیب‌زاده: دستیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

فصلنامه پایش

سال اول شماره سوم تابستان ۱۳۸۱ صص ۲۱-۱۷

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۱/۲/۷

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی عاقبت حاملگی‌هایی که به وسیله پیج خوردنگی بندناف به دور گردن یا بدن جنین عارضه‌دار شده بودند، انجام شد. به‌این منظور خانم‌های بارداری که جهت زایمان به زایشگاه نیکنفس دانشگاه علوم پزشکی کرمان مراجعه کردند و دارای معیارهای حاملگی ترم، یک‌قلو و ورتکس بودند به عنوان گروه مورد و حاملگی‌هایی با جنین‌های بدون پیج خوردنگی بندناف به عنوان گروه شاهد برگزیده شدند. همچنین مقایسه فراوانی‌ها به کمک آزمون کای دو و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از روش تحلیلی T-Student انجام شد.

در ۴۷۸ بیمار بررسی شده فراوانی کلی پیج خوردنگی بندناف ۴۰/۱۷ درصد، شیوع پیج خوردنگی بندناف به دور گردن ۳۴/۳۱ درصد و به دور اندام ۵/۰۲ درصد بود.

همچنین دو دور بندناف گردنی یا بیشتر در ۶/۴۹ درصد موارد پیج خوردنگی مشاهده شد. از طرفی حاملگی‌های با پیج خوردنگی بندناف در طول پیشرفت Labor به میزان بیشتری الگوی غیرطبیعی ضربان قلب جنین را نشان دادند ($P<0.001$). در این گروه همچنین میانگین آپگار دقیقه اول و پنجم به‌طور معنی‌داری از گروه کنترل کمتر بود ($P=0.285$) و میانگین تعداد پیج خوردنگی بندناف نیز در گروه با دفع مکونیوم به‌طور معنی‌داری بیش از گروه فاقد دفع مکونیوم بود ($P=0.24$). بنابراین پیج خوردنگی بندناف به دور گردن یا اندام‌های جنین با خطر بیشتر دفع مکونیوم، الگوی غیرطبیعی ضربان قلب جنین در طول Labor و آپگار پایین دقیقه اول و پنجم در ارتباط است. همچنین در صورت پیج خوردنگی بندناف احتمال عوارض جنینی و نوزادی وجود دارد. این در حالی است که با سونوگرافی داپلر می‌توان پیج خوردنگی بندناف را قبل از تولد تشخیص داد.

کلید واژه‌ها: بندناف، ضربان قلب جنین، عوارض Labor، اولتراسونوگرافی، آپگار اسکور

* نویسنده اصلی: کرمان، صندوق پستی ۷۶۱۳۵-۳۴۲۹

تلفن: ۰۳۴۱-۵۷۷۲۴

E-mail: tashrafganjoei@yahoo.com SID.ir

مقدمه

مجموع ۴۷۸ خانم باردار مراجعه کننده جهت زایمان به زایشگاه نیکنفس دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عنوان نمونه تحت مطالعه برگزیده شدند. البته لازم به ذکر است که فقط حاملگی‌های ترم یک قلو و ورتکس که از ابتدای فاز فعال زایمان تحت نظر بودند، مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش Simple random consecutive sampling انتخاب شدند.

همچنین نوع مطالعه مقطعی و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت آینده‌نگر بود. مقایسه فراوانی‌ها در دو گروه به وسیله آزمون کای دو و مقایسه میانگین‌ها به وسیله آزمون T-Student شده و موارد $P < 0.05$ معنی‌دار در نظر گرفته شد.

جهت بررسی عاقبت حاملگی در دو گروه با و بدون پیچ‌خوردگی بندناف حاملگی‌های عارضه‌دار از جمله پره‌اکلامپسی، دکولمان و IUGR نیز از جریان مطالعه حذف شدند.

یافته‌ها

یافته‌های جمعیت‌شناختی در جدول شماره ۱ توضیح داده شده است. در ۴۷۸ بیمار مورد بررسی پیچ‌خوردگی بندناف در ۰/۴۰ درصد موارد مشاهده شد که به تفکیک شیوع پیچ‌خوردگی بندناف به دور گردن ۳۴/۳۱ درصد، دور اندام، ۵/۰ درصد و دور گردن و اندام ۸۴/۰ درصد و شیوع دو دور بندناف گردنی یا بیشتر ۴۹/۶ درصد بود. پس از حذف حاملگی‌های عارضه‌دار عاقبت حاملگی در دو گروه با و بدون پیچ‌خوردگی بندناف مقایسه شد که میانگین آیگار دقیقه اول و دقیقه پنجم در موارد دارای پیچ‌خوردگی بندناف به طور معنی‌داری از میانگین در گروه بدون پیچ‌خوردگی کمتر بود ($P < 0.05$). میانگین وزن موقع تولد در گروه دارای پیچ‌خوردگی نیز نسبت به گروه بدون پیچ‌خوردگی از نظر آماری تفاوت معنی‌داری نداشت (جدول شماره ۲).

در رابطه با وقایع حین زایمان، همانگونه که در جدول شماره ۳ دیده می‌شود میزان دیسترس جنینی در گروه دارای پیچ‌خوردگی ۲۳/۶ درصد و در گروه بدون پیچ‌خوردگی ۴/۹ درصد و تفاوت آماری معنی‌دار است ($P < 0.0001$).

شیوع چشمگیر آسفیکسی نوزاد در کشورهای در حال توسعه و نقش بسیار مهم آن در افزایش مرگ و میر و معلولیت‌های نوزادان اهمیت پیشگیری از آسفیکسی نوزاد را به عنوان یکی از اولویت‌های طب مادران و نوزادان مطرح می‌کند. زیرا آسفیکسی در بسیاری موارد منجر به مرگ جنین شده و در سایر موارد به دلیل آسیب مغزی منتهی به فلج مغزی، تشنج و اختلال در یادگیری می‌شود. از آن جاکه بند ناف ممکن است دور قسمت‌هایی از بدن جنین به خصوص گردن پیچ بخورد، با پیشرفت زایمان و نزول جنین به داخل کanal زایمانی، انقباضات رحمی ممکن است باعث فشرده‌گی بندناف و کاهش انقباضات قلب جنین شود. بنابر این پیچ‌خوردگی بندناف می‌تواند به عنوان یکی از علل آسفیکسی نوزادی مطرح گردد [۱]. از طرفی با توجه به آن که شیوع یک دور پیچ‌خوردگی بند ناف به دور گردن جنین ۲۳-۲۳ درصد است [۲، ۳]، محققین [۴] و [۵] نشان داده‌اند که وجود یک دور پیچ‌خوردگی بند ناف به دور گردن با افزایش میزان افت ضربان قلب جنین به صورت مستغیر در طول مرحله اول و دوم زایمان همراه است و احتمال اسیدمی شریان نافی را افزایش داده و حتی ممکن است منجر به مرگ جنین شود.

از طرف دیگر پیچ‌خوردگی بندناف می‌تواند باعث محدودیت رشد جنین شود و شدت محدودیت ارتباط مستقیم با تعداد پیچ‌خوردگی دارد [۶]. بنابراین از آن جاکه تقریباً تمام مواد غذایی لازم جهت رشد و بلوغ جنین توسط بند ناف به جنین می‌رسد، اختلالات ساختمانی و عملکردی بند ناف تأثیر مهمن و مستقیمی بر پیامدهای حوالی زایمان دارد و مشکلات نوزادی از جمله سندروم آسپراسیون، آنسفالوپاتی ایسکمیک-هیپوکسیک و تشنج نوزادی گزارش شده است [۱].

این در حالی است که امکان تشخیص پیچ‌خوردگی بندناف در مراحل قبل از زایمان به کمک سونوگرافی دابل‌روجود دارد [۷]. با توجه به جمیع موارد مذکور هدف از این تحقیق بررسی ارتباط پیچ‌خوردگی بند ناف با عوارض حین زایمان است.

مواد و روش کار

بر اساس شیوع یک دور پیچ‌خوردگی بندناف به دور گردن ۲۱-۲۹ درصد) [۷]، $\alpha = 0.05$ و توان مطالعه ۹۵ درصد، در

جدول شماره ۱- یافته های دموگرافیک افراد مورد بررسی

P	پیج خوردگی		متغیر
	بلی	خیر	
۰/۳۸۹	۲۵/۷۶±۵/۱۶	۲۶/۱۷±۵/۰۶	سن مادر
۰/۴۶۰	۲/۲۲±۱/۷۱	۲/۱۰±۱/۷۶	تعداد حاملگی
۰/۳۴۴	۱/۱۶±۱/۶۲	۱/۰۲±۱/۶۱	تعداد زایمان
۰/۲۱۰	۳۹/۲۷±۱/۶۲	۳۹/۴۵±۱/۵۰	سن حاملگی (هفتاه)

جدول شماره ۲- عاقبت نوزادی

P	پیج خوردگی		(درصد) (نفر ۲۴۳)
	گروه بدون پیج خوردگی (نفر ۱۶۵)	گروه با پیج خوردگی (نفر)	
۰/۰۰۹	۹/۱۱±۰/۷۳	۸/۸۷±۱/۰۹	آپکار دقیقه اول
۰/۰۱۷	۹/۹۵±۰/۲۸	۹/۸۰±۰/۸۹	آپکار دقیقه پنجم
۰/۶۹۳	۳۲۲۶/۰±۴۷۱/۱۰	۳۲۴۲/۷±۴۰۲/۷۴	وزن نوزاد به گرم
۰/۱۲۰	٪۴۵	٪۱۸	ماکروزومی (بالای ۴ کیلوگرم)

همچنین میانگین تعداد دوره های بندنا ف در گروهی که دفع مکونیوم داشتند ($۰/۷۳۹ \pm ۱/۴۱۶۷$)، به طور معنی داری بیش از گروه فقد دفع مکونیوم ($۰/۴۲۱ \pm ۰/۱۸۰۶$) بود.
 $(P=0/007)$.

نوع دیسترس جنبی در گروه دارای پیج خوردگی شامل افت متغیر $۰/۷۹$ ، افت دیبرس $۰/۳۱۰$ و افت طولانی $۰/۵۵$ درصد است، اما در گروه فقد پیج خوردگی افت متغیر $۱/۱۶$ ، افت دیبرس $۰/۱۶$ و افت طولانی $۱/۲$ درصد است. دفع مکونیوم نیز در گروه دارای پیج خوردگی به طور معنی داری بیش از گروه فقد پیج خوردگی است ($P<0/05$).

جدول شماره ۳- وقایع حین زایمان

P	پیج خوردگی		(درصد) (درصد)
	گروه بدون پیج خوردگی (درصد)	گروه با پیج خوردگی (درصد)	
<۰/۰۰۰۱	۴/۹	۲۳/۶	ضریان قلب غیرطبیعی
	۲/۱	۷/۹	افت متغیر
۰/۰۰۰۰	۱/۶	۱۰/۳	افت دیبرس
	۱/۲	۵/۵	افت طولانی
۰/۰۲۸۵	۱۵/۶	۲۴/۸	دفع مکونیوم

و شدید به ترتیب $۳۷/۵$ ، $۴۲/۸۶$ و $۰/۵۰$ درصد بود. ارتباط بین دفع مکونیوم و بروز دیسترس جنبی نیز در موارد با پیج خوردگی بندنا ف از نظر آماری معنی دار بود ($P=0/0009$). همچنین در مطالعه حاضر شیوع سازارین در گروه با پیج خوردگی نسبت به گروه فقد پیج خوردگی افزایش نداشته که ممکن است به دلیل بروز دیسترس جنبی در مراحل انتهایی زایمان و امکان زایمان قریب الوقوع باشد.

از طرفی تحقیق حاضر نشان داد که شیوع دیسترس جنبی در گروه فقد دفع مکونیوم $۰/۵/۸$ درصد و در موارد دفع مکونیوم خفیف، متوسط و شدید به ترتیب $۰/۲/۲$ ، $۰/۲/۲۵$ و $۰/۴/۲۱$ درصد است که ارتباط بین دفع مکونیوم و بروز دیسترس جنبی از نظر آماری معنی دار است ($P<0/0001$). از طرف دیگر در گروه دارای پیج خوردگی بندنا ف شیوع دیسترس جنبی در موارد فقد دفع مکونیوم $۰/۰/۲۰$ درصد است، در حالی که در گروه های با دفع مکونیوم به میزان خفیف، متوسط

از طرف دیگر تحقیق ما نشان داد که میانگین آپگار دقیقه اول و پنجم در گروه با پیچ خوردنگی به طور معنی داری از گروه فاقد پیچ خوردنگی کمتر است، در حالی که در تحقیق Larson فقط آپگار دقیقه اول کمتر بود و متوسط آپگار دقیقه ۵ در دو گروه یکسان بود، زیرا با اقدامات مناسب و سریع احیا، اسیدمی نوزاد اصلاح می شد اما آپگار پایین دقیقه پنجم در تحقیق ما شاید نشانگر آن باشد که اقدامات احیا به سرعت انجام نگرفته است.

حدود ۱۵۰ تحقیق انجام شده در رابطه با بررسی قبل از تولد مرغولوژی بندناف به طریق سونوگرافی توسط ShereDM در سال ۱۹۹۷ در آمریکا [۹] بررسی شد. وی نشان داد که حالات بالقوه خطرناک برای جنین از جمله گره بندناف و پیچ خوردنگی را می توان با سونوگرافی تشخیص داد و بررسی مرغولوژیک بندناف توسط سونوگرافی قبل از تولد ممکن است وضعیت جنین را بهبود بخشد.

Collins [۱۲] نیز نشان داد بندناف گردنی که قبل از ترم توسط سونوگرافی تشخیص داده می شود، ممکن است خوبیه خود برطرف شود و از طرفی ممکن است بندناف گردنی سبب ایجاد مشکلات حوالی زایمان شود، بنابراین انجام سونوگرافی حوالی زایمان توصیه می شود. همچنین Collins در تحقیق سال ۱۹۹۷ [۵] خود بندناف گردنی را به دو نوع A و B تقسیم بندی کرد که فرم A به صورت قفل نشده است و ممکن است خوبیه خود باز شود، اما نوع B به صورت قفل شده است و نمی تواند خوبیه خود باز شود و شیوه آن یک پنجاهم زایمان ها می باشد. علی رغم این که اکثر نوزادان با بندناف گردنی بدون عارضه خاص متولد می شوند اما در نوع B شیوه دیسترس جنینی، نیاز به سزارین و حتی امکان تولد نوزاد مرده بیشتر است.

در نهایت نتایج تحقیق ما نشان می دهد که پیچ خوردنگی بندناف می تواند منجر به یکسری عوارض جنینی و نوزادی شود در حالی که بهبود تکنیک های اولتراسونوگرافی امکان تشخیص آن را قبل از تولد فراهم کرده است و در صورت تشخیص سونوگرافیک پیچ خوردنگی بندناف کنترل دقیق و نیز در صورت امکان، مانیتورینگ مداوم جنین الزامی است.

بحث و نتیجه گیری

هدف از مطالعه حاضر تعیین تفاوت در عواقب حین زایمان و نوزادی در حاملگی های با و بدون پیچ خوردنگی بندناف بود که در جریان آن یک دور پیچ خوردنگی بندناف دورگردن در ۲۷/۸۲ درصد موارد مشاهده شد که مشابه تحقیقات [۲ و ۳] می باشد. شیوع دو دور بندناف گردنی یا بیشتر نیز ۶/۴۹ درصد بود که مشابه تحقیقات [۷، ۸ و ۱۰] می باشد (شیوع ۲/۵-۸/۳ درصد). Larson [۱۰] در سال ۱۹۹۵ نشان داد که در بیش از ۴۰ درصد موارد اختلالات بندناف، الگوی غیرطبیعی ضربان قلب جنین دیده می شود. تحقیق حاضر تعیین نشان داد که میزان بروز دیسترس جنینی در گروه با پیچ خوردنگی بندناف نسبت به گروه بدون پیچ خوردنگی به طور معنی داری بیشتر است (۲۳/۶ درصد نسبت به ۴/۹ درصد) که با تحقیق مذکور مشابه است. همچنین تحقیق مذکور نشان داد که در موارد پیچ خوردنگی بندناف افت ضربان قلب به صورت متغیر شایع تر است، اما در تحقیق حاضر شیوع افت دیررس بیشتر بوده است که شاید به دلیل عدم امکان پایش مداوم ضربان قلب در تمام بیماران این مرکز باشد.

از طرفی در مطالعه حاضر میزان دفع مکونیوم در حضور دیسترس جنینی و پیچ خوردنگی بندناف به طور معنی داری از گروه کنترل بیشتر بود ($P = 0/0001$) که این یافته نیز مشابه تحقیق Larson [۱۰] است. علاوه بر آن که در تحقیق حاضر یک مورد تولد زنده با چهار دور پیچ خوردنگی بندناف نیز دیده شد.

Sornes در سال ۱۹۹۵ در نروژ نشان داد که پیچ خوردنگی بندناف باعث محدودیت رشد جنین می شود و شدت محدودیت با تعداد پیچ خوردنگی ارتباط دارد [۱۶]. تحقیق Osak در سال ۱۹۹۷ کانادا نیز این نکته را تأیید کرد [۱۱]. همچنین تحقیق Larson [۱۰] نشان داد که وزن موقع تولد جنین های با پیچ خوردنگی بندناف کمتر است، اما در تحقیق حاضر تفاوت وزن نوزادان با و بدون پیچ خوردنگی از نظر آماری معنی دار نبود و متوسط وزن نوزادان متولد شده $460/94 \pm 2180$ است که البته با افزایش حجم نمونه ممکن است تفاوت معنی داری دیده شود.

تشکر و قدردانی

در پایان از مسئولین محترم زایشگاه نیکنفس دانشگاه علوم پزشکی کرمان و کلیه عزیزانی که در انجام این تحقیق ما را یاری نمودند، تشکر و سپاسگزاری می‌گردد

منابع

- 1-Kumari S, Saxena A, Monga D, Mali A, Kabra M, Korray RM, et al. Significance of cord problems at birth. Indian pediatrics 1992; 29: 301-5
- 2-Hankins GDV, Synder RR, Hauth JC, Gilstrap LC, Hammond T. Nuchal cords and neonatal outcome. Obstetrics & Gynecology 1987; 70: 687-91
- 3-Shui KP, Eastman NJ. Coiling of the umbilical cord around the fetal neck. Journal of Obstetrics & Gynecology British Emergency Medical Planning 1957; 64: 227-8
- 4-Wang G, Bore KE, Stanek J. Pathological evidence of prolonged umbilical cord encirclement as a cause of fetal death. American Journal of Perinatology 1998; 15: 585-8
- 5-Collins JH. Nuchal cord type A and type B. American Journal Obstetrics & Gynecology 1997; 177: 94 - 98
- 6-Sornes T. Umbilical cord encirclements and fetal growth restriction. Obstetrics & Gynecology 1998, 86: 725-8
- 7-Cunningham, Gant, Leveno. Williams Obstetrics, 20th Edition, USA: Mc Graw-Hill Companies, 2001
- 8-Lipitz S, Seidman DS, Gale R, Stevenson DK. Is fetal growth affected by cord entanglements? Journal of Perinatology 1993; 13: 385-8
- 9-Shere DM, Anyaegbuam A. Prenatal ultrasonographic morphologic assessment of the umbilical cord: a review survey. Obstetrics & Gynecology 1997; 52: 506-23
- 10-Larson JD, Rayburn WF, Crosby S, Thurnu GR. Multiple nuchal cord entanglements and intrapartum complications. American Journal of Obstetrics & Gynecology 1995; 173: 1228-31
- 11-Osak R, Webster KM, Bocking AD, Campbell MK, Richardson BS. Nuchal cord evident at birth impacts on fetal size relative to that of the placenta. Early Human Development 1997; 49: 193-200
- 12-Collins JH, Collins CR, Weekwerth SR, Angelis LD. Nuchel cords: Timing of prenatal diagnosis and duration. American Journal of Obstetrics & Gynecology 1995; 173:768-71