

## کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در سالمندان: مطالعه‌ای جمعیتی

مریم سادات وحدانی نیا\*: مریم پژوهشیار، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

دکتر آزیتا گشتاسبی: استادیار پژوهش، گروه بهداشت مادر و کودک، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

دکتر علی منظری: دانشیار پژوهش، گروه سلامت روان، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

دکتر فرزانه مفتون: استادیار پژوهش، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

فصلنامه پایش

سال چهارم شماره دوم بهار ۱۳۸۴ ص ۱۲۰-۱۱۳

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۳/۱۰/۱۶

### چکیده

سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسائل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است. با در نظر داشتن نیازهای خاص این دوران توجه به کیفیت زندگی در سالمندان نیز امر مهمی است که عمدهاً مورد غفلت قرار می‌گیرد. در پژوهش حاضر به بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در سالمندی و عوامل جمعیتی مؤثر بر آن پرداخته شده است. نمونه مورد مطالعه به روش نمونه‌گیری خوشای تصادفی شده در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران انتخاب گردید. ابزار به کار برده شده به منظور اندازه‌گیری کیفیت زندگی، گونه فارسی پرسشنامه The Short Form Health Survey (SF-36) بود. همچنین اطلاعات مربوط به وضعیت سلامتی افراد از نظر ابتلاء به بیماری‌های مزمن زمینه‌ای و نیز عوارض کوتاه مدت از طریق مصاحبه جمع‌آوری گردید. در مجموع ۳۹۶ سالمند مورد مطالعه قرار گرفتند. از این تعداد، ۳۹/۶ درصد مصاحبه شوندگان زن و ۸۰/۳ درصد متأهل بودند. از نظر توزیع سنی، ۸۲/۱ درصد در گروه سنی ۷۴-۶۰ سال بوده و میانگین سال‌های تحصیل آنان ۵/۳ سال بود.

در بررسی رابطه بین جنس و وضعیت سلامتی با میانگین امتیازهای سنجش‌های کیفیت زندگی در تمامی ابعاد تفاوت معنی‌داری از نظر آماری به دست آمد ( $P=0.007 < 0.001$ ). در بررسی رابطه بین متغیرهای سن، تحصیلات، تأهل و شغل با امتیازهای سنجش‌های کیفیت زندگی نیز، در بیشترین موارد روابط آماری معنی‌داری مشاهده شد.

یافته‌های مطالعه نشان دهنده آن است که کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در سالمندان با وضعیت سلامتی و متغیرهای جمعیتی وابسته است. با توجه به نیازهای ویژه در این دوران، کیفیت زندگی در سالمندان می‌تواند به راحتی مورد تهدید قرار گرفته و این رو در نظر داشتن عوامل رزمینه‌ای مؤثر بر سطح کیفیت زندگی دوران سالمندی دارای اهمیت بالقوه‌ای است.

**کلیدواژه‌ها:** کیفیت زندگی، سالمندی، مشخصات جمعیتی، بیماری‌های مزمن

\* نویسنده پاسخگو: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک ۵۱

تلفن: ۶۶۴۸۰۸۰۵ نامبر: ۶۶۴۸۰۸۰۵

E-mail: mvahdani@ihsr.ac.ir

نظر داشتن این امر، نیاز به برنامه ریزی نوآورانه و اصلاحاتی در سیاست‌گزاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه احساس می‌شود. در راستای تحقق این هدف سازمان بهداشت جهانی برنامه‌ای را با تمرکز بر فرآیندهای توانمند سازی در سالمندان در سه حوزه: افراد سالمند و توسعه، بهبود سلامتی و رفاه در سالمندی و اطمینان بخشی از ایجاد محیط‌های توانمند کننده و حمایتی را مورد توجه قرار داده است [۱۱].

با توجه به افزایش جمعیت سالمند و نیز مطرح بودن نیازهای خاص این مرحله از زندگی در سالمندان ضرورت بررسی کیفیت زندگی و متعاقباً نیازهای سالمندان اهمیت می‌یابد. در پژوهش حاضر به بررسی کیفیت زندگی در جمعیت سالمند شهر تهران و اثر متغیرهای زمینه‌ای بر آن پرداخته شده است.

## مواد و روش کار

این پژوهش بر مبنای جمعیت به صورت مقطعی در سطح شهر تهران در سال ۱۳۸۱ انجام شد. نمونه مورد مطالعه به روش نمونه‌گیری خوشای چند مرحله‌ای تصادفی از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران انتخاب شده و ۴۵۷ سالمند مورد مطالعه قرار گرفتند.

افراد سالمند دارای ۶۰ سال سن و بالاتر در هر دو جنس به منظور مطالعه در نظر گرفته شدند (بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی، سن سالمندی در کشورهای در حال توسعه ۶۰ سال و در کشورهای توسعه یافته ۶۵ سال در نظر گرفته می‌شود).

ابزار به کار برده شده به منظور اندازه گیری کیفیت زندگی گونه فارسی پرسشنامه The Short Form Health Survey (SF-36) بود. پایایی و روایی گونه فارسی این پرسشنامه در مطالعه دیگری نشان داده شده است [۱۲]. این پرسشنامه دارای ۳۶ سؤال بوده و کیفیت زندگی را در ۸ بعد اندازه گیری می‌نماید. با مراجعه حضوری پرسشگران آموزش دیده به درب منزل، هدف از انجام مطالعه توضیح داده شده و رضایت افراد کسب می‌شد. در صورت تمایل افراد، پرسشنامه‌ها به روش خود ایفا می‌شوند. در صورت نداشتن تحصیلات با انجام مصاحبه تکمیل شده و در صورت نداشتن تحصیلات با انجام مصاحبه توسط پرسشگر تکمیل می‌گردید. همچنین اطلاعات مربوط به

## مقدمه

سالمندی دوره‌ای از تجربه سفر زندگی است که طی آن سالمندان در معرض تهدیدات بالقوه‌ای نظیر افزایش ابتلا به بیماری‌های مزمن، تنها بی و انزوا، عدم برخورداری از حمایت اجتماعی بوده و بهدلیل ناتوانی‌های جسمی و ذهنی در موارد زیادی نیز استقلال فردیشان مورد تهدید قرار می‌گیرد [۱]. این عوامل می‌تواند منجر به افت کیفیت زندگی در سالمندان شود.

اگر چه افزایش سن در سالمندان با افت کیفیت زندگی در آنان همراه است [۲، ۳]، اما اثر سایر متغیرهای زمینه‌ای را نباید در این کاهش از نظر دور داشت. بر اساس نتایج مطالعه‌ای در این زمینه سالمندانی که در زندگی روزمره نیاز به کمک اطرافیان و مراقبان دارند از سطح کیفیت زندگی پایین‌تری برخوردار بوده و در حقیقت علایم متعددی را که نیاز به مراقبت پرستاری را در آنها مطرح می‌سازد دارند [۴].

همچنین متغیرهایی نظیر اندازه توده بدنی و فشار خون به عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در سالمندان شناسایی شده‌اند؛ چنان که سالمندان دارای اندازه مناسب توده بدنی و فشار خون تعديل شده از سلامت و عملکرد جسمی مناسبتری برخوردار هستند [۵-۷]. عوامل خوش بینی، عدم ابتلا به افسردگی و نیز ابتلا به بیماری‌های مزمن در حد کمتر و داشتن حرک در زندگی روزمره نیز بر اساس یافته‌های مطالعات به عنوان عوامل پیشگویی کننده بر پیامدهای مثبت سلامتی در سالمندان و وضعیت بهتر عملکرد جسمی و بهداشت روان نشان داده شده‌اند [۸، ۹].

همچنین باید توجه داشت با افزایش امید به زندگی و کاهش میزان باروری، نسبت افراد سنین ۶۰ سال و بالاتر در سراسر جهان در روندی سریع رو به رشد بوده است. به گونه‌ای که پیر شدن جمعیت یکی از مهم‌ترین چالش‌های بهداشت عمومی در قرن آینده خواهد بود. بنا بر آمار ارایه شده توسط سازمان بهداشت جهانی تا سال ۲۰۰۰، افراد سنین ۶۰ سال و بالاتر حدود ۶۰۰ میلیون نفر بوده است و این تعداد تا سال ۲۰۲۵ به ۱/۲ بیلیون نفر خواهد رسید. همچنین بیش از دو سوم جمعیت سالمند در کشورهای رو به توسعه بدویژه آسیای شرقی بوده و تا سال ۲۰۲۵ افزایش بیش از ۳۰۰ درصد جمعیت سالمند در این کشورها مورد انتظار است [۱۰]. با در

**یافته‌ها**

اطلاعات مربوط به کیفیت زندگی در مورد ۳۹۶ سالمند به دست آمد که از توزیع نسبتاً یکسانی در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران برخوردار بودند. در مورد متغیر شغل، افراد بازنشسته، بی‌کار و خانه‌دار به عنوان گروه غیر شاغلین در نظر گرفته شدند. در بررسی بیماری‌های مزمن، ابتلا به سرطان در یک مورد گزارش شد که به علت کم بودن حجم نمونه در این گروه، در نمونه مورد مطالعه سرطان در گروه بیماری‌های مزمن در نظر گرفته نشد. مشخصات جمعیتی نمونه مورد مطالعه در جدول شماره ۱ نشان داده شده است.

مشخصات جمعیتی و وضعیت سلامتی با پرسش از افراد جمع‌آوری گردید. وضعیت سلامت به صورت عدم ابتلا به بیماری، عوارض کوتاه مدتی که در مدت ۲ ماه اخیر فرد را دچار مشکل نموده و بیماری‌های مزمن به صورت ابتلا به فشار خون، دیابت، بیماری‌های قلبی - عروقی، درد مزمن کمر، سرطان‌ها، دردهای مفصلی، اعصاب و روان و بیماری‌های تنفسی تعریف شد. امتیازهای مربوط به سنجش‌های کیفیت زندگی در نرم‌افزار آماری SPSS محاسبه گردیده و به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه با امتیازهای این سنجش‌ها آزمون‌های t-test و ANOVA به کار برده شد.

جدول شماره ۱- مشخصات جمعیتی نمونه مورد مطالعه (n=۳۹۶)

سن (سال)	تعداد	درصد
۶۰-۷۴	۳۲۵	۸۲/۱
≥۷۵	۷۱	۱۷/۹
میانگین (انحراف معیار)	۶۷/۹ (SD=±۹/۸)	
جنس		
زن	۱۵۷	۳۹/۶
مرد	۲۳۹	۶۰/۴
تحصیلات (سال)		
بی‌سواد	۱۴۰	۳۵/۴
۱-۵	۸۶	۲۱/۷
۶-۹	۸۴	۲۱/۲
۱۰-۱۲	۴۳	۱۰/۹
>۱۲	۴۳	۱۰/۸
تأهل		
مجرد	۵	۱/۳
متأهل	۳۱۸	۸۰/۳
مطلقه / بیووه	۷۳	۱۸/۴
شغل		
غیر شاغل	۳۰۸	۷۷/۸
شاغل	۸۸	۲۲/۲
وضعیت سلامتی		
سالم	۲۳۸	۶۰/۱
عوارض کوتاه مدت	۵۵	۱۳/۹
ابتلا به بیماری مزمن	۱۰۳	۲۶

در بررسی ارتباط بین میانگین امتیازهای مربوط به سنجش‌های کیفیت زندگی با سطح تحصیلات (آزمون ANOVA) نیز در مورد بیشتر سنجش‌ها تفاوت معنی‌دار از نظر آماری مشاهده شد (جدول شماره ۴).

ارتباط بین میانگین امتیازهای مربوط به سنجش‌های کیفیت زندگی با وضعیت تأهل (آزمون t-test) در جدول شماره ۵ ارایه شده است. در تمامی سنجش‌ها متأهلین نسبت به دو گروه مجرد و مطلقه / بیوه از میانگین امتیاز بالاتری برخوردار بودند. ارتباط معنی‌دار آماری نیز به جز در مورد سنجش محدودیت جسمی، در مورد سایر سنجش‌ها به دست آمد.

در بررسی تحلیلی ارتباط بین متغیرهای جنس، سن و شغل بر میانگین امتیازهای مربوط به سنجش‌های کیفیت زندگی مورد بررسی قرار گرفت (آزمون t-test). به این ترتیب متغیر جنس بر میانگین تمامی سنجش‌های کیفیت زندگی اثر داشته؛ به طوری که در تمامی سنجش‌ها متوسط نمرات در گروه زنان نسبت به مردان پایین‌تر است. در مورد متغیر سن نیز، بیشترین تغییرات در میانگین در مورد سنجش محدودیت جسمی نشان داده شد (جدول شماره ۲). در بررسی ارتباط شغل با میانگین سنجش‌های کیفیت زندگی نیز، ارتباط معنی‌داری در تمامی سنجش‌ها به جز سنجش سلامت روان به دست آمد. در تمامی سنجش‌ها نیز گروه شاغلین از میانگین امتیاز بالاتری برخوردار بودند (جدول شماره ۳).

جدول شماره ۲- ارتباط متغیرهای جنس و سن با میانگین امتیازهای سنجش‌های کیفیت زندگی در نمونه مورد مطالعه (n=۳۹۶)

P	سن				P	جنس				
	(n=۷۱) ≥۷۵		(n=۳۲۵) ۶۰-۷۴			مرد (n=۲۳۹)		زن (n=۱۵۷)		
	SD	میانگین	SD	میانگین		SD	میانگین	SD	میانگین	
0/001	۳۰/۵	۴۹/۸	۲۶/۸	۶۲/۸	<0/001	۲۴/۹	۶۸/۳	۲۷/۹	۴۸/۳	عملکرد جسمی
0/003	۴۰/۵	۲۷/۴	۴۱/۵	۴۳/۴	<0/001	۴۲/۵	۴۸/۹	۳۷/۱	۲۷/۸	محدودیت جسمی
0/02	۳۰/۷	۵۲/۶	۲۹/۲	۶۱/۷	<0/001	۲۷/۹	۶۶/۷	۲۹/۲	۴۹/۹	درد جسمی
0/۲۳	۲۰/۲	۴۸/۳	۲۰/۹	۵۱/۵	<0/001	۲۰/۸	۵۴/۲	۱۹/۷	۴۶/۱	سلامت عمومی
0/۰۰۲	۱۸/۲	۴۹/۲	۱۹/۳	۵۷/۱	<0/001	۱۸/۱	۵۹/۹	۱۹/۴	۴۹/۴	نشاط
0/۱۲	۳۱/۲	۵۵/۸	۲۷/۷	۶۲/۰	<0/001	۲۶/۳	۶۵/۵	۳۰/۰	۵۳/۸	عملکرد اجتماعی
0/۱۹	۴۵/۱	۴۵/۵	۴۴/۱	۵۳/۲	<0/001	۴۳/۱	۵۸/۷	۴۴/۴	۴۱/۴	مشکلات روحی
0/۷۷	۱۶/۰	۶۳/۰	۱۸/۰	۶۲/۴	<0/001	۱۷/۳	۶۵/۳	۱۷/۵	۵۸/۲	سلامت روان

جدول شماره ۳- ارتباط متغیر شغل با میانگین امتیازهای سنجش‌های کیفیت زندگی

در نمونه مورد مطالعه (n=۳۹۶)

P	شغل				
	(n=۸۸) شاغل		غیر شاغل (n=۳۰۸)		
	SD	میانگین	SD	میانگین	
<0/001	۲۰/۳	۷۶/۱	۲۸/۲	۵۶/۱	عملکرد جسمی
0/001	۴۱/۵	۵۳/۹	۴۱/۱	۳۶/۷	محدودیت جسمی
<0/001	۲۵/۹	۷۲/۵	۲۹/۷	۵۶/۵	درد جسمی
0/001	۱۸/۳	۵۷/۷	۲۱/۱	۴۹/۱	سلامت عمومی
<0/001	۱۵/۶	۶۳/۵	۱۹/۷	۳۵/۵	نشاط
0/02	۲۳/۷	۶۷/۰	۲۹/۴	۵۹/۱	عملکرد اجتماعی
0/01	۴۱/۴	۶۲/۱	۴۴/۸	۴۸/۹	مشکلات روحی
0/06	۱۷/۰	۶۵/۶	۱۷/۸	۶۱/۷	سلامت روان

افراد سالم در تمامی سنجش‌ها از دو گروه مبتلا به عوارض کوتاه مدت و بیماری‌های مزمن از میانگین امتیاز بالاتری برخوردار بودند (جدول شماره ۶).

ارتباط بین وضعیت سلامتی با میانگین امتیاز‌های مربوط به سنجش‌های کیفیت زندگی نیز (آزمون t-test) در تمامی سنجش‌ها تفاوت معنی‌داری را به دست داد. به این نحو که

جدول شماره ۴- ارتباط سال تحصیلات با میانگین امتیاز‌های سنجش‌های کیفیت زندگی در نمونه مورد مطالعه (n=۳۹۶)

P	(n=۴۳)>۱۲		(n=۴۳) ۱۰-۱۲		(n=۸۴) ۶-۹		(n=۸۶) ۱-۵		بی‌ساد (n=۱۴۰)	
	SD	میانگین	SD	میانگین	SD	میانگین	SD	میانگین	SD	میانگین
<0.001	۲۱/۸	۷۴/۱	۲۴/۲	۶۹/۳	۲۸/۹	۶۴/۰	۲۶/۶	۶۱/۱	۲۷/۹	۵۱/۱
0.005	۴۳/۹	۵۵/۸	۴۱/۹	۵۲/۹	۴۰/۷	۴۰/۴	۴۰/۳	۳۹/۸	۴۰/۹	۳۲/۶
0.003	۳۲/۲	۶۸/۳	۲۸/۴	۶۹/۳	۳۳/۵	۵۸/۹	۲۶/۶	۶۳/۵	۲۷/۱	۵۳/۳
0.03	۲۲/۱	۵۸/۵	۲۲/۸	۵۴/۲	۲۱/۶	۴۸/۵	۲۱/۷	۵۲/۱	۱۷/۹	۴۸/۳
0.45	۲۱/۱	۵۹/۱	۲۲/۶	۵۷/۲	۲۱/۸	۵۴/۵	۱۷/۰	۵۷/۴	۱۷/۴	۵۳/۹
0.02	۲۹/۹	۶۸/۰	۲۸/۹	۶۴/۵	۳۲/۱	۶۳/۵	۲۵/۲	۶۳/۰	۲۶/۴	۵۴/۶
0.05	۴۳/۴	۶۲/۰	۴۱/۰	۶۳/۵	۴۵/۹	۴۶/۴	۴۳/۳	۵۵/۴	۴۴/۴	۴۶/۱
0.60	۲۰/۰	۶۵/۷	۲۱/۵	۶۳/۴	۱۹/۶	۶۱/۳	۱۵/۲	۶۳/۴	۱۵/۸	۶۱/۴

جدول شماره ۵- ارتباط وضعیت تأهیل با میانگین امتیاز‌های سنجش‌های کیفیت زندگی

در نمونه مورد مطالعه (n=۳۹۶)

P	(n=۷۳) مطلقه / بیوه		(n=۳۱۸) متأهل	
	SD	میانگین	SD	میانگین
<0.001	۳۱/۴	۴۶/۵	۲۵/۹	۶۳/۹
0.1	۴۱/۳	۳۴/۹	۴۱/۷	۴۱/۹
<0.001	۲۶/۲	۴۹/۶	۲۹/۹	۶۲/۶
0.04	۲۰/۷	۴۶/۷	۲۰/۷	۵۲/۰
<0.001	۱۹/۹	۴۷/۶	۱۸/۷	۵۷/۷
<0.001	۲۷/۸	۴۹/۸	۲۷/۹	۶۳/۶
<0.001	۴۳/۹	۳۹/۷	۴۴/۰	۵۴/۸
<0.001	۱۵/۹	۵۵/۶	۱۷/۷	۶۴/۲

جدول شماره ۶- ارتباط وضعیت سلامتی با میانگین امتیاز‌های سنجش‌های کیفیت زندگی

در نمونه مورد مطالعه (n=۳۹۶)

P	(n=۱۵۸) بیمار		(n=۲۳۸) سالم	
	SD	میانگین	SD	میانگین
<0.001	۲۷/۸	۵۱/۶	۲۶/۴	۶۶/۳
0.007	۴۰/۵	۳۳/۷	۴۲/۰	۴۵/۱
<0.001	۲۸/۶	۴۸/۸	۲۷/۹	۶۷/۵
<0.001	۲۱/۲	۴۵/۶	۱۹/۷	۵۴/۵
<0.001	۲۰/۵	۴۹/۲	۱۷/۳	۶۰/۱
<0.001	۲۹/۱	۵۱/۹	۲۶/۳	۶۶/۸
0.008	۴۵/۱	۴۴/۵	۴۳/۳	۵۶/۷
<0.001	۱۷/۸	۵۷/۴	۱۶/۸	۶۵/۹

معنادار آماری به دست آمد و عمدها سالمندان در سطوح تحصیلی دبیلم و بالاتر نسبت به سطوح پایین تر تحصیلی از میانگین امتیاز بالاتری برخوردار بودند. این یافته در تأیید یافته های مطالعات دیگر نشان دهنده آن است که تحصیلات به عنوان نقطه مثبتی در برخورداری از یک زندگی سالمندی سالم مؤثر بوده و این امر به سلامتی بهتر و رضایت از زندگی منجر می شود [۱۷].

در بررسی رابطه متغیر وضعیت تأهل، میانگین امتیاز های سنجش های کیفیت زندگی در متأهلین از دو گروه مجرد و مطلقه / بیوی بیشتر به دست آمد. از آنجا که یکی از خطرات بالقوه تهدید کننده سلامتی در سنین سالمندی، تنها وی و انزواست، توجه به ایجاد محیطی حمایتی و توانمندسازی سالمندان به منظور مواجهه مناسب با این عامل ضروری به نظر می رسد. چنان که برخورداری از حس تعلق به عنوان عاملی مؤثر بر کیفیت زندگی در سالمندان نشان داده شده است [۱۸].

در بررسی وضعیت سلامتی سالمندان نیز، در تمامی ابعاد سالمندان مبتلا به هر دو عوارض کوتاه مدت و نیز بیماری های مزمن میانگین امتیاز کیفیت زندگی پایین تری را داشته و تفاوت های آماری معناداری در مقایسه با گروه سالم نشان داده شد. به این ترتیب بر اساس نتایج مطالعه، وضعیت سلامتی فرد به عنوان یک عامل پیشگویی کننده بر سطح امتیاز کسب شده در سنجش های کیفیت زندگی دارای اثر است.

همچنین به نظر می رسد ابزار به کار برده شده جهت اندازه گیری کیفیت زندگی از روایی و اعتبار لازم در جهت پیشگویی امتیاز های کیفیت زندگی در سالمندان برخوردار است. چنانچه بر اساس نتایج مطالعات نیز ابزار استاندارد SF-36 می تواند برای ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در سالمندان به کار برده شده و از اعتبار لازم در این زمینه برخوردار است [۱۹].

به طور کلی از آنجا که با افزایش سن، احتمال ابتلا به بیماری های مزمن در سالمندان افزایش می یابد، توجه به عوامل حمایت کننده و سایر متغیرهای زمینه ای در جهت توانمند سازی سالمندان که منجر به ارتقای کیفیت زندگی در آنان می گردد ضرورت و اهمیت می یابد.

## بحث و نتیجه گیری

در مطالعه حاضر به بررسی اثر متغیرهای جمعیتی جنس، سن، شغل، تحصیلات و تأهل و نیز وضعیت سلامتی بر کیفیت زندگی جمعیت سالمند شهر تهران با استفاده از ابزار استاندارد SF-36 پرداخته شد.

در بررسی تأثیر متغیر جنس، میانگین نمره امتیاز های زنان در تمامی سنجش ها نسبت به مردان پایین تر بوده و تفاوت های معناداری را از نظر آماری نشان داد. این یافته در تأیید نتایج مطالعات در این زمینه است [۲، ۳]. البته در مطالعاتی دیگر متغیر جنس در تعامل با سایر متغیرهای زمینه ای مؤثر بر کیفیت زندگی در سالمندان، به عنوان عاملی مؤثر نشان داده نشده و عواملی نظیر ناتوانی های عملکردی دارای ارتباط بیشتری بودند [۱۳].

در مورد متغیر سن نیز، بیشترین تفاوت در میانگین امتیاز ها در ابعاد عملکرد جسمی و نشاط مشاهده شد و سالمندان سنین بیش از ۷۵ سال از امتیاز پایین تری برخوردار بودند. بدیهی است در سنین بالاتر سالمندی بروز ناتوانی ها بازتر بوده و به صورت کاهش فعالیت جسمی و محدودیت های جسمانی ظاهر می شود، اگر چه افزایش سن اثری بر روی ابعاد سلامت عمومی و روانی سالمندان به دست نداد. همچنین در بررسی اثر متغیر شغل، گروه شاغلین از میانگین امتیاز بالاتر در تمامی سنجش ها برخوردار بوده و ارتباط آماری معناداری بین دو گروه در تمامی سنجش ها نشان داده شد. این یافته ها در تأیید یافته های مطالعات در این زمینه بیانگر آن است که افزایش سن به تنها ی اثری بر روی ابعاد کیفیت زندگی به ویژه سلامت روانی نداشته و توجه به سایر ابعاد زندگی در یک سالمند بویژه ابعاد عملکردی، استقلال فردی و حس کنترل فرد بر زندگی خود دارای اثر پیشگویی کننده بر کیفیت زندگی در سالمندان هستند [۱۴، ۱۵]. از این رو، هنگامی که سالمندان در یک شیوه زندگی ارتقا دهنده سلامتی در گیر گردد، از استعداد بیشتری برای بهره مندی از یک زندگی سالم برخوردار بوده و احتمالاً به مدت طولانی تری از یک زندگی بدون بار بیماری و ناتوانی بهره خواهد برد [۱۶]. در مورد سطح تحصیلات نیز، بین سطوح مختلف تحصیلی در مورد بیشترین سنجش های کیفیت زندگی تفاوت های

دوران می‌تواند به راحتی مورد تهدید قرار گیرد، در نظر داشتن عوامل زمینه‌ای مؤثر بر کیفیت زندگی سالمندی از اهمیت بالقوه‌ای برخوردار است. از این رو از آنجا که کیفیت زندگی به بسیاری منابع و متغیرهای زمینه‌ای وابسته است، برنامه‌ریزی‌هایی در جهت افزایش مشارکت اجتماعی، بهبود خدمات پزشکی و بهداشتی و ارایه خدمات مشاوره در جمعیت سالمندان باید مد نظر قرار گیرد. طراحی مطالعات جامع و طولی در درک بهتر سالمندی سالم و کیفیت زندگی در سالمندان نیز پیشنهاد می‌گردد.

همچنین اندازه گیری کیفیت زندگی در سالمندان به منظور بررسی وضعیت سلامت آنان، بررسی اثر درمانی مداخلات پزشکی در مورد بیماری‌های مزمن، ارزیابی بار بیماری و تخمین هزینه - اثربخشی سیاست‌های مراقبت بهداشتی در سالمندان و نیز برنامه ریزی‌های بهداشتی کمک‌کننده است [۲۰، ۲]. در مجموع یافته‌های مطالعه حاضر نشان دهنده اثر پیشگویی کننده وضعیت سلامتی و نیز متغیرهای جمعیتی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در دوران سالمندی است. با توجه به آن که کیفیت زندگی در این

## منابع

- 1- Heath H, Schofield I. Healthy ageing, nursing older people. Part I: Theoretical foundation. 1<sup>st</sup> Edition, Mosby publishers: Italy, 1999
- 2- Tsai SY, Chi LY, Lee LS, Chou P. Health-related quality of life among urban, rural and island community elderly in Taiwan. Journal of Formos Medicine Association 2004; 103: 196-204
- 3- Knurowski T, Lazic D, van Dijk JP, Geckova AM, Tobiasz- Adamczyk B, van den Heuvel WJ. Survey of Health status and quality of life of the elderly in Poland and Croatia. Croatia Medicine Journal 2004; 45: 750-56
- 4- Hellstrom Y, Persson G, Hallberg IR. Quality of life and symptoms among older people living at home. Journal of Advanced Nursing 2004; 48: 584-93
- 5- Yan LL, Daviglas ML, Liu K. BMI and health-related quality of life in adults 65 years and older. Obesity Research 2004; 12: 69-76
- 6- Furmonavicius T. Impact of physiological factors on some dimensions of health-related quality of life of elder men. Medicine 2003; 39: 896-901
- 7- Stewart KJ, Turner KL, Bacher AC. Are fitness, activity and fatness associated with health-related quality of life and mood in older persons? Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation 2003; 23: 115-21
- 8- Achat H, Kawachi I, Spiro I, de Medles DA, Sparrow D. Optimism and depression as predictors of physical and mental functioning: the normative aging study. Annals of Behavioral Medicine 2000; 22: 127-30
- 9- Bryant LL, Beck A, Faireclough DL. Factors that contribute to positive perceived health in an older population. Journal of Aging and Health 2000; 12: 169-92
- 10- Towards policy for health and ageing. Available in: who.int/hpr/ageing/ageing.pdf
- 11- Active ageing: a policy framework. Available in: who.int.hpr/ageing/ActiveAgeingPolicyFrame.pdf
- 12- Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The short form health survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Quality of Life Research 2005; 14: 875-82
- 13- Lee Y, Shinkai S. A comparison of correlates of self-rated health and functional disability of older persons in the Far East: Japan and Korea. Archive of Gerontology of Geriatrics 2003; 37: 63-76
- 14- Hellstrom Y, Hallberg IR. Determinants and characteristics of help provision for elderly people living at home and in relation to quality of life. Scandinavian Journal of Caring Science 2004; 18: 387-95
- 15- Mowad L. Correlates of quality of life in older adult veterans. Western Journal of Nursing Research 2004; 26: 293-306
- 16- Stuifbergen AK, Seraphin A, Roberts G. An explanatory model of health promotion and quality of life in chronic disability conditions. Nursing

- Research 2000; 4: 122-9
- 17- Meek S. Contribution of education to health and life satisfaction in older adults mediated by negative affect. Journal of Ageing and Health 2001; 13: 92-119
- 18- Nesbit BJ, Heidrich SM. Sense of coherence and illness appraisal in older women's quality of life. Research in Nursing and Health 2000; 23: 25-34
- 19- Azen SP, Palmer JM, Mandel D. Psychometric properties of Chinese translation of the SF-36 health survey questionnaire in the well elderly study. Journal of Ageing and Health 1999; 11: 240-51
- 20- Lips P, van Schoor NM. Quality of life in patients with osteoporosis. Osteoporosis International 2005; 16: 447-55