

آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان مرد مدارس مقطع راهنمایی پسرانه شهر تهران در مورد مصرف دخانیات

غلامرضا حیدری: پژوهش عمومی، مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات، پژوهشکده سل و بیماری‌های ریوی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

علی رمضانخانی: دانشیار، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مصطفی حسینی*: دانشیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمود یوسفی فرد: دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد رضا مسجدی: استاد، پژوهشکده سل و بیماری‌های ریوی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فصلنامه پایش
سال نهم شماره چهارم پاییز ۱۳۸۹ صص ۳۶۱-۳۵۵
تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۷/۸/۱۱
[نشر الکترونیک پیش از انتشار-۲ آبان ۱۳۸۹]

چکیده

میزان آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان در مورد مصرف دخانیات باید مورد مطالعه قرار گیرد. زیرا مصرف سیگار این قشر به عنوان الگوی تواند تأثیر بسزایی بر شروع و تجربه مصرف دخانیات دانش آموزان داشته باشد. بدین منظور در سال ۸۷ این مطالعه بر روی ۵۵۱ معلم مرد مدارس مقطع راهنمایی پسرانه شهر تهران انجام پذیرفت. در ابتدا ۵ منطقه آموزش و پرورش و سپس در هر منطقه ۱۰ مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند. از همه معلمان مدارس منتخب در مورد وضعیت مصرف سیگار، آگاهی، نگرش و عملکرد آنها سؤالاتی پرسیده شد.

از معلمان مورد مطالعه ۱۵۰ نفر تجربه مصرف بیش از ۱۰۰ نخ سیگار داشته‌اند. بنابراین شیوع مصرف سیگار آنان در سال ۸۷٪/٪ ۲۷/٪ ۹۵٪/٪ ۳۱/٪ ۲۲٪/٪ ۲۳٪/٪ ۴/٪ ۹۵٪/٪ ۱۴/٪ ۵ درصد) به صورت روزانه و ۴۰ نفر (٪ ۷/٪ ۳ درصد) به صورت گهگاهی سیگار می‌کشیدند. هر چند ۳۰ نفر (٪ ۵/٪ ۴ درصد) دیگر در هنگام مصاحبه اظهار به ترک سیگار نمودند. آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان مورد مطالعه ارتباط معنی داری با مصرف سیگار آنها داشت ($P < 0.001$). معلمان با آگاهی ضعیف، نگرش و عملکرد نامناسب‌تری داشتند. ضمناً معلمان با نگرش نامناسب، عملکرد نامناسب‌تری نیز داشتند. شیوع مصرف سیگار، همچنین ارتباط بین آگاهی، نگرش و عملکرد در بین معلمان مناطق مختلف آموزش و پرورش، بین معلمان متولد تهران و سایر شهرستان‌ها و همچنین بین آگاهی، نگرش و عملکرد متفاوت معنی داری نداشت ($P > 0.05$). به نظر می‌رسد شیوع مصرف سیگار معلمان تقریباً مشابه عموم مردم است. به دلیل الگوپذیری دانش آموزان از معلمان باستی برنامه‌های آموزشی کنترل دخانیات برای این قشر طراحی و اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها: مصرف سیگار، دخانیات، معلمان، آگاهی، نگرش، عملکرد

*نویسنده پاسخگو: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی

تلفن: ۸۸۹۸۹۱۲۵

E-mail: mhossein110@yahoo.com

[۱۶، ۱۷]. بنابراین بررسی وضعیت آگاهی، نگرش، عملکرد و شیوع مصرف سیگار این گروه می‌تواند نه تنها در برنامه‌ریزی‌های کنترل دخانیات آنها، بلکه در پیشگیری مصرف در نوجوانان نیز مورد استفاده مسئولان کشور قرار گیرد. تاکنون چنین مطالعه‌ای در کشور ما صورت نگرفته و در بررسی وسیع متون نیز مطالعه مشابهی در جهان یافت نشد.

مواد و روش کار

مطالعه حاضر مقطعی - توصیفی است که در آن معلمان مرد مدارس مقطع راهنمایی پسرانه شهر تهران طی سال ۸۷ از نظر نگرش، آگاهی و عملکرد در مورد مصرف دخانیات مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از فرمول $d = \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 p(1-p)}{n}$ و با در نظر گرفتن $P=0.5$ برای سطح آگاهی، نگرش و عملکرد خوب و متوسط و اطمینان آماری 95% و دقت $d=0.5$ اندازه نمونه 385 نفر در نظر گرفته شد و مقرر گردید به صورت تصادفی از مناطق مختلف آموزش و پرورش تهران انتخاب شود. در ابتدا با استفاده از جدول اعداد تصادفی از میان کلیه مناطق آموزش و پرورش 5 منطقه انتخاب گردید. سپس در هر منطقه 10 مدرسه راهنمایی پسرانه به صورت تصادفی انتخاب شد و با احتساب وجود به طور متوسط 10 معلم در هر مدرسه و پرسشگری از تمامی معلمان مدارس مربوطه مجموعاً 551 نفر مورد بررسی قرار گرفت.

از آنجایی که در عمل انتخاب تصادفی معلمان از مدارس راهنمایی به صورت خوش‌های بوده است با احتساب ضریب طراحی (Design effect) حدود $1/5$ و افزایش نمونه 385 تا 551 نفر دقت‌های ذکر شده در محاسبه اندازه نمونه اولیه نیز افزایش یافت.

در مدارس از پرسشنامه خوداظهاری مقتبس از پرسشنامه استاندارد سازمان بهداشت جهانی و اتحادیه جهانی مبارزه با سل و بیماری‌های ریوی استفاده گردید که از پایایی و روایی آن در مطالعات قبلی و همچنین در بررسی مقدماتی این مطالعه حاضر اطمینان حاصل شده بود [۱۸، ۱۹]. شاخص‌های اندازه‌گیری شده شامل سن شروع مصرف سیگار، محل تولد، نوع استخدام، تجربه مصرف سیگار (صرف حداقل 100 نخ سیگار به عنوان فرد سیگاری تعریف شده است)، وضعیت مصرف سیگار در حال حاضر، آگاهی درباره دخانیات (شامل 4 سؤال اطلاعات عمومی 4 جوابی)، نگرش

مقدمه

صرف سیگار در افرادی که الگوی نوجوانان و جوانان هستند، می‌تواند باعث شروع و تجربه مصرف در آنان گردد. از این افراد می‌توان به هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان، روحانیون و خصوصاً به معلمان اشاره کرد. پولسن و همکاران بر اساس مطالعه‌ای در دانمارک اظهار می‌دارند که مصرف سیگار معلمان در ساعت مدرسه در سیگاری شدن دانش آموزان نقش مهمی را ایفا می‌کند [۱]. بنابراین باید میزان آگاهی، نگرش، عملکرد و شیوع مصرف دخانیات معلمان مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت نیاز برای آنان برنامه‌های آموزشی تدوین گردد [۲، ۳].

در جهان مطالعات معدودی در این زمینه انجام پذیرفته است. سورنسن و همکاران در هند شیوع مصرف سیگار معلمان را بالا ذکر کرده و دسترسی به شرایط ترک آن را مشکل گزارش نموده‌اند [۴]. مطالعه‌ای در ترکیه میزان شیوع مصرف سیگار معلمان مرد و زن را به ترتیب 48 و 33 درصد گزارش می‌نماید. هر چند در این مطالعه میزان آگاهی و نگرش این معلمان نسبت به قوانین مربوط به تولید و منع مصرف سیگار مناسب ذکر شده است [۵]. همچنین تالای و همکاران در مطالعه‌ای دیگر در ترکیه شیوع مصرف سیگار معلمان را بالا گزارش کرده و از آن به عنوان عامل خطری برای مصرف سیگار دانش آموزان نام برده‌اند [۶]. در یمن عبدالله و همکاران میزان شیوع مصرف سیگار معلمان مرد را 14 درصد گزارش نموده‌اند [۷].

ساخر مطالعات در ترکیه، اسپانیا، ژاپن، رومانی، مالزی، هند، و نیال میزان شیوع مصرف سیگار معلمان را به ترتیب 43 ، 45 ، 37 ، 21 ، 20 و 65 درصد بیان نموده‌اند [۸-۱۴]. از مطالعه‌ای در هند بر روی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان در مورد مصرف دخانیات این نتیجه به دست آمد که تمامی دانشجویان از مضرات سیگار آگاه بوده‌اند، ولی وضع نگرش مطلوبی نداشته‌اند و در ضمن 29 درصد از دانشجویان غیرپزشکی و 18 درصد از دانشجویان پزشکی سیگار مصرف می‌نمودند که مؤید این مطلب است که صرف آگاهی بالا به تنها نمی‌تواند رفتار (عملکرد) فرد را تغییر دهد [۱۵].

انتخاب معلمان دوره راهنمایی به این دلیل بوده است که مطالعات نشان داده‌اند اولاً سینین مقطع راهنمایی دوره بحرانی و مهمی برای شروع مصرف دخانیات دانش آموزان بوده و ثانیاً چنانچه ذکر شد معلمان می‌توانند از مؤثرترین الگوهای آنان باشند

(P=0/13). درصد معلمان سیگاری متولد تهران و یا شهرستان‌ها نیز تفاوت معنی‌داری نداشت (P=0/18). همچنین بین نوع استخدام معلمان با شیوع مصرف سیگار آنها ارتباط معنی‌داری مشاهده نگردید (P=0/25). جدول شماره ۳ وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان مورد مطالعه بر حسب وضعیت مصرف دخانیات آنها را نشان می‌دهد. چنانچه جدول شماره ۳ نشان می‌دهد، آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان مورد مطالعه ارتباط معنی‌داری با مصرف سیگار آنها دارد (P<0/001). بدین مفهوم که درصد بیشتری از معلمان با آگاهی ضعیف (48/4 درصد) نسبت به معلمان با آگاهی متوسط و خوب (21/3 درصد) مبادرت به مصرف سیگار می‌نمودند. همچنین معلمان با نگرش سطح متوسط و خوب نسبت به مسئله دخانیات کمتر از معلمان با نگرش نامناسب مبادرت به مصرف سیگار می‌نمودند (19/5 درصد در مقابل 66/7 درصد). فقط ۷/۵ درصد از معلمانی که اظهار می‌داشتند در سال‌های آینده مبادرت به مصرف دخانیات نخواهند نمود، سیگاری بودند (یعنی عملکرد مناسب داشتند). درصورتی که ۸۰ درصد از آنها بی‌که اظهار داشتند با احتمال یا حتی در سال‌های آینده دخانیات مصرف خواهد نمود (یعنی عملکرد نامناسب داشته‌اند) سیگاری بودند.

به عبارت دیگر نسبت شانس مصرف سیگار معلمان با آگاهی ضعیف، ۳/۵ برابر (CI: ۲/۳-۵/۲٪) معلمان با آگاهی متوسط و خوب است. همچنین نسبت شانس مصرف سیگار معلمان با نگرش نامناسب ۴/۴ برابر (CI: ۲/۷-۷/۶٪) آنها بی‌که نگرش متوسط و خوب داشته‌اند. نسبت شانس مصرف سیگار معلمان با عملکرد نامناسب حدود ۲/۹ برابر (CI: ۱/۵-۵/۶٪) معلمانی است که عملکرد مناسب داشته‌اند.

ضمناً در این مطالعه معلمین با آگاهی ضعیف، نگرش نامناسب‌تری نسبت به معلمان با آگاهی متوسط و خوب داشتند (P=0/001 در مقابل ۱۴/۲٪، ۰/۲۶٪). از طرفی معلمان با آگاهی ضعیف، عملکرد نامناسب‌تری نسبت به معلمان با آگاهی متوسط و خوب داشتند (P=0/۵٪ در مقابل ۱۰/۶٪، ۰/۰۴٪). علاوه بر این معلمان با نگرش نامناسب، عملکرد نامناسب‌تری نیز نسبت به گروه خوب و متوسط داشتند (P<0/001 در مقابل ۴/۲٪، ۰/۲۸٪).

بحث و نتیجه گيري

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که شیوع مصرف سیگار معلمان مرد مورد مطالعه ۲۷/۲ درصد بوده که متأسفانه با میزان شیوع در

درباره دخانیات (۴ سؤال ۵ جوابی نزدبانی) و یک سؤال عملکرد در مورد احتمال عدم مصرف دخانیات طی ۵ سال آینده مورد ارزیابی قرار گرفت (جدول شماره ۱).

در مورد سؤالات آگاهی و نگرش از جمع و طبقه بندي مجموعه نمرات اخذ شده پاسخ‌های افراد به دو گروه نامناسب و متوسط و خوب گروه بندي گردید و پاسخ‌های صحیح سؤال عملکرد به صورت مناسب و سایر گزینه‌ها به صورت نامناسب طبقه بندي شد و از این گروه بندي‌ها در تحلیل‌ها استفاده گردید. اطلاعات مطالعه در نرمافزار (11.5 SPSS) وارد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از توصیف وضعیت مصرف سیگار، آزمون کای دو و تحلیل رگرسیون لجستیک در بررسی ارتباط آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان و مصرف سیگار آنها مورد استفاده قرار گرفت و سطح معنی‌داری a=0/05 در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

در این مطالعه ۵۵۱ معلم مرد مدارس مقطع راهنمایی پسرانه در تهران مورد پرسشگری قرار گرفتند و علاوه بر برخی مشخصات جمعیتی، سؤالاتی در مورد آگاهی از مضرات سیگار و نگرش و عملکرد آنان در مورد مصرف آن پرسیده شد. همان طور که در جدول شماره ۲ ملاحظه می‌شود از معلمان مورد مطالعه ۱۵۰ نفر تجربه مصرف بیش از ۱۰۰ نخ سیگار داشته‌اند که از نظر این مطالعه سیگاری تعریف می‌شوند هر چند ۳۰ نفر (5/4٪) از آنان در مصاحبه اظهار به ترک سیگار نمودند. بدین ترتیب در سال ۸۷ شیوع مصرف سیگار معلمان مرد مدارس مقطع راهنمایی پسرانه تهران ۰/۲۷٪ (CI: ۰/۲۲-۰/۳۱٪) بوده است. ۸۰ نفر (۱۴/۵٪) درصد از معلمان به صورت روزانه و ۴۰ نفر (7/۳٪) درصد) به صورت گهگاهی سیگار مصرف می‌نمودند. سایر معلمان (40/1 نفر، ۷۲/۸ درصد) یا اصلاً تجربه مصرف سیگار نداشتند و یا تجربه مصرف آنان کمتر از ۱۰۰ نخ سیگار بوده است. ۶۰ نفر از معلمان سیگاری (روزانه یا گهگاهی) کمتر از ۱۰ نخ سیگار (50 درصد، ۴1/۷٪ درصد ۵۰ نفر) بین ۱۱ تا ۲۰ نخ سیگار و ۸/۳ درصد (10 نفر) بیش از ۲۰ نخ سیگار مصرف می‌نمودند. ۱۷ نفر (14/2٪ درصد) از معلمان سیگاری اظهار داشته‌اند که در فاصله ۵ دقیقه اول بعد از بیدار شدن، سیگار مصرف می‌کنند. میانگین (انحراف معیار) سن شروع مصرف سیگار معلمان مورد مطالعه (17/3 سالگی) بوده است (جدول شماره ۲). شیوع مصرف سیگار در بین معلمان در مناطق مختلف جغرافیایی آموزش و پرورش تفاوت معنی‌داری نداشت

نپرداخته‌اند. نتایج این مطالعه گواه این مطلب است که فقط ۶۰ درصد از معلمان مورد مطالعه دارای آگاهی متوسط و خوب هستند، در صورتی که نگرش متوسط و خوب درباره عدم مصرف دخانیات در بیش از ۸۰ درصد از این افراد دیده می‌شود. در این مطالعه شیوع مصرف سیگار در معلمانی که دارای سطح آگاهی پایین‌تر یا نگرشی نامناسب هستند، بالاتر است که با نتایج این گونه مطالعات در سایر اقسام مطابقت دارد [۱۸، ۱۹، ۲۱].

به طور کلی با توجه به درصد نسبتاً پایین آگاهی متوسط و خوب در این قشر متعالی از جامعه، باید برنامه‌ریزی‌های کنترل دخانیات در پیشگیری از مصرف در این افراد، مورد نظر مسئولان کشور قرار گیرد. در یافته‌های بدست آمده از این مطالعه تفاوتی در تجربه سیگار معلمان، بر حسب منطقه جغرافیایی خدمت دیده نشد که این امر توجیه پذیر است. چرا که تجربه شروع مصرف سیگار در معلمان مورد مطالعه به سال‌های قبل از خدمت یعنی به حدود ۱۷ سالگی می‌رسد.

کل جامعه مردان تفاوتی ندارد، در صورتی که توقع جامعه این است که این قشر عزیز به دلیل قداست شغلی و همچنین امکان آگاهی‌های مختلف اجتماعی احتمالاً یا سیگار مصرف نمی‌کند یا این که شیوع این مشکل در این گروه باید خیلی کمتر باشد. از طرف دیگر شیوع مصرف نسبتاً بالای دخانیات این قشر می‌تواند زنگ خطری برای جامعه آموزش و پرورش ما محسوب گردد، زیرا مصرف سیگار این گروه در الگو پذیری دانش‌آموزان تأثیرگذار است [۲۰]. به طور کلی مطالعات محدودی در مورد مصرف دخانیات معلمان انجام شده است. نتایج اولیه این مطالعه مبنی بر شیوع بالا یا حداقل به اندازه جامعه کل مردان در ایران در جامعه مردان تهرانی با مطالعه سورنسون و همکاران در هند [۴] و تالایی و همکاران در ترکیه [۶] مطابقت دارد. در ضمن این مطالعات اذعان نموده‌اند که مصرف سیگار معلمان عامل مهمی در شروع و یا تجربه سیگار دانش‌آموزان است. ولی هیچ یک از این مطالعات به بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان در مورد مصرف دخانیات

جدول شماره ۱- سوالات * مربوط به بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان مرد مدارس مقطع راهنمایی پسرانه شهر تهران در مورد مصرف دخانیات

(الف) سوالات زیر را بخوانید و بهترین گزینه را انتخاب کنید

۱) در دود سیگار چند ماده سم وجود دارد؟

الف) ۱۰۰

ج) ۴۰۰

۲) سالانه چند نفر به علت بیماری‌های ناشی از سیگار در ایران می‌میرند؟

الف) هزار

ب) ۱۰۰ هزار

۳- روزانه در ایران چه هزینه‌ای فقط برای مصرف سیگار خرج می‌شود؟

الف) ۱ میلیون تومان

ب) ۱۰۰ میلیون تومان

ج) ۱ میلیارد تومان

۴- روند مصرف سیگار در کشورهای پیشترهای چگونه است؟

الف) ثابت

ب) رو به افزایش

ب) سوالات زیر را بخوانید. آیا با این موضوع موافقید که:

۱- مصرف قلیان از مصرف سیگار بهتر است؟

الف) شدیداً مخالفم

ب) مخالفم

۲- دود ناشی از دخانیات تأثیر زیادی بر سلامتی اطرافیان ندارد.

الف) شدیداً مخالفم

ب) مخالفم

۳- قیمت هر بسته سیگار بایستی سالیانه از طریق مالیات افزایش یابد.

الف) شدیداً مخالفم

ب) مخالفم

ج) سوال زیر را بخوانید و وضعیت خود را مشخص کنید

۱- در ۵ سال آینده وضعیت مصرف سیگار کشیدن شما چگونه خواهد بود؟

الف) اصلاً مصرف نمی‌کنم

ب) احتمالاً مصرف می‌کنم

ج) حتماً مصرف می‌کنم

* سوالات بخش الف مربوط به سنجش میزان آگاهی فرد نسبت به مصرف سیگار، سوالات قسمت ب مربوط به بررسی سطح نگرش فرد نسبت به مصرف سیگار و قسمت ج در ارتباط با بررسی عملکرد فرد در ارتباط با مصرف سیگار هستند.

جدول شماره ۲ - توزیع وضعیت مصرف سیگار معلمان مدارس راهنمایی پسرانه تهران بر حسب منطقه کار، محل تولد و وضعیت استخدام

وضعیت مصرف سیگار	درصد	تعداد
تجربه مصرف سیگار بیش از ۱۰۰ نخ داشته (پیش از انجام مطالعه)	۲۷/۲	۱۵۰
ترک	۵/۴	۳۰
گهگاهی	۷/۳	۴۰
صرف روزانه	۱۴/۵	۸۰
سیگار نمی کشد یا تجربه مصرف کمتر از ۱۰۰ نخ داشته (پیش از انجام مطالعه)	۷۲/۸	۴۰۱
سن شروع مصرف سیگار میانگین (\pm انحراف معیار)	$(\pm 4/0) 17/3$	
میزان مصرف روزانه		
کمتر از ۱۰ نخ سیگار	۵۰	۶۰
۱۱-۲۰ نخ سیگار	۴۱/۷	۵۰
بیش از ۲۰ نخ سیگار	۸/۳	۱۰
صرف سیگار معلمان بر حسب منطقه محل کار		
شمال (منطقه ۱)	۱۸	۲۷
جنوب (منطقه ۱۴)	۲۴	۳۶
شرق (منطقه ۴)	۲۱/۳	۳۲
غرب (منطقه ۲۲)	۲۳/۳	۳۵
مرکز (منطقه ۷)	۱۳/۴	۲۰
محل تولد معلمان سیگاری		
تهران	۴۶	۶۹
خارج از تهران	۵۴	۸۱
وضعیت استخدامی معلمان سیگاری		
رسمی	۴۹/۳	۷۴
پیمانی اقرارداری	۵۰/۷	۷۶

جدول شماره ۳ - وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان مرد مدارس راهنمایی پسرانه تهران بر حسب مصرف سیگار

P	درصد	تعداد	جمع	وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان		وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان		آگاهی
				سیگاری	غیرسیگاری	تعداد	درصد	
<0.0001	۶۰/۳	۳۸۲	۱	۲۱/۳	۶۰	۷۸/۷	۲۲۲	متوسط و خوب
	۳۹/۷	۱۸۶	۳/۵ (۲/۳-۵/۲)	۴۸/۴	۹۰	۵۱/۶	۹۶	ضعیف
<0.0001	۸۷/۳	۴۸۱	۱ (ref.)	۲۲/۹	۱۱۰	۷۷/۱	۳۷۱	نگرش
	۱۲/۷	۷۰	۴/۴ (۲/۷-۷/۶)	۵۷/۱	۴۰	۴۲/۹	۳۰	متوسط و خوب
0.001	۹۲/۷	۵۱۱	۱ (ref.)	۲۵/۴	۱۳۰	۷۴/۶	۳۸۱	نامناسب
	۷/۳	۴۰	۲/۹ (۱/۵-۵/۶)	۵۰/۰	۲۰	۵۰/۰	۲۰	عملکرد
	۱۰۰	۵۵۱		۲۷/۲	۱۵۰	۷۲/۸	۴۰۱	مناسب
								نامناسب
								جمع

رفتار تأثیری داشته باشد [۱۵]. برای اجرای برنامه‌های کنترل دخانیات در یک کشور پرداختن به روش‌های پیشگیری از شروع مصرف در دانش آموزان بسیار مهم است و برای آن باید وضعیت مصرف در معلمان را به عنوان یک الگوپذیر رفتاری در نوجوانان شناخت و بر آن اساس مداخلات مربوطه را طراحی نمود [۲۲، ۲۳]. همچنین پیشنهاد می‌گردد در مقاطع سنی و تحصیلی پایین‌تر برنامه‌های پیشگیری از شروع مصرف سیگار آغاز گردد. باید هشدارهای لازم به دانش آموزان مبنی بر عدم استعمال دخانیات داده شود و عواقب تجربه اولین سیگار را برای آنها توضیح داد. برنامه‌های آموزشی در مدارس باید به گونه‌ای طراحی و اجرا گردد که بتواند سطح آگاهی و عملکرد معلمان و دانش آموزان را تغییر دهد و همچنین بتواند آگاهی و نگرش مناسب این افراد را به عملکرد قابل قبولی تبدیل کند.

سهم نویسندها

غلامرضا حیدری: مجری مطالعه، کمک در تدوین مقاله و
ویراستاری نهایی

علی رمضانخانی: مشاور اجرایی مطالعه، کمک در تدوین مقاله
مصطفی حسینی: ورود داده‌ها به رایانه، تجزیه، تحلیل و تفسیر
داده‌ها، تنظیم جدول‌ها و کمک در تدوین مقاله
محمود یوسفی فرد: بررسی متون داخلی و خارجی مرتبط با
مطالعه، کمک در تجزیه، تحلیل آماری و تنظیم جدول‌ها و ویرایش
مقاله

محمد رضا مسجدی: مشاور اجرایی مطالعه، کمک در تدوین مقاله

تشکر و قدردانی

نویسندها از زحمات همه همکاران محترم در مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات برای همکاری‌های ارزشمندشان در اجرای این تحقیق و تدوین این مقاله سپاسگزاری و قدردانی می‌نمایند.

سطح نگرش معلمان در این مطالعه در مورد مصرف سیگار نسبتاً مطلوب است که این می‌تواند به دلیل شرایط تحصیلی و یا شغلی این گروه باشد، اما هنوز هم در حدود ۳۰ درصد از این افراد مصرف سیگار وجود دارد که نشان‌دهنده این موضوع است که اکثر افرادی که نگرش نامناسبی دارند سیگار مصرف می‌کنند. ۷/۵ درصد از معلمانی که اظهار می‌نمودند در طول ۵ سال آینده مطمئناً سیگار نخواهند کشید، سیگاری بوده‌اند و در مقابل ۸۰ درصد از افرادی که حتی احتمال کمی برای مصرف سیگار در طول این سالها می‌داده‌اند، سیگار مصرف می‌نمودند.

شایان ذکر است که ۵۰ نفر از معلمان نیز اظهار نموده‌اند که تجربه مصرف سیگار کمتر از ۱۰۰ نخ داشته‌اند، بنابراین با توجه به وجود ۱۵۰ نفر معلم سیگاری، مجموع افرادی که به نوعی سیگار را تجربه نموده‌اند ۲۰۰ نفر (۳۶/۳ درصد) بوده و این گویای این مطلب است که ۱۵۰ از ۲۰۰ (۷۵ درصد) از افرادی که سیگار را تجربه نموده‌اند به مصرف دائم آن روی می‌آورند، حتی اگر شغل مقدسی مانند معلمی نیز داشته باشند. احتمال سیگاری شدن ۷۵ درصد برای افرادی که فقط تجربه اندکی از مصرف سیگار داشته‌اند، شاید به دلیل رخ دادن این پدیده در سینه پایین باشد.

در این مطالعه معلمان با آگاهی ضعیف، نگرش و عملکرد نامناسب‌تری نسبت به معلمان با آگاهی متوسط و خوب داشتند. علاوه بر این معلمان با نگرش نامناسب، عملکرد نامناسب‌تری نیز نسبت به گروه خوب و متوسط داشتند. نکته قابل توجه این است که ارتباطات موجود بین آگاهی، عملکرد و نگرش معلمان در تمامی مناطق کاری آموزش و پرورش، با هر وضعیت استخدامی و برای متولدان تهران و خارج از تهران تفاوتی ندارد.

نگرش نسبت به آگاهی، تأثیر بیشتری بر عملکرد می‌گذارد. این امر خاطر نشان می‌سازد که آگاهی هنگامی باعث یک عملکرد مناسب می‌شود که نگرشی مناسب در مورد مصرف سیگار ایجاد کرده باشد. چنانچه ذکر گردید در هیچ مطالعه‌ای به بررسی نگرش و عملکرد معلمان در مورد سیگار پرداخته نشده است. در نتیجه ارتباط بین این عوامل نیز مطالعه نگردیده است. در هند مطالعه انجام شده روی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان در مورد مصرف دخانیات نشان داد که آگاهی بالا به تنها یعنی نمی‌تواند روی

منابع

1. Poulsen LH, Osler M, Roberts C, Due P, Damsgaard MT, Holstein BE. Exposure to teachers smoking and adolescent smoking behavior: analysis of cross sectional data from Denmark. *Tobacco Control* 2002; 11: 246-51
2. Everett SA. Initiation of cigarette smoking and subsequent smoking behavior among U.S. high school students. *Preventive Medicine* 1999; 29: 327-33
- 3- Chen J, Millar WJ. Age of smoking initiation: implications for quitting. *Health Reports* 1998; 9: 39-46
- 4- Sorensen G, Gupta PC, Sinha DN, Shastrri S, Kamat M, Pendnkar MS, et al. Teacher tobacco use prevention in tow regions in India: qualitative research findings. *Preventive Medicine* 2005; 41: 424-32
- 5- Yorgancioğlu A, Danacı AE, Pınar Çelik MFT, Şen FS. Attitudes of the high school teachers and students towards smoking: two sides of the story. *Turkish Respiratory Journal* 2002; 3: 43-8
- 6- Talay F, Kurt B, Tug T. Smoking habits of the elementary school teacher students in education faculty and related factors. *Tuberk Toraks* 2008; 56: 171-8
- 7- Abdulla S, Ahmed AB. Prevalence and attitudes of smoking among secondary school teachers in Hadramout coastal districts, Yemen. *The Online Journal of Health and Allied Sciences* 2006; 5: 1-5
- 8- Coogan PF, Adams M, Geller AC, Brooks D, Miller DR, Lew RA, et al. Factors associated with smoking among children and adolescents in Connecticut. *American Journal of Preventive Medicine* 1998; 15: 17-24
- 9- Barrueco M, Hernandez-Mezquita MA, Jimenez-Ruiz C, Torrecilla M, Vega MT, Garrido E. Attitudes of teachers about tobacco prevention at school. *Allergologia et Immunopathologia (Madr)* 2000; 28: 219-24
- 10- Ohida T, Osaki Y, Mochizuki Y, Sekiyama M, Kawaguchi T, Ishii T, et al. Smoking behaviors and attitudes among school teachers in Mie, Japan. *Journal of Epidemiology* 2000; 10: 16-21
- 11- Mihaltan F, Ghiculete D, Enache G, Negreanu D, Tabacu E, Petru JD. Survey of the prevalence of smoking in Rumanian teachers. *Pneumologie* 1994; 48: 481-3
- 12- Bin Yaacob I, bin Harun MH. Smoking habits and attitudes among secondary school teachers. *Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health* 1994; 25: 74-9
- 13- Kumar A, Mohan U, Jain VC. Academicians' attitudes and beliefs towards anti-smoking measures. *Public Health* 1996; 110: 241-6
- 14- SKa S. A study on patterns of tobacco use among school teachers in mahottary district of Nepal. *Journal of Nepal Health Research Council* 2006; 5: 44-9
- 15- Shah VN, Verma PB, Tripathi CB. Knowledge, attitude and practice regarding tobacco consumption among the college students of Bhavnagar city (Gujarat). *Indian Journal of Community Medicine* 2005; 30: 1-4
- ۱۶- حیدری غلامرضا. پیش‌بینی نتیجه ترک سیگار بر اساس آزمون فاگرستروم در افراد مراجعه کننده به کلینیک ترک سیگار در طی سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۲. پژوهنده ۱۳۸۵: ۶: ۶۲-۳۵۷
- ۱۷- حیدری غلامرضا. بررسی وضعیت مصرف سیگار و عوامل همراه آن در دانش‌آموzan دبیرستانی شهر تهران در سال ۱۳۸۲. پژوهنده ۱۳۸۳: ۵: ۵-۵۶
- ۱۸- مسجدی محمد رضا. بررسی شیوع استعمال دخانیات در میان دانشجویان دانشگاه‌های تهران. *نظام پزشکی* ۱۳۸۱: ۴: ۸۷-۲۸۳
- ۱۹- حیدری غلامرضا. نگرش دانش‌آموzan دبیرستانی شهر تهران در مورد استعمال دخانیات. *تنفس* ۱۳۸۳: ۱۱: ۳۵-۲۹
- ۲۰- محمد کاظم، نوربالا احمد علی، مجذزاده سیدرضا، کریملو مسعود. روند تغییرات شیوع استعمال دخانیات در ایران (۱۳۷۰-۱۳۷۸) بر اساس دو طرح ملی سلامت و بیماری. *حکیم* ۱۳۷۹: ۴: ۲۹۰-۱۹۷
- ۲۱- حیدری غلامرضا. تأثیر خانواده در گرایش به مصرف سیگار دانش‌آموzan دبیرستانی شهر تهران. *نظام پزشکی* ۱۳۸۵: ۱: ۳۸۵-۲۴
- 22- Joel J, Heidelbaugh E, Jauniaux MB. Clinical men's health. 1st Edition, Elsevier Health Sciences: Landon, 2007
- 23- Frank J. Curbing the epidemic governments and the economics of tobacco control. 1st Edition, World Bank Publication: USA, 1999