

استاندارد سازی پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعده‌گی PSST: ترجمه و روان‌سنجی گونه ایرانی

شیوا سیه بازی: دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه زهرا حریری: دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت مادر و کودک، دانشگاه تربیت مدرس
علی منتظری: استاد، گروه پژوهشی سلامت روان، مرکز تحقیقات بهداشت مادر و کودک، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
لیدا مقدم بنائیم*: استادیار، گروه مامایی، دانشگاه تربیت مدرس

فصلنامه پاییش

سال دهم شماره چهارم پاییز ۱۳۹۰ صص ۴۲۷-۴۲۱

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۹/۱/۱۵

[نشر الکترونیک پیش از انتشار-۳۰ شهریور ۱۳۹۰]

چکیده

این مطالعه به منظور ترجمه و اعتبارسنجی پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعده‌گی (Premenstrual Symptoms Screening Tool-PSST) برای اولین بار در ایران انجام گردید.

ابزارهای مختلفی برای اندازه گیری علایم قبل از قاعده‌گی وجود دارد که برای تشخیص سندروم قبل از قاعده‌گی و اختلال ملال قبل از قاعده‌گی به کارمی رود. از جمله این‌ها، پرسشنامه PSST است که شدت بیماری را در حد لزوم و تأثیر علایم را در زندگی افراد نشان می‌دهد و از چارت‌های دو سیکلی آینده نگر عملی تر و از نظر زمانی به صرفه‌تر است. این پرسشنامه شامل دو بخش علائم و تأثیر علائم بر زندگی افراد است.

برای اعتبار سنجی این ابزار نمونه‌ای از دانشجویان دختر ساکن خوابگاه‌های دانشگاه‌های تهران به طور تصادفی انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. پایایی پرسشنامه با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. برای بررسی روایی پرسشنامه نیز از دو روش ظاهری و محتوایی استفاده گردید.

در مجموع ۴۹۸ دانشجوی دختر وارد مطالعه شدند. میانگین سنی شرکت کنندگان ۲۳/۰۵ با انحراف معیار ۲/۲۹ سال بود. میانگین شاخص توده بدنی ۲۱/۲ \pm ۳۴/۵ کیلو گرم بر متر مربع، میانگین روزهای خوبیزی قاعده‌گی ۶/۱ \pm ۲۷/۳۳ و طول سیکل‌های قاعده‌گی ۲۹/۴ \pm ۴۸/۵۵ روز به دست آمد. در آزمون پایایی این ابزار، مقادیر آلفای کرونباخ ۰/۹ به دست آمد. مقادیر نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا به ترتیب ۰/۷ و ۰/۸ حاکی از روایی محتوایی این پرسشنامه است.

علاوه بر این، امتیازهای گروههای سالم و بیمار در حیطه‌های مختلف، اختلاف معنی‌دار داشتند. نتایج به دست آمده حاکی از روایی و پایایی این ابزار در ایران است که می‌تواند در مطالعات مربوطه استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها: روایی و پایایی، سندروم قبل از قاعده‌گی، پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعده‌گی

* نویسنده پاسخگو: تهران، تقاطع بزرگراه شهید دکتر چمران و جلال آل احمد، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، گروه مامایی

تلفن: ۸۲۸۸۳۸۵۷

E-mail: moghaddamb@modares.ac.ir

مقدمه

شیوع PMS و PMDD، اثر دارو و درمان‌های مختلف بر بیماری، پیش‌بینی‌های بهداشتی و غیره. لذا این مطالعه با هدف تدوین نسخه ایرانی پرسشنامه PSST برای اولین بار در ایران انجام گردید.

مواد و روش کار

پرسشنامه PSST شامل ۱۹ سؤال بوده که دارای دو بخش است (بخش اول که شامل ۱۴ علایم خلقی، جسمی و رفتاری است و بخش دوم که تأثیر این علایم را بر زندگی افراد می‌سنجد و شامل ۵ سؤال است). برای هر سؤال ۴ معیار اصلاحاً، خفیف، متوسط و شدید ذکر گردید که از صفر تا ۳ نمره بندی شدند. جهت تشخیص PMS متوسط یا شدید سه شرط ذیل باید با هم وجود داشته باشد: ۱- از گزینه ۱ تا ۴ حداقل یک مورد متوسط یا شدید باشد، ۲- علاوه بر مورد قبلی از گزینه ۱ تا ۱۴ حداقل ۴ مورد متوسط یا شدید باشد و ۳- در بخش تأثیر علایم بر زندگی (۵ گزینه آخر) یک مورد متوسط یا شدید وجود داشته باشد.

جهت تشخیص PMDD نیز سه شرط ذیل باید با هم وجود داشته باشد: ۱- از گزینه ۱ تا ۴ حداقل یک مورد شدید باشد، ۲- علاوه بر مورد قبلی از گزینه ۱ تا ۱۴ حداقل ۴ مورد متوسط یا شدید باشد و ۳- در بخش تأثیر علایم بر زندگی (۵ گزینه آخر) یک مورد شدید وجود داشته باشد.

ابتدا پرسشنامه PSST توسط دو نفر پژوهشگر به فارسی ترجمه گردید که سرانجام یک نسخه نهایی فارسی تهیه شد. این نسخه به صورت جداگانه دو بار به انگلیسی ترجمه گردید، از این دو نسخه یک نسخه نهایی انگلیسی تهیه شد که با پرسشنامه اصلی مقایسه گردید. در نهایت تغییراتی در پرسشنامه اعمال گردید. از جمله در سؤال اول کلمه Anger به زودرنجی ترجمه شد و در سؤال هشتم بخش دوم نیز در سؤال الف (Your work efficiency or productivity) کلمه خلاقیت حذف شده و کلمه تحصیلی اضافه گردید. همچنین در گزینه ب، کلمه دوستان اضافه شد (ضمیمه ۱ و ۲).

سپس یک تست پایلوت برای ۳۰ دانشجوی دختر ساکن خوابگاه‌های دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. مدت متوسط برای تکمیل پرسشنامه ۴/۶ دقیقه بود. ۹۰ درصد از افراد اظهار داشتند که هیچ مشکلی در تکمیل پرسشنامه نداشتند و طبق اظهارات ۸۳ درصد از افراد هیچ پرسشی نامفهوم نبود. همچنین ۹۶ درصد بیان

سال‌های طبیعی تولید مثل یک زن با تغییرات ریتمیک ماهانه در میزان ترشح هورمون‌های زنانه و تغییراتی متناظر در تخدمان‌ها و سایر اندام‌ها مشخص می‌شوند که به این طرح ریتمیک چرخه قاعده‌گی می‌گویند [۱]. مجموعه‌ای بزرگ از علایم جسمانی، روحی و هیجانی به نام سندرم پیش از قاعده‌گی در برخی زنان به صورت دوره‌های پیش از قاعده‌گی رخ می‌دهد و با شروع قاعده‌گی از بین می‌رود [۲]. سندرم پیش از قاعده‌گی، یکی از شایع‌ترین اختلالات سنین باروری است که زندگی زنان را به میزان قابل توجهی مختل می‌سازد [۳]. این سندرم در تمام فرهنگ‌ها وجود داشته و دارای اثرات گوناگون بر موقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و حرفة‌ای زنان است [۴].

تاکنون بیش از ۲۰۰ علامت برای سندرم پیش از قاعده‌گی شناخته شده است که مربوط به تغییرات جسمی، خلقی و رفتاری است که در این دوران رخ می‌دهد [۵]. باید توجه کرد که سندرم پیش از قاعده‌گی به علت شیوع بالای آن و به علت عوارض ناشی از آن که برای خود فرد و خانواده اش ایجاد می‌کند از اهمیت خاصی برخوردار است.

نوع شدید علایم پیش از قاعده‌گی به عنوان بیماری دیسفوریک قبل از قاعده‌گی، یا اختلال ملال قبل از قاعده‌گی (Pre Menstrual Dysphoric Disorder-PMDD) شده است که یکی از اختلالات شایع روانپزشکی در زنان است [۶]. جهت تشخیص این سندرم‌ها ابزارهای مختلفی وجود دارد که یک نمونه آنها پرسشنامه PSST است. طراحی این پرسشنامه به منظور دستیابی به یک ابزار غربالگری ساده و راحت برای تعیین افرادی که از PMS شدید یا اختلال دیسفوریک قبل از قاعده‌گی (PMDD) رنج می‌برند و یا کسانی که احتمالاً از درمان سود می‌برند بوده است. PSST معیارهای طبقه بندی شده DSM-IV را به یک مقیاس درجه بندی بر اساس شدت بیماری تبدیل می‌کند. افرادی که این پرسشنامه را طراحی کرده‌اند معتقدند که PSST شدت بیماری را در حد لزوم و همچنین تأثیر علایم را در زندگی افراد نشان می‌دهد و از چارت‌های دو سیکلی آینده نگر عملی‌تر و از نظر زمان به صرفه‌تر است. این ابزار یک وسیله غربالگری کارا و مؤثر است [۷] که در برخی از کشورهای جهان از جمله آمریکا، ژاپن، آلمان، تایلند و کانادا استفاده گردیده است [۷-۱۰] و از آنجا که موارد استفاده زیادی می‌توان برای این ابزار نام برد از جمله تعیین

شد. پذیرش سؤالات بر اساس نمره شاخص روایی محتوا بالاتر از ۰/۷۸ بود [۱۳].

يافته‌ها

مشخصات شرکت کنندگان در جدول‌های شماره ۱ و ۲ نمايش داده شده است. ميانگين سنی شرکت کنندگان به ترتیب ۲۳/۰۵ سال با انحراف معیار ۳/۲۹ بود. ميانگين و انحراف معیار شاخص توده بدنی به ترتیب ۲۱/۳۴ (کيلوگرم برمتر مربع) و ۲/۵، ميانگين و انحراف معیار طول سیکل قاعده‌گی به ترتیب ۲۹/۴۸ (روز) و ۴/۵۵ و ميانگين و انحراف معیار مدت خونریزی نيز ۶/۲۷ (روز) و ۱/۳۳ بودند.

سازگاري درونی (Internal consistency) سؤالات اين پرسشنامه با استفاده از آلفای كرونباخ بررسی شد. مقدار اين شاخص در بخش علایم ۰/۹۰ و در بخش تأثير علایم بر روی زندگی ۰/۹۱ و در کل سؤالات ۰/۹۳ به دست آمد. همچنان همبستگی درون خوش (Intra-class correlation) بین اين دو بخش ۰/۸ بوده است.

در بررسی کيفی محتوا طبق نظر متخصصان امر تغييرات لازم در پرسشنامه اعمال گردید. همچنان در بحث روایی محتوایي کمی که از دو ميزان نسبت روایی محتوا (Content Validity Ratio- CVR) و (Content Validity Index-CVI) شاخص روایی محتوا استفاده شد، مقادير CVR و CVI به ترتیب ۰/۷ و ۰/۸ به دست آمد. اين مقادير بالاتر از حد قابل قبول ۰/۶۲ (برای CVR و ۰/۷۸ برای CVI) بوده و حاکي از اين است که اين پرسشنامه از روایی محتوایي برخوردار است. با استفاده از تحليل آماری سه گروه را زنان مشخص شدند: گروه اول شامل ۲۵۳ نفر (۵۰/۸ درصد) بود که مبتلا به سندروم قبل از قاعده‌گی نبودند و يا دچار PMS خفيف بودند. گروه دوم دانشجویان شامل ۱۶۶ نفر (۳۳/۳ درصد) داراي معیارهای PMS بودند که علایم به طور متوسط تا شدید روی عملکرد و فعالیت روزانه آنها تأثير داشته است. گروه سوم شامل ۲۹ دانشجو (۱۵/۹ درصد) بود که معیارهای DSM-IV برای اختلال ملال پيش از قاعده‌گی را داشتند.

علایم متوسط تا شدید جسماني و خلقی و نيز تداخل علایم با عملکردهای گوناگون افراد در جدول شماره ۳ گزارش شده است. در بررسی آماری رابطه معنی‌داری بین سندروم پيش از قاعده‌گی و اختلال ملال پيش از قاعده‌گی و علایم پاسخ دهندهان مشاهده شد؛

نمودند کلمه یا عبارتی که باعث خجالت یا ناراحتی شان شود در پرسشنامه وجود نداشته است. ۹۰ درصد از افراد نيز گزینه‌های موجود (اصلاً، خفيف، متوسط و شدید) را واضح، روشن و کافي دانسته‌اند. طبق نتایج مطالعه پایلوت تغييرات مختصری در ترجمه پرسشنامه داده شد و نسخه نهايی تهيه و در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. نمونه گيري به صورت آسان بود و از دانشجويان دختر ساكن خوابگاه‌های دانشگاه تهران و تربیت مدرس درخواست انجام مصاحبه شد. از حدود ۵۵۰ دانشجو ۴۹۸ نفر با انجام مصاحبه موافق نموده و در کل ۴۹۸ پرسشنامه توسط پژوهشگران تکمیل گردید.

ورود داده‌ها و تجزيه و تحليل آماري با نرم‌افزار SPSS16 انجام گردید و از آزمون های مجدور کاي و آلفاي كرونباخ در تحليل داده‌ها استفاده شد. جهت ارزیابي پایایی پرسشنامه از آزمون ثبات درونی (Internal Consistency) استفاده گردید. آلفاي كرونباخ مساوي و يا بالاتر از ۰/۷ به عنوان مقدار قابل قبول در نظر گرفته شد [۱۱]. جهت روایی از دو روش روایی ظاهری و روایی محتوایي استفاده گردید. برای تعیين روایی محتوایي از دو روش كيفي و كمي استفاده گردید که در بررسی روایی محتوایي از قضاوی متخصصان مختلف از جمله زنان، مامایی، اپیديمیولوژی، پرستاری و بهداشت استفاده شد. در بررسی كيفي ابزار بر اساس معیارهای درخواست شد تا پس از بررسی كيفي ابزار بر اساس معیارهای رعایت دستور زبان استفاده از کلمات مناسب، قرارگيري آيت‌ها در جای مناسب خود و امتياز دهي مناسب بازخورد لازم را ارایه دهند که بر اساس آن اصلاحات لازم اعمال گردید. برای بررسی روایی محتوایي به شكل کمي از دو ميزان نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا استفاده شد. ابتدا برای تعیين نسبت روایی محتوا از پانل خبرگان (۱۰ نفر) درخواست شد تا هر سؤال را بر اساس طيف سه قسمتی (ضروري است، مفید است ولی ضروري نیست و ضروري ندارد) بررسی نمایند که مقدار بالاتر از ۰/۶۲ به عنوان حد قابل قبول در نظر گرفته شد [۱۲]. سپس برای بررسی شاخص روایی محتوا، سه معیار سادگي، اختصاصي بودن و وضوح به صورت مجزا در طيف ليکرتی ۴ قسمتی برای هر يك از سؤالات توسط متخصصان مورد بررسی قرار گرفت (مثالاً ۱: غير مرتبط، ۲: تا حدودی مرتبط، ۳: مرتبط و ۴: كاملاً مرتبط). بدین منظور امتياز شاخص روایی محتوا به وسیله تجمع امتيازات موافق برای هر سؤال که رتبه ۳ و ۴ را كسب کرده‌اند بر تعداد کل متخصصان محاسبه

به افراد غیرمبلا بسیار بیشتر بود (جدول شماره ۳).

بدین صورت که میزان عالیم متوسط تا شدید در افراد مبتلا به هر دو سندروم پیش از قاعده‌گی و اختلال ملال پیش از قاعده‌گی نسبت

جدول شماره ۱- مشخصات جمعیتی شرکت کنندگان در مطالعه

جمع	اختلال ملال پیش از قاعده‌گی (n=۷۹)			سندرم پیش از قاعده‌گی متوسط تا شدید (n=۱۶۶)			سندرم پیش از قاعده‌گی خفیف/عدم وجود آن (n=۲۵۳)			گروه سنی (سال)
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	
۱۰۰	۱۲۹	۱۴	۱۸	۳۴/۱	۴۴	۵۱/۹	۶۷			۱۸-۲۰
۱۰۰	۲۷۳	۱۵	۴۱	۳۳/۷	۹۲	۵۱/۳	۱۴۰			۲۱-۲۵
۱۰۰	۹۶	۲۰/۹	۲۰	۳۱/۲	۳۰	۴۷/۹	۴۶			> ۲۵
وضعیت تأهل										
۱۰۰	۴۶۹	۱۵/۵	۷۳	۳۳/۵	۱۵۷	۵۱	۲۳۹			مجرد
۱۰۰	۲۹	۲۰/۷	۶	۳۱	۹	۴۸/۳	۱۴			متاهل
وضعیت سیکل قاعده‌گی										
۱۰۰	۴۵۰	۱۶/۷	۷۵	۳۳/۵	۱۵۱	۴۹/۸	۲۲۴			منظم
۱۰۰	۴۸	۸/۳	۴	۳۱/۲	۱۵	۶۰/۵	۲۹			نامنظم
رشته تحصیلی										
۱۰۰	۲۶۱	۱۴/۵	۲۸	۳۴/۵	۹۰	۵۱	۱۳۳			پزشکی
۱۰۰	۲۳۷	۱۷/۳	۴۱	۳۲/۱	۷۶	۵۰/۶	۱۲۰			غیرپزشکی
سطح تحصیلات										
۱۰۰	۳۲	۲۱/۹	۷	۵۰	۱۶	۲۸/۱	۹			کاردانی
۱۰۰	۱۷۴	۱۵/۵	۲۷	۳۶/۲	۶۳	۴۸/۳	۸۴			کارشناسی
۱۰۰	۱۸۴	۱۶/۸	۳۱	۳۲/۱	۵۹	۵۱/۱	۹۴			کارشناسی ارشد
۱۰۰	۹۹	۱۲/۱	۱۲	۲۷/۳	۲۷	۶۰/۶	۶۰			دکتری حرفه‌ای
۱۰۰	۵	۲۰	۱	۲۰	۱	۶۰	۳			دکتری تخصصی
۱۰۰	۴	۲۵	۱	۰	۰	۷۵	۳			دستیاری

جدول شماره ۲- مشخصات جسمانی شرکت کنندگان در مطالعه

میانگین	انحراف معیار	تعداد	میانگین	انحراف معیار	تعداد	میانگین	انحراف معیار	تعداد	میانگین	انحراف/عدم وجود آن	سندرم پیش از قاعده‌گی خفیف/عدم وجود آن
۲/۳۷	۲۱/۷۸	۷۹	۲/۴۴	۲۱/۳۵	۱۶۶	۲/۵۶	۲۱/۱	۲۵۳	۲۱/۱	شاخص توده بدنی	شاخص توده بدنی
۴/۷	۲۹/۱۳	۷۶	۴/۴۱	۲۹/۶۹	۱۵۹	۴/۶۱	۲۹/۴۶	۲۴۰	۴/۶۱	طول سیکل قاعده‌گی (روز)	طول سیکل قاعده‌گی (روز)
۱/۴	۶/۳	۷۹	۱/۲۱	۶/۳۳	۱۶۶	۱/۳۸	۶/۲۲	۲۵۲	۱/۳۸	طول مدت خونریزی (روز)	طول مدت خونریزی (روز)

جدول شماره ۳- مقایسه علایم در سه گروه سندرم پیش از قاعده‌گی خفیف یا عدم وجود آن، سندرم متوسط تا شدید و اختلال ملال قبل از قاعده‌گی

سندرم پیش از سندرم پیش از اختلال ملال پیش

قاعده‌گی خفیف/عدم قاعده‌گی متوسط تا از قاعده‌گی

(n=۷۹) (n=۱۶۶) (n=۲۵۳)

	وجود آن (n=۲۵۳)	شدید (n=۱۶۶)	عداد	درصد	وجود آن (n=۷۹)	عداد	درصد	عداد	درصد	علایم *
P<0.0001 ($\chi^2=142/8, df=2$)	۹۶/۲	۷۶	۹۰/۴	۱۵۰	۴۱/۹	۱۰۶	۴۱/۹	۷۶	۹۰/۴	عصبانیت/زودرنجی
P<0.0001 ($\chi^2=136/3, df=2$)	۸۴/۸	۶۷	۶۹/۹	۱۱۶	۲۳/۳	۵۹	۲۳/۳	۶۷	۶۹/۹	اضطراب/تنش
P<0.0001 ($\chi^2=138/3, df=2$)	۸۴/۸	۶۷	۶۵/۱	۱۰۸	۲۰/۶	۵۲	۲۰/۶	۶۷	۶۵/۱	گریه کردن/افزایش حساسیت در مقابل پاسخ منفی
P<0.0001 ($\chi^2=180/8, df=2$)	۹۴/۹	۷۵	۷۴/۱	۱۲۳	۲۲/۱	۵۶	۲۲/۱	۷۵	۷۴/۱	خلق افسرده/انا امیدی
P<0.0001 ($\chi^2=145/1, df=2$)	۷۷/۲	۶۱	۶۳/۳	۱۰۵	۱۵/۴	۳۹	۱۵/۴	۶۱	۶۳/۳	کاهش علاقه به فعالیتهای شغلی
P<0.0001 ($\chi^2=114, df=2$)	۸۶/۵	۵۲	۶۵/۱	۱۰۸	۱۸/۲	۴۶	۱۸/۲	۵۲	۶۵/۱	کاهش علاقه به فعالیتهای داخل منزل
P<0.0001 ($\chi^2=125/3, df=2$)	۷۴/۷	۵۹	۶۰/۲	۱۰۰	۱۶/۶	۴۲	۱۶/۶	۵۹	۶۰/۲	کاهش علاقه به فعالیتهای اجتماعی
P<0.0001 ($\chi^2=109/2, df=2$)	۶۸/۴	۵۴	۵۶	۹۳	۱۵/۴	۳۹	۱۵/۴	۵۴	۵۶	دشواری در تمرکز (مانند عدم تمرکز بر روی درس یا هر کار دیگر)
P<0.0001 ($\chi^2=94/7, df=2$)	۸۱	۶۴	۷۷/۱	۱۲۸	۳۵/۲	۸۹	۳۵/۲	۶۴	۷۷/۱	خستگی/اکمبوڈ انژوی
P<0.0001 ($\chi^2=19/0.9, df=2$)	۲۷/۸	۲۲	۳۱/۹	۵۳	۱۴/۲	۳۶	۱۴/۲	۲۲	۳۱/۹	پرخوری/ولع غذایی
P<0.0001 ($\chi^2=28/2, df=2$)	۲۱/۵	۱۷	۲۲/۹	۳۸	۵/۹	۱۵	۵/۹	۱۷	۲۲/۹	بی خوابی
P<0.0001 ($\chi^2=69/7, df=2$)	۵۸/۲	۴۶	۵۸/۴	۹۷	۲۱/۷	۵۵	۲۱/۷	۴۶	۵۸/۴	پر خوابی (نیاز بیشتر به خواب)
P<0.0001 ($\chi^2=119/7, df=2$)	۷۵/۹	۶۰	۴۷/۶	۷۹	۱۳/۸	۳۵	۱۳/۸	۶۰	۴۷/۶	احساس آشفتگی یا غیرقابل کنترل بودن
P<0.0001 ($\chi^2=47/7, df=2$)	۷۹/۷	۶۳	۷۲/۹	۱۲۱	۴۵/۱	۱۱۴	۴۵/۱	۷۲/۹	۷۹/۷	داشتن علایم جسمانی مانند درد پستان، سردرد، دردهای عضلانی/امضاتی، نفح شکم، افزایش وزن
P<0.0001 ($\chi^2=20.9, df=2$)	۸۶/۱	۶۸	۵۴/۸	۹۱	۶/۳	۱۶	۶/۳	۶۸	۵۴/۸	کارآمدی شغلی/تحصیلی
P<0.0001 ($\chi^2=236/1, df=2$)	۸۸/۶	۷۰	۶۸/۱	۱۱۳	۸/۳	۲۱	۸/۳	۷۰	۶۸/۱	ارتباط با همکاران و دوستان
P<0.0001 ($\chi^2=229, df=2$)	۸۷/۳	۶۹	۶۱/۴	۱۰۲	۶/۳	۱۶	۶/۳	۶۹	۶۱/۴	ارتباط با خانواده
P<0.0001 ($\chi^2=210, df=2$)	۸۲/۳	۶۵	۵۶/۶	۹۴	۵/۱	۱۳	۵/۱	۶۵	۵۶/۶	فعالیتهای اجتماعی
P<0.0001 ($\chi^2=169, df=2$)	۷۰/۹	۵۶	۴۹/۴	۸۲	۴/۷	۱۲	۴/۷	۵۶	۴۹/۴	مسئولیتهای خانوادگی

* وجود علایم متوسط یا شدید

بحث و نتیجه گیری

شیوع PMDD در تحقیقات دیگر که با استفاده از ابزارهای PSST آینده نگر انجام شده مشابه پژوهش‌های انجام شده توسط در سایر کشورها بوده است. به عنوان مثال در دو مطالعه‌ای که توسط Meaden در سال ۲۰۰۵ و Hichi در سال ۲۰۰۲ انجام شد، ۲/۷ و ۳/۵ درصد از زنان تحت مطالعه PMDD داشتند [۲۰، ۲۱]. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بخشی از این اختلافات مربوط به تفاوت‌های فرهنگی و داشتن دیدگاه منفی در مواجهه با قاعده‌گی و متعاقب آن محدودیت‌های اعمال شده در واکنش زنان نسبت به قاعده‌گی بین جوامع و کشورهای مختلف است و این اختلافات نمی‌تواند صرفاً مربوط به نوع ابزار به کار گرفته شده باشد.

این مطالعه دارای محدودیت‌هایی از جمله گذشته نگر بودن این پرسشنامه است که می‌تواند روی میزان گزارش عالیم تأثیر بگذارد. با این حال درصد شیوع به دست آمده در این مطالعه مشابه بسیاری از مطالعات دیگر انجام شده است که از ابزارهای آینده نگر دو سیکلی استفاده نمودند. همچنین در این مطالعه بین زنانی که مبتلا به نوع خفیف سندرم پیش از قاعده‌گی بودند و آنهایی که این سندرم را نداشتند، تفاوتی قائل نشده‌یم. از آنجا که پرسشنامه PSST از جمله پرسشنامه‌های اختصاصی کیفیت زندگی است که فقط روی عالیم تمرکز کرده و ابعاد دیگر را در نظر نمی‌گیرد، شاید بهتر باشد که پرسشنامه دیگری را طراحی نمود که بتواند ابعاد دیگر را هم مورد بررسی قرار دهد. در پایان، از آنجا که پرسشنامه PSST یک پرسشنامه غربالگری بوده و این مطالعه بر آن نبوده است تا به موضوع غربالگری این ابزار پردازد و فقط جهت تهیه نسخه ایرانی پرسشنامه، این مطالعه انجام شده است، توصیه می‌شود پژوهشی دیگر با در نظر گرفتن یک ابزار استاندارد دیگر و مقایسه با این پرسشنامه و تعیین حساسیت و ویژگی آن انجام گردد.

این مطالعه نشان داد که پرسشنامه ترجمه شده فارسی PSST در شرایط کشور ما دارای روایی و پایایی قابل قبولی است. از آنجا که گزینه‌های این ابزار کم است، استفاده از آن در مطالعات مختلف آسان می‌باشد. از طرفی این ابزار در نقاط مختلف جهان مورد استفاده واقع شده است و از این رو، قابلیت مقایسه نتایج طرح‌های داخل کشور را با سایر نقاط فراهم می‌کند.

سهم نویسندها

شیوا سیه بازی: جمع آوری داده‌ها، ورود داده‌ها به رایانه
فاطمه زهرا حریری: جمع آوری داده‌ها، ورود داده‌ها به رایانه

این مطالعه به بحث پیرامون تبیین نسخه ایرانی پرسشنامه غربالگری عالیم قبل از قاعده‌گی PSST می‌پردازد که مناسب بودن آن برای جمعیت تحت مطالعه در این تحقیق اثبات شده و آلفای کرونباخ معادل ۰/۹ به دست آمده است.

طبق مطالعه‌ای در سوئیس شیوع عالیم PMS به دست آمده در سطح ملی و با پایه جمعیتی با نتایج به دست آمده از PSST برای تشخیص PMS متوجه تا شدید منطبق بوده و استفاده از نسخه آلمانی این پرسشنامه برای PMS در جمعیت سوئیس تأیید شده است [۱۴]. شیوع سندرم پیش از قاعده‌گی در این مطالعه ۳۳/۳ درصد بوده که مشابه برخی از تحقیقات در این زمینه در ایران است. از جمله در تحقیق انجام شده توسط دکتر آذین علوی و همکاران، شیوع سندرم پیش از قاعده‌گی در دانشجویان علوم پزشکی بندر عباس ۵۴/۹ درصد بود [۱۵]. همچنین در پژوهش انجام شده با هدف بررسی سندرم پیش از قاعده‌گی و نشانه‌های مرتبط با آن در دانشجویان توسط فرنگیس شاهپوریان و همکارانش ۴۳/۷۸ درصد از افراد به نوعی از PMS رنج می‌برند [۱۶].

طراحان پرسشنامه PSST در سال ۲۰۰۳ میزان شیوع و PMMD را به ترتیب ۷/۲۰ و ۵/۱ درصد گزارش نمودند [۷]. همچنین در مطالعه انجام شده در تایلند با عنوان بررسی شیوع سندرم پیش از قاعده‌گی در پرستاران تایلندی که از فرم استاندارد شده PSST برای تشخیص PMS استفاده گردید، شیوع آن نیز ۲۵/۱ درصد گزارش گردید [۱۷]. اما میزان شیوع PMS در پژوهش انجام شده در سال ۲۰۰۵ در کشور ژاپن ۵/۳ درصد بوده است [۱۸]. این داده‌ها حاکی از این است که شیوع سندرم پیش از قاعده‌گی در ایران با وجود پرسشنامه‌های متعدد (گذشته نگر و آینده نگر) تقریباً مشابه بوده و بالاتر از میزان مشاهده شده در کشورهای دیگر است. شیوع اختلال ملال قبل از قاعده‌گی نیز در این مطالعه نسبتاً بالا (۱۵/۹ درصد) گزارش گردید. میزان شیوع اختلال ملال قبل از قاعده‌گی در مطالعات انجام شده توسط پرسشنامه PSST در سایر کشورها ۱/۲ و ۵/۱ درصد گزارش شده است [۱۸، ۷]. در پژوهش انجام شده دیگر در ایران توسط فائزه تاتاری و همکارانش شیوع اختلال ملال قبل از قاعده‌گی ۴/۹ درصد و تقریباً مشابه کشورهای دیگر گزارش شد [۱۹]. ولی شیوع اختلال ملال قبل از قاعده‌گی در این مطالعه نسبتاً بالا (۱۵/۹ درصد) گزارش گردید که باید با مطالعات بیشتر تأیید گردد.

این مقاله بخشی از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مامایی خانم‌ها شیوا سیه بازی و فاطمه زهرا حریری در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران است و بدین وسیله از دانشجویان خوابگاه‌های دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس که با گشاده رویی پاسخگوی پژوهشگران بودند تشکر و قدردانی می‌گردد.

علی منتظری: راهنمایی در زمینه نحوه استاندارد سازی و استاندارد سازی نهایی پرسشنامه، راهنمایی در زمینه نگارش مقاله لیدا مقدم بنائی؛ تحلیل داده‌ها، ویرایش مقاله

تشکر و قدردانی

منابع

1. Sloane E. Biology of women. 4th Edition, Delmar Thomson Learning: New York, USA, 2002
2. Berek Js. Berek & Novak's Gynecology. 14th Edition, Lippcott Williams & Wilkins (LWW): Philadelphia, USA, 2007
3. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecology endocrinology and infertility, 7th Edition, Lippcott Williams & Wilkins (LWW): Philadelphia, USA, 2005
4. Havens CS, Sllivan ND, Tilton P. Manual of outpatient Gynecology. 2th Edition. Mosby: St. Louis, USA, 1991
5. Ryan KJ, Berkowitz RS, Barbieri RL, Dunaif, AE. Kistner's Gynecology and Women's Health Nursing. 7th Edition, Mosby: St. Louis, USA, 1999
6. Mortola J F, Premenstrual syndrome, In: Goldman MB, Hatch MC. Women and health. Springer Academic Press: New York, USA, 2000; 114-62
7. Steiner M, Macdougall, Brown E. The premenstrual symptoms screening tool (PSST) for clinicians. Archives of Women's Mental Health 2003; 6: 203-9
8. Kayatekin KZ, Sabo AN, Halbreich U. Levetiracetam for treatment of premenstrual dysphoric disorder: a pilot, open-label study. Archives of Women's Mental Health 2008; 11: 207-11
9. Flintbox: The Premenstrual Symptoms Screening Tool (PSST). [<http://www.flintbox.com/public/project/575>]
10. Mass R, Moll B, Holldorfer M, Wiedemann K, Richter-Appelt H, Dahme B, et al. Effects of the premenstrual syndrome on facial expressions of sadness. Scandinavian Journal of Psychology 2008; 49: 293-98
11. Nedjat S, Montazeri A, Holakouie K, Mohammad K, Majdzadeh R. Psychometric properties of the Iranian interview-administered version of the World Health Organization's Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF): a population-based study. Biomed central Health Services Research 2008; 8: 61
12. Pennington, D. Essential Personality. 1 st Edition, Arnold: London, UK, 2003
13. Polit DF, Beck CT, Owen SV. Focus on research methods. Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Research in Nursing & Health 2007; 30: 459-67
14. Tschudin S, Bitzer J, Zemp E. Premenstrual syndrome in Switzerland assessed by Premenstrual Symptoms Screening Tool [abstract]. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology 2007; 28: 51
15. Alavi A, Salahi moghaddam A, Alimalayeri N, Ramezanpour A. Prevalence of clinical manifestation of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder in students of Bandar Abbas medical university. Medical Journal of Hormozgan University 2007; 4: 335-41 [Persian]
16. Shahpourian F, Mahmoudi Z, Bastani F, Parsai S, Hoseini F. Premenstrual Syndrome (PMS) and the related symptoms among students of Tehran University of Medical Sciences (IUMS). Iran Journal of Nursing 2006; 18: 57-66 [Persian]
17. Chayachinda C, Rattanachaiyanont M, Phattharayuttawat S, Kooptiwoot S. Premenstrual Syndrome in Thai Nurses. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 2008, 3: 203-9
18. Takeda T, Tasaka K, Sakata M, Murata Y. Prevalence of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder in Japanese women. Archives of Women's Mental Health, 2006; 9: 209-12
19. Tatari F, Shaker J, Hosseini M, Rezaii M, Amirian M, Amirian F. Frequency of premenstrual dysphoric disorder (PMDD), premenstrual syndrome (PMS) and some related factors in students of girls' high schools of Kermanshah. Journal of Research in Behavioral Sciences 2007; 1: 13-18 [Persian]
20. Meaden PM, Hartlage SA, Cook-Karr J. Timing and severity of symptoms associated with the menstrual cycle in a community –based sample in the Midwestern United States. Psychiatry Research 2005; 134: 27-36
21. Halbreich U, Borenstein J, Pearlstein T, Kahn L. The prevalence, impairment, impact and burden of premenstrual dysphoric disorder (PMS/PMDD). Psychoneuroendocrinology 2003; 28: 1-23