

## فرآ تحلیل اثربخشی تأثیر طب سوزنی برای تسکین درد در ایران

رقیه صادقی<sup>۱</sup>، محمدعلی حیدرnia<sup>۲\*</sup>، منصوره زاغری تفرشی<sup>۳</sup>، مریم رسولی<sup>۴</sup>، حمید سوری<sup>۵</sup>

۱. شعبه بینالملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
۲. گروه پزشکی، اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
۳. گروه مدیریت، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
۴. گروه کودکان، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
۵. گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

فصلنامه پایش

سال دوازدهم شماره پنجم مهر - آبان ۱۳۹۲ صص ۴۶۶-۴۵۹

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۸/۷

[نشر الکترونیک پیش از انتشار - ۲۳ شهریور ۹۲]

### چکیده

با توجه به افزایش استفاده از طب سوزنی برای تسکین درد در ایران، تاکنون، مرور نظاممند مستندات و ترکیب آن‌ها و ارائه تصویری کامل از ابعاد این موضوع مورد مطالعه قرار نگرفته است؛ لذا هدف از انجام این پژوهش، مطالعه فرا تحلیل اثربخشی طب سوزنی برای تسکین درد در ایران با محوریت بررسی اندازه اثر آن است. پژوهش حاضر فرا تحلیل ۷ مطالعه استفاده از طب سوزنی برای تسکین درد در جامعه ایرانی بود، که دارای ویژگی‌های ورود به پژوهش (تجربی، بررسی تأثیر طب سوزنی برای تسکین درد، چاپ شده در مجلات معتبر) بودند. برای یافتن بررسی‌های انجام شده در کشور، از مقاله‌های چاپ شده در مجلات معتبر داخلی، همایش‌ها و پایان نامه‌های موجود در بانک‌های اطلاعاتی؛ Magiran, SID Irandoc, Iranmedex, IRCT، استفاده شد. و سپس با استفاده از فرم استخراج اطلاعات شامل اطلاعات کلی مرتبط با مقاله (عنوان، نویسنده و زمان انجام مطالعه) مشخصات مطالعه (حجم نمونه گروه کنترل و شاهد، نوع درد، ابزار سنجش درد) و نتایج حاصله، اطلاعات گردآوری شده به کمک نرم افزار آماری CMA تحلیل شد. مطالعات شامل نمونه که ۴۳۶ نمونه که ۲۱۸ نمونه در گروه مورد و ۲۱۸ نمونه در گروه شاهد بودند. بیشترین مدت مداخله سه ماه با ۹ جلسه درمان و کمترین مدت ۱۵ دقیقه بوده است. از ۷ مطالعه فرا تحلیل شده، ۵ مطالعه نشان داد که طب سوزنی دارای اثر معنی دار آماری در تسکین درد است. نتیجه تلفیق اندازه اثرها نشان داد که میزان تأثیر طب سوزنی در تسکین درد ۱/۳۱۰ است که در فاصله اطمینان ۰/۵۳۵-۰/۰۸۵-۰/۰۰۱ (P<0/001). نتایج به دست آمده، نشان داد طب سوزنی واقعی برای تسکین درد مؤثر است، و با توجه به جدول اندازه اثر کوهن، اثربخشی طب سوزنی در دسته بزرگ قرار می‌گیرد.

**کلیدواژه:** ایران، تسکین درد، طب سوزنی، فرا تحلیل

\* نویسنده پاسخگو: تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه پزشکی اجتماعی  
تلفن: ۷۷۳۶۲۱۱۱

E-mail: aliheidarnia2@gmail.com

## مقدمه

دلیل نیاز است با مرور نظاممند در که مطالعات موجود در این زمینه، بتوان به بهترین و علمی‌ترین شواهد دسترسی پیدا کرد. در پژوهش حاضر، کلیه مقالاتی که در مجلات علمی پژوهشی داخلی، در مورد استفاده از طب سوزنی برای تسکین درد به چاپ رسیده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. مرور ساده مستندات نشان می‌دهد که، روند استفاده از طب سوزنی برای تسکین درد در کشور طی سالیان اخیر افزایش داشته است. پژوهش حاضر با محوریت بررسی اندازه اثر، به اثربخشی طب سوزنی در تسکین درد می‌پردازد، تا به این سؤال پاسخ داده شود که میزان تأثیر طب سوزنی در تسکین درد قدر است؟ و آیا این تأثیر به لحاظ آماری معنی دار است یا خیر؟ نتایج بهدست آمده از این مرور نظام مند خواهد توانست میزان استفاده از بهترین و با کیفیت‌ترین مستندات موجود در زمینه اثربخشی طب سوزنی در تسکین درد را ارتقا دهد.

## مواد و روش کار

طراحی مطالعه: پژوهش حاضر یک فرا تحلیل مطالعات استفاده از طب سوزنی برای تسکین درد جامعه ایرانی است، که با روش مرور گزارش‌های چاپ شده از پژوهش‌های تجربی در مورد تأثیر طب سوزنی بر تسکین درد انجام گرفته است. برای یافتن بررسی‌های انجام شده در کشور، از مقاله‌های چاپ شده در مجلات معتبر داخلی، همایش‌ها، پایان نامه‌های موجود در بانک‌های اطلاعاتی؛ مهندسی سازه‌های انسانی، Magiran، SID Irandoc، Iranmedex، IRCT، سازوکار جستجوی مقاله‌ها به طور عمده با استفاده از جستجوی نظاممند کلید واژه‌های فارسی با همه ترکیبات احتمالی کلمات مهم، اصلی و حساس انجام شد. در این جستجو به طور کلی برای بالا بردن حساسیت در جستجو، از کلید واژه‌های طب مکمل، طب سنتی، طب سوزنی، تسکین درد و مدیریت درد استفاده گردید.

معیارهای انتخاب: در ابتدا فهرستی از عنوانین و چکیده تمام مقالات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی تهیه شد. معیار اولیه گزینش مقاله‌ها، ارتباط آن‌ها با استفاده از طب سوزنی برای تسکین درد بود. سپس مقالات مرتبط به صورت مستقل از هم، وارد فرایند پژوهش شدند. اگر با استفاده از خلاصه مقالات عدم تطابق موضوع آنها با اهداف مشخص می‌شد، مقاله رد شده، و در غیر این صورت، مقاله به طور کامل بررسی می‌شد.

معیارهای ورود و خروج: با توجه به پراکندگی علل استفاده شده از طب سوزنی، نوع بررسی‌ها و نیز همسان نبودن معیارهای به کار

درد (حد یا مزمن)؛ حسی ناخوشایند، تجربه‌ای منحصر به فرد و فرایند ادراکی پیچیده‌ای است که می‌تواند تحت تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی باشد [۱]، و به علت اهمیت زیادی که دارد، از سال ۱۹۹۵، به عنوان پنجمین علامت حیاتی مطرح شده است [۲]. بر اساس نظریه انجمان درد آمریکا، رهایی از درد، از حقوق مسلم بیماران اعلام گردیده است [۳]. تسکین به موقع و صحیح درد، بهبودی سریع‌تر و افزایش رضایتمندی بیمار را به دنبال دارد و ادامه درد بدون استفاده از روش مناسب تسکین، سبب به وجود آمدن مشکلات فردی و اجتماعی شده، و در نهایت کیفیت زندگی افراد را کاهش می‌دهد [۴]. درد از نظر فیزیولوژی به دو دسته تقسیم می‌شود درد همراه با اختلال عملکرد بافت عصبی تقسیم می‌شود، و درد همراه با اختلال عملکرد بافت غیرعصبی. درد نوسیسیتیو (درد با منشأ آسب بافتی) زمانی رخ می‌دهد که انتهاهای عصبی در منطقه محیطی بوسیله یک محرك عصبی فعال شوند [۲]. دردهای نوسیسیتیو ممکن است به صورت تند، مبهم یا شدید باشند. از مثال‌های دردهای نوسیسیتیو می‌توان به دردهای اسکلتی عضلانی اشاره کرد که منشاء آنها در اسکلت بدن، عضلات یا مفاصل است، ممکن است در اثر ضربه یا التهابات ناشی از فرسودگی، وضعیت استقراب بدن، عدم توازن عضلانی یا استفاده بیش از حد عضلات به وجود آیند، که سبب شود تا فرد، این نوع درد را تجربه کند و ممکن است ماهما و حتی سال‌ها ادامه یابد [۲-۳]. درمان‌های مرسوم متعددی برای تسکین درد از جمله فیزیوتراپی، تزریق کورتیکواستروئید، جراحی، داروی مسكن وجود دارد که بر حسب نوع و مکان درد از آن‌ها استفاده می‌شود [۵]. در خصوص کارآمدی این درمان‌ها مباحثت چالشی عمدہ‌ای وجود دارد و از طرفی مطالعات مختلف نشان دهنده بروز عوارض جانبی ناخواسته و وابستگی نسبت به درمان‌های دارویی موجود هستند [۶-۸]. طی چهار دهه گذشته، طب سوزنی برای درمان درد از توجه قابل ملاحظه‌ای در جهان برخوردار شده است [۹،۱۰] و یکی از روش‌های اصلی مورد تأیید و پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی است [۱۱]. استقبال استفاده‌کنندگان خدمات سلامت از طب سوزنی، منجر به تغییر در رویکرد نظام سلامت در دنیا [۱۲-۱۶] و ایران شده است. از این رو، بررسی مطالعاتی که با استفاده از طب سوزنی به تسکین درد می‌پردازند، با در نظر گرفتن مزایای هزینه اثربخشی و میزان کم عوارض جانبی، حائز اهمیت است. به همین

سوزني را برای انواع مختلف درد مورد آزمون قرار داده‌اند که شامل ديسمنوره اوليه [۱۹]، كمردرد مزمن مکانيکي [۲۰، ۲۳]، استئوارتیت زانو [۲۱] درد اينگوينال [۱۸، ۲۲]، و درد شانه [۱۷] است. در همه مطالعات گروه مورد، مداخله طب سوزني را درياافت نموده و گروه شاهد يا فاقد مداخله بوده و يا از طب سوزني غير واقعي استفاده کرده بودند. در دو مطالعه نيز برای گروه شاهد، از پيروكسيكام خوراکي [۲۰، ۲۲] و در يك مطالعه از ايوبپروفن [۲۱] استفاده شده است. در يك مطالعه نيز الکترواكوپانکچر به کار گرفته شد [۲۲]. در همه مطالعات برای محاسبه اثريخشي طب سوزني، که شاخص ميزان تأثير طب سوزني در تسکين درد است، اطلاعات مربوط به سنجش درد با استفاده از مقیاس آنالوگ بصری Visual Analog Scale (VAS) استخراج گردید، که يك مقیاس ۱۰ قسمتی (۰ = بي دردي، ۱ = درد خيلي کم، ۳ = درد کم، ۵ = درد متوسط، ۷ = درد شديد و ۹ = درد خيلي شديد) است و در يك مطالعه چگونگي استفاده از اين مقیاس به بيماران آموزش داده شده است [۱۷]. طول مداخله درمان در مطالعات نيز متنوع و داراي مقادير متفاوتی بوده است. بيشترین مدت زمان مداخله درمانی سه ماهه با ۹ جلسه درمان بوده و کمترین آن شامل درمان ۱۵ دقيقه اي بوده است.

### يافته‌ها

اندازه اثر شاخصی است کمي که نتایج و یافته‌های آماری مطالعات در قالب آن خلاصه و یك‌دست می‌شوند و عنصر کلیدی در فراتحليل بوده و هدف از استفاده از آن، يك شکل کردن یافته‌های آماری مطالعات در يك شاخص عددی و اندازه مشترک جهت مقایسه و ترکيب نتایج آماری مطالعات است [۲۴]. از آنجايي که، با توجه به داده‌های موجود در ۷ مطالعه فراتحليل شده، در هیچ يك از مطالعات به گزارش اندازه اثر پرداخته نشده و صرفاً بر مبنای سطح معناداري، اثر بخش بودن طب سوزني مورد بررسی قرار گرفته است، بنابراین نمی‌توان يك برد که ميزان تأثير طب سوزني در تسکين درد چقدر است. زيرا سطح معنی داري به شدت تحت تأثير حجم نمونه بوده و به تنهايی نمی‌تواند نشان دهنده ميزان تأثير طب سوزني در تسکين درد باشد و آزمون‌های معنی داري به هیچ وجه مبين شدت رابطه نیست، بلکه فقط نشان دهنده احتمال آن است که رابطه مشاهده شده ناشی از خطای نمونه‌گیری باشد [۲۵]. اثر کلی طب سوزني در تسکين درد: در جدول ۲ اطلاعات مربوط به اندازه اثر و معنی داري آن به تفکيك مطالعات فرا تحليل شده اريه

برده شده، از معیارهای ورود و خروج به شرح زير استفاده شد. معیارهای ورود: مطالعاتی مورد ارزیابي قرار گرفتند که به صورت پژوهش‌های تجربی بودند، تأثير طب سوزني را برای تسکين درد گزارش کرده بودند و فقط برای بررسی تسکين درد (صرف نظر از حاد يا مزمن بودن) در بيماران بزرگسال (بالاتر از ۱۸ سال) انجام شده بودند. بررسی‌ها اصیل بوده، در نشریه‌های معتبر چاپ شده و يا به صورت پایان نامه مطرح شده باشند.

معیارهای خروج: بررسی‌هایی از مطالعه خارج شدند که؛ بر روی دردهای زایمانی انجام شده بودند، به صورت گذشته‌نگر، کيفي و يا مروري تأثير طب سوزني برای تسکين درد را بررسی کرده بودند، متغيرهایی غير از درد را مورد مطالعه قرار داده بودند، کار آزمایي‌هایي که گروه کنترل نداشتند (نیمه تجربی) و بررسی‌هایي که از روش‌های شناختي رفتاري استفاده کرده بودند. همچنین، مطالعاتي که به صورت خلاصه مقاله، نامه به سرديب، خلاصه کنگره‌ها، سمینارها، گزارش موردي و علوم پايه بودند نيز از مطالعه خارج شدند.

استخراج داده‌ها: داده‌های کليدي مورد نياز از مقالات استخراج شده و در فرم استخراج اطلاعات ثبت شدند.

فرم استخراج اطلاعات شامل: اطلاعات کلي مرتبه با مقاله (عنوان، نويسنده و زمان انجام مطالعه) مشخصات مطالعه (حجم نمونه، گروه کنترل و شاهد، نوع درد، ابزار سنجش درد) و نتایج حاصله بود. سپس، اطلاعات گردآوري شده به کمک نرم افزار آماري CMA (Comprehensive Meta Analysis) ارزیابي شدند. در ميان متون کلي ۳۵ مطالعه به دست آمد که پس از بررسی کل متون و با توجه به معیارهای ورود، در نهايیت، ۷ مقاله وارد مطالعه شدند (نمودار ۱). در مجموع ۷ مطالعه فرا تحليل شده ۴۳۶ نمونه را مورد بررسی قرار داده‌اند که از اين تعداد ۲۱۸ نمونه در گروه مداخله و ۲۱۸ نمونه در گروه کنترل حضور داشته‌اند. روش‌های آماري مورد استفاده عموماً آزمون پارامتريک t بوده است، که ميانگين و انحراف معيار و سطح معنی داري مطالعات گزارش شده است. در يك مطالعه نيز از آزمون ناپارامتريک کاي اسکور برای آزمون تأثير طب سوزني در تسکين درد استفاده شده است (جدول ۱). سال انتشار ۷ مطالعه فرا تحليل شده نشان مي‌دهد که، در زمينه پژوهش و انتشار مقاله در حوزه تأثير طب سوزني در کاهش درد در کشورمان، با موضوع نسبتاً جديدي روبه رو هستيم. مطالعات بين سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ در مجلات به چاپ رسيده‌اند [۲۳-۲۳]. پژوهشگران استفاده از طب

$Q_T = 79/0.2$ , df = 6,  $P < 0.001$ ). برای توضیح این ناهمگونی تصمیم گرفته شد، که از طول درمان به عنوان متغیر تعدیل گر و توضیح دهنده بخشی از ناهمگونی بین مطالعات استفاده شود. انتظار می‌رود که هر چه طول درمان بیشتر باشد، تاثیر طب سوزنی در کاهش درد بیشتر گردد. برای آزمون این فرضیه از تعداد جلسات درمانی که در جدول ۱ به تفکیک مطالعات ارایه شده است به عنوان شاخصی از طول دوره درمانی استفاده گردید. برای بررسی تأثیر آن بر نتایج نیز، روش آماری فرا رگرسیون به کار گرفته شد. نتایج ارایه شده در جدول ۴ نشان می‌دهد تاثیر طول درمان بر اثربخشی طب سوزنی در کاهش درد به لحاظ آماری معنادار است و مقدار تأثیر آن نیز  $0.19 - 0.019$  است. بنابراین می‌توان گفت هرچه تعداد جلسات درمانی بیشتر باشد، به اثربخشی طب سوزنی در کاهش درد بیماران می‌افزاید و سبب می‌شود طب سوزنی بهتر عمل کند.

اریبی انتشار: در فراتحلیل حاضر به مسئله اریبی انتشار (Publication bias) بر اساس رویکرد روزنثال [۲۹] پرداخته می‌شود. بدین ترتیب که به محاسبه تعداد مطالعات تاثیر طب سوزنی در کاهش درد با میانگین تاثیر صفر که قادر باشند نتایج فراتحلیل را دگرگون سازند، پرداخته شده است. همانطور که در جدول ۵ ملاحظه می‌شود، برآورد نشان می‌دهد،  $20.3$  مطالعه با میانگین تاثیر صفر موردنیاز است تا بتواند مقدار سطح معناداری  $7$  اندازه اثر فراتحلیل حاضر را تغییر داده و از وضعیت معنادار به وضعیت غیرمعنادار تغییردهد. به عبارت دیگر  $29$  برابر اندازه اثر فراتحلیل حاضر باشیتی اندازه اثر غیرمعنادار به لحاظ آماری پیدا نمود تا نتایج فراتحلیل حاضر را دگرگون نماید. بنابراین می‌توان بطور نسبی از مقاوم بودن فراتحلیل حاضر در مقابل اریبی انتشار مطمئن بود.

مطالعات یافت شده از بانک‌های اطلاعاتی  $35$  مورد

مطالعات حذف شده بر اساس خلاصه و عنوان  $17$  مورد

مطالعات مرتبط با طب سوزنی در تسکین درد  $18$  مورد

مطالعات انتخاب شده براساس معیارهای ورود  $7$  مورد

گردیده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود علامت تمامی مقادیر اندازه اثر منفی است، که نشان می‌دهد طب سوزنی همواره باعث تسکین درد بیماران می‌گردد، اما متفاوت بودن بزرگی اندازه اثر و سطح معنی‌داری نشان می‌دهد که، اثر طب سوزنی در تسکین درد همواره به یک میزان نبوده و به لحاظ آماری نیز همواره معنی‌دار نیست. از  $7$  مطالعه فرا تحلیل شده،  $5$  مطالعه نشان می‌دهد که طب سوزنی دارای اثر معنی‌دار آماری در تسکین درد اثر معنی‌دار مطالعه بیانگر آن است که طب سوزنی در تسکین درد اثر معنی‌دار آماری ندارد. با وجود چنین تناقضاتی این سؤال پیش می‌آید که آیا طب سوزنی در تسکین درد مؤثر است یا خیر؟ نتیجه تلفیق اندازه اثرها (ستون آخر جدول ۲) نشان می‌دهد که میزان تأثیر طب سوزنی در تسکین درد  $1/310 - 1/310$  است که در سطح  $95$  درصد با فاصله اطمینان  $-0/535 - 2/085$  تغییر می‌کند. این اندازه اثر به لحاظ آماری معنی‌دار نیز هست ( $P < 0.001$ ). از آنجایی که بعد از محاسبه اندازه اثر، فرا تحلیل گر باید با معیاری اهمیت آن را از نظر بزرگی اندازه تفسیر نماید، و در واقع بایستی به این سؤال که اندازه اثر  $1/310 - 1/310$  از نظر مقدار چگونه است؟ پاسخ دهد، در این پژوهش، با استفاده از جدول اندازه اثر کوهن [۲۶]، اقدام به تفسیر اندازه اثر شده است. بدین صورت که، کوهن، اندازه اثرها را بر اساس مقدار آن‌ها به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می‌کند (جدول ۳). بنابراین بر مبنای این دسته بندی، مقدار به دست آمده اندازه اثر طب سوزنی در تسکین درد به میزان  $1/310 - 1/310$  در دسته بزرگ قرار می‌گیرد.

بررسی ناهمگونی مطالعات: نتایج نشان می‌دهد مقدار آماره هگز [۲۷] و هگز و الکین [۲۸] در  $7$  مطالعه تلفیق شده در فراتحلیل حاضر به لحاظ آماری معنادار است، بنابراین مطالعات ناهمگون اند

جدول ۱: مؤلفه‌های شکلی و روش‌شناسی ۷ مطالعه فرا تحلیل شده

نوسینده/گان	نوع	درد	دارای	و همکاران (۱۳۸۹)	اویله	دیسمنوره	طب سوزنی	ساده	گروه مورد	مدخله گروه	شاهد	سنجرش	کاهش درد	طول مداخله	گروه مورد	حجم نمونه	جنس نمونه	بازه سنی نمونه	روش آماری
امان الهی و همکاران (۱۳۸۸)	کمر درد	زمان	آرتربیت زانو	طب سوزنی	پیروکسیکام خوارکی	vas	دو جلسه (دو هفته)	دو هفته (دو جلسه در هفته)	۵۰	۵۰	سه ماه	vas	طب سوزنی نقاط	غیر مرتبط	گروه شاهد	گروه مورد	گروه شاهد	جنس نمونه	بازه سنی نمونه
امان الهی و همکاران (۱۳۸۶)	استئو آرتربیت زانو	طب سوزنی	ایبوپروفن	vas	دو جلسه (دو هفته در هفته)	دو هفته (دو جلسه در هفته)	۲۳	۲۳	۴۵	۴۵	نیم ساعت	vas	طب سوزنی	طب سوزنی	کترو اکپانکچر	طب سوزنی	زن و مرد	زن و مرد	t-test میانگین و انحراف معیار
امان الهی و همکاران (۱۳۸۸)	شانه	زمان	اینگونیال توکلی	طب سوزنی	بدون مداخله	vas	۱۸	۱۸	۴۵	۴۵	روز ۱۲ (۳ جلسه)	vas	طب سوزنی	طب سوزنی	کترو اکپانکچر	طب سوزنی	مرد	زن و مرد	t-test میانگین و انحراف معیار
امان الهی و همکاران (۱۳۸۶)	هادیانفر	زمان	اینگونیال راجی	طب سوزنی	بدون مداخله	vas	۱۵ دقیقه	۱۵	۳۰	۳۰	۱۵ دقیقه	vas	طب سوزنی	طب سوزنی	پیروکسیکام	طب سوزنی	مرد	مرد	Chi-square
هادیانفر و همکاران (۱۳۸۸)	کمر درد	زمان	اینگونیال راجی	طب سوزنی	بدون مداخله	vas	دو هفته (دو جلسه در هفته)	دو هفته (دو جلسه در هفته)	۲۶	۲۶	۲۶	vas	طب سوزنی نقاط	غیر مرتبط	گروه شاهد	گروه مورد	جنس نمونه	بازه سنی نمونه	t-test میانگین و انحراف معیار

جدول ۲: محاسبه اندازه اثر تأثیر طب سوزنی در کاهش درد

شماره مطالعه	اندازه اثر(d)	مقدار	حد پایین	حد بالا	P_Value
۱	-۲/۲	-۲/۶۹۵	-۱/۷۰۶	-۱/۷۸۸	/۰/۰۱
۲	-۲/۰۵۳	-۲/۷۱۸	-۱/۳۸۸	-۱/۰۰۱	/۰/۰۱
۳	-۰/۸۰۱	-۰/۱۹۲	-۰/۲۱۰	-۰/۰۰۱	/۰/۰۱
۴	-۰/۷۱۹	-۰/۱۴۲	-۰/۲۹۶	-۰/۰۰۱	/۰/۰۱
۵	-۳/۵۵۶	-۴/۵۹۶	-۲/۵۱۵	-۰/۰۰۱	/۰/۰۱
۶	-۰/۱۹۸	-۰/۷۱۳	-۰/۳۱۷	-۰/۴۵۰	/۰/۴۵۰
۷	-۰/۰۴۰	-۰/۵۷۶	-۰/۴۹۵	-۰/۸۸۳	/۰/۸۸۳
کل	-۱/۳۱۰	-۲/۰۸۵	-۰/۰۳۵	-۱/۰۰۱	

### بحث و نتیجه‌گیری

یافته‌های به دست آمده از بررسی‌های مورد تحلیل، مؤید این مطلب است که، روش‌های مختلف طب سوزنی، در تسکین درد مؤثر واقع می‌شود. در این بررسی سعی شد تا به طور اختصاصی به تأثیر طب سوزنی بر تسکین درد پرداخته شود. در ۵ پژوهش از ۷ پژوهش مورد بررسی، بیماران دارای درد که تحت درمان روش‌های مختلف طب سوزنی به تنها یا به طور توان قرار گرفتند، به طور معنی داری میزان درد در آن‌ها نسبت به قبل از درمان مداخله‌ای، تسکین یافته بود. هم‌چنان، با بررسی مطالعات مشخص شد که، طب سوزنی غیر واقعی تأثیرات ضد دردی به اندازه طب سوزنی واقعی ندارد. بر طبق مطالعه توکلی و همکاران، میزان درد در گروه طب سوزنی غیر واقعی نسبت به گروه طب سوزنی واقعی بالاتر بود و این

جدول ۳: اندازه اثر و تفسیر آن

اندازه اثر(d)	اندازه اثر
کوچک	.۰/۲
متوسط	.۰/۵
بزرگ	.۰/۸

جدول ۴: نتایج آزمون آماری تأثیر طول درمان بر اثربخشی طب سوزنی در کاهش درد بیماران

متغیر	ضریب رگرسیونی(B)	خطای استاندارد	مقدار	تعداد جلسات درمانی
.۰/۰۰۱	-۵/۲۵	.۰/۰۳	-۰/۰۱۹	
.۰/۰۵۲	-۱/۹۴	.۰/۱۷	-۰/۳۳	مقدار ثابت

به یک مطالعه وسیع تر که به موضوع طب سوزنی غیر واقعی، یکپارچگی تعریف درد، درمان های بهینه طب سوزنی، و کاربرد نتایج عینی تر خواهند پرداخت، احساس می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که طب سوزنی واقعی برای تسکین درد مؤثر است، و این تأثیر در مقایسه با داروها و طب سوزنی غیر واقعی، بیشتر است. هرچند که با توجه به ناهمانگی بالینی زیاد بین مطالعات، باید در نتیجه گیری کلی دقت بیشتری شود. به همین دلیل، پیشنهاد می شود که برای پیدا کردن بهترین شواهد درمان با طب سوزنی برای تسکین درد، پژوهش های بیشتری انجام شود.

### سهم نویسندها

رقیه صادقی: طراحی مطالعه، تفسیر و تجزیه و تحلیل داده ها  
محمدعلی حیدرنیا: استاد راهنمای اول  
منصوره زاغری: استاد راهنمای دوم  
مریم رسولی: استاد مشاور  
حمید سوری: استاد مشاور

### تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل قسمتی از رساله دکترای تخصصی پرستاری است که موضوع آن به تصویب شورای پژوهشی شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رسیده و به شماره ۱۱۶/۴۵۱ ثبت شده است.

اختلاف با توجه به آزمون های آماری معنی دار بود. از آنجایی که، هر یک از مطالعات مورد تحلیل، تأثیر طب سوزنی را در مورد یک نوع درد خاص بررسی کردند، لذا، تعریفی همسو از درد در مطالعات وجود ندارد. فقط دو مطالعه، کمردرد را به صورت درد حاد برای با طول زمانی کمتر از سه ماه و مزمن با طول زمانی بیشتر از چهار ماه تعریف کردند [۲۰، ۲۳]. اگرچه تمام مطالعات، طب سوزنی را به عنوان درمان اولیه به کار برند، ولی طب سوزنی به کاررفته از لحاظ فراوانی و طول مدت درمان ها، زمان باقی ماندن سوزن ها، تعداد سوزن های به کار رفته و نوع طب سوزنی متفاوت و بنابراین درمان ها و نوع مداخلات نیز ناهمانگ بودند. از طرفی دیگر عدم کورسوبی در مطالعات و عدم پیگیری یکسان از موارد دیگری است که در مطالعات مورد تحلیل مشاهده شده است. از محدودیت های دیگر این مطالعه، ناهمگونی پیامدهای گزارش شده در مطالعات بود. بدین صورت که یک تعریف مشخص و یکسانی در مطالعات از تسکین درد مطرح نشده بود. در مطالعه عماد و امان الهی اثرات مربوط به کاهش درد نظیر بهبود دامنه حرکتی گزارش شد ولی در مطالعه توکلی و همکاران، دارابی و همکاران، امان الهی و همکاران، راجی و همکاران، هادیانفرد و همکاران با استفاده از مقیاس ده قسمتی آنالوگ بصری پیامد تسکین درد گزارش شد. از طرفی، تعداد نمونه در مطالعات کوچک بود و بیشترین تعداد نمونه از ۵۰ بیمار تشکیل می شد که در بررسی دارابی و دیگران مشاهده گردید. پژوهش های آتی برای موضوعات بحث شده پیشنهاد می شود و نیاز

### منابع

1. Bishop FL, Lewith GT. A Review of psychosocial predictors of treatment outcomes: what factors might determine the clinical success of acupuncture for Pain? Journal Acupuncture Meridian study 2008; 1:1-12
2. Benzschawel Valerie Chyle. Patient perceptions of treatment options for chronic pain, Master of nursing thesis, Montana State University, 2008
3. Feinberg S, Leong M, Bertagnolli A, Keller K. Chronic Pain Medication & Treatment. ACPA Resource Guide to Chronic Pain. American Chronic Pain Association. 2012 Available from: <http://www.theacpa.org>
4. Fouladbakhsh JM, Vallerand AH, Jenuwine ES. Self-Treatment of pain among adolescents in an urban community. Pain Management Nursing 2012;13:80-93
5. Brown C A. The beliefs of people with chronic pain in relation to important treatment components. European Journal of Pain 2004; 8: 325-33
6. Baghery Nasami M, Mohammadi E, Sadeghi R. The effect of benson relaxation on indicators amount of disease activity In rheumatoid patients referred to Rheumatology Research Center EMAM Hospital clinic. Journal of Mazandaran medical university 2003; 13: 22-28 [Persian]
7. Helmrich S, Yates P, Nash R, Hobman A. Factors influencing nurses decision to use non-pharmacological therapies to manage patients pain. Australian journal of Advanced Nursing 2001; 19: 27-35
8. Song X. Patients' Experiences of Acupuncture Treatment for Low Back Pain in Beijing Union Medical College Hospital Out-Patient Clinic.

- Bachelor's Thesis. Degree Programme in Nursing. JAMK University of sciences, 2010
9. Brumblay S KN, Green CR. Predictors of Complementary and Alternative Medicine Use in Chronic Pain Patients. *Pain Medicine* 2010; 11: 16-24
  10. Heidarnia MA, Sabeti P. The basic theory of acupuncture, 1<sup>st</sup> Edition, Horofie publisher: Tehran, 2000 [Persian]
  11. Smith AO, Sterk C, McCarty F, -Dyson DH, DiClemente R. Development and evaluation of a complementary and alternative medicine use survey in African-Americans with acquired immune deficiency syndrome. *Journal Alternative Complementary Medicine* 2010; 16: 569-77
  12. Heidarnia MA, Torabpour M, Mohammadi E. Study effect of acupressure on patients pain after abdominal surgery. *Journal Modares Medical Science* 2000; 2: 25-31
  13. Thomas KJ. Use and expenditure on complementary medicine in England: a population based survey. *Complementary Therapies in Medicine* 2001; 9: 2-11
  14. Gupta V, Gupta J. Complementary & alternative medicine in pain management - being better informed. *Pain News*, Publication of the British Pain Society, spring 2010; 34-36
  15. Bishop F L, Yardley L, Lewith GT. Treat or Treatment: a qualitative study analyzing patients' use of complementary and alternative Medicine. *American Journal of Public Health* 2008; 98: 1700-5
  16. Nichol J, Thompson EA, Shaw A. Beliefs, decision-making, and dialogue about complementary and alternative medicine (CAM) within families using CAM: a qualitative study. *Journal Alternative Complementary Medicine* 2011; 17:117-25
  17. Amanollahi A, Hollisaz M.T, Shamsoddini A. effectiveness of Acupuncture on trigger points in fibromyalgia syndrome patients. *Journal Teb janbaz* 2009; 2: 7-10 [Persian]
  18. Raji B, Jalali SM, Noyan Ashraf MA, Sharifi M, Peiravy Sereshke H. Acupuncture for post-operative pain after inguinal hernia repair: a placebo controlled, double-blinded clinical trial. *Tehran University Medical Journal* 2007; 65: 36-40 [Persian]

19. Darabi R, Aghamohammadi H, Jafari A, Sadeghifard F, Hacupian G. Study effect of acupuncture in primary dysmenorrheal in 15-30 females refers Boali gynecology clinic. *Journal of Azad medical university* 2010; 20: 170-74 [Persian]
20. Amanollahi A, Hollisaz M.T, Shamsoddini A. Comparison of effectiveness of Acupuncture and oral Piroxicam on pain and daily living activity of mechanical chronic low back pain patients. *Kowsar Medical Journal* 2010; 14: 243-48 [Persian]
21. Emad MR, Amanollahi A. Comparison of Ibuprofen with acupuncture in reducing Knee Osteoarthritis Pain. *Journal Armaghane danesh* 2007; 12: 35-43 [Persian]
22. Tavakkoli Tabassi K, Taghavi Razavizadeh R, Mohammadi S, Attaran Kabiri A, Golchian A. Investigation of the effects of acupuncture on pain following inguinal surgery. *Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences* 2012; 19: 791-97 [Persian]
23. Hadianfar. MJ, Azizi. S, Ghelich. Y, Sabet. R, Amanollahi. A. Comparing the effect of acupuncture and oral piroxicam in reduced pain and improved function of patient with chronic mechanical low back pain. *Journal Artesh University Medical Science* 2010; 7: 272-76 [Persian]
24. Brebaugh JA. Effect Size Estimation: Factors to Consider and Mistakes to Avoid. *Journal of Management* 2003; 29: 79-7
25. Dvas D A. Surveys in social research: translated by Nayebi H, 1<sup>st</sup> Edition, Nashrenay publisher: Tehran, 1390 [Persian]
26. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences: 1<sup>st</sup> Editon, Academic press: New York, 1977
27. Hedges LV. Statistical Methodology in Meta-Analysis. 1st Edition, National Institue of Education:Washington, D.C, 1982
28. Hedges LV, Olkin I. Statistical Method for Meta-Analysis. 1st Editon, Academic Press: New York, 1985
29. Rosenthal R. Research: How Are We Doing?. Distinguished Lecture presented at the meeting of the Eastern Psychological Association, Boston, MA. ERIC Document Reproduction Service No. 316580. 1989

## ABSTRACT

### Meta-analysis of effectiveness of acupuncture for pain relief in Iran

Roghayeh Sadeghi<sup>1</sup>, Mohamad Ali Heidarnia<sup>1\*</sup>, Mansoure Zaghari Tafreshi<sup>2</sup>, Maryam Rasouli,<sup>3</sup>, Hamid Soori<sup>5</sup>

1. International Branch, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2. Department of Community Medicine, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3. Department of management, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4. Department of pediatrics, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

5. Department of Epidemiology, Safety Promotion and Injury Prevention Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Payesh 2013; 12: 459-466

Accepted for publication: 28 October 2012

[EPub a head of print-14 September 2013]

**Objective (s):** With regard to the increase use of acupuncture for pain relief in Iran, until now, there is no structured review of the existing scientific documents. The aim of this study was to provide a meta analysis of evidence on effectiveness of acupuncture in pain relief in Iran.

**Methods:** Using several databases seven studies were identified and included in this meta analysis. We included studies if the study was experimental, and the primary outcome was pain relief. Then the data were analyzed performing conventional analysis using CMA statistical software.

**Results:** In all data for 436 individuals were available for analysis (218 cases and 218 controls). The longest intervention time was 3 months with 9 sessions and the least was 15 minutes. Among 7 studies, 5 studies showed that acupuncture had a significant effect on pain relief. The result of integration of data indicated the effect size value -1.310 (95% CI = -0.535 to -2.085 ( $P < 0.001$ )).

**Conclusion:** The findings from this analysis indicated that acupuncture was effective in pain relief.

**Key Words:** Iran, Pain relief, Acupuncture, Meta analysis

\* Corresponding author: Department of Health Education, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.  
Tel: 77362111  
E-mail: aliheidarnai2@gmail.com