

بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی سالمدان (CASP-19)

مجیده هروی کریموفی^{۱*}، ناهید رژه^۱، احیاء گرشاسبی^۲، مریم نیکخواه^۳، علی منتظری^۴

۱. مرکز تحقیقات مراقبت‌های سالمدانی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

۲. مرکز تحقیقات مراقبت‌های سالمدانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

۳. دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

۴. مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

نشریه پایش

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۴/۵/۵

سال پانزدهم شماره چهارم، مرداد - شهریور ۱۳۹۵ صص ۴۲۲-۴۳۱

[نشر الکترونیک پیش از انتشار- ۹۵ خرداد- ۱۶]

چکیده

پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی سالمدان (CASP-19) از رایج‌ترین ابزارهای مورد استفاده برای ارزیابی کیفیت زندگی سالمدان است. پرسشنامه مذکور شامل ۱۹ گویه در چهار بعد کنترل، استقلال، خودیابی و کامیابی است. پژوهش حاضر با هدف ترجمه و تعبیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه CASP-19 انجام گرفته است. این پژوهش از نوع مطالعات روش شناختی است که روی ۱۰۰ فرد سالمدان انجام شد. پس از کسب مجوز از طراح ابزار، ترجمه بر اساس پروتکل سازمان سلامت جهان در خصوص فرایند ترجمه و تطبیق ابزارها به نسخه فارسی ترجمه شد. سپس پایایی پرسشنامه (همسانی درونی و ثبات) و روایی شامل روایی کیفی صوری، محتوا، مقایسه گروههای شناخته شده و روایی ملکی (سنجد همبستگی بین نسخه فارسی پرسشنامه CASP-19 و SF-36) صورت گرفت. میانگین سنی مشارکت کنندگان (۷/۳۲) بود بیش از نیمی از آنان (۵۴ درصد) را زنان تشکیل می‌دادند. میزان همسانی درونی (آلای کرونباخ) برای زیر مقیاس‌ها رضایت بخش بود (۰/۸۸-۰/۷۰). آزمون-پس آزمون در دو مرحله، با فاصله زمانی دو هفته تکمیل گردید و با استفاده از آزمون شاخص همبستگی درون خوش‌ای (ICC) با هم مقایسه (ICC) با هم مقایسه ($p < ۰/۰۱$) صورت گرفت. نمره ابعاد بین نسخه فارسی پرسشنامه CASP-19 برمبنای وجود یا عدم غفلت مراقبتی نشان دهنده افتراق بر اساس پارامتر مذکور بود. روایی ملکی بیانگر همبستگی معناداری بین غالب ابعاد نسخه فارسی پرسشنامه CASP-19 و نمره کل آن و SF-36 بود. نتایج نشان داد این پرسشنامه دارای پایایی و روایی مناسب، نمره گذاری ساده، و قابلیت به کارگیری در موقعیت‌های مختلف همچون جایگاه‌های بالینی، منازل و محیط‌های تحقیقاتی توسط ارائه دهنده خدمات بهداشتی می‌باشد. پیشنهاد می‌گردد در مطالعات آینده، روایی سازه نسخه فارسی پرسشنامه CASP-19 در حجم نمونه بزرگتری با استفاده از تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه: ترجمه، اعتباریابی، نسخه فارسی، ابعاد پرسشنامه CASP-19، کیفیت زندگی سالمدان

* نویسنده پاسخگو: تهران، خیابان ولی‌عصر، کوچه شهید رحیم زاده، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات سالمدانی، دانشگاه شاهد

تلفن: ۰۶۴۱۸۵۸۰

E-mail: Heravi@shahed.ac.ir

مقدمه

شرطی که به کیفیت زندگی و شمار سال های عمر توجه بیشتری معطوف شود[۱۵]. بدین ترتیب مشکلات دوران سالمندی علاوه بر بار بالینی و اقتصادی، کیفیت زندگی وابسته به سلامتی را در سالمندان مورد تهدید قرار داده و اهمیت بررسی سطح کیفیت زندگی را در سالمندان آشکار می‌سازد. بنابراین سنجش کیفیت زندگی سالمندان نه تنها ابزار ارزشیابی مؤثر بودن مداخلات درمانی، بلکه روشی برای تحلیل برنامه ریزی، هزینه ها و اثر بخشی مداخلات نیز هست[۹]. جمع آوری اطلاعات یکی از مراحل مهم پژوهش است که نیازمند استفاده از ابزارهای مناسب است. پژوهشگران برای جمع آوری داده ها یا پرسشنامه ای جدید طراحی می‌نمایند و یا از پرسشنامه های خارجی که اعتبار و پایایی آن ها تائید شده است استفاده نمایند[۱۶]. اندازه گیری کیفیت زندگی با چالش های مختلفی روبرو است[۱۷]. تحقیقات کیفیت زندگی فاقد اساس و پایه نظری است[۱۸]. از طرفی هر ابزار اندازه گیری باید مناسب برای جمعیت مورد مطالعه باشد [۱۷]. اندازه گیری کیفیت زندگی اشخاص سالمند یک پدیده پیچیده و چندوجهی است[۱۸]. پرسشنامه ها باید به ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی کیفیت زندگی حساس باشند. جستجوی مقالات در بانک های اطلاعاتی مدلاین (MEDLINE) و سینا هل (CINAHL) نشان داد در بسیاری از مطالعات برای سنجش کیفیت زندگی اشخاص سالمند از ابزارهای عمومی کیفیت زندگی استفاده شده است [۱۹-۲۵] و در تعدادی از مطالعات پژوهشگران از ابزارهای برای بررسی کیفیت زندگی سالمندان استفاده کرده اند که به طور اختصاصی برای این امر طراحی شده اند[۲۶-۳۰]. در این میان پرسشنامه CASP-۱۹ (۲۰۰۳) شامل ۱۹ آیتم می‌باشد که در انگلستان بر اساس مدل جبران نیازها (Needs satisfaction model) طراحی شده است [۳۱] و سپس در کشورهای اروپایی مورد آزمون قرار گرفت [۱۷، ۳۲]. این ابزار به ۱۲ زبان ترجمه شده و مطالعات متعددی برای روانسنجی و استانداردسازی این ابزار در فرهنگهای مختلف از جمله در کشورهای بزرگ [۳۳]، تایوان [۳۴] ایرلند [۳۵]، ایتالی [۳۶] انجام گرفته است. در مطالعه ای [۲۰۰۷] این پرسشنامه برای مردان و زنان سالمند ۱۰ کشور اروپایی شامل سوئد، اتریش، آلمان، هلند، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، دانمارک، یونان و سوئیس بکار گرفته شد [۳۷]. بر مبنای نتایج اغلب مطالعات مذکور، این پرسشنامه ابزاری معتبر و پایا برای بررسی کیفیت زندگی این سالمندان در فرهنگهای مختلف شناخته شده است [۳۰-۳۷].

بهبود شرایط زندگی و افزایش طول عمر و اميد به زندگی پدیده سالمندی را در جوامع به دنبال داشته است. پدیده افزایش جمعیت سالمندان یکی از مهمترین چالش های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی برای ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین اعضای خانواده و جامعه در قرن بیست و یکم به شمار می‌رود [۱-۳]. پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ میلادی میزان جمعیت سالمندان در کشورهای در حال توسعه به ۸۰ درصد برسد [۴]. این چالش به موقعیت جمعیتی کشور ایران نیز مربوط می‌شود؛ در کشور ما بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰، حدود ۸/۲ درصد از جمعیت کشور، و ۱/۶ درصد از جمعیت شهر تهران در سنین ۶۰ سالگی و بالاتر قرار دارند [۵]. بنابراین ایران نیز با شتاب بالای پیر شدن جمعیت، در حال تغییر الگوی جمعیتی، به سمت سالمند شدن است [۴]. تغییر در الگوی بیماری ها سبب کاهش میزان بیماری های عفونی، افزایش بیماری های مزمن و جمعیت سالمندان به ویژه در کشورهای رو به توسعه گشته و منجر به افزایش توجه به مفاهیم سلامتی و کیفیت زندگی طی دهه های گذشته گردیده است [۷]. اهمیت کیفیت زندگی و وضعیت سلامت تا حدی است که صاحب نظران یکی از چالش های اصلی و عمدۀ بهداشت در قرن بیست و یکم را زندگی با کیفیت برتر بیان کرده اند [۸-۱۰]. از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت، کیفیت زندگی نشانگر درک هر فرد از وضعیت زندگی بر اساس فرهنگ، اهداف، نظام ارزش ها، استانداردها و علایق فردی وی می باشد [۱۱]. فاسینو در خصوص بررسی کیفیت زندگی اظهار می دارد امروزه کیفیت زندگی یک شاخص اساسی در روند مراقبت محسوب می‌شود و از آنجا که کیفیت زندگی ابعاد متعددی مانند جنبه های فیزیولوژیک، عملکرد و وجود فرد را در بر می گیرد توجه به آن از اهمیت خاصی برخوردار است و برای ارزیابی صحیح کیفیت زندگی باید به ابعاد فوق توجه شود [۱۲]. با توجه به نیازهای ویژه در دوران سالمندی، کیفیت زندگی در این دوره می تواند به راحتی مورد تهدید قرار گیرد [۱۳]. امروزه بهبود کیفیت زندگی سالمندان از جنبه های مهم مراقبت سالمندان به شمار می رود و تلاش برای بهبود کیفیت زندگی و ایجاد محیطی مناسب برای زندگی سالمندان به یک نگرانی مشترک جهانی تبدیل شده است [۱۴]. سازمان بهداشت جهانی (۱۹۹۴) اعلام کرده است: در همه جا عمر طولانی یکی از مواهب توسعه اجتماعی شناخته شده است؛ ولی به

های مربوط و مناسبی که برای کلمات یا اصطلاحات متن انگلیسی وجود دارد را ثبت نمایند تا در مراحل بعدی به آن‌ها مراجعه و در صورت لزوم جایگزین شوند. در نهایت در این مرحله دو ترجمه فارسی مستقل از پرسشنامه CASP-۱۹ به دست آمد. در مرحله دوم، دو ترجمه فارسی پرسشنامه و معادل‌های ثبت شده آن‌ها توسط مجریان و همکاران طرح و مترجمین مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت. این افراد پس از بررسی هر دو ترجمه و بحث در مورد تفاوت‌های موجود بین آن دو به رفع اختلاف‌های موجود بین دو ترجمه پرداخته و نهایتاً با در نظر گرفتن تمام گزینه‌ها برای معادل سازی کلمات یا اصطلاحات، یک نسخه فارسی واحد از پرسشنامه CASP-۱۹ تهیه گشت. در مرحله سوم، دو تن از افراد مسلط به هر دو زبان انگلیسی و فارسی (متفاوت از دو مترجم اولیه) که هیچ اطلاعی از نسخه انگلیسی پرسشنامه CASP-۱۹ و نیز تحقیق و مراحل آن ندارند نسخه فارسی واحد به دست آمده از مرحله قبل را به زبان انگلیسی ترجمه شد. در مرحله چهارم، دو ترجمه انگلیسی توسط مجریان طرح بررسی شده و نسخه واحد انگلیسی بدست آمده با نسخه اصلی انگلیسی پرسشنامه CASP-۱۹ مقایسه شد. در نهایت با انجام اصلاحات لازم و ویرایش توسط کارشناس زبان و ادبیات فارسی، نسخه نهایی فارسی پرسشنامه CASP-۱۹ مورد تأیید قرار گرفت. برای تعیین روایی صوری به صورت کیفی پرسشنامه در اختیار ۱۰ سالمند که شرایط ورود به مطالعه را داشتند گذاشته شد و از آن‌ها خواسته می‌شد در مورد مسائلی همچون خواناً بودن، واضح و شفاف بودن سبک نگارشی گویه‌ها، درک آسان، سخت و مشکل بودن گویه‌ها، کلمات گیج کننده، واضح بودن گویه‌ها، مناسب بودن نحوه طبقه‌بندی پاسخ‌ها، سهولت تکمیل پرسشنامه، دستور زبان و املاء کلمات، نظرات خود را اظهار کنند اخذ نظرات به صورت مصاحبه چهره به چهره و بر اساس راهنمای مصاحبه، با بیمار انجام گرفت.^[۳۹]

برای بررسی روایی محتوا از روایی محتوای کیفی استفاده شد. در این قسمت، پانل خبرگان متشکل از ۵ فرد صاحب نظر پیشنهادات خود را برای تطابق بیشتر پرسشنامه فارسی با جامعه هدف ایرانی ارایه نمودند. جامعه هدف پژوهش حاضر شامل زنان و مردان سالمند مقیم جامعه بود که در هنگام پژوهش عضو کانونهای جهاندیدگان باشگاه شهر وندان شهر تهران بودند. شهر تهران به ۴ منطقه شمال، جنوب، شرق و غرب تقسیم و از هر منطقه ۲ کانون جهاندیدگان باشگاه شهر وندان به صورت تصادفی ساده انتخاب شد.

به رغم تلاش‌های وافر محققین، گونه فارسی استاندارد شده این ابزار یافت نشد. با عنایت به اهمیت پرسشنامه مذکور در بررسی کیفیت زندگی سالمندان، پژوهشگران مطالعه‌ای را با هدف تعیین پایابی و روایی گونه فارسی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی سالمندان (CASP-۱۹) انجام دادند.

مواد و روش کار

پژوهش حاضر یک مطالعه روش شناسی است، هدف از پژوهش روش شناسی طراحی و ارزشیابی ابزارها و مقیاسها یا تکنیک‌های جمع‌آوری اطلاعات است که در این پژوهش ترجمه و روانسنجی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی سالمندان (CASP-۱۹) مدنظر است. پرسشنامه مذکور در سه مرحله پانل مشورتی، گروه‌های متمرکز و مطالعه مقدماتی (تعیین ساختار و مدت زمان تکمیل) طراحی شد. پرسشنامه شامل ۱۹ گویه و ۴ بعد کنترل (۴ عبارت)، استقلال (۵ عبارت)، خود شکوفایی (۵ عبارت) و لذت (۵ عبارت) است. ابزار مذکور به صورت لیکرت دارای چهارگزینه "غالب اوقات" تا "هرگز" می‌باشد. کمترین امتیاز مربوط به هر عبارت "صفر" و بیشترین امتیاز "سه" می‌باشد. شایان ذکر است که نمره گذاری ۶ عبارت پرسشنامه شامل آیتم‌های ۱، ۲، ۴، ۶، ۸ و ۹ عکس‌سایر عبارات می‌باشد. طراحان حداکثر نمره پرسشنامه را ۵۷ (رضایت کامل از هر چهار بعد) و صفر (فقدان کامل کیفیت زندگی) گزارش نموده اند.^[۳۱] پس از اخذ مجوز از طراح پرسشنامه فرآیند ترجمه ابزار براساس پروتکل سازمان جهانی بهداشت انجام گرفت.^[۳۸] به منظور دستیابی به نسخه فارسی، ۴ مرحله انجام شد. ابتدا دو تن از افراد مسلط به هر دو زبان انگلیسی و فارسی و آشنا به پژوهش به طور جداگانه و مستقل نسخه انگلیسی پرسشنامه را به فارسی ترجمه نمودند و تمام معادل‌های فارسی در مورد کلمات و جملات انگلیسی پرسشنامه ثبت شد. مترجمین به گونه‌ای انتخاب گردیدند که یکی از آن‌ها با علوم پزشکی و اصطلاحات آن و نیز مشخصات دوران سالمندی آشنایی داشت؛ در حالیکه نفر دیگر هیچ‌گونه آشنایی با علوم پزشکی و اصطلاحات وابسته نداشت. در این مرحله از مترجمین خواسته شد که در عین وفادار بودن به متن انگلیسی در هنگام ترجمه پرسشنامه CASP-۱۹ به زبان فارسی، از ترجمه تحت الفاظی خودداری نمایند، از هر کدام از مترجمین درخواست گردید تا علاوه بر تهیه یک ترجمه کامل از پرسشنامه CASP-۱۹، تمام معادل-

"موردی ندارد" دلالت بر شرایطی دارد که عبارت مورد نظر با شرایط زندگی سالم‌مند همخوانی و تناسب ندارد. امتیازهای اخذ شده در محدوده ۰-۱۰۰ هستند و امتیاز بالاتر نشان دهنده وجود میزان بیشتری از علائم غفلت مراقبتی است. ویژگی های روان سنجی ابزار مذکور مورد بررسی قرار گرفته است و از روایی و پایابی مناسب در خانواده های ایرانی بهره مند است [۴۲]. پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی شامل سن، جنس، وضعیت تاہل، وضعیت سکونت، میزان تحصیلات، وضعیت اقتصادی، وضعیت اشتغال، سابقه مصرف سیگار، سابقه بیماری جسمانی و تعداد دفعات بستری در بیمارستان در سال گذشته بود. به منظور تعیین روانهای شناخته شده استفاده شد. این روش برای آن که پرسشنامه به چه میزان توان جدا سازی گروه ها و زیر گروه های گوناگون را دارد به کار گرفته می شود؛ [۴۳]. در این پژوهش فرض بر این بود که نسخه فارسی پرسشنامه CASP-۱۹ قابلیت افتراق بین عدم یا وجود غفلت مراقبتی را دارد و سالم‌مندانی که از غفلت مراقبتی رنج می‌برند دارای نمره کمتر کیفیت زندگی هستند. به منظور بررسی روایی ملاکی، همبستگی نسخه فارسی پرسشنامه CASP-۱۹ و نمره SF-36 اندازه گیری گردید. پایابی ابزار با استفاده از روش تحلیل همسانی مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین همسانی درونی، ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و نیز برای هر بعد محاسبه گردید. به منظور بررسی ثبات نیز از روش آزمون- بازآزمون استفاده شد. بدین ترتیب که ۳۰ سالم‌مند پرسشنامه را در دو مرحله، با فاصله زمانی دو هفته تکمیل کردند. سپس نمرات کسب شده در این ۲ مرحله با استفاده از آزمون شاخص همبستگی درون خوشه ای (ICC) با هم مقایسه شد. SPSS ۱۸ تحلیل داده ها بعد از دوبار بازبینی با استفاده از نرم افزار آمار توصیفی، تعیین روایی همگرا با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، روایی افتراقی با انجام آماره تی تست، تعیین همسانی درونی با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای هر عامل و کل ابزار و تعیین آزمون- بازآزمون با استفاده از آزمون شاخص همبستگی درون خوشه ای (ICC) صورت پذیرفت.

يافته‌ها

۱۰۰ نفر از سالم‌مندان عضو کانونهای جهان‌دیدگان باشگاه شهر وندان شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه های پژوهش

نمونه گیری در هر یک از کانون های جهان‌دیدگان باشگاه شهر وندان نیز به صورت تصادفی انجام گرفت. ابتدا از معاونت پژوهشی دانشگاه مجوز اخذ گردید و سپس با کانون های جهان‌دیدگان و ۱۰۰ سالم‌مندی که شرایط ورود به طرح را داشتند هماهنگی انجام گرفت. معیارهای ورود به مطالعه برای سالم‌مندان عبارت بود از: سن ۶۰ سال یا بالاتر، تمایل به شرکت در پژوهش، سکونت در مناطق مختلف شهر تهران، توانایی تکلم به زبان فارسی، و عدم ابتلاء به ناشنوایی، بیماری تأیید شده روانی و اختلالات شناختی (کسب نمره ۶ یا بالاتر از نسخه فارسی آزمون کوتاه وضعیت Iranian version of the Abbreviated Mental Test Score) [۴۰]. برای این افراد هدف از اجرای طرح و نحوه انجام آن توضیح داده شد. پس از اطمینان محرمانه ماندن اطلاعات نزد پژوهشگر و جلب رضایت آنان، پرسشنامه ها تکمیل شد. برای گردآوری داده ها از نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی سالم‌مندان (CASP-۱۹)، نسخه فارسی پرسشنامه SF36 [۴۱]، مقیاس غفلت مراقبتی [۴۲] و پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک شرکت کنندگان در پژوهش استفاده شد. پرسشنامه فرم کوتاه ۳۶ (SF36) یک ابزار عمومی اندازه گیری وضعیت سلامت و کیفیت زندگی است که از آن می‌توان برای اندازه گیری وضعیت سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی گروه های جمعیتی سالم و بیمار استفاده کرد. نسخه فارسی پرسشنامه SF-36 جهت سنجش کیفیت زندگی از منظر سلامت دارای ۳۶ گویه در ۸ بعد سلامت است که عبارتند از: عملکرد جسمی، محدودیت در ایفای نقش به علت مشکلات جسمانی، درد جسمی، سلامت عمومی، نشاط، عملکرد اجتماعی، محدودیت در ایفای نقش به علت مشکلات عاطفی، سلامت روان. هر یک از ابعاد پرسشنامه مذکور متناسب با سوالات، گزینه های مختلفی را مورد اندازه گیری قرار می‌دهد که بر حسب نیاز آن سوال از دو گزینه (بله، خیر) الی شش گزینه در تمام اوقات، بیشتر اوقات، اغلب اوقات، گاهی اوقات، بعضی وقت ها، هیچ وقت را شامل می‌شود. امتیازهای هر مقیاس از صفر تا ۱۰۰ متغیر است که صفر بدترین و ۱۰۰ بهترین وضعیت را در مقیاس مورد نظر گزارش می‌کند. پایابی و روایی نسخه اصلی و همچنین نسخه فارسی پرسشنامه مذکور مورد تأیید قرار گرفته است [۴۱]. مقیاس غفلت مراقبتی از سالم‌مندان شامل ۱۱ عبارت که قسمتی از پرسشنامه بررسی سوءرفتار در خانواده نسبت به سالم‌مندان می‌باشد. ابزار مذکور دارای گزینه های "بلی"، "خیر" و "موردی ندارد" است. گزینه

ای (ICC) نشان می‌دهد. با توجه به مقادیر به دست آمده در جدول فوق، بین نمرات آزمون اول و دوم توافق معناداری (P<0.0001) وجود دارد که تأیید کننده تکرار پذیری زیر مقیاس‌ها و کل پرسشنامه بوده و نشان دهنده ثبات بالا در نسخه فارسی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی سالمدان (CASP-19) می‌باشد.

جدول ۱: مشخصات جمعیتی سالمدان مشارکت کننده در مطالعه

میانگین(انحراف معیار)	متوجه سن (سال)	تعداد دفعات بستره	جنسیت
۶۹/۶۶(۷/۳۲)			مرد
۲ (۱/۱۹)			زن
(n)			وضعیت تاهم
۴۶			متاهم
۵۴			همسر فوت شده
۷۲			چدا شده
۲۲			تحصیلات
۱			بی سواد
۱۵			خواندن و نوشتن
۱۱			ایتدایی(سیکل اول)
۳۸			دیبلم(سیکل دوم)
۴۶			دانشگاهی
۱۰			وضعیت اشتغال
۴۱			خانه دار
۹			کارآزاد
۳۹			بازنشسته
۱۱			از کارافتاده
۴			تعداد فرزندان
۴۱			بدون فرزند
۵۴			۱-۳
۱			۴-۶
۱۲			۷+بالاتر
۷۷			وضعیت زندگی سالمدان با خانواده
۱۰			تبه
۱			با همسر
۷			با فرزندان
۶۱			با دیگران
۲۳			کفایت منابع مالی
۹			اصلًا کافی نیست
۷۷			در حد کمی
۲۳			در حد متوسط
۸۹			کافی است
۱۱			وضعیت مصرف دارو
			صرف دارو
			عدم مصرف دارو
			وضعیت سکونت
			مالک
			مستأجر

در سال ۹۴-۱۳۹۳ تکمیل گردید. میانگین سنی مشارکت کننده‌گان (۶۹/۶۶(۷/۳۲) بود بیش از نیمی از آستان (۵۴ درصد) را زنان تشکیل می‌دادند، از میان مشارکت کننده‌گان اکثریت نمونه‌ها از نظر میزان تحصیلات دارای سیکل اول (۳۸ درصد)، خانه دار (۴۱ درصد)، متاهل (۷۲ درصد)، دارای ۴-۶ فرزند (۵۴ درصد) بودند. اکثریت آستان با همسرانشان زندگی می‌کردد (۷۷ درصد) و کفايت منابع مالی آستان در حد کم (۶۱ درصد) بود. اطلاعات بیشتر در خصوص مشخصات فردی شرکت کننده‌گان در پژوهش، در جدول ۱ آمده است. به منظور ارزیابی توان جداسازی زیرگروه‌های گوناگون توسط نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی سالمدان (CASP-19) از طریق پارامتر غفلت مراقبتی از سالمدان (وجود و عدم وجود غفلت) از آزمون تی مستقل استفاده شد (جدول ۲). نتایج بیانگر آن است از نظر آماری تفاوت معناداری در جهت مورد انتظار در ۳ بعد کنترل، استقلال و کامیابی وجود دارد. به بیان دیگر، سالمدانی که از سابقه غفلت برخوردار هستند امتیازهای پایین تری را در ۳ بعد کنترل، استقلال و کامیابی کسب نمودند. شایان ذکر است کسب امتیاز بالاتر از پرسشنامه مذکور نشان دهنده کیفیت زندگی بالاتر است.

جدول ۳ بیانگر روایی همگرا است. در این مرحله همگرایی ۸ بعد پرسشنامه SF-۳۶ شامل عملکرد جسمی، محدودیت در ایفای نقش به علت مشکلات جسمی، درجه جسمی، سلامت عمومی، نشاط، عملکرد اجتماعی، محدودیت در ایفای نقش به علت مشکلات عاطفی و سلامت روان با ۴ بعد کنترل، استقلال، خودیابی و کامیابی نسخه فارسی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی سالمدان (CASP-19) سنجیده شد. جهت بررسی روایی همگرا، ضرایب همبستگی و سطح معناداری نمره ابعاد بین نسخه فارسی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی سالمدان (CASP-19) و نمره ابعاد پرسشنامه SF-۳۶ محاسبه گردید. بین اکثریت ابعاد ۲ پرسشنامه همبستگی مشاهده شد ($P < 0.05$).

جدول ۴ نشان دهنده همسانی درونی و ثبات است. ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد و کل پرسشنامه، در نمونه‌ای شامل ۱۰۰ سالمدان محاسبه گردید که ضریب آلفای کرونباخ بین ۰/۷۰ تا ۰/۸۸ بود. در مرحله بعد تعیین ثبات با استفاده از شاخص همبستگی درون خوشه‌ای (ICC) در نمونه‌ای شامل ۳۰ نفر از سالمدان تعیین گردید. جدول ۴، ثبات (آزمون مجدد) نمره ابعاد و کل نسخه فارسی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی سالمدان (CASP-19) را با استفاده از شاخص همبستگی درون خوشه

جدول ۲: مقایسه گروه های شناخته شده: میانگین امتیاز ابعاد پرسشنامه CASP-۱۹ برمبنای وجود یا عدم غفلت مراقبتی

احتمال معنی داری	وجود غفلت مراقبتی (n=۱۶)	عدم غفلت مراقبتی (n=۸۴)	ابعاد n=۱۰۰
	میانگین(انحراف معیار)	میانگین(انحراف معیار)	
۰/۰۰۰۱	۳/۶۴ (۱/۰۹)	۴/۸۰ (۱/۰۹)	کنترل
۰/۰۰۴	۶/۲۸ (۱/۱۷)	۷/۲۶ (۱/۲۲)	استقلال
۰/۷۹	۸/۲۶ (۴/۶۲)	۷/۹۲ (۴/۶۴)	خودبایی
۰/۰۲۷	۸/۹۳ (۳/۲۰)	۱۱/۱۹ (۳/۶۳)	کامیابی
۰/۸۹	۲۹/۰۴ (۵/۶۴)	۲۹/۲۶ (۵/۸۶)	نمره کل

جدول ۳: ضرایب همبستگی نمره ابعاد بین نسخه فارسی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی سالمدنان (CASP-۱۹) و نمره ابعاد پرسشنامه SF-۳۶

نمره کل CASP-۱۹	بعد کامیابی	بعد خودبایی	بعد استقلال	بعد کنترل	کیفیت زندگی n=۱۰۰
۰/۴۱**	۰/۵۱۰**	۰/۱۲۲	-۰/۱۹۲*	-۰/۲۸۱**	عملکرد جسمی
۰/۲۰۸**	۰/۵۱۵**	۰/۱۴۳	-۰/۱۵۳	-۰/۱۴۸*	محددیت در اینقای نقش(مشکلات جسمی)
۰/۱۵۸*	۰/۶۶۰**	۰/۰۹۷	-۰/۰۰۸	-۰/۲۵۳**	درد جسمی
۰/۴۸۸**	۰/۵۳۶**	۰/۵۰۸**	-۰/۴۸۶**	-۰/۵۴۹**	سلامت عمومی
۰/۷۲۲**	۰/۵۴۰**	۰/۳۳۸**	-۰/۴۷۵**	-۰/۸۱۳**	نشاط
۰/۱۹۵**	۰/۴۴۷**	۰/۱۱۹*	-۰/۱۵۴	-۰/۳۹۶**	عملکرد اجتماعی
۰/۷۲۳**	۰/۱۵۴	۰/۱۹۶	-۰/۲۵۸**	-۰/۲۷۲**	محددیت در اینقای نقش (مشکلات عاطفی)
۰/۲۸۵**	۰/۴۵۷**	۰/۱۹۳	-۰/۲۷۸**	-۰/۵۰۴**	سلامت روان

** معنادار در سطح <0/۰۱ P

* معنادار در سطح <0/۰۵ P

جدول ۴: تعیین همسانی درونی و ثبات پرسشنامه: آلفای کرونباخ و شاخص همبستگی درون خوش ای (ICC) نسخه فارسی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی سالمدنان (CASP-۱۹)

احتمال معنی داری	CI=۰/۹۵ حد بالایی حد پایینی	ICC (n=۳۰)	آلفای کرونباخ (n=۱۰۰)	میانگین(انحراف معیار)
۰/۰۰۰۱	۰/۹۳	۰/۷۷	۰/۸۸	۰/۷۰ ۳/۴۳ (۱/۰/۸)
۰/۰۰۰۱	۰/۹۴	۰/۷۸	۰/۸۷	۶/۲ (۱/۲۴)
۰/۰۰۰۱	۰/۹۸	۰/۹۵	۰/۹۶	۸/۳۲ (۳/۶۱)
۰/۰۰۱	۰/۹۸	۰/۹۳	۰/۹۶	۱۲/۵۲ (۳/۴۵)
۰/۰۰۰۱	۰/۹۷	۰/۹۰	۰/۹۴	۳۰/۴۸ (۵/۲۵)
				نمره کل

پرسشنامه مذکور به سادگی امکان پذیر بوده و می تواند توسط کارکنان حرف پزشکی جهت شخص سالمدن در مراکز بهداشتی درمانی طی حدود ۱۰-۱۵ دقیقه تکمیل گردد، در مطالعه حاضر ترجمه پرسشنامه با دقت توسط افراد مسلط و آگاه و با پیروی از اصول ترجمه و توجه به فرایند صحیح آن و دقت در تطابق فرهنگی معانی انجام شده است و از نقاط قوت آن رعایت گام های اصلی مورد تایید طبق منابع معتبر برای فرایند ترجمه و روانسنجی ابزارها می باشد [۱۶]. در این پژوهش جهت اعتباریابی این پرسشنامه، روایی صوری(کیفی)، روایی محتوا(کیفی)، روایی افتراقی(مقایسه گروه های شناخته شده)، همسانی درونی(ضریب

بحث و نتیجه گیری

مطالعات زیادی در زمینه بررسی و ارتقا کیفیت زندگی سالمدنان انجام شده است. لازمه انجام صحیح این مطالعات در اختیار داشتن ابزارها یا مقیاس های معتبر و پایا شامل پرسشنامه های استاندارد می باشد. لذا طراحی، تدوین و روان سنجی یک پرسشنامه برای همه پژوهشگران از جمله محققین رشته پرستاری جهت بررسی کیفیت زندگی سالمدنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس در این پژوهش، پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی سالمدنان (CASP-۱۹) با ۱۹ عبارت در چهار بعد به زبان فارسی ترجمه و سپس ویژگی های روانسنجی آن تعیین گشت. کاربرد

[۳۳]. لکن در مطالعه کیم و همکاران میزان الفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه CASP-۱۹ بین ۰/۴۷ تا ۰/۷۸ بود [۴۵]. پایابی نسخه فارسی پرسشنامه با شیوه آزمون مجدد نیز مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده از دو بار اجرای آزمون به فاصله دو هفته، ثبات بالای پرسشنامه مذکور را نشان می‌دهد. شواهد بیانگر آن است که از این روش برای تعیین ثبات ابزارهای کیفیت زندگی استفاده شده است. این شیوه در مطالعات لسک و همکاران، سکی و همکاران و پترسون و همکاران بکار گرفته شد [۴۶-۴۸]. بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی سالماندان (CASP-۱۹) در حدقابل قبولی است. این ابزار می‌تواند جهت اندازه‌گیری پیامد سلامت در بخش‌های پژوهشی، بهداشتی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد. کاربرد پرسشنامه مذکور به سادگی امکان‌پذیر بوده و می‌تواند توسط سالماندان یا ارائه دهنده خدمات بهداشتی از جمله پرستاران، در عرصه‌های مختلف نظری‌جامعه، مراکز بهداشتی و بیمارستان، در مدت کمتر از ۱۵ دقیقه تکمیل گردد. نمره گذاری (امتیازبندی) ساده و پایابی و روایی مناسب قابلیت بکارگیری آن را بالا می‌برد. ذکر این نکته لازم است که برخی از محدودیت‌های پژوهش حاضر، تعمیم پذیری نتایج را با محدودیت مواجه می‌کند. انجام این مطالعه با حجم نمونه بالاتر و انجام تحلیل عاملی می‌تواند در ارتقاء پرسشنامه مذکور موثر باشد. به رغم نیاز به مطالعات بیشتر، امیداست که ابزار اختصاصی سنجش کیفیت زندگی سالماندان (CASP-۱۹) بتواند برای پژوهشگران مفید واقع شود.

سهم نویسندها

مجیده هروی کریمی: طراحی طرح پژوهشی، مدیریت مشترک طرح پژوهشی، ترجمه و نهایی کردن پرسشنامه، تحلیل داده‌ها، تهیه و تدوین مقاله ناهید رژه: مدیریت مشترک طرح پژوهشی، ترجمه و نهایی کردن پرسشنامه احیا گرشاسبی: مدیریت مشترک طرح پژوهشی، ترجمه و نهایی کردن پرسشنامه مریم نیکخواه: ترجمه و نهایی کردن پرسشنامه، جمع آوری داده‌های منتظری: مدیریت مشترک طرح پژوهشی، ترجمه و نهایی کردن پرسشنامه، تحلیل داده‌ها، مشارکت در تهیه مقاله

آلفای کرونباخ) و ثبات انجام گرفت. در مرحله تعیین روایی صوری، روایی به شکل کیفی انجام شد که مورد تأیید سالماندان بود. سپس با متخصصان مصاحبه شد و از روایی محظوظ کیفی و تطابق فرهنگی اطمینان حاصل شد. در این پژوهش، برای بررسی روایی افتراقی پرسشنامه از مقایسه گروه‌های شناخته شده جهت پارامتر غفلت مراقبتی از سالماندان (یکی از اشکال سوئرفتار) استفاده گردید. نتایج تحلیل مقایسه گروه‌های شناخته شده در این پارامتر روایی مستدلی را در ۳ بعد پرسشنامه (کنترل، استقلال و کامیابی) نشان داد. هنگامی که غفلت مراقبتی از سالماندان به عنوان تنها عامل تعیین وجود شواهد بهبود کیفیت زندگی بکار برد شد، تفاوت‌های آماری معنا داری بین گروه‌ها مشاهده شد. به بیان دیگر، سالماندانی که از غفلت مراقبتی برخوردار هستند امتیاز پایین تری را از نسخه فارسی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی سالماندان (CASP-۱۹) در ۳ بعد کنترل، استقلال و کامیابی کسب نمودند. یافته‌های پژوهش هروی و همکاران نشان داد که گروه سالماندان بدون تجربه سوئرفتار، نسبت به سالماندان با تجربه در بعد غفلت مراقبتی به طور معنی‌دار از کیفیت زندگی بهتری برخوردار بودند و در گروه سالماندان آزار دیده، سالماندان با تجربه غفلت در مقایسه با سالماندان بدون تجربه غفلت، به طور معنی‌داری نمره بهتری کسب نمودند [۸]. مطالعه جایاورانا ولايو (۲۰۰۶) نشان داد که وجود سوئرفتار، میزان کیفیت زندگی سالماندان را کاهش می‌دهد [۴۴]. جهت بررسی روایی همگرا، ضرایب همبستگی و سطح معناداری نمره ابعاد بین نسخه فارسی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی سالماندان (CASP-۱۹) و نمره ابعاد پرسشنامه SF-۳۶ محاسبه گردید. بین اکثربیت ابعاد ۲ پرسشنامه و نمره کل پرسشنامه CASP-۱۹ با نمره ابعاد پرسشنامه SF-۳۶ همبستگی قوی مشاهده شد. سیم و همکاران و کیم و همکاران جهت تعیین روایی همگرا به ترتیب از پرسشنامه های SF-۱۰، SF-۱۲، SF-۱۱ استفاده نمودند و نشان دادند که بین پرسشنامه CASP-۱۹ و غالب ابعاد پرسشنامه‌های مذکور همبستگی قوی وجود داشت [۱۷، ۴۵]. در این پژوهش، ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه ترجمه شده، نشان دهنده همسانی درونی خوب عبارات ابزار می‌باشد که پایابی نسخه فارسی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی سالماندان را تأیید می‌نماید. لیما و همکاران برای تعیین پایابی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی سالماندان نیز از روش همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ در سطح خوب استفاده نمودند

پژوهشی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های سالمندی دانشگاه شاهد و سالمندان شرکت کننده در این پژوهش اعلام می‌دارند.

تشکر و قدردانی

پژوهشگران به این وسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از تمامی افرادی که در انجام پژوهش مساعدت نموده اند به ویژه معاونت

منابع

- 1.Kinsella K, Phillips DR. Global Aging: The Challenge of Success. Population Bulletin, Population Reference Bureau 2005; 60: 1-5
- 2.Lunenfeld B. The ageing male: demographics and challenges. World Journal of Urology 2002; 20:11-16
- 3.Marais S, Conradie G, Kritzinger A. Risk factors for elder abuse and neglect: brief descriptions of different scenarios in South Africa. International Journal of Older People Nursing 2006; 1: 186–189
4. Motlagh MA, Yazdani Sh, Taheri Tanjani p, Elderly health measures in the Islamic Republic of Iran. 1st Edition, : Fozhan Graphic: Tehran, 2015
- 5.Sheykhi MT. Social Security and the Elderly People's Pathology in Tehran: a Sociological Study. Iranian Journal of Ageing 2008; 2:454-61
- 6.Training manual and comprehensive care, integration of the elderly. Report of the Ageing Department of Ministry of Health and Medical Education (Online) Available:http://hd.lums.ac.ir/parameters/lums/modules/cdk/upload/content/portal_content/File/behdashti/MatalebAmoozeshi/Rahnama%20salmandi%20gheir%20pezeshk.pdf
- 7.Breslow L. Health measurement in the third era of health. American Journal of Public Health 2006; 96:17-19
- 8.Heravi-Karimooi M, Rejeh N, Montazeri A. Health-related quality of life among abused and non-abused elderly people: a comparative study; Payesh 2013; 12: 479-488[Persian]
9. Darvishpoor Kakhki A, Abed Saeedi J, Delavar A, Saeed- O-Zakerin M. Tools for measurement of health status and quality of life of elderly people. Research in Medicine 2010; 33: 162-73
- 10.Hadi N, Rahmani Z, Montazeri A. Health-related quality of life in chronic renal failure patients Receiving Hemodialysis. Payesh 2010; 9:349-54
- 11.Isikhan V, Guner P, Komurcu S, Ozet A, Arpacı F, Ozturk B. The relationship between disease features and quality of life in patients with cancer-I. Cancer Nursing 2001; 24: 490-5
- 12.Fassino S, Leombruni P, Abbate Daga G, Brustolin A, Rovera GG, Fabris F. Quality of life in dependent older adults living at home. Archives of Gerontology and Geriatrics 2002; 35: 9-20
- 13.Vahdaninia M Goshtasbi A Montazeri A, Maftoun F. Health related quality of life in an elderly population in Iran: a population based study Payesh 2005; 4:113- 120
- 14.Neamati Dehkordy S, Dasht Bozorgy B, Pakseresht S, Rasekh A. The effect of reminiscence therapy on elderly quality of life. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 2008; 9:75-82
- 15.Sajadi H. and Biglarian A. Quality of life among elderly women in Kahrizak Charity Foundation, Tehran, Iran. Payesh Health Monitor. J of the Iranian Institute for Health Sciences Research 2007; 6: 105-108
- 16.Afrasibai Far A, Yaghmaie F, Abdoli S, Abed Saeedi Zh. Research Tool Translation and Cross-Cultural Adaptation. Journal of Nursing & Midwifery Faculty, Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2006.54:5 8-67
- 17.Sim J, Bartlam B, Bernard M. The CASP- 19 as a measure of quality of life in old age: Evaluation of its use in a retirement community. Quality of Life Research 2011; 20, 997–1004
- 18.Higgs P, Hyde M, Wiggins R, Blane D. Researching quality of life in early old age: The importance of the sociological dimension. Social policy and administration 2003; 37, 239–252
19. Ware Jr JE, Sherbourne CD. The MOS 36-Item Short – Form Health Survey (SF-36) I: conceptual framework and item selection. Medical Care 1992; 30: 473-83
- 20.Ware J Jr, Kosinski M, Keller SD. A 12-Item Short-Form Health Survey: construction of scales and preliminary tests of reliability and validity. Medical Care 1996; 34:220-33
- 21.Hunt SM, McEwen J, McKenna SP. Measuring health status: a new tool for clinicians and epidemiologists. The Journal of the Royal College of General Practitioners 1985; 35: 185-88

- 22.** Bergner M, Bobbitt RA, Carter WB. The Sickness Impact Profile: development and final revision of a health status measure. *Medical Care* 1981; 19: 787-805
- 23.** Bowling A, Windsor J. Discriminative power of the health status questionnaire 12 in relation to age, sex, and longstanding illness: findings from a survey of households in Great Britain. *Journal of Epidemiology and Community Health* 1997; 51: 564-73
- 24.** Naumann VJ, Byrne GJ. WHOQOL-BREF as a measure of quality of life in older patients with depression. *International Psychogeriatrics* 2004; 16: 159-73
- 25.** Huang IC, Wu AW, Frangakis C. Do the SF-36 and WHOQOL-BREF measure the same constructs? Evidence from the Taiwan population. *Quality of Life Research* 2006; 15: 15-24
- 26.** Guyatt GH, Eagle DJ, Sackett B, Willan A, Griffith L, McIlroy W, Patterson CJ, Turpie I. Measuring quality of life in the frail elderly. *Journal of Clinical Epidemiology* 1993; 46: 1433-1444
- 27.** Rai GS, Kellanda P, Rai SG, Wientjes HJ. Quality of life cards - a novel way to measure quality of life in the elderly. *Archives of Gerontology and Geriatrics* 1995; 21:285-9
- 28.** Irvine D, O'Brien-Pallas LL, Murray M, Cockerill R, Sidani S, Laurie-Shaw B, Lochhaas-Gerlach J. The reliability and validity of two health status measures for evaluating outcomes of home-care nursing. *Research in Nursing and Health* 2000; 23: 43-54
- 29.** De Leo D, Diekstra RF, Lonnqvist J, Trabucchi M, Cleiren MH, Frisoni GB, and et als. LEIPAD, an internationally applicable instrument to assess quality of life in the elderly. *Journal of Behavioral Medicine* 1998; 24:17-27
- 30.** Bowling A, Hankins M, Windle G, Bilotta C, Grant R. A short measure of quality of life in older age: The performance of the brief Older People's Quality of Life questionnaire (OPQOL-brief). *Archives of gerontology and geriatrics* 2013; 56: 181-7
- 31.** Hyde M, Wiggins RD, Higgs P, Blane DB. A measure of quality of life in early old age: the theory, development and properties of a needssatisfaction model (CASP- 19). *Aging and Mental Health* 2003; 7:186-94
- 32.** Wiggins, R., Netuveli, G., Hyde, M., Higgs, P., & Blane, D. The evaluation of a self enumerated scale of quality of life (CASP- 19) in the context of research on ageing: A combination of exploratory and confirmatory approaches. *Social Indicators Research* 2008; 89, 61-77
- 33.** Lima FM, Hyde M, Chungkham HS, Correia C, Siqueira Campos A, Campos M, and et als. Quality of Life amongst Older Brazilians: a Cross-Cultural Validation of the CASP-19 into Brazilian-Portuguese. *PLoS One* 2014; 9: 94-289
- 34.** Wu TY, Chie WC, Kuo KL, Wong WK, Liu JP, Chiu ST, Cheng YH, Netuveli G, Blane D. Quality of life (QOL) among community dwelling older people in Taiwan measured by the CASP- 19, an index to capture QOL in old age. *Archives of Gerontology and Geriatrics* 2013; 57:143-50
- 35.** Sexton E, King-Kallimanis BL, Conroy RM, Hickey A. Psychometric evaluation of the CASP-19 quality of life scale in an older Irish cohort. *Quality of Life Research* 2013; 22: 2549-59
- 36.** Knesebeck OVD, Wahrendorf M, Hyde M, Siegrist J: Socio-economic position and quality of life among older people in 10 European countries: results of the SHARE study. *Ageing and Society* 2007; 27: 269–284
- 37.** Knesebeck OVD, Wahrendorf M, Hyde M, Siegrist J: Socio-economic position and quality of life among older people in 10 European countries: results of the SHARE study. *Ageing and Society* 2007; 27: 269–284
- 38.** World Health Organization. Process of translation and adaptation of instruments. Available from: [http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/translation/en/\[25/12/2012\].](http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/translation/en/[25/12/2012].)
- 39.** Taheri Kharame Z, Heravi-Karimooi M, Rejeh N, Hajizadeh E, Montazeri A. Translation and validation study of the Iranian version of Seattle Angina Questionnaire. *Payesh* 2013; 12: 79-87 [Persian]
- 40.** Heravi-Karimooi M, Anoosheh M, Foroughan M, Sheykh MT, Hajizadeh E. Understanding loneliness in the lived experiences of Iranian elders. *Scandinavian Journal of Caring Sciences* 2010; 24: 274–280
- 41.** Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, et al. The short form health survey [SF-36]: translation and validation study of the Iranian version. *Quality of Life Research* 2005; 14: 875-882
- 42.** Heravi-Karimooi M. Designing and determining psychometric properties of the Domestic Elder Abuse Questionnaire. PhD Dissertation. Tarbiat Modares University, 2009
- 43.** Rubio DM, Berg-Weger M, Tebb SS, Lee ES, Rauch S. Objectifying content validity: conducting a content validity study in social work research. *Research on Social Work Practice* 2003; 27: 94-104

- 44.**Jayawardena KM, Liao S. Elder abuse at end of life. Journal of Palliative Medicine 2006; 9:127-36
- 45.**Kim GR, Netuveli G, Blane D , Peasey A, Malyutina S, Simonova G, and et al. Psychometric properties and confirmatory factor analysis of the CASP-19, a measure of quality of life in early old age: the HAPIEE study. Aging and Mental Health 2015; 19: 595–609
- 46.**Leske DA, Hatt SR, Holmes JM, Test-retest reliability of health-related quality-of-life questionnaires in adults with strabismus. American Journal of Ophthalmology 2010; 149: 672-6
- 47.**Seki S, Kato N, Ito N, Kinugawa K, Ono M, Motomura N, Yao N, Watanabe M. Validity and reliability of seattle angina questionnaire Japanese version in patients with coronary artery disease Asian. Nursing Research 2010; 4: 57-63 20
- 48.**Pettersen KI, Reikvam A, Stavem K. Reliability and validity of the Norwegian translation of the seattle angina questionnaire following myocardial infarction. Quality of Life Research 2005; 14:883-9

ABSTRACT

A validation study of the Persian version of Older People's Quality of Life Questionnaire (CASP- 19)

Majideh Heravi-Karimooi ^{1*}, Nahid Rejeh¹, Ehya Garshasbi ², Maryam Nikkhah ³, Ali Montazeri⁴

1. Elderly Care Research Centre - Shahed University, College of Nursing & Midwifery, Tehran, Iran

2. Elderly Care Research Centre - Shahed University, College of Medical, Tehran, Iran

3. Faculty of Nursing and Midwifery, Shahed University, Tehran, Iran

4. Health Metrics Research Centre, Iranian Institute for Health Sciences Research, ACECR, Tehran, Iran

Payesh 2016; 4: 422-431

Accepted for publication: 27 July 2015

[EPub a head of print-5 June 2016]

Objective (s): This study aimed to translate and validate a Persian version of the CASP-19, in Iran.

Methods: The existing CASP-19 (English version) was translated into Persian version according to the World Health Organization protocol for translation and adaptation of instruments. The operational measure (CASP-19) consists of 19 Likert-scaled items that cover four theoretical domains: control, autonomy, self-realization and pleasure. Data were collected from 100 older people. Reliability (internal consistency, test- retest reliability) face validity, content validity, known groups comparisons and criterion validity of the CASP-19 and the SF-36, were examined.

Results: The mean age of the participants was 69.6 (standard deviation \pm 7.32) years, and more than half (54%) were female. We observed satisfactory internal consistency (Cronbach's α 0.70–0.88) for the subscales. Test-retest reliability (ICC) of the questionnaire with two weeks interval was 0.96($p < 0.001$). The result of known- groups comparisons showed that the questionnaire discriminated subgroups of elderly people who differed in neglect. Criterion validity was assessed by comparing SF-36 and CASP-19 (Persian version). Relationship between translated scale and the SF-36 subscales showed significant correlation in most dimensions.

Conclusion: The findings suggest that the CASP-10 is a valid measure for assessing quality of life in elderly populations in different settings.

Key Words: Validation, Persian version, CASP-19, Quality of Life

* Corresponding author: Faculty of Nursing and Midwifery, Shahed University
Tel: 66418580
E-mail: Heravi@shahed.ac.ir