

تأثیر ۳ ماه پیاده‌روی منظم بر برخی شاخص‌های گلیسمیک و فشار خون زنان دیابتی نوع ۲

زهرا بیات^{۱*}، عباسعلی گائینی^۲، علیرضا قلی پور^۳

۱. پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

۲. دانشگاه تهران، تهران، ایران

۳. دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

نشریه پاییش

سال هفدهم، شماره دوم، فروردین - اردیبهشت ۱۳۹۷ صص ۱۵۹-۱۶۷

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

[نشر الکترونیک پیش از انتشار- ۹۶ اسفند]

چکیده

مقدمه: برای کمک به کنترل قند خون و کاهش عوامل خطر قلبی-عروقی در بیماران دیابتی نوع ۲، انجام فعالیت‌های ورزشی توصیه می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ۳ ماه پیاده‌روی منظم بر برخی شاخص‌های گلیسمیک و فشارخون زنان دیابتی نوع ۲ بود. مواد و روش کار: ۱۰۰ زن دیابتی نوع ۲ تصادفی به ۲ گروه پیاده‌روی منظم و گروه کنترل تقسیم شدند. گروه اول به مدت ۳ ماه پیاده‌روی را هر روز به مدت ۳۰ دقیقه انجام دادند. گروه کنترل در طی پژوهش فعالیت بدنی منظم نداشتند. هموگلوبین گلیکوزیله، گلوکزخون ناشتا و فشارخون در ۲ گروه سنجیده شد. از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف استاندارد داده‌ها استفاده شد و برای بررسی تغییرات درون گروهی از آزمون t وابسته و برای مقایسه بین گروهی از روش تحلیلی کوواریانس استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 ارزیابی شده و برای آزمون ها سطح معناداری ($p < 0.05$) در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: در پیش آزمون هیچ تفاوتی در ویژگی‌های توصیفی آزمودنی‌ها وجود نداشت. در گروه پیاده‌روی منظم، عوامل هموگلوبین گلیکوزیله، گلوکزخون ناشتا، فشارخون سیستولی و دیاستولی تغییرات معنادار در پس آزمون داشتند و در گروه کنترل افزایش معنادار در گلوکزخون ناشتا و فشارخون سیستولی مشاهده شد ($p < 0.05$). مقایسه بین دو گروه نشان داد تغییرات هموگلوبین گلیکوزیله ($p = 0.000$ ، $p = 0.0001$)، فشارخون سیستولی و دیاستولی ($p = 0.000$) بین دو گروه معنادار بود.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می‌توان گفت پیاده‌روی منظم می‌تواند تأثیر مثبتی بر شاخص‌های گلیسمی بیماران دیابتی نوع ۲ داشته باشد و در صورت داشتن زندگی کم تحرک و بدون فعالیت بدنی منظم، بیماری افراد دیابتی نوع ۲ حتی با مصرف قرص بهتر نخواهد شد.

کلیدواژه: هموگلوبین گلیکوزیله، گلوکز خون ناشتا، دیابت نوع ۲، پیاده‌روی منظم

* نویسنده پاسخگو: هرمزگان، جزیره کیش، بلوار نیایش، دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی کیش

تلفن: ۰۷۶۴۴۴۳۲۹۳۴

E-mail: z.bayat@ut.ac.ir

مقدمه

زندگی است [۸]. سال هاست که تمرین بدنی به همراه رژیم غذایی و درمان دارویی به عنوان درمان دیابت نوع ۲ شناخته شده است [۹]. فعالیت بدنی برای بیماران دیابتی نوع ۲ فواید بسیاری به همراه دارد؛ از جمله می توان به کاهش قند خون، کاهش چربی های مضر خون، پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی و کاهش وزن بدن آنها اشاره کرد [۱۰]. فشار خون بالا، که به عنوان یک فشار خون پایدار ۱۴۰/۹۰ میلی متر گیگو یا تعریف شده است، همبستگی زیادی با دیابت نوع ۱ و نوع ۲ دارد. فشار خون بالا عامل اصلی خطر برای هر دوی بیماری قلبی عروقی آترواسکلروز و عوارض جانبی میکرواسکولار است. در دیابت نوع ۱، پرفشاری خون بالا ناشی از بیماری کلیوی دیابتی است، در حالی که در دیابت نوع ۲، معمولاً با سایر عوامل خطر بیماری قلبی ارتباط دارد [۱۱]. درمان اولیه فشار خون بالا شامل اصلاح رژیم غذایی و افزایش تمرین، با هدف کنترل وزن است. اگر فشار خون هدف، در طی ۶-۳ ماه از شروع مداخله شیوه زندگی بهبود پیدا نکند، باید درمان دارویی در نظر گرفته شود [۱۲]. تمرین مقاومتی و هوایی -هر دو-، قند خون، چربی خون، فشار خون را کنترل می کند و حتی باعث بهتر شدن شاخص هایی می شوند که می تواند بیماری دیابت نوع ۲ را مدیریت کند و از عوارض بی شمار بیماری بکاهد [۸]. به تازگی، انجمن دیابت آمریکا در سال ۲۰۱۷ به بیماران دیابتی نوع ۲ پیشنهاد کرده است فعالیت ورزشی باید ۱۵۰ دقیقه در هفته باشد متوجه مانند پیاده روی انجام شود [۷]. در پژوهش هراتیان و افخمی اردکانی در سال ۱۳۸۱ معلوم شده است در بیماران دیابتی، محدودیت مشخص حرکتی مفصل وجود دارد [۱۳]؛ که پیشنهاد شده است از ورزش هایی که فشار کمتری بر مفاصل وارد می کند اما تقریباً همه مفاصل در آن فعالیت شرکت دارند، استفاده شود [۱۴]. شمسی و همکارانش طی سال ۱۳۸۸ با بررسی تأثیر آموزش پیاده روی در ۸۰ زن مبتلا به دیابت نوع ۲، به این نتیجه رسیدند که قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله در گروهی که پیاده روی به مدت سه ماه انجام داده اند در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنادار داشته است [۱۵]. کاشفی و همکارانش در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ مرد و زن دیابتی نوع ۲ را به دو گروه تقسیم کردند. در گروه تمرینی به مدت سه ماه هر هفته سه بار و هر جلسه ۲۰ دقیقه پیاده روی داشتند و همراه با پیاده روی رژیم غذایی نیز دریافت کردند. بعد از مداخلات، گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنادار در گلوكز خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله داشته است [۱۶].

بیماری دیابت نوعی بیماری متابولیکی است که با افزایش قند خون ناشی از نارسایی ترشح انسولین یا نارسایی عمل انسولین یا هر دو همراه است [۱]. بیماری دیابت عوارض زیادی دارد که آسیب، نقص عملکرد و نارسایی اندام های متفاوت به ویژه چشم ها، کلیه ها، اعصاب، قلب و رگ های خونی از شمار آنها است [۱]. شیوع دیابت نوع ۲، در سرتاسر جهان رو به افزایش است [۲]. برآورد شده است در سال ۲۰۱۳ حدود ۳۸۲ میلیون نفر یا حدود ۸/۲٪ بزرگسالان در سراسر جهان دیابت خواهند داشت، این تعداد ممکن است تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۵۹۲ میلیون نفر، یا نسبت ۱ به ۱۰ بزرگسالان مبتلا به دیابت برسد. حدود ۸۵ تا ۹۵٪ کل بیماران دیابتی، دیابت نوع ۲ دارند. فدراسیون جهانی دیابت تخمین زده است حدود ۱۷۵ میلیون نفر یا تقریباً نیمی از افراد مبتلا به دیابت، از بیماری خود آگاه نیستند. بیشتر این افراد بیماری دیابت نوع ۲ دارند [۳]. در جدیدترین پژوهش مرووری که توسط سورینگ و همکارانش [۲۰۱۵] انجام شده است هزینه های بیماری دیابت نوع ۲ به دو بخش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شد. حداقل هزینه های مستقیم حدود ۲۴۲ دلار در کشور مکزیک و بیشترین حدود ۱۱۹۷۲ دلار در ایالات متحده آمریکا بوده است؛ در حالی که حداقل هزینه های غیر مستقیم ۴۵ دلار در پاکستان و حداکثر ۱۶۹۱۴ دلار در کشور باهاما بوده است [۴]. صادقی مزیدی و همکارانش هزینه های درمانی بیماران دیابتی نوع ۲ شهر شیراز را در سال ۱۳۸۷ بررسی کردند. در این پژوهش کل هزینه های اقتصادی ناشی از بیماری دیابت نوع ۲، ۳۷/۹۴۲/۳۱۵/۰۴۰ ریال به دست آمد. هزینه های مستقیم پزشکی و هزینه های غیر مستقیم ناشی از بیماری دیابت در یک بیماری نوع ۲ در نیمه اول سال ۱۳۸۷، به ترتیب ۸۱۵۱۷۳/۲ ریال و ۶۹۲۸۱۵۶/۴ ریال و در مجموع ۷۷۴۳۳۲۹/۶ ریال بوده است [۵]. با توجه به عوارض بی شماری که گریبان بیماران دیابتی نوع ۲ را می گیرد و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم فراوان این بیماری و عوارض بی شماری که نظر می رسد شناخت عوامل ابتلا به بیماری دیابت و درمان این بیماری از اولویت های هر جامعه ای باشد. عوامل ژنتیکی و سبک زندگی بر ابتلا به بیماری دیابت مؤثرند [۶]. عوامل سبک زندگی به عنوان شاخص های مهم ابتلا به بیماری دیابت نوع ۲ شناخته شده اند. این شاخص های عبارتند از: عدم فعالیت بدنی، سبک زندگی بی تحرک، مصرف سیگار و مصرف زیاد الکل [۷]. درمان اساسی بیماری دیابت توجه به شیوه

های عصبی و مشکلات دیسک کمر نبودند و سابقه سکته مغزی نداشتند. در یک جلسه توجیهی نحوه صحیح پیاده روی و میزان شدت پیاده روی برای بیماران توضیح داده شد. رضایت نامه شرکت در پژوهش از آزمودنی‌ها گرفته شد. گروه کنترل در مدت انجام پژوهش هیچ‌گونه فعالیت بدنی مانند پیاده روی منظم نداشتند. هموگلوبین گلیکوزیله، گلوکز خون ناشتا، فشارخون سیستولی و دیاستولی پیش و پس از مداخله در ۲ گروه سنجیده شد. آزمودنی‌ها ۱ روز پیش و ۱ روز پس از مداخله برای انجام نمونه‌گیری خونی به آزمایشگاه معرفی شدند. فرد در وضعیت نشسته، پاها روی زمین قرار داشته، و دست در سطح قلب نگهداشته شد، بعد از ۱۰ دقیقه استراحت فشارخون سنجیده شد. فشارخون دو مرتبه هم در پیش آزمون و هم در پس آزمون سنجیده شد و میانگین این دو سنجش به عنوان فشارخون بیمار در هر نوبت ثبت شد. از فشارسنج بازویی جیوه‌ای استاندارد برای سنجش فشارخون بیماران دیابتی نوع ۲ استفاده شد. در این پژوهش شدت پیاده روی براساس روش ۱۵ امتیازی مقیاس درک فشار بورگ Rating Perceived Exertion-RPE سنجیده شد. با توجه به توصیه اتحادیه انجمان‌های پزشکی ورزشی اروپا (European Federation of Sports Medicine Associations) در آخرین ویرایش سال ۲۰۱۷، آزمودنی‌ها، فعالیت‌های بدنی را در سطح متوسط (RPE ۱۰ تا ۱۴) دست کم سه بار در هفته انجام دادند [۲۰]. با توجه به پیشنهاد انجمان دیابت آمریکا در سال ۲۰۱۷، بیماران با خطر بالا باید تشویق شوند تا فعالیت بدنی را با شدت پایین و مدت کوتاه شروع کنند و به آهستگی شدت و مدت را افزایش دهند [۷]. از آن‌جایی که بیماران دیابتی نوع ۲ در این پژوهش، فشارخونی بالاتر از حد طبیعی داشتند، بنابراین جز بیماران با خطر بالا دسته‌بندی می‌شوند. بیماران هر روز، پیاده روی سبک تا متوسط را انجام می‌دادند. نحوه صحیح پیاده روی، برای بیماران توضیح داده شد. پیاده روی با تلاش متوسط انجام می‌شد، به این صورت که ضربان قلب و ریتم تنفس افزایش می‌یافت؛ اما فرد از نفس نمی‌افتد [۲۱]. تمرینات افزایش تدریجی داشت به طوری که جلسات اول ۳۰ دقیقه افزایش تدریجی داشت به طوری که جلسه آخر به حدود ۶۰ دقیقه پیاده روی رسید. شدت از سبک به متوسط افزایش داشت. از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف استاندارد داده‌ها استفاده شد و برای بررسی تغییرات درون گروهی از آزمون t وابسته و برای مقایسه بین گروهی از روش تحلیلی کوواریانس استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم

نیو دنگ در سال ۲۰۱۴ در مقاله‌ای موری تأثیر پیاده روی بر گلوکز پلاسمایی را بعد از وعده غذایی بیماران دیابتی نوع ۲ سنجید و به این نتیجه رسید که پیاده روی بعد از صرف غذا موجب کاهش معنادار گلوکز پلاسمایی بعد از وعده غذایی می‌شود؛ در این پژوهش مشاهده شد تفاوتی بین فعالیت سبک و شدید پیاده روی وجود ندارد [۱۷]. کیو و همکارانش در سال ۲۰۱۴ در یک مقاله موری تأثیر پیاده روی بر فشارخون بیماران دیابتی نوع ۲ را بررسی کردند. بیشتر پژوهش‌ها کاهش غیرمعنادار را بر فشارخون سیستولی مشاهده کردند. همچنین، میزان کاهش فشارخون دیاستولی بیماران دیابتی نوع ۲ که مبتلا به پرفشارخونی بودند را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش بیماران به دو گروه رژیم غذایی و پیاده روی و رژیم غذایی تنها تقسیم شدند. نتایج نشان داد که گروهی که همراه با رژیم غذایی پیاده روی می‌کردند، کاهش معنادار در فشارخون سیستول و دیاستول داشتند [۱۹]. با توجه به نتایج پژوهش‌های ذکر شده در بالا، تأثیر پیاده روی بر فشارخون بیماران دیابتی نوع ۲ هنوز به طور کامل مشخص نشده است. بنابراین، با انجام این پژوهش می‌توان به این سوال پاسخ داد که پیاده روی می‌تواند بر فشارخون این بیماران تأثیر داشته باشد یا خیر؟

تعداد کمی آزمودنی در پژوهش‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این پژوهش سعی بر آن شد تا با افزایش تعداد آزمودنی‌ها نتایج دقیق‌تری به دست آورد. از آن جایی که پیاده روی کم هزینه‌ترین فعالیت ورزشی هوایی به شمار می‌آید و حتی در محیط منزل، در فضاهای سرپوشیده و فضاهای باز نظیر پارک‌ها نیز قابل انجام است، در پژوهش حاضر تأثیر ۳ ماه پیاده روی منظم بر شاخص‌های گلیسمیک و فشارخون زنان دیابتی نوع ۲ بررسی شده است.

مواد و روش کار

۱۰۰ زن مبتلا به دیابت نوع ۲ تصادفی به ۲ گروه پیاده روی منظم و کنترل تقسیم شدند. گروه اول به مدت ۳ ماه پیاده روی منظم را بین ساعت ۷ تا ۱۰ صبح به مدت ۳۰ دقیقه انجام دادند. هر دو گروه روزانه ۵۰۰ میلی‌گرم قرص متفورمین و ۵ میلی‌گرم گلی بن کلامید مصرف می‌کردند. حداقل سن آزمودنی‌ها ۵۰ و حداکثر ۷۰ سال بود و هیچ یک از آن‌ها دخانیات یا مواد مخدر استعمال نمی‌کردند، مبتلا به بیماری‌های قلبی، کلیوی، پروتئینوری و یا بیماری-

ناشتا معنادار بود ($F=1,99$, $p=0,001$). همچنان، اثر متقابل گروه در زمان برای متغیر هموگلوبین گلیکوزیله نیز معنادار بود ($F=25,98$, $p=0,000$). در گروه پیاده روی پس از سه ماه پیاده روی فشارخون سیستولی $6/98$ درصد کاهش داشت که معنادار بود ($p=0,000$). فشار خون دیاستولی $4/74$ درصد کاهش داشت که معنادار بود ($p=0,000$). کاهش $27/02$ درصدی قند خون ناشتا معنادار بود ($p=0,000$). همچنان، کاهش $9/62$ درصدی هموگلوبین گلیکوزیله معنادار بود ($p=0,000$). در گروه کنترل فشار خون سیستولی $3/56$ درصد افزایش داشت که معنادار بود ($p=0,001$). فشار خون دیاستولی $3/08$ درصد افزایش داشت که معنادار بود ($p=0,006$). افزایش $6/37$ درصدی قند خون گروه کنترل مشاهده شد ($p=0,007$)؛ همچنان هموگلوبین گلیکوزیله با درصد کاهش، تغییراتش معنادار نبود ($p=0,493$).

افزار SPSS18 ارزیابی شد و سطح معناداری ($p < 0,05$) در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

اطلاعات توصیفی آزمودنی‌ها شامل سن، قد، وزن بدن، شاخص توده بدن و سابقه ابتلا به بیماری دیابت به تفکیک گروه‌ها توصیف شد (جدول ۱). در پیش‌آزمون هیچ‌گونه تفاوت معنادار در متغیرهای شاخص‌های گلیسمیک و فشار خون بین دو گروه دیده نشد (جدول ۲). در پس آزمون فشارخون دیاستولی، فشارخون سیستولی، قندخون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله بین دو گروه تفاوت معنادار داشت. اثر متقابل گروه در زمان برای متغیر فشار خون سیستولی معنادار بود ($F=43/68$, $p=0,000$) و ($F=1,99$, $p=0,000$). اثر متقابل گروه در زمان برای متغیر قند خون بود ($F=53/13$, $p=0,000$). اثر متقابل گروه در زمان برای متغیر قند خون

جدول ۱: توصیف ویژگی‌های آزمودنی‌ها

Pvalue	گروه کنترل	گروه پیاده روی	
.0/190	۵۲/۰۶ (۴/۲۸)	۵۳/۷۷ (۴/۵۲)	سن (سال)
.0/910	۱/۵۸ (.۰/۰۷)	۱/۵۸ (.۰/۰۷)	قد (متر)
.0/۲۳۴	۶۳/۷۰ (.۸/۰۵)	۶۱/۲۱ (.۱۱/۰۷)	وزن بدن (کیلوگرم)
.0/۱۴۷	۲۵/۳۶ (.۲/۹۷)	۲۴/۳۴ (.۳/۸۶)	شاخص توده بدن (کیلوگرم بر متر مربع)
.0/۶۳۱	۸/۹۲ (.۴/۴۰)	۸/۴۸ (.۴/۶۴)	سابقه ابتلا به بیماری (سال)

داده‌ها به صورت میانگین (انحراف معیار) می‌باشد.

جدول ۲: تغییرات بین گروهی و درون گروهی فشارخون سیستولی و دیاستولی، قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله

Pvalue (تغییرات بین گروهی)	Pvalue (تغییرات درون گروهی)	پس آزمون	پیش آزمون	گروه‌ها	
.0/000	.0/000	۱۱۶/۶۰ (۱۳/۴۶)	۱۲۵/۹۰ (۱۶/۴۳)	گروه پیاده روی	فشار خون سیستولی (میلی‌متر جیوه)
	.0/001	۱۳۵/۱۰ (۱۴/۵۲)	۱۳۰/۹۰ (۱۵/۶۴)	گروه کنترل	
.0/000	.0/000	۷۴/۹۰ (.۸/۱۷)	۷۸/۹۰ (.۱۰/۷۰)	گروه پیاده روی	فشارخون دیاستولی (میلی‌متر جیوه)
	.0/006	۸۷/۲۲ (.۸/۷۲)	۸۵/۰۰ (۱۰)	گروه کنترل	
.0/001	.0/000	۱۵۳/۶۰ (۶۹/۶۷)	۲۱۰/۲۸ (۷۰/۲۷)	گروه پیاده روی	قند خون ناشتا
	.0/007	۱۹۸/۸۶ (۶۰/۷۸)	۱۸۸/۱۶ (۵۳/۵۸)	گروه کنترل	(میلی‌گرم بر دسی‌لیتر)
.0/000	.0/000	۷/۰۳ (.۱/۲۵)	۷/۹۲ (.۲/۰۵)	گروه پیاده روی	هموگلوبین گلیکوزیله (درصد)
	.0/493	۹/۰۹ (.۲/۵۸)	۹/۲۸ (.۲/۰۶)	گروه کنترل	

داده‌ها به صورت میانگین (انحراف معیار) می‌باشد.

شدن شاخص‌های گلیسمیک و فشار خون بیماران شود. در پژوهش حاضر پیاده روی منظم در بیماران دیابتی نوع ۲ باعث کاهش درصدی قند خون ناشتا و کاهش $9/62$ درصدی هموگلوبین گلیکوزیله شد که این تغییرات معنادار بود ($p=0,000$).

بحث و نتیجه‌گیری

یافته‌های این پژوهش نشان داد که سه روز پیاده روی در هفت‌هه با شدت ۱۰ تا ۱۴ می‌تواند فشار خون سیستولی، قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله را در حد معناداری کاهش دهد. از طرفی، مصرف قرص بدون فعالیت بدنی منظم نتوانست باعث بهتر

را از طریق سازوکارهای سیگنالی مشخص بالا می‌برند. انقباض عضله شامل تغییر وضعیت انرژی (یعنی افزایش AMP/ATP)، افزایش غلظت Ca^{+2} داخل سلولی، افزایش ROS و PKC می‌شود. این تغییرات چندین آبشار سیگنالینگ را فعال می‌کنند که بعضی از آن‌ها در نهایت GLUT4 را فعال می‌کنند (۳۵). افزایش GLUT4 باعث افزایش جذب گلوکز از خون می‌شود که در نهایت باعث کاهش قند خون در بیماران دیابتی نوع ۲ می‌شود. در این پژوهش پس از سه ماه پیاده‌روی کاهش معنی دار ۶/۹۸ درصدی فشارخون سیستولی و ۴/۷۴ درصدی فشارخون دیاستولی مشاهده شد (۱۰). نتایج پژوهش‌های مورتاق و همکارانش طی سال ۲۰۱۵ با پژوهش حاضر همخوان بود. نتایج پژوهش‌های بلی و همکارانش در سال ۲۰۱۱ و کای و همکارانش در سال ۲۰۱۴ نشان داد تمرینات فشارخون سیستول و دیاستول را کاهش می‌دانند اما این مقدار معنادار نبوده است [۱۸، ۲۴]. نتایج این پژوهش‌ها با پژوهش حاضر ناهمسو بود. دلیل آن می‌تواند تفاوت در جنس آزمودنی‌ها و شدت و مدت تمرینات باشد. توسعه پرفشارخونی در بیماران دیابتی خیلی مضر است، زیرا توسعه بیماری‌های قلبی و عروقی را سرعت می‌بخشد و برآورد می‌شود مسئول حدود ۷۵٪ عوارض قلبی و عروقی از جمله سکته، بیماری عروق کرونری و بیماری عروق محيطی است [۳۶، ۳۷]. در نتیجه، کاهش فشارخون می‌تواند باعث جلوگیری از عوارض ذکر شده در بالا شود.

فعالیت ورزشی طولانی مدت سبب کاهش فشارخون استراتحتی و فعالیت بدنی می‌گردد که ریشه در افزایش واکنش گیرندهای بتا دو دارد؛ بنابراین انبساط عروقی افزایش می‌یابد. چندین سازوکار به عنوان علت کاهش فشارخون ناشی از فعالیت ورزشی شناخته شده است که از آن جمله می‌توان به کاهش تون آدرنرژیک، تأثیر بر دستگاه سمپاتیک، کاهش مقاومت محيطی نسبت به انسولین، کاهش وزن و چربی‌های بدن اشاره کرد [۳۸]. در فعالیت ورزشی طولانی مدت، با توجه به سازگاری ناشی از ماهیت هوایی برنامه فعالیت ورزشی در تعديل ترشح هورمون‌های غدد فوق کلیه مانند اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین و در نتیجه کاهش مقاومت عروقی و تعديل عملکرد دستگاه رنین-آنژیوتانسین و کاهش ترشح آلدسترون ناشی از فعالیت ورزشی هوایی، باعث کاهش فشارخون دیاستولی می‌شود [۳۸]. پس از فعالیت ورزشی شدید، با تنظیم مجدد نقطه عکس-العمل در گیرندهای فشاری سرخ‌گی، فشارخون کاهش می‌یابد [۳۹]. هرگونه تغییر در واکنش‌بذری عروقی با کاهش هدایت

نتایج مطالعات "شمسمی و همکاران" و کاشفی و همکاران، "والکر و همکارانش" "شنوی و همکاران" و "کای و همکاران" طی کاهش معنادار در قند خون ناشتا یا هموگلوبین گلیکوزیله را نشان داد [۲۲، ۲۳] که با پژوهش حاضر همخوان بود.

در پژوهش بل و همکارانش در سال ۲۰۱۱ هر چند هموگلوبین گلیکوزیله در گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنادار داشت، ولی کاهش گلوکز خون ناشتا در گروه تمرینی معنادار نبود [۱۸] که با پژوهش حاضر ناهمخوان بود. گلوکز خون ناشتا تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله کمیت و کیفیت تغذیه قبل از آزمایش HbA1c و نیز میزان قند خون قبل از آزمایش قرار می‌گیرد، اما میزان تغییرات گلوکز خون ۱۲۰ روز قبل را نشان می‌دهد و کمتر تحت تأثیر عوامل ذکر شده است [۱۸]. دلیل تفاوت در نتایج می-تواند اختلاف در شدت‌های تمرینی و تعداد کمتر آزمودنی‌ها باشد. پیاده‌روی یک فعالیت بدنی مناسب برای پیشگیری از عوامل خطر بیماری دیابت نوع ۲ است [۱۸، ۲۵]. پیاده‌روی آثار مثبتی بر سلامت بیماران دیابتی نوع ۲ دارد که از جمله آن‌ها می‌توان کنترل قندی [۲۶-۲۹]، کاهش وزن [۲۶-۳۰] و کاهش فشارخون [۲۶، ۳۱] اشاره کرد. پیاده‌روی به عنوان یک فعالیت ورزشی هوایی، می‌تواند پاسخ‌دهی عضلات اسکلتی به انسولین را با افزایش دهد و یا فعالیت پروتئین‌های درگیر در متابولیسم گلوکز و پیامرسانی انسولین را بهتر کند [۳۲]، که پیامد آن کاهش گلوکز خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابتی نوع ۲ است. پیاده‌روی ضمناً می‌تواند موجب بهتر شدن فشارخون شود [۳۳].

جذب گلوکز تحریک شده توسط فعالیت بدنی در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲، طبیعی یا در سطوح نزدیک به طبیعی است [۳۴]. از آن جایی که جذب گلوکز تحریک شده توسط فعالیت بدنی، در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ طبیعی است، جذب گلوکز به عنوان یک ابزار بالقوه برای درمان دیابت از اهمیت حیاتی برخوردار می‌باشد. در طی چند سال گذشته سازوکار سیگنالینگ که تنظیم حمل و نقل گلوکز ناشی از فعالیت بدنی را توضیح می‌دهند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد که فعالیت بدنی، سیگنال‌های مولکولی را فعال می‌کند که نقص عملکرد انسولین در عضلات اسکلتی آن‌ها را از بین می‌برد [۳۵]. هم انسولین و هم فعالیت بدنی، جذب گلوکز عضلانی اسکلتی را از طریق انتقال GLUT4، از داخل سلول به غشای پلاسمایی، افزایش می‌دهند. انسولین و فعالیت بدنی تحرک انتقال GLUT4

پیشنهاد می‌شود علاوه بر پیاده‌روی، تأثیر فعالیت‌های ورزشی مثل آب درمانی و بیوگا و فعالیت‌های ورزشی هوایی و مقاومتی نیز بر شاخص‌های گلیسمیک و فشارخون سیستول و دیاستول بیماران دیابتی نوع ۲ انجام گیرد، تا بتوان مقایسه‌ای بین این تمرینات انجام داد. آزمودنی‌های پژوهش حاضر زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ بودند، با انجام این پژوهش در دو جنسیت می‌توان به اطلاعات بهتری دست پیدا کرد.

سهم نویسنده‌گان

زهرا بیات: اجرای پژوهش، استخراج داده‌ها، جستجوی منابع و متنون، نگارش مقاله
عباسعلی گائینی: راهنمایی پژوهش و تدوین، ویرایش کلی مقاله
علیرضا قلی‌پور: انجام کارهای آماری

تشکر و قدردانی

از آزمودنی‌های شرکت کننده در این مطالعه، به جهت همکاری صمیمانه کمال تشکر را داریم.

منابع

- American diabetes association. Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus.diabetess care 2004; 27:62-69
- Moghissi ES, Korytkowski MT, DiNardo M, Einhorn D, Hellman R, Hirsch IB, et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American Diabetes Association Consensus Statement on Inpatient Glycemic Control. Diabetes Care 2009; 32:1119-31
- IDF, Diabetes Atlas, 6th Edition, International Diabetes Federation, Brussels, 2013. Online version of IDF Diabetes Atlas: www.idf.org/diabetesatlas
- Seuring t, archangelidi o, suhrcke m. The Economic Costs of Type 2 Diabetes: a Global Systematic Review. Pharmaco Economics 2015;33:811-831
- Sadeghi Mazidi A, Kharazmi E, Javanbakht M, Heidari A, Bayati M. Cost of diabetes in type II diabetic patients. Payesh 2012;11:443-449[Persian]
- Ripsin CM, Kang H, Urban RJ. Management of Blood Glucose in Type 2 Diabetes Mellitus. American Family Physician 2009;79:29-36
- American Diabetes Association. Lifestyle Management. Standards of Medical Care in Diabetes-2017. Diabetes Care 2017;40:S33-S43
- Michael J. Fowler MD. Diabetes Treatment, Part 1: Diet and Exercise. Diabetes foundation. ClinCal Diabetes 2007;25:105-109
- Sigal RJ, Castaneda-Sceppa GC, White RD, Kenny LP, Wasserman DH. Physical Activity/Exercise and Type 2 DiabetesA consensus statement from the American Diabetes Association Reviews/Commentaries/ADA Statements. Diabetes Care 2006; 29:1433-8
- American Diabetes Association. Physical Activity/Exercise and Diabetes. Diabetes Care 2004;27:S58-62
- American Diabetes Association. Cardiovascular Disease and Risk Management. Diabetes Care 2017;40:S75-S87
- American Diabetes Association. Children and Adolescents. Diabetes Care 2017; 40: S105–S113
- Haratiyan M, Afkhami Ardakani M. Joint motion limitation in diabetic patients referring to Yazd Diabetes Research Center. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services Yazd 2003;10:61-65
- Gerrits EG, Landman GW, Nijenhuis-Rosien L, Bilo HJ. Limited Joint Mobility Syndrome in Diabetes

- Mellitus: A. Minireview. *World Journal Diabetes* 2015;6:1108-1112
- 15.** shamsi M, sharifirad G, kachoyee A, hassanzadeh A. The Effect of Educational Program Walking Based on Health Belief Model on Control Suger in Woman by Type 2 Diabetics. *Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism* 2010;11:490-499
- 16.** Kashefi M, Khani Jihoni A, Bahafori Khalili R, Hatami M. Evaluation of the Effects of Educating about Nutrition and Jogging on the Blood Sugar of Type II Diabetic Patients of a Clinic in Shiraz, Iran. *Hakim Health System Research* 2009;12:54-60[Persian]
- 17.** Newdang SS. The Effects of Postprandial Walking on Glycemic Control in Adults at Risk for Impaired Glucose Tolerance and Type 2 Diabetes. *School of Physician Assistant Studies* 2014; 3: 474, 1-19
- 18.** Qiu S, Cai X, Schumann U, Velders M, Sun Z, Steinacker JM. Impact of Walking on Glycemic Control and Other Cardiovascular Risk Factors in Type 2 Diabetes: a Meta Analysis. *PLoS One* 2014;9:1-9.e109767
- 19.** Paula TP, Viana LV, Neto AT, Leitão CB, Gross JL, Azevedo MJ. Effects of the DASH Diet and Walking on Blood Pressure in Patients with Type 2 Diabetes and Uncontrolled Hypertension: A Randomized Controlled Trial. *Journal Clinical Hypertens (Greenwich)* 2015; 17:895-901
- 20.** Zupet P, Löllgen H. European Federation of Sports Medicine Associations. Exercise Prescription for Health-Training recommendations- Date of publication: 2015, Date of revision: 2017; 1-18. Online version of efsma: <http://www.efsmascientific.eu>.
- 21.** Borg GA. Psychophysical bases of perceived exertion. *Medicine and science in sports and exercise*. 1982;14: 377-381
- 22.** Walker KZ, Piers LS, Putt RS, Jones JA, O'Dea K. Effects of Regular Walking on Cardiovascular Risk Factors and Body Composition in Normoglycemic Women and Women with Type 2 Diabetes. *Diabetes Care* 1999;22:555-61
- 23.** Shenoy S, Guglani R, Sandhu JS. Effectiveness of an aerobic Walking Program Using Heart Rate Monitor and Pedometer on the Parameters of Diabetes Control in Asian Indians with Type 2 Diabetes. *Primary Care Diabetes* 2010;4:41-5
- 24.** Belli T, Ribeiro LF, Ackermann MA, Baldissera V, Gobatto CA, Galdino da Silva R. Effects of 12-Week Overground Walking Training at Ventilatory Threshold Velocity in Type 2 Diabetic Women. *Diabetes Research and Clinical Practice* 2011;93:337-43
- 25.** Murtagh EM, Nichols L, Mohammed MA, Holder R, Nevill AM, Murphy MH. The Effect of Walking on Risk Factors for Cardiovascular Disease: an Updated Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Control Trials. *Preventive Medicine* 2015;72:34-43
- 26.** Karstoft K, Winding K, Knudsen SH, Nielsen JS, Thomsen C, Pederson BK, et al. The Effects of Free-Living Interval-Walking Training on Glycemic Control, Body Composition, and Physical Fitness in Type 2 Diabetic Patients: a Randomized, Controlled Trial. *Diabetes Care* 2013;36: 228-236
- 27.** Rooijen AJ, Rheeder P, Eales CJ, Becker PJ. Effect of Exercise Versus Relaxation on Haemoglobin A(1C) in Black Females with Type 2 Diabetes Mellitus. *QJM* 2004;97: 343-351
- 28.** Church TS, Blair SN, Cocreham S, Johannsen N, Johnson W, Kramer K. Effects of Aerobic and Resistance Training on Hemoglobin A1c Levels in Patients with Type 2 Diabetes: a Randomized Controlled Trial. *JAMA* 2010;304: 2253-2262
- 29.** Koo BK, Han KA, Ahn HJ, Jung JY, Kim HC, Min KW, et al. The Effects of Total Energy Expenditure from All Levels of Physical Activity vs. Physical Activity Energy Expenditure from Moderate-to-Vigorous Activity on Visceral Fat and Insulin Sensitivity in Obese Type 2 Diabetic Women. *Diabet Medicine* 2010;27: 1088-1092
- 30.** Kurban S, Mehmetoglu I, Yerlikaya HF, Gonan S, Erdem S. Effect of Chronic Regular Exercise on Serum Ischemia-Modified Albumin Levels and Oxidative Stress in Type 2 Diabetes Mellitus. *Endocrine Research* 2011;36: 116-123
- 31.** Gram B, Christensen R, Christiansen C, Gram J. Effects of Nordic Walking and Exercise in Type 2 Diabetes Mellitus: a Randomized Controlled Trial. *Clinical Journal of Sport Medicine* 2010; 20: 355-361
- 32.** Wang Y, Simar D, Fiatarone Singh MA. Adaptations to Exercise Training within Skeletal Muscle in Adults with Type 2 Diabetes or Impaired Glucose Tolerance: a Systematic Review. *Diabetes Diabetes/Metabolism Research and Reviews* 2009;25:13- 40
- 33.** Kelley GA, Kelley KS, Tran ZV. Walking and Resting Blood Pressure in Adults: a Meta-analysis. . *Preventive Medicine* 2001;33:120-127
- 34.** Martin IK, Katz A, Wahren J. Splanchnic and muscle metabolism during exercise in NIDDM patients. *American Journal of Physiology-*

- Endocrinology and Metabolism Endocrinol Metab 1995;269: 583–590
- 35.** Stanford KI and Goodyear LJ. Exercise and type 2 diabetes: molecular mechanisms regulating glucose uptake in skeletal muscle. Advances in Physiology Education 2014; 38:308–314
- 36.** Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL Jr, et al. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA 2003;289:2560–2572
- 37.** El-Atat F, McFarlane SI, Sowers JR. Diabetes, Hypertension, and Cardiovascular Derangements: Pathophysiology and Management. Current Hypertension Reports 2004;6:215-23

- 38.** Heydari H, Bororchi fard F, Yaghmaei F, Nasiri N, Hamdzade S. The effect of short-term aerobic exercise on the blood pressure in elderly clients with hypertension. Medical-Surgical Nursing Journal 2014;3:51-45
- 39.** Halliwill JR, Taylor JA, Eckberg DL. Impaired sympathetic vascular regulation in humans after acute dynamic exercise. The Journal of Physiology 1996;495:279–88
- 40.** Halliwill, JR. Mechanisms and clinical implications of post exercise hypotension in humans. Exercise and Sport Sciences Reviews 2001;29:65–70
- 41.** Patil RD, Dicarlo SE, Collins HL. Acute exercise enhances nitric oxide modulation of vascular response to phenylephrine. American Journal of Physiology 1993;265:1184–88

ABSTRACT

The effectiveness of regular walking on glycemic index and blood pressure in type 2 diabetic women

Zahra Bayat ^{1*}, Abbas Ali Gaeini ², Ali Reza Gholipoor ³

1. Tehran University, Kish International Campus, Kish, Iran
2. Tehran University, Tehran, Iran
3. Razi University, Kermanshah, Iran

Payesh 2018; 17(2): 159-167

Accepted for publication: 19 February 2018
[EPub a head of print-28 February 2018]

Objective (s): Regular walking has a positive impact on diabetic patients' health. The aim of this study was to evaluate the effect of regular walking for 3 months on some glycemic indexes and blood pressure in women with type 2 diabetes.

Methods: 100 patients with type 2 diabetes were randomly assigned in 2 groups (regular walking group and the control group). The first group walked 3 months regularly for 30 minutes. The intensity of walking measured by Borg scale of perceived exertion. The control group had no regular walking regularly. Glycosylated hemoglobin, fasting blood glucose, systolic and diastolic blood pressure were measured before and after the intervention. Covariance analysis method and paired t-test were used.

Results: There were no differences between two groups in the characteristics of patients including height, weight, age, and history of diabetes. Glycosylated hemoglobin, fasting blood glucose, systolic and diastolic blood pressure decreased significantly in regular walking group and fasting blood glucose and systolic blood pressure increased significantly in the control group ($p \leq 0.05$). Comparison between two groups showed that changes in glycosylated hemoglobin ($p < 0.0001$), fasting blood glucose ($p = 0.001$), systolic and diastolic blood pressure ($p < 0.0001$ between two groups) was significant.

Conclusion: The findings suggest that regular walking can improve glycemic indices in type 2 diabetic patients.

Key Words: Glycosylated Hemoglobin, Fasting Blood Glucose, Type 2 Diabetes, Regular Walking

* Corresponding author: Tehran University, Kish International Campus, Kish, Iran
Tel: 07644432934
E-mail: z.bayat@ut.ac.ir