

بررسی اقتصادی آبیاری جویچه‌ای یک در میان برای سورگوم دانه‌ای با قیمت‌های یارانه‌ای و واقعی آب آبیاری

محمد مهدی قاسمی و علیرضا سپاسخواه^۱

چکیده

در این پژوهش، اثر کم آبیاری با اعمال روش آبیاری جویچه‌ای یک در میان، که یکی از روش‌های نوین مدیریت آبیاری در مزرعه است، در مورد گیاه سورگوم دانه‌ای (*Sorghum durra L.*) بررسی شد. این پژوهش در چارچوب طرح‌های یک بار خرد شده با سه تیمار اصلی دور آبیاری ۱۰، ۱۵ و ۲۰ روز، و سه تیمار فرعی روش آبیاری جویچه‌ای معمولی، یک در میان ثابت و یک در میان متغیر، در چهار تکرار، در دو منطقه باجگاه و کوشک استان فارس انجام گرفت. با توجه به هزینه‌ها در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت و مدنظر قرار دادن قیمت‌های یارانه‌ای و واقعی آب در دو منطقه، سود به ازای واحد آب آبیاری و نسبت درآمد به هزینه محاسبه گردید. نتایج نشان داد که مقادیر این عوامل اقتصادی برای روش آبیاری جویچه‌ای یک در میان ثابت و متغیر با دور ۱۰ روز در هر دو منطقه، تفاوت چندانی با آبیاری جویچه‌ای معمولی با دور ۱۰ روز نداشت، و حتی در باجگاه بیشتر نیز می‌باشد. روابطی نیز بین مقدار آب آبیاری، بازده کاربرد آب، قیمت آب و سود به ازای واحد آب آبیاری با بازده‌های مختلف انتقال ارائه گردید. هم‌چنین، ضرایب رابطه خطی بین هزینه‌ها و مقدار آب آبیاری تعیین شد. نتایج نشان داد که با افزایش قیمت آب، کشاورز مجبور است بازده کاربرد بیشتری برای آب به کار گیرد تا زیان نمیند.

واژه‌های کلیدی: آبیاری جویچه‌ای یک در میان، قیمت آب، بررسی اقتصادی آبیاری

که برای استفاده حداکثر از واحد حجم آب، موازین فنی مقرر

مقدمه

در تعیین آب مورد نیاز رعایت نمی‌شود. در چنین شرایطی، به گیاه به قدر لزوم از نظر اقتصادی، نه به قدر کافی تا جایی که

محدودیت منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک موجب شده که آب به عنوان مهم‌ترین نهاده تولید تلقی گردد. به طوری

۱. به ترتیب دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و استاد آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

نیاز دارد، محصول کاهش چندانی نداشته و اقتصادی‌تر بوده است. بنابراین، در شرایطی همانند ایران، که کمبود نسبی آب و فراوانی نسبی اراضی وجود دارد، برای اقدام در زمینه توسعه پایدار لازم است طرح‌های کم‌آبیاری آزمایش و در صورت تحقق، رواج یابد تا از منابع آب در اختیار حداکثر استفاده برده شود.

با توجه به موارد یاد شده، این پژوهش به بررسی اقتصادی آبیاری جویچه‌ای یک در میان برای سورگوم دانه‌های با قیمت‌های یارانه‌ای و واقعی آب آبیاری پرداخته است. بدین منظور در دو منطقه باجگاه و کوشک استان فارس، آزمایشی با سه تیمار دور آبیاری و سه تیمار روش آبیاری جویچه‌ای انجام گردید. پس از محاسبه درآمد حاصل از فروش محصول و هزینه‌های تولید با قیمت‌های واقعی و یارانه‌ای آب، نسبت سود به هزینه و سود به ازای واحد آب آبیاری محاسبه شد، و نتیجتاً روابطی بین کل هزینه‌ها با مقدار آب آبیاری و بازده‌های کاربرد مختلف و نیز سود به ازای واحد آب آبیاری با بازده کاربرد، بازده انتقال آب آبیاری و کل هزینه‌های آبیاری و سودی که عاید کشاورز می‌شود استخراج گردید. بدین ترتیب، روش اقتصادی آبیاری با دور مناسب برای گیاه سورگوم در مناطق مذبور پیشنهاد شده است.

مواد و روش‌ها

این پژوهش در دو منطقه باجگاه و کوشک استان فارس، که از لحاظ آب و هوا، سطح ایستابی، نوع و نیم‌رخ خاک متفاوت می‌باشند، انجام گرفت. برخی از ویژگی‌های دو منطقه فوق در جدول ۱ آورده شده است.

آزمایش در چارچوب طرح‌های یک بار خرد شده در چهار تکرار، با سه تیمار اصلی دور آبیاری ۱۰، ۱۵ و ۲۰ روز، و سه تیمار فرعی روش آبیاری جویچه‌ای معمولی، جویچه‌ای یک در میان ثابت که از هر دو جویچه یکی آبیاری می‌شد و تا آخر دوره ثابت بود، و جویچه‌ای یک در میان متغیر که جای

بازده کاربرد مصرف آب حداکثر و عملکرد محصول از نظر اقتصادی قبل قبول باشد، آب داده می‌شود، که به آن کم‌آبیاری تنظیم شده گفته می‌شود (۱۱). واضح است که هرگاه منابع آب محدود بوده و یا هزینه‌های آب زیاد باشد، بازده مصرف آب (از نظر اقتصادی) در حالت تولید حداکثر محصول، کمتر خواهد بود. هنگامی که مشکلاتی از نظر تأمین سرمایه، انرژی، نیروی کارگر و یا منابع حیاتی دیگر وجود داشته باشد، یا هنگامی که هزینه این گونه منابع زیاد باشد، استفاده از کم‌آبیاری می‌تواند در افزایش سود مفید واقع گردد. هم‌چنین، در صورتی که هدف به حداکثر رساندن سود و ثبت تولید مواد غذایی باشد، کم‌آبیاری می‌تواند به عنوان یک راهکار ارزشمند مطرح گردد (۱۰ و ۱۴). در این مورد، انتخاب شیوه و زمان آبیاری و گیاه مناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گیاه سورگوم یکی از گیاهان مقاوم به خشکی است، و تغییرات اقلیمی که شرایط را برای رشد گیاهان زراعی چهار کربنده مانند سورگوم مساعد می‌کند ممکن است در آینده اهمیت آن را افزایش دهد (۱).

آبیاری جویچه‌ای یک در میان یکی از روش‌های نوین آبیاری سطحی است. در روش‌های قدیمی آبیاری سطحی، تمام مزرعه آبیاری می‌شود و از آن تبخیر صورت می‌گیرد، در صورتی که گیاهان زراعی، به ویژه در آغاز فصل رشد، تمام سطح مزرعه را نمی‌پوشانند. بنابراین، مقداری از آب تلف می‌شود. در روش آبیاری جویچه‌ای یک در میان، که بخشی از مزرعه آبیاری می‌شود، سطح تبخیر کاهش می‌یابد و آب کمتری وارد مزرعه می‌گردد (۲ و ۱۳). هم‌چنین، در این روش فرونشست عمقی کاهش یافته (۹) و به دنبال آن مشکلات بالا آمدن سطح ایستابی کم می‌شود. علاوه بر موارد بالا، آبیاری جویچه‌ای یک در میان سرعت آبیاری را حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش می‌دهد (۱۲).

خواجه عبدالهی و سپاسخواه (۳) با بررسی اقتصادی آبیاری جویچه‌ای یک در میان ذرت دانه‌ای با دوره‌های مختلف اظهار داشتند که تیمارهای آبیاری چهار روزه یک در میان نسبت به تیمار آبیاری جویچه‌ای با دور هفت روز معمولی آب کمتری

جدول ۱. برخی از ویژگی‌های مناطق باجگاه و کوشکک (۷)

نام محل	طول	عرض	ارتفاع از سطح دریا (متر)	سطح ایستابی (متر)	دماهی هوا (درجه سانتی گراد)	بارندگی سالیانه (میلی متر)	میانگین سالیانه خاک	متوسط بافت
باجگاه	۵۲۰	۳۲۱	۱۸۱۰	>۳۰	۱۲/۷۴	۳۷۲	رسی شنی	
کوشکک	۵۲۰	۳۵'	۱۶۰۹	۱-۲	۱۵/۲۵	۴۲۴	لوم رسی	

بقیه محاسبات انجام گردید.

در باجگاه از آب چاه برای آبیاری استفاده می‌شود. هزینه‌های استحصال آب از چاه شامل دو قسمت است: هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه شامل حفر چاه، خرید و نصب موتور پمپ، تأمین برق، و هزینه‌های جاری یا بهره‌برداری مانند مصرف برق یا احیاناً گازوییل، تعمیرات و نگهداری. با در نظر گرفتن کل هزینه‌های سالیانه و میانگین حجم آب قابل تأمین از یک حلقه چاه، هزینه تأمین هر متر مکعب آب کشاورزی از چاه را می‌توان ارائه داد. مردشتی و فرجود (۸) با محاسبه هزینه‌های ثابت و متغیر چاه، قیمت‌هایی را از ۶/۳۷ ریال تا ۶/۲۳ ریال برای هر متر مکعب آب چاه، با نرخ بهره از ۱۰ تا ۲۰ درصد در منطقه سروستان ارائه کرده‌اند. عبداللهی عزت‌آبادی (۶) رابطه زیر را برای برآورد هزینه‌های یک متر مکعب آب بر حسب ریال، در صورتی که عمق لوله آب‌کشی برابر عمق چاه فرض گردد، ارائه کرده است:

$$Y_t = ۸/۳۹ + ۰/۴۵۵ D \quad [۱]$$

که در آن D عمق چاه بر حسب متر و Y_t کل هزینه‌های یک متر مکعب آب بر حسب ریال است. با فرض آن که عمق چاه ۱۲۷ متر است، کل هزینه‌های دست‌رسی به یک متر مکعب آب در باجگاه در حدود ۶۵ ریال در سال ۱۳۷۵ برآورد شد. با در نظر گرفتن نرخ تورم ۱۷ درصد در سال ۱۳۷۶ و نرخ تورم ۲۰ درصد در سال ۱۳۷۷، قیمت یک متر مکعب آب برابر ۹۱/۲۶ ریال برآورد گردید. این قیمت در پرسش‌های محلی نیز تأیید شد. در کوشکک، آب آبیاری مزروعه از شبکه آبیاری و زه‌کشی سد درودزن تأمین می‌شود. با توجه به سرمایه‌گذاری سد،

جویچه‌های آبیاری شده در هر دور عوض می‌شد، انجام گرفت.

بذر مورد نظر سورگوم (*Sorghum durra* L.) دانه‌ای رقم کیمیا بوده، و بذرها در عمق ۳-۴ سانتی‌متر و به فاصله ۱۰ سانتی‌متر روی پشت‌هایی به فاصله ۷۵ سانتی‌متر کاشته شد و تراکم گیاهی ۱۳۳ هزار بوته در هکتار به وجود آمد. پیش از هر آبیاری، رطوبت اعمق مختلف خاک به وسیله دستگاه نوترون‌متر اندازه‌گیری شد، و مقدار آب آبیاری بر اساس کمبود آب خاک نسبت به ظرفیت زراعی در عمق ریشه محاسبه، و آبیاری به وسیله سیفون انجام گردید. تیمارهای آبیاری پس از استقرار گیاهان و پس از سه آبیاری معمولی با دور هفت روز اعمال شد. در هنگام برداشت نیز عملکرد دانه با رطوبت ۱۴ درصد در ۲۰ متر مربع از هر کرت ۶۰ متر مربعی، با کnar گذاشتن حاشیه سیز، برآورد گردید (۷).

برای بررسی اقتصادی هر پژوهشی می‌بایست هزینه‌ها و درآمدهای آن پژوهش شناخته شود. هدف از بررسی اقتصادی پژوهش حاضر این است که از نظر آبیاری راه حلی ارائه گردد که بیشترین سود به دست آید. در جدول ۲ هزینه‌های ثابت و متغیر برای کلیه تیمارها نشان داده شده است. لازم به یادآوری است که هزینه‌های ثابت با مذکورة حضوری با مسئولین خدمات کشاورزی و فروشگاه‌های نهاده‌های کشاورزی تهیه شده است. قیمت‌ها بر اساس قیمت‌های سال ۱۳۷۷ محاسبه شده، هزینه‌های متغیر شامل هزینه آب آبیاری و کارگر برای آبیاری در مرحله داشت و هزینه حمل و نقل به سیلو می‌باشد. درآمد و سود ناخالص کلیه تیمارها در جدول ۳ برآورد شده است. سپس با توجه به هزینه‌های متغیر نشان داده شده در جدول ۲

جدول ۲. هزینه‌های مختلف محصول مزرعه یک هکتاری در مناطق باجگاه و کوشکک استان فارس در سال ۱۳۷۷ (۷)

مبلغ هزینه (ریال)	نوع هزینه
هزینه‌های کاشت:	
۱۰۰۰۰	شخم دو مرتبه (هر هکتار ۵۰۰۰۰ ریال)
۲۵۰۰۰	صف کردن زمین مزرعه (هر هکتار ۲۵۰۰۰ ریال)
۲۵۰۰۰	شیارزن (هر هکتار ۲۵۰۰۰ ریال)
۲۷۲۰۰	کود اوره ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار (هر کیسه ۵۰ کیلویی ۱۳۶۰۰ ریال)
۷۷۰۰۰	کود فسفات آمونیوم ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار (هر کیسه ۵۰ کیلویی ۱۵۴۰۰ ریال)
۷۰۰۰۰	بذر سورگوم ۱۰ کیلوگرم در هکتار (هر کیلوگرم ۷۰۰۰ ریال)
۲۰۰۰۰	بذر کاری (هر هکتار ۲۰۰۰۰ ریال)
۱۰۰۰۰	متفرقه (کارگر برای مرمت جویچه‌ها و ...)
هزینه‌های داشت:	
۱۲۵۰۰	علفکش (۲-۴D و ...)
۲۷۲۰۰	کود اوره سرک ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار
متغیر	کارگر برای آبیاری (به ازای هر ۱۰ ساعت ۲۰۰۰۰ ریال)
متغیر	قیمت آب آبیاری
۱۰۰۰۰	متفرقه (کارگر برای وجین و ...)
هزینه‌های برداشت:	
۱۲۰۰۰	کمباین برای برداشت (هر هکتار ۱۲۰۰۰۰ ریال)
متغیر	حمل به سیلو (هر کیلو ۱۵ ریال)
۱۰۰۰۰	متفرقه (حمل و نقل و ...)
۸۰۳۹۰۰	کل هزینه‌های ثابت

انجام شده، تفاوت‌ها شناخته شده و شاید راهکار مناسبی به دست آمد تا از این نعمت پر بهای الهی استفاده بهینه گردد.
برای محاسبه درآمدها، قیمت فروش محصول حائز اهمیت است. با توجه به کوچک بودن سطح زیر کشت سورگوم در کشور، قیمت تضمینی برای محصول سورگوم وجود ندارد. از این رو، نرخ هر کیلوگرم محصول دانه با رطوبت ۱۴ درصد برای نرخ ذرت، یعنی ۴۳۰ ریال در نظر گرفته شد.^۱
دستمزد کارگر با ۱۰ ساعت کار در هر دو منطقه ۲۰۰۰۰ ریال است. با در نظر گرفتن دبی نهر آبیاری ۳۵ لیتر در ثانیه، بازده مختلف کاربرد آب از ۵۰ تا ۸۰ درصد، و نیز بازده انتقال

کanal‌های درجه یک، دو و سه، مرمت آنها، آبخیزداری سد و هزینه‌های متغیر سد، حداقل قیمت برای هر متر مکعب آب ۱۰۰ ریال برآورد شد (پرسش از مسئولان آب منطقه‌ای فارس). ولی هر متر مکعب آب در کوشکک به قیمت ۸/۲ ریال به کشاورز فروخته می‌شود. این قیمت بر اساس قانون تثیت آب بهای زراعی مصوب مجلس شورای اسلامی به مقدار چهار درصد، دو درصد و یک درصد میانگین تولید محصول برای شبکه‌های مدرن، تلفیقی و سنتی محاسبه شده است. چنان‌که دیده می‌شود، این قیمت کمتر از یک دهم قیمت واقعی (غیر یارانه‌ای) آب است (حداقل قیمت آب). بنابراین، با توجه به اهمیت آب در این مناطق، محاسبات در این پژوهش، با دو نرخ

۱. با پرسش از خریداران محصولات کشاورزی

جدول ۳. درآمد و سود ناخالص تیمارهای مختلف آبیاری در باجگاه و کوشک (یک هکتار) در سال ۱۳۷۷ (۷)

محل	تیمار	محصول (کیلوگرم در هکتار)	هزینه حمل و نقل ^۱	سود ^۲	هزینه عملیات زراعی ^۳	درآمد ناخالص ^۴
		۶۵۱۵/۸	۹۷/۷۴	۲۸۰۱/۸۰	۸۰۳/۹۰	۱۹۰۰/۱۶
		۵۲۸۳/۲	۷۹/۲۵	۲۲۷۱/۷۷	۸۰۳/۹۰	۱۳۸۸/۶۲
		۵۴۲۹/۳	۸۱/۴۴	۲۳۳۴/۵۸	۸۰۳/۹۰	۱۴۴۹/۲۴
		۵۱۵۸/۵	۷۷/۳۸	۲۲۱۸/۱۶	۸۰۳/۹۰	۱۳۳۶/۸۸
		۳۵۴۸/۳	۵۳/۲۲	۱۵۲۵/۷۵	۸۰۳/۹۰	۶۶۸/۶۲
		۳۷۶۲/۰	۵۶/۴۳	۱۶۱۷/۶۶	۸۰۳/۹۰	۷۵۷/۱۳
		۳۴۰۲/۲	۵۱/۰۳	۱۴۶۲/۹۴	۸۰۳/۹۰	۶۰۸/۰۱
		۲۰۹۴/۸	۳۱/۴۲	۹۰۰/۷۴	۸۰۳/۹۰	۶۵/۴۲
		۱۹۱۳/۱	۲۸/۷۰	۸۲۲/۶۲	۸۰۳/۹۰	-۹/۹۸
		۷۲۳۱/۹	۱۰۸/۴۸	۳۱۰۹/۷۱	۸۰۳/۹۰	۲۱۹۷/۳۳
		۵۶۷۱/۵	۸۵/۰۷	۲۴۳۸/۷۵	۸۰۳/۹۰	۱۵۴۹/۷۷
		۵۷۸۵/۵	۸۶/۷۸	۲۴۸۷/۷۷	۸۰۳/۹۰	۱۰۹۷/۰۸
		۵۴۵۷/۸	۸۱/۸۷	۲۳۴۶/۸۳	۸۰۳/۹۰	۱۴۶۱/۰۷
		۴۰۶۱/۳	۶۰/۹۲	۱۷۴۶/۳۴	۸۰۳/۹۰	۸۸۱/۰۲
		۳۷۴۴/۲	۵۶/۱۶	۱۶۱۰/۰۰	۸۰۳/۹۰	۷۴۹/۹۴
		۲۸۹۹/۹	۴۳/۵۰	۱۲۴۶/۹۵	۸۰۳/۹۰	۳۹۹/۰۵
		۱۷۷۴/۱	۲۶/۶۱	۷۶۲/۸۷	۸۰۳/۹۰	-۶۷/۶۴
		۱۷۳۱/۴	۲۵/۹۷	۷۴۴/۴۹	۸۰۳/۹۰	-۸۵/۳۸

^۱. بر حسب هزار ریال^۲. آبیاری جویچه‌ای معمولی با دور ۱۰ روز^۳. آبیاری جویچه‌ای یک در میان ثابت با دور ۱۰ روز^۴. آبیاری جویچه‌ای یک در میان متغیر با دور ۱۰ روز

آبیاری جویچه‌ای یک در میان متغیر و ثابت با دور آبیاری ۱۰ روز در باجگاه بیشتر از جویچه‌ای معمولی با دور آبیاری ۱۰ روز می‌باشد. در کوشک نیز مقدار سود به ازای واحد آب آبیاری در آبیاری جویچه‌ای یک در میان متغیر و ثابت دور آبیاری ۱۰ روز با آبیاری جویچه‌ای معمولی دور آبیاری ۱۰ روز قابل مقایسه است. بنابراین، در خشکسالی‌ها، کشاورز می‌تواند با استفاده از روش‌های آبیاری جویچه‌ای یک در میان با اطمینان

۹۰ درصد، هزینه‌ها محاسبه گردیده، که در جداول ۴ و ۵ نمونه‌هایی از آن آورده شده است.

نتایج و بحث

چنان که در جدول ۴ دیده می‌شود، در هر دو منطقه مقدار بیشینه سود خالص مربوط به تیمارهای دور ۱۰ روز معمولی است، ولی سود خالص به ازای واحد آب آبیاری تیمارهای

جدول ۴. سود خالص، سود به ازای واحد آب آبیاری و نسبت درآمد به هزینه در تیمارهای مختلف آبیاری با بازده کاربرد ۷۰ درصد و بازده انتقال ۹۰ درصد و قیمت آب در باجگاه و کوشکک به ترتیب ۹۱/۲۶ و ۱۰۰ ریال (۷)

محل	تیمار (میلی متر)	عمق آب آبیاری	حجم آب استفاده شده در هزار (۱۰۰۰ متر مکعب)	سود به ازای واحد آب آبیاری ^۱ به هزینه	سود خالص ^۱	سود خالص ^۱	هزینه کارگر ^۱	هزینه آب در هکتار ^۱	سود به ازای هزینه
۱/۲۵	۴/۹۰	۵۶۰/۰۷	۱۸۱/۳۸	۱۱۵۸/۷۱	۱۲/۷۰	۷۹۹/۹۰	۱۰۵		
۱/۲۲	۵/۰۰	۴۱۵/۰۹	۱۳۱/۷۷	۸۴۱/۷۶	۹/۲۲	۵۸۱/۱۰	۱۰۶		
۱/۲۳	۵/۱۶	۴۴۲/۷۰	۱۳۶/۲۴	۸۷۰/۳۰	۹/۵۴	۶۰۰/۸۰	۱۰۷		
۱/۱۰	۲/۰۹	۲۰۲/۳۴	۱۵۳/۰۶	۹۸۰/۹۷	۱۰/۷۵	۶۷۷/۲۰	۱۰۸		
۰/۹۳	-۱/۶۳	-۱۰۸/۰۶	۱۰۵/۱۲	۶۷۱/۵۶	۷/۳۶	۴۶۳/۶۰	۱۰۹	باجگاه	
۱/۰۰	۰/۰۷	۴/۴۴	۱۰۱/۹۰	۶۵۰/۹۹	۷/۱۳	۴۴۹/۴۰	۱۰۷		
۰/۸۵	-۳/۴۳	-۲۵۱/۴۴	۱۱۶/۲۳	۷۴۳/۱۲	۸/۱۴	۵۱۳/۰۰	۲۰۶		
۰/۶۰	-۱۰/۰۶	-۵۹۰/۴۷	۸۸/۷۸	۵۶۷/۱۲	۷/۲۱	۳۹۱/۵۰	۲۰۷		
۰/۵۶	-۱۱/۹۱	-۶۴۵/۱۰	۸۵/۹۶	۵۴۹/۱۰	۷/۰۲	۳۷۹/۱۰	۲۰۷		
۱/۲۸	۵/۷۸	۶۸۷/۱۲	۱۸۸/۷۸	۱۳۲۱/۴۳	۱۳/۲۱	۸۳۲/۵۰	۱۰۶		
۱/۲۱	۴/۹۰	۴۳۱/۴۱	۱۳۹/۸۰	۹۷۸/۵۷	۹/۷۹	۶۱۶/۵۰	۱۰۶		
۱/۲۱	۴/۶۹	۴۳۰/۸۲	۱۴۵/۷۸	۱۰۲۰/۴۸	۱۰/۲۰	۶۴۲/۹۰	۱۰۷		
۱/۱۱	۲/۴۵	۲۳۶/۵۸	۱۵۳/۰۶	۱۰۷۱/۴۳	۱۰/۷۱	۶۷۵/۰۰	۱۰۸		
۰/۹۷	-۰/۶۶	-۴۸/۳۷	۱۱۶/۲۴	۸۱۳/۶۵	۸/۱۴	۵۱۲/۶۰	۱۰۹	کوشک	
۰/۹۸	-۰/۴۲	-۲۵/۰۷	۹۶/۹۴	۶۷۸/۵۷	۷/۷۹	۴۲۷/۵۰	۱۰۷		
۰/۶۷	-۷/۷۳	-۶۲۰/۸۶	۱۲۷/۰۵	۸۹۲/۸۶	۸/۹۳	۵۶۲/۵۰	۲۰۶		
۰/۵۰	-۱۳/۹۵	-۷۵۴/۴۴	۸۵/۸۵	۶۰۰/۹۵	۷/۰۱	۳۷۸/۶۰	۲۰۷		
۰/۴۹	-۱۴/۲۵	-۷۸۳/۴۳	۸۷/۲۶	۶۱۰/۷۹	۷/۱۱	۳۸۴/۸۰	۲۰۷		

۱. بر حسب هزار ریال

۴۹/۷ ریال در باجگاه (نرخ آب بهای زمان پژوهش) صورت گرفت.

همان گونه که در جدول ۵ آمده است، نسبت درآمد به هزینه در مقایسه با جدول ۴ افزایش یافته است. باز هم تیمارهای دور آبیاری ۱۰ روز یک در میان ثابت و متغیر از نظر صرفه اقتصادی در هر دو منطقه چشم‌گیر هستند. مقایسه جداول ۴ و ۵ نشان می‌دهد که با قیمت یارانه‌ای، حتی با بازده کاربرد کم آب، در تیمارهای ۱۰ روز یک در میان ثابت و متغیر، کشاورز سود قابل قبولی به دست می‌آورد.

برای مشخص تر شدن رابطه قیمت، بازده کاربرد آب، بازده

بیشتری به کشت و کار پردازد. نسبت سود به هزینه در ستون آخر جدول ۴ نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

با کم شدن بازده کاربرد آب، مقادیر سود خالص، سود به ازای واحد آب آبیاری و بالاخره نسبت درآمد به هزینه کاهش می‌یابد، تا جایی که بیشتر تیمارها غیر اقتصادی می‌شوند. این نتایج برای حالتی است که کشاورز مجبور باشد قیمت واقعی (غیر یارانه‌ای) آب در کوشک و باجگاه را پردازد، در حالی که در کوشک قیمت یارانه‌ای آب و در باجگاه قیمت آب عملاً برای کشاورز شاید کمتر از این مقدار باشد. بنابراین، محاسبه‌های اقتصادی بر اساس قیمت ۸/۲ ریال در کوشک و

جدول ۵. سود خالص، سود به ازای واحد آب آبیاری و نسبت درآمد به هزینه در تیمارهای مختلف آبیاری با بازده کاربرد ۵۰ درصد و بازده انتقال ۹۰ درصد و قیمت آب در باجگاه و کوشک به ترتیب ۴۹/۷ و ۸/۲ ریال (۷)

							محل	تیمار	
					سود به ازاء واحد نسبت سود				
				هزینه آب	سود	عمق آب آبیاری	حجم آب استفاده شده در	تیمار	
		به هزینه آب آبیاری ^۱	به هزینه خالص ^۱	کارگر ^۱	در هکتار ^۱	هزینه (۱۰۰۰ متر مکعب)	در هکتار ^۱	(میلی متر)	
۱/۳۷	۴/۷۷	۷۶۲/۷۸	۲۵۳/۹۴	۸۸۳/۴۵	۱۷/۷۸	۷۹۹/۹۰	۱۰e		
۱/۳۳	۴/۸۴	۵۶۲/۳۵	۱۸۴/۴۸	۶۴۱/۷۹	۱۲/۹۱	۵۸۱/۱۰	۱۰f		
۱/۳۴	۴/۹۵	۵۹۴/۹۶	۱۹۰/۷۳	۶۶۳/۵۵	۱۳/۳۵	۶۰۰/۸۰	۱۰v		
۱/۲۰	۲/۷۶	۳۷۳/۹۶	۲۱۴/۹۸	۷۴۷/۹۳	۱۵/۰۵	۶۷۷/۲۰	۱۵e		
۱/۰۱	۰/۱۰	۹/۴۳	۱۴۷/۱۷	۵۱۲/۰۲	۱۰/۳۰	۴۶۳/۶۰	۱۵f	باجگاه	
۱/۰۸	۱/۳۲	۱۱۸/۲۳	۱۴۲/۱۷	۴۹۶/۳۴	۹/۹۹	۴۴۹/۴۰	۱۵v		
۰/۹۲	-۱/۱۸	-۱۲۱/۴۳	۱۶۲/۸۶	۵۶۶/۵۸	۱۱/۴۰	۵۱۳/۰۰	۲۰e		
۰/۶۵	-۶/۲۷	-۴۹۱/۲۵	۱۲۴/۲۹	۴۳۲/۳۹	۸/۷۰	۳۹۱/۵۰	۲۰f		
۰/۶۰	-۷/۲۴	-۵۴۹/۰۲	۱۲۰/۳۵	۴۱۸/۶۹	۸/۴۲	۳۷۹/۱۰	۲۰v		
۲/۳۴	۱۰/۷۰	۱۷۸۱/۳۴	۲۶۴/۲۹	۱۵۱/۷۰	۱۸/۰۰	۸۳۲/۵۰	۱۰e		
۲/۰۴	۱۰/۰۷	۱۲۴۱/۷۲	۱۹۵/۷۱	۱۱۲/۳۴	۱۳/۷۰	۶۱۶/۵۰	۱۰f		
۲/۰۵	۹/۹۲	۱۲۷۵/۸۴	۲۰۴/۱۰	۱۱۷/۱۵	۱۴/۲۹	۶۲۴/۹۰	۱۰v		
۱/۹۲	۸/۳۲	۱۱۲۳/۷۸	۲۱۴/۲۹	۱۲۳/۰۰	۱۵/۰۰	۶۷۵/۰۰	۱۵e		
۱/۵۶	۷/۱۰	۶۲۵/۳۸	۱۶۲/۷۳	۹۳/۴۱	۱۱/۳۹	۵۱۲/۶۰	۱۵f	کوشک	
۱/۵۰	۷/۲۷	۵۳۶/۳۲	۱۳۵/۷۱	۷۷/۹۰	۹/۵۰	۴۲۷/۵۰	۱۵v		
۱/۱۰	۱/۰۵	۱۱۸/۴۸	۱۷۸/۰۷	۱۰۲/۵۰	۱۲/۰۰	۵۶۲/۵۰	۲۰e		
۰/۷۵	-۳/۳۹	-۲۵۶/۸۲	۱۲۰/۱۹	۶۸/۹۹	۸/۴۱	۳۷۸/۶۰	۲۰f		
۰/۷۳	-۳/۶۱	-۲۲۷/۶۶	۱۲۲/۱۶	۷۰/۱۲	۸/۵۵	۳۸۴/۸۰	۲۰v		

۱. بر حسب هزار ریال

E_a = بازده کاربرد آب (اعشار)

C_w = قیمت هر متر مکعب آب (ریال)

همان گونه که معادله‌های ۲ و ۳ نشان می‌دهند، سود با بازده

کاربرد آب رابطه مستقیم و با قیمت آب رابطه معکوس دارد. با بالا رفتن قیمت آب کشاورز مجبور است بازده کاربرد آب را افزایش دهد تا سود او کم نشود (۳).

شكل کلی رابطه بین کل هزینه‌ها و مقدار آب آبیاری مصرف شده، با توجه به قیمت آب آبیاری و بازده کاربرد متفاوت به صورت زیر است:

$$C = A + B \times I \quad [۴]$$

که در آن C کل هزینه‌ها بر حسب ریال و I مقدار آب آبیاری بر

انتقال آب، مقدار آب آبیاری، کل هزینه‌های آبیاری و سودی که

عاید کشاورز می‌شود، معادله‌های ۲ و ۳ استخراج شد:

برای بازده انتقال ۹۰ درصد:

$$B = -25949/1 + 192/22 E_a - 68/8 C_w \quad [۲]$$

$$(R^2 = 0/68, SE = 4302, n = 144, P < 0/001)$$

برای بازده انتقال ۷۰ درصد:

$$B = -21963/1 + 368/33 I + 151/08 E_a - 140/59 C_w \quad [۳]$$

$$(R^2 = 0/78, SE = 4050, n = 144, P < 0/001)$$


که در آنها:

B = سود به ازای هر واحد آب آبیاری (ریال)


I = مقدار آب آبیاری (میلی متر)

جدول ۶. ضرایب معادله ۳ با قیمت‌های متفاوت هر متر مکعب آب و بازده‌های کاربرد آب آبیاری (۷)

محل	آب آبیاری (ریال)	قیمت هر متر مکعب	ثابت معادله A	ضریب B در بازده‌های کاربرد آب متفاوت			
				۸۰	۷۰	۶۰	۵۰
		%					
باجگاه	۹۱/۲۶	۷۷۹/۶۲۱	۲/۵۰۵	۲/۱۱۴	۱/۸۳۵	۱/۶۲۵	
	۴۹/۷۰	۷۷۹/۶۲۱	۱/۵۸۱	۱/۳۴۵	۱/۱۷۵	۱/۰۴۸	
کوشک	۱۰۰/۰۰	۷۶۹/۴۵۰	۲/۷۱۶	۲/۲۹۲	۱/۹۹۰	۱/۷۶۳	
	۸/۲۰	۷۶۹/۴۵۰	۰/۶۷۶	۰/۵۹۲	۰/۵۳۳	۰/۴۸۸	



شکل ۱. رابطه بین هزینه‌ها و مقدار مصرف آب آبیاری در بازده‌های ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصد کاربرد آب با قیمت آب ۸/۲ ریال به ازای هر متر مکعب در کوشک



شکل ۲. رابطه بین هزینه‌ها و مقدار مصرف آب آبیاری در بازده‌های ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصد کاربرد آب با قیمت آب ۱۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب در کوشک

کوشک، با تیمار دور ۱۰ روز جویچه‌ای معمولی در هر کدام از این مناطق قابل مقایسه است. سود به ازای واحد آب آبیاری در باجگاه برای آبیاری جویچه‌ای یک در میان ثابت و متغیر به ترتیب ۵۰۰۰ و ۵۱۶۰ ریال، و برای آبیاری جویچه‌ای معمولی ۴۹۰۰ ریال برای دور ۱۰ روز می‌باشد. همین مقادیر در کوشک به ترتیب ۴۹۰۰ و ۴۶۹۰ ریال در برابر ۵۷۸۰ ریال است. با در نظر گرفتن قیمت یارانه‌ای، مقادیر فوق ۴۹۵۰ و ۴۸۴۰ در برابر ۴۷۷۰ در باجگاه، و ۱۰۰۷ و ۹۹۲ ریال در برابر ۱۰۷۰ ریال در کوشک است.

روابط ارائه شده بین سود به ازای واحد آب آبیاری، مقدار آب آبیاری، بازده کاربرد آب و قیمت آب نشان می‌دهند که سود با بازده کاربرد رابطه مستقیم و با قیمت آب رابطه معکوس دارد. پس با افزایش قیمت آب، کشاورز مجبور است بازده کاربرد بیشتری برای آب به کار گیرد تا زیان نمیند.

شکل کلی رابطه بین هزینه‌ها و مقدار آب آبیاری مصرف شده نیز به صورت خطی است، که با کاهش بازده کاربرد آب، شیب خطوط افزایش می‌یابد، و این افزایش شیب در شرایط قیمت‌های واقعی بیشتر و فاصله خطوط هزینه‌ها هم مشهودتر است. برخی از پژوهندگان (۴ و ۵) نیز برای استفاده بهتر از آب و هدر ندادن آن راه‌کارهای مختلفی پیشنهاد کرده‌اند. یکی از این راه‌کارها افزایش قیمت آب، و راه‌کار دیگری که برخی از پژوهندگان بر آن تأکید بیشتری می‌ورزند تحویل آب به کشاورزان به صورت حجمی است. پژوهش حاضر ضمن تأیید هر دو نحوه برخورد فوق، روش آبیاری جویچه‌ای یک در میان را، به ویژه در موقع کم‌آبی، به کشاورزان توصیه می‌کند تا کشاورز حداقل سود را به دست آورد.

حسب میلی‌متر می‌باشد. A و B ضرایب معادله‌اند که در جدول ۶ برای قیمت‌های در نظر گرفته شده و با بازده‌های کاربرد متفاوت ارائه شده‌اند. در شکل‌های ۱ و ۲ رابطه بین مقدار آب آبیاری و هزینه‌های محاسبه شده با بازده‌های متفاوت کاربرد برای قیمت آب ۸/۲ ریال و ۱۰۰ ریال در کوشک ارائه گردیده است. داده‌ها نشان می‌دهد که با افزایش مقدار آب آبیاری، هزینه‌ها به طور خطی افزایش می‌یابد. با کاهش بازده کاربرد آب، شیب این خطوط افزایش یافته و فاصله خطوط از هم زیادتر می‌شود. نکته جالبی که در شکل ۲ دیده می‌شود این است که در قیمت کم آب، با افزایش بازده کاربرد، تغییرات زیادی در هزینه‌ها به وجود نمی‌آید، و در نتیجه کشاورز رغبتی برای افزایش بازده کاربرد نشان نمی‌دهد. مقایسه این شکل با شکل ۱ این موضوع را نمایان‌تر می‌سازد. بنابراین، وجود قیمت مناسب آب، با در نظر گرفتن ضوابط مشخص برای جلوگیری از هدر رفتن آب، امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

نتیجه‌گیری

با توجه به اهمیت آب در مناطق خشک و نیمه خشک و اهمیت روزافزون آن، لازم است به آب به عنوان یک نهاده با ارزش و نادر توجه شود. در این پژوهش پس از برآورد قیمت واقعی آب در دو منطقه باجگاه و کوشک، و قیمت‌هایی که کشاورزان با بت آب‌ها در زمان پژوهش پرداخت می‌کردند، و مدنظر قرار دادن هزینه‌های مختلف تولید سورگوم، به بررسی اقتصادی کشت سورگوم با روش آبیاری جویچه‌ای یک در میان پرداخته شده است.

نتایج بررسی اقتصادی گویای آن است که تیمارهای آبیاری دور ۱۰ روز جویچه‌ای یک در میان ثابت و متغیر در باجگاه و

منابع مورد استفاده

۱. استاسکوف، ب. سی. ۱۳۷۶. زراعت غلات. (ترجمه: م. ح. راشد محصل، م. حسینی، م. عبدی و ع. ملافیلابی). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

۲. پرند، ا. ر. ۱۳۷۶. اثر آبیاری جویچه‌ای معمولی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد ذرت با آبیاری جویچه‌ای یک در میان در شرایط سطح ایستابی عمیق و کم عمق. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
۳. خواجه عبدالهی، م. ح. و ع. سپاسخواه. ۱۳۷۵. بررسی اقتصادی آبیاری جویچه‌ای یک در میان با دوره‌ای مختلف برای ذرت. مجله آب و توسعه ۱۵: ۵۴-۶۰.
۴. سلطانی، غ. ۱۳۷۵. نرخ گذاری آب کشاورزی. مجله آب و توسعه ۱۲: ۱۲-۲۱.
۵. سلطانی، غ. و م. زیبایی. ۱۳۷۵. نرخ گذاری آب کشاورزی. مجله آب و توسعه ۱۴: ۵-۲۴.
۶. عبدالهی عزت‌آبادی، م. ۱۳۷۵. ارزیابی اقتصادی گزینه‌های تأمین آب کشاورزی در شهرستان رفسنجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
۷. قاسمی، م. م. ۱۳۷۸. اثر آبیاری جویچه‌ای یک در میان بر عملکرد سورگوم دانه‌ای در دو منطقه باجگاه و کوشک استان فارس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
۸. مردشتی، م. ن. و م. ر. فرجود. ۱۳۷۵. برآورد قیمت تمام شده آب کشاورزی در محدوده‌ای از دشت سروستان در استان فارس. مجله آب و توسعه ۱۴: ۳۱-۱۳۸.
9. Benjamin, J. G., L. K. Porter, H. R. Duke and L. R. Ahuja. 1997. Corn growth and nitrogen uptake with furrow irrigation and fertilizer bands. *Agron. J.* 89: 609-612.
10. English, M., L. James and C. F. Chen. 1990. Deficit irrigation. II: observations in the Columbia Basin. *ASCE, J. Irrig. Drain. Eng.* 116(3): 413-426.
11. English, M. J., J. T. Musick and V. V. N. Murty. 1990. Deficit irrigation. PP. 631-663. In: G. J. Hoffman, T. A. Howell and K. H. Solomon (Eds.), *Management of Farm Irrigation Systems*. ASAE, St. Joseph, MI, USA.
12. New, L. 1971. Influence of alternate furrow irrigation and time of application on grain sorghum production. *Tex. Agric. Exp. Sta. Prog. Rept.* No. 2953.
13. Sepaskhah, A. R. and A. A. Kamgar-Haghghi. 1997. Water use and yields of sugarbeet grown under every other furrow irrigation with different irrigation intervals. *Agric. Water Manage.* 34: 71-79.
14. Stegman, E. C., J. T. Musick and J. I. Stewart. 1980. Irrigation water management. PP. 787-800. In: M. E. Jensen (Eds.), *Design and Operation of Farm Irrigation Systems*. ASAE Monograph. No. 3, St. Joseph, MI, USA.