

## اثر پتانسیل‌های محرک رشد سویه‌های بومی از توباکتر کروکوکوم روی رشد، عملکرد و جذب عناصر غذایی در گندم

سعیده رجایی<sup>۱</sup>، حسینعلی علیخانی<sup>۲</sup> و فایز رئیسی<sup>۱</sup>

### چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر برخی از پتانسیل‌های محرک رشد شناخته شده در تعدادی از سویه‌های برتر *Azotobacter chroococcum* روی رشد، عملکرد و جذب عناصر غذایی در گندم (*Triticum aestivum L.*) در شرایط گلخانه‌ای به اجرا در آمد. تعدادی از سویه‌های از توباکتر کروکوکوم برتر از نظر تولید IAA، سیدوفور، هیدروژن سیانید و ثبت کننده نیتروژن ملکولی انتخاب و بذر گندم رقم پیشناز در قالب یک طرح کاملاً تصادفی توسط این سویه‌ها تلقیح و برخی از شاخص‌های رشد، عملکرد و جذب عناصر غذایی اندازه‌گیری شد که اثر تلقیح باکتری بر روی شاخص‌های عملکرد بیولوژیک، درصد پروتئین دانه، وزن هزار دانه، شاخص سطح برگ و به ویژه جذب عناصر N, P, Fe و Zn مثبت و معنی‌دار گردید. بیشترین آثار معنی‌دار در افزایش شاخص‌های مذکور در تیمارهای سویه‌های از توباکتر کروکوکوم تولید کننده فیتوهormون (IAA) و سویه‌های ثبت کننده نیتروژن ملکولی مشاهده گردید. به طور کلی بر اساس نتایج این مطالعه می‌توان گفت بعضی سویه‌های از توباکتر کروکوکوم بومی استان چهار محال و بختیاری که در زمرة ریزوپباکتری‌های محرک رشد گیاه (PGPR) قرار گرفته بودند تأثیر مثبتی روی رشد و عملکرد گندم شامل عملکرد بیولوژیک و کیفیت دانه (درصد پروتئین دانه) تحت شرایط گلخانه‌ای داشته‌اند. هم‌چنین از این سویه‌ها می‌توان در جهت بهبود تغذیه گندم از نظر عناصر غذایی کم مصرف مانند آهن و روی استفاده نمود.

**واژه‌های کلیدی:** از توباکتر کروکوکوم، PGPR، IAA، سیدوفور، HCN، ثبت بیولوژیک نیتروژن، رشد گندم، عملکرد، جذب عناصر

### مقدمه

رتبه اول قرار دارد. هم‌چنین گندم عمده‌ترین محصول زراعی گندم جزء مهم‌ترین گیاهان زراعی جهان، به ویژه در کشورهای زیر کشت در استان چهار محال و بختیاری بوده که بالغ بر ۵۲ در حال توسعه، به شمار می‌آید و در مقایسه با سایر محصولات این اراضی زیر کشت را به خود اختصاص داده است که از و غلات بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده این مقدار ۴۳/۶ درصد آبی و ۵۶/۴ درصد تحت کشت دیم بوده است (۱). ظرف چند دهه اخیر تلاش برای افزایش تولید در واحد سطح و مصرف زیاد و نامتعادل کودهای شیمیایی، تحت کشت غلات، گندم با ۵۱/۰٪ (۷۱/۷۶ هزار هکتار) در

۱. به ترتیب دانشجوی دکتری و دانشیار خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

۲. استادیار خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

ترکیبات نامحلول معدنی به اثبات رسیده است که از جمله روش‌های افزایش تحرک و قابلیت جذب عناصر غذایی می‌باشد (۱۸ و ۱۹). گزارش‌های متعددی در خصوص توان تولید فیتوهormون‌ها توسط باکتری‌های PGPR دی‌ازوتروف از جمله باکتری‌های جنس ازتوباکتر وجود دارد. در حقیقت افزایش رشد گیاه در اثر تلکیح ازتوباکتر بیشتر به هورمون‌های تولید شده توسط این باکتری و افزایش رشد ریشه نسبت داده شده است تا تثبیت بیولوژیکی نیتروژن (۲۶). در برخی از موارد مشاهده شده است که حتی در سطوح و مقدار کافی کودهای نیتروژنی، تلکیح گیاهان با باکتری‌های دی‌ازوتروف از جمله ازتوباکتر موجب افزایش رشد و نمو گیاهان شده است که در این صورت احتمالاً وجود مکانیسم‌های دیگری به غیر از تثبیت نیتروژن، از جمله تولید مواد تنظیم کننده رشد مانند ایندول استیک اسید (Indole Acetic Acid: IAA) علت افزایش رشد گیاه بوده است (۶ و ۱۵). نارولا و همکاران اثر تلکیح سویه‌های ازتوباکتر کروکوکوم تولید کننده IAA و حل کننده فسفات را روی جذب عناصر NPK تحت شرایط گلخانه‌ای ثبت و معنی دار گزارش کردند (۱۹). در یک بررسی سلیمان و همکاران گزارش دادند تلکیح گندم با ازتوباکتر تحت شرایط گلخانه تا ۵۰ درصد نیتروژن مورد نیاز گیاه را جایگزین نموده است (۲۲). هم‌چنین اثر ازتوباکتر در افزایش جوانه زنی دانه‌های محصولات مختلف نیز ثبت گزارش شده است که میزان این تأثیر به سویه ازتوباکتر بستگی دارد. در بین محققین مختلف از نظر استفاده از سویه‌های مناسب برای هر فنوتیپ گیاهی اتفاق نظر وجود دارد. به عنوان مثال زاید و همکاران نشان دادند در بین ژنوتیپ‌های مختلف گندم پاییزه تعدادی از ژنوتیپ‌ها پاسخ بهتری به تلکیح ازتوباکتر نشان می‌دهند (۲۶).

رابطه بین ژنوتیپ گیاهی و سویه وابسته به ویژگی‌های مشارکتی در سیستم شامل ترکیبات کیفی و کمی ترشحات ریشه گیاه، متابولیت‌های ویژه میکروبی و ویژگی‌های ژنوتیپ گیاهی در جذب و انتقال نیتروژن عنوان شده است. باید به این نکته توجه داشت که شرایط خاک همچون مقدار رطوبت و

پیامدهایی منفی زیست محیطی و افزایش هزینه تولید را به همراه داشته است و این امر ضرورت تجدید نظر در شیوه‌های جدید افزایش تولید محصول را گوشزد می‌نماید (۲). فراهم‌سازی شرایط لازم برای استفاده بیشتر از فرایندهای طبیعی مانند تثبیت بیولوژیکی نیتروژن یکی از راهکارهای تولید بهینه محصول و مهم‌تر از آن حفظ سلامت محیط است که امروزه در کشورهای مختلف به طور جدی دنبال می‌شود. یکی از شیوه‌های بیولوژیکی برای افزایش تولید در کشاورزی، استفاده بالقوه از میکروارگانیزم‌های مفید خاکزی است که می‌توانند از روش‌های مختلف باعث افزایش رشد و عملکرد گیاه شوند. از جمله این موجودات می‌توان به ریزوپاکتری‌های محرک رشد (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) گیاه (PGPR) اشاره کرد. این گروه از باکتری‌ها در منطقه ریزوسفر از طریق مکانیسم‌های مختلفی باعث افزایش رشد و عملکرد گیاه می‌شوند (۵ و ۲۳). امروزه مکانیسم‌های مستقیم تأثیر گذار انواع PGPR مانند تولید فیتوهormون‌ها (اکسین‌ها، سیتوکین‌ها، جیرلین‌ها و ...) و یونوفورها (سیدروفورها)، افزایش دستررسی گیاه به عناصر، افزایش فراهمی عناصر غذایی و یا افزایش تحرک و قابلیت جذب آن عناصر، افزایش جوانه‌زنی، توسعه سیستم ریشه‌ای، فعالیت‌های آنزیمی چون ACC-دآمیناز و تولید ریزوپیوتوکسین‌ها به منظور کاهش آثار سوء اتیلن تنفسی و افزایش گرهزایی و نهایتاً تثبیت بیولوژیک نیتروژن مولکولی و غیره به اثبات رسیده است (۵). باکتری‌های متعلق به خانواده ازتوباکترسه علاوه بر تثبیت نیتروژن ملکولی موجود در اتمسفر از طریق افزایش تحرک و قابلیت جذب عناصر غذایی و به ویژه تولید فیتوهormون‌های رشد گیاهی موجب بهبود شرایط تغذیه و رشد گیاه می‌شوند. به علاوه این باکتری از طریق کنترل عوامل بیماری‌زا، به طور غیر مستقیم، نیز به حفظ سلامت گیاه کمک نموده که تأثیر نهایی آن، بهبود رشد و عملکرد گیاهان زراعی می‌باشد (۸ و ۱۸). پتانسیل تولید سیدروفورهای مختلف توسط ازتوباکتر و افزایش قابلیت جذب Zn، Fe و Mo هم‌چنین توانایی این باکتری‌ها در افزایش حلایق فسفر از

جدول ۲ مورد استفاده قرار گرفت. جهت آزمون گلخانه‌ای بذر گندم بهاره (Triticum aestivum L.) رقم پیشناز مورد استفاده قرار گرفت. این رقم از بخش غلات مرکز مهندسی زراعی واقع در شهرستان کرج تهیه گردید. بذرهای سالم استریل و جوانه‌دار شدند. بررسی گلخانه‌ای در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل پانزده تیمار، ۱۴ سویه باکتری و یک تیمار شاهد فاقد باکتری و هر تیمار شامل ۵ تکرار (گلدان ۶ کیلویی شامل ۳ بوته در هر گلدان) انجام گرفت. ابتدا سویه‌های مورد نظر در محیط کشت مایع وینوگرادسکی کشت داده شدند و جمعیت میکروبی بر اساس معیار مک فارلندر در حد  $10 \times 5$  باکتری در هر میلی‌لیتر یکسان گردید (۴ و ۱۹).

بعد از جوانه دار شدن بذرها و تلقیح آنها توسط محلول معلق میکروبی، مرحله کاشت صورت گرفت. تمامی گلدان‌ها روزانه به صورت وزنی و با آب مقطر آبیاری شدند. مقدار برنامه کودی مصرفی در مورد تمامی گلدان‌ها شامل ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به صورت اوره و در سه قسط مساوی (در زمان کاشت، در پایان ماه اول و در هنگام ظهرور سنبله هماه با آب آبیاری به خاک گلدان‌ها اضافه گردید)، ۷۵ کیلوگرم فسفر در هکتار به صورت سوپر فسفات تریپل و ۴۰ کیلوگرم در هکتار پتابیم به صورت سولفات پتابیم بود که نیمی از سولفات پتابیم در ابتدای کاشت و نیم دیگر آن در پایان ماه اول به گلدان‌ها افزوده شد (۲۶، ۲۲، ۱۶ و ۲۷). هم‌چنین در یک نوبت ۲۰۰ میلی‌لیتر محلول غذایی هوگلند اما فاقد آهن به خاک گلدان‌ها داده شد تا نیاز گیاهان به عناصر کم مصرف تا حدودی مرتفع گردد. در طول مدت رشد گیاه گلدان‌ها در اتفاق رشد با طول دوره روشنایی ۱۰ ساعت با نور ۱۰۰۰۰ لوکس (لامپ بخار سدیم و هلیم ۴۰۰ وات) نگهداری شدند. در یک ماهه آخر رشد گندم طول دوره روشنایی به ۱۲ ساعت رسید تا گیاهان روز بلند گندم وارد فاز زایشی گردند. در طول دوره رشد گیاه، سطح برگ در مرحله ظهرور کامل سنبله‌ها و ارتفاع بوته (۳۵ و ۷۵ روز) اندازه‌گیری شد. در پایان این دوره سایر شاخص‌های رشد گندم از جمله وزن خشک ریشه،

ماده آلی، pH و بافت خاک روی نتیجه تلقیح مؤثر هستند (۲۱). با توجه به نتایج تحقیقات محققین تلقیح از توباکتر به طور متوسط افزایشی معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد در عملکرد گیاهان مختلف، بهویژه گندم به دنبال داشته است (۱۳ و ۲۳). هدف از این پژوهش بررسی پتانسیل کاربرد سویه‌های از توباکتر کروکوکوم بومی به عنوان کود بیولوژیک محرک رشد گیاه (Plant Growth Promoting Biofertilizer: PGPB) آثار انواع برتر باکتری روی شاخص‌های رشد و عملکرد و جذب عناصر غذایی در گندم بوده است که امری ضروری در جهت توسعه مصرف کودهای زیستی و کشاورزی پایدار در خاک‌های هر منطقه به شمار می‌آید.

## مواد و روش‌ها

تعداد ۷۵ نمونه خاک از مزارع مختلف گندم در استان چهارمحال و بختیاری تهیه و ۷۰ سویه از توباکتر کروکوکوم از این خاک‌ها جداسازی گردید. سپس توانایی تولید IAA، سیدروفور، هیدروژن سیانید (HCN) و هم‌چنین تثبیت نیتروژن ملکولی در این سویه‌ها اندازه گیری شد (۳، ۴، ۶، ۱۷ و ۲۰ و ۲۶) و از بین این سویه‌ها ۱۴ سویه برای آزمون گلخانه‌ای انتخاب شدند که خصوصیات آنها در جدول ۱ نشان داده شده است. همان طور که در این جدول مشاهده می‌شود سویه‌های منتخب دارای بالاترین پتانسیل در زمینه تولید ترکیبات مذکور می‌باشند. به عنوان مثال سویه‌های ۲۳ و ۲۶ دارای بالاترین پتانسیل تولید سیدروفور و سویه‌های ۲۵ و ۷۲ دارای بالاترین پتانسیل تولید IAA در بین ۷۰ سویه از توباکتر بودند. در مورد تولید IAA تثبیت بیولوژیک نیتروژن علاوه بر سویه‌های برتر، سویه‌هایی با پتانسیل متوسط و هم‌چنین فاقد توانایی‌های مذکور نیز جهت مقایسه استفاده شدند. به عنوان مثال سویه ۱۷ فاقد توانایی تثبیت بیولوژیک نیتروژن می‌باشد. بین سویه‌های منتخب از نظر پتانسیل‌های محرک رشد همپوشانی وجود نداشت.

جهت آماده کردن خاک گلدان‌ها نمونه برداری از خاک‌های اطراف کرج (حصارک) صورت گرفت و خاکی با مشخصات

جدول ۱. سویه‌های مورد استفاده در آزمون گلخانه‌ای

ویژگی	شماره سویه	mekanisem تحریک رشد گیاه
8.3 nmol C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> h <sup>-1</sup>	AZT- 5	
7.5 nmol C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> h <sup>-1</sup>	AZT- 8	
7.6 nmol C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> h <sup>-1</sup>	AZT- 69	ثبت بیولوژیک نیتروژن
0 nmol C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> h <sup>-1</sup>	AZT- 17	
0 nmol C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> h <sup>-1</sup>	AZT- 68	
بیشترین قطر هاله به کلانی	AZT- 23	
بیشترین قطر هاله به کلانی	AZT- 26	تولید سیدروفور
HCN بیشترین تولید	AZT- 48	
HCN بیشترین تولید	AZT- 11	تولید HCN
72 mg / l IAA	AZT- 25	
70 mg / l IAA	AZT- 13	
67 mg / l IAA	AZT- 72	تولید IAA
40 mg / l IAA	AZT- 53	
0 mg / l IAA	AZT- 57	

جدول ۲. برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در آزمون گلخانه‌ای

Sand	Silt	Clay	بافت	مواد آلی	EC dS/m	pH	Fe <sup>2+</sup> mg/kg	N %	P <sup>1</sup> mg/kg	(قابل جذب)
۶۰/۶	۱۵/۸	۲۳/۶	sandy clay loam	۰/۶۸	۰/۶۱	۷/۳	۸/۵۵	۰/۰۴	۷/۸۸	۱. روش اولسن (۱۴) ۲. عصاره‌گیری (۱۴) DTPA

داده شده است. طبق نتایج اثر تیمار باکتری بر روی ارتفاع بوته در پایان ماه اول (گیاه ۳۵ روزه) در سطح ۱ درصد معنی دار می‌باشد. بیشترین ارتفاع بوته در این مرحله متعلق به سویه شماره ۱۳ می‌باشد و ارتفاع بوته تنها در این تیمار به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد و سایر تیمارها افزایش نشان می‌دهد. در حالی که ارتفاع بوته در تیمارهای ۲۳ و ۱۷ به طور معنی داری کمتر از تیمار شاهد می‌باشد. بین خود تیمارهای از توباكتر نیز اختلافاتی وجود دارد، با این حال اثر تیمار باکتری بر روی ارتفاع گیاه ۷۵ روزه و ارتفاع نهایی بوته معنی دار نگردید.

اثر تیمار روی سطح برگ بوته در سطح ۱ درصد معنی دار می‌باشد. مقایسات میانگین سطح برگ در تیمارهای مختلف نشان می‌دهد سطح برگ بوته در تیمارهای ۸، ۲۵، ۷۲ و ۶۹ به طور معنی داری در سطح احتمال ۵ درصد از تیمار شاهد و سایر تیمارها بیشتر بوده است، در حالی که در تیمارهای ۱۱، ۱۷، ۵۷، ۴۸ و ۲۶ به طور معنی داری نسبت

وزن خشک قسمت‌های هوایی گیاه (عملکرد بیولوژیک)، وزن خشک دانه (عملکرد دانه)، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، ارتفاع نهایی بوته، طول سنبله و تعداد پنجه‌ها اندازه‌گیری گردید. در پایان غلظت نیتروژن، فسفر و آهن در اندام‌های هوایی گیاه اندازه‌گیری شد و مقدار کل جذب این عناصر در گیاه محاسبه گردید. غلظت نیتروژن و درصد پروتئین دانه به روش کجلدال، غلظت فسفر به روش رنگ سنجی (روش عصاره‌گیری اولسن) و غلظت آهن و روی (عصاره‌گیری با DTPA) به روش جذب اتمی اندازه‌گیری شد (۱۴). نتایج این آزمون بر اساس طرح کاملاً تصادفی تجزیه و میانگین‌ها با استفاده از آزمون LSD's Fisher's LSD در سطح احتمال ۵ درصد با استفاده از نرم افزار آماری SAS مقایسه شدند.

## نتایج

### الف) شاخص‌های رشد گندم

در جدول ۳ نتایج مقایسه میانگین شاخص‌های رشد گندم نشان

جدول ۳. مقایسه میانگین شاخص‌های رشد و عملکرد گندم در تیمارهای سویه‌های مختلف ازتوپاکتر کروکوکوم

	تیمار (سویه‌های ازتوپاکتر)	وزن خشک ریشه در هر گرم (g)	وزن خشک ریشه در هر گرم (g)	اندام هوانجی (g)	وزن خشک ریشه در هر گرم (g)	تعداد دانه در سنبله	وزن هزار دانه (g)	عملکرد پرورشی دانه (cm <sup>3</sup> /روزه)	ارتفاع بوته (cm) (نهاخ)	ارتفاع بوته (cm) (رژه)	طول سنبله (cm)	سطح برگ (cm <sup>2</sup> )	پنجه در در بوته	سبنله در بوته
۱/۷۳	۴۳۳۰ <sup>a</sup>	۱۰۱/۸۰ <sup>b</sup>	۷۱/۱۸	۷۱/۴	۶۴/۱	۲۵/۵bcd	۹/۹۱def	۰/۵۱	۲۲/۵۴bc	۱۵/۹۹	۲/۹۹ <sup>f</sup>	۰/۹۹۳۰ <sup>e</sup>	control	
۱/۴۶	۴/۱۹۵ab	۱۰۱/۵۸ <sup>b</sup>	۷/۳۱	۷۲/۲	۶۴/۰	۳۷/۴۳	۹/۶۱ef	۰/۵۰	۲۲/۹۱bc	۱۵/۵۰	۳/۴۹bcde	۰/۳۵۳۰ <sup>d</sup>	A - 5	
۱/۶۶	۲/۳۴۵ <sup>cde</sup>	۱۱۳/۱۰ <sup>a</sup>	۷/۴۲	۷۷/۲	۶۵/۲	۲۶/۲bcd	۱۰/۷۳ <sup>a</sup>	۰/۲۲۵	۲۴/۰ab	۱۶/۹۶	۲/۶۲abcd	۰/۳۴۷۸	A - 8	
۱/۵۳	۲/۹۹۸ab	۸۱/۷۵ <sup>d</sup>	۶/۸۴	۷۰/۲	۶۲/۷	۳۴/۲def	۹/۵۰ef	۰/۵۳۳	۲۱/۴bc	۱۶/۹۰	۲/۲۰def	۰/۳۶۵۰	A - 11	
۱/۶۶	۳/۸۴abcd	۱۰۲/۵۵ <sup>b</sup>	۷/۵۲	۷۱/۸	۶۴/۵	۴۲/۷ <sup>a</sup>	۱۰/۰bcd	۰/۶۱	۲۳/۳۵bc	۱۷/۱۳	۳/۶۸abc	۰/۳۷۰	A - 13	
۱/۵۳	۲/۳۹۵dc	۸۵/۸۰ <sup>d</sup>	۶/۸۰	۷۰/۰	۶۳/۴	۳۲/۳ <sup>c</sup>	۹/۷۹cddef	۰/۴۵۱	۲۰/۶۲c	۱۵/۸۵	۲/۹۴ <sup>f</sup>	۰/۳۳۴۰	A - 17	
۱/۶۰	۲/۹۹۶ <sup>c</sup>	۱۰۱/۵۵ <sup>b</sup>	۹/۶۰	۷۰/۰	۶۴/۱	۳۲/۹ <sup>ef</sup>	۱۰/۲abed	۰/۵۶۲	۲۲/۶۲bc	۱۶/۹۴	۳/۲۷def	۰/۳۸۸۸	A - 23	
۱/۷۳	۳/۸۰abcd	۱۱۳/۸۰ <sup>a</sup>	۷/۵۷	۷۳/۴	۶۹/۹	۲۶/۴bcd	۱۰/۵۹ab	۰/۶۳۹	۲۷/۲۲ <sup>a</sup>	۱۵/۱۴	۳/۸۶ab	۰/۳۶۴۰	A - 25	
۱/۳۹	۳/۱۱۳۰ <sup>c</sup>	۹۴/۵۰ <sup>c</sup>	۷/۳۰	۷۳/۳	۶۴/۰	۲۱/۴bcd	۹/۵۸ef	۰/۵۳۰	۲۲/۷۹bc	۱۸/۰۸	۳/۳۹def	۰/۳۵۷	A - 26	
۱/۵۹	۳/۹۳۰abc	۹۴/۵۰ <sup>c</sup>	۷/۴۹	۷۲/۸	۶۴/۰	۳۶/۷bc	۱۰/۳cddef	۰/۵۱۲	۲۲/۵bc	۱۶/۰۳	۳/۱۵ef	۰/۳۶۴۹	A - 48	
۱/۵۹	۳/۷۷۳۲bcd	۹۷/۹۸bc	۷/۳۷	۷۳/۲	۶۵/۱	۳۶/۷bc	۱۰/۴ab	۰/۵۰۰	۲۲/۶۲bc	۱۵/۱۴	۳/۲۶ef	۰/۳۸۴۰	A - 53	
۱/۴۶	۴/۱۹۱ab	۸۲/۱۰ <sup>d</sup>	۷/۰۲	۷۱/۱	۶۴/۰	۲۶/۹bc	۹/۵۰f	۰/۵۰۳	۲۲/۳۹bc	۱۵/۳۲	۳/۲۳def	۰/۳۶۸۳	A - 57	
۱/۵۹	۳/۹۹۶ab	۸۵/۷۵ <sup>d</sup>	۷/۱۶	۷۱/۰	۶۴/۰	۳۶/۹bc	۸/۵۰g	۰/۴۷۷	۲۲/۱bc	۱۴/۰	۳/۲۱def	۰/۳۵۵۰	A - 68	
۱/۴۶	۳/۴۶۴cd	۱۱۳/۳۰ <sup>a</sup>	۷/۲۱	۷۲/۱	۶۳/۶	۲۵/۳bcd	۱۰/۲۷abc	۰/۵۱۱	۲۳/۱۹bc	۱۵/۲۱	۳/۳۷def	۰/۳۴۰۰	A - 69	
۱/۷۳	۳/۸۴abcd	۱۱۶/۳۳ <sup>a</sup>	۷/۳۳	۷۲/۸	۶۵/۰	۳۵cdde	۱۰/۱۳abcd	۰/۶۲۸	۲۷/۱۷ <sup>a</sup>	۱۶/۰۷	۳/۹۹ <sup>a</sup>	۰/۳۵۳۰	A - 72	
۰/۴۱	۴/۸۸۴	۲۲۳/۳۹	۰/۴۶	۰/۰	۶۱/۰	۹/۶۲	۱/۵۶	۰/۵۲	۲/۵۲	۳/۴۳	۰/۸۲۵۰	F		
۰/۹۵۷۷	<۰/۰۰۰۱	<۰/۰۰۰۱	۰/۹۴۶۲	۰/۹۹۹	<۰/۰۰۰۱	<۰/۱۸۹	۰/۰۰۰۱	۰/۱۱۱۸۹	۰/۰۰۰۲۹	۰/۹۹۶۶۶	۰/۰۰۰۴	۰/۹۹۷	P	
N.S.	۰/۵۰۵	۹/۸۸۶۲	N.S.	N.S.	۲/۲۲۳۲	۲/۲۲۲۲	N.S.	۳/۲۲۳۱	N.S.	۰/۴۶۴۴	N.S.	LSD <sub>0.05</sub>		
۲۰	۱۳	۱۲/۰۵۲	۱۰	۶/۲۸	۷/۱۸	۶	۱۹/۷	۱۲/۲۷	۲۰	۱۳/۱	۲۰	۲۰	CV	

- حروف متباہ در هر سنتون نشانه عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد می‌باشد.

- تندی صفات به ازای بیک بوته می‌باشند.

- N.S. غیر معنی دار

علاوه جذب نیتروژن در تیمارهای ۸ و ۱۳ نسبت به سایر تیمارها به جز تیمارهای ۲۵ و ۷۲ افزایش معنی داری یافته است.

میزان جذب فسفر توسط گیاه گندم در تیمار سویه شماره ۷۲ در درجه اول و تیمارهای شماره ۲۵، ۸، ۱۳، ۱۱، ۲۶ و ۵ در

درجات بعدی نسبت به تیمار شاهد به صورت معنی داری افزایش یافته است ولی بین خود تیمارهای مذکور اختلاف آماری معنی داری مشاهده نمی شود.

مقایسه میانگین مقدار کل جذب آهن توسط گندم نشان می دهد که در تیمارهای ۲۵، ۲۶، ۴۸، ۷۲، ۶۸ آهن نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی داری در سطح احتمال ۵ درصد داشته است.

هم چنین تأثیر تیمارهای مختلف باکتری بر روی مقدار کل جذب روی در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار می باشد. میزان کل جذب روی در تیمارهای ۲۵، ۱۳، ۸، ۷۲، ۲۳، ۲۵، ۶۹ و ۴۸ به صورت معنی داری نسبت به تیمار شاهد افزایش یافته است. بین خود تیمارهای مذکور از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود ندارد. در سایر تیمارها از نظر جذب روی اختلاف معنی داری با تیمار شاهد مشاهده نمی شود ولی در عمل میزان Zn جذب شده در تمام تیمارهای میکروبی بیشتر از شاهد می باشد هر چند این افزایش معنی دار نیست.

#### د) غلظت عناصر

در جدول ۴ علاوه بر جذب، اختلاف بین غلظت عناصر در گیاه نیزار نظر آماری مورد بررسی قرار گرفته است. اثر تیمارهای سویه های مختلف از توپاکتر کروکوکوم روی غلظت نیتروژن، فسفر و آهن در سطح ۱ درصد معنی دار می باشد در حالی که این اثر روی غلظت روی در گیاه در سطوح آماری ۵ و ۱ درصد معنی دار نمی باشد. روند مقایسه میانگین ها در مورد غلظت عناصر تقریباً مشابه با وضعیت جذب می باشد.

#### بحث

در مجموع می توان گفت تلقیح گندم با از توپاکتر در کنار مصرف کودهای شیمیایی می تواند آثار گوناگونی در رشد و

به تیمار شاهد و سایر تیمارها کاهش نشان می دهد. بر طبق نتایج جدول ۳ اثر تیمار باکتری روی میانگین طول سنبله، تعداد پنجه در بوته، تعداد سنبله در هر بوته معنی دار نمی باشد

#### ب) عملکرد

در جدول ۳ اثر تیمارهای مختلف باکتری روی شاخص های عملکرد گندم نیز نشان داده شده است. طبق نتایج وزن خشک اندام هوایی در سطح ۱ درصد معنی دار می باشد. وزن خشک اندام هوایی گیاه در تیمار ۲۵، ۱۳، ۸، ۷۲ و ۵ به طور معنی داری بیشتر از تیمار شاهد است. بین سایر تیمارها و تیمار شاهد اختلاف معنی داری وجود ندارد. همچنین وزن خشک اندام هوایی در تیمار شماره ۷۲ نسبت به تمامی تیمارها به جز تیمارهای ۲۵، ۱۳ و ۸ به طور معنی داری بیشتر می باشد. اثر تیمار باکتری بر روی وزن خشک ریشه، تعداد دانه در سنبله و عملکرد دانه معنی دار نشد.

تلقیح سویه های مختلف از توپاکتر کروکوکوم روی وزن هزار دانه (جدول ۳) تأثیر معنی داری در سطح ۱ درصد داشته است. میانگین وزن هزار دانه در تیمارهای ۲۵ و ۷۲ به صورت معنی داری نسبت به تیمار شاهد و سایر تیمارها افزایش نشان می دهد. بین تیمار شاهد و سایر تیمارها اختلاف آماری معنی داری مشاهده نمی شود.

اثر تیمارهای مختلف باکتری روی درصد پروتئین دانه در سطح ۱ درصد معنی دار می باشد. درصد پروتئین دانه در گیاه تلقیح شده با سویه های ۸، ۲۵، ۵۳ و ۶۹ به صورت معنی داری بیشتر از تیمار شاهد می باشد. بین سایر تیمارها و تیمار شاهد به جز تیمار ۶۸ اختلاف معنی داری وجود نداشته و میانگین درصد پروتئین دانه در تیمار ۶۸ به طور معنی داری کمتر از تیمار شاهد و سایر تیمارها می باشد.

#### ج) جذب عناصر غذایی

در جدول ۴ اثر تیمارهای مختلف باکتری روی جذب نیتروژن، فسفر، آهن و روی در گندم نشان داده شده است. طبق نتایج اثر تیمارهای مختلف باکتری روی جذب نیتروژن، آهن و فسفر در سطح ۱ درصد معنی دار می باشد. کل نیتروژن جذب شده در تیمارهای ۸، ۱۳، ۷۲ و ۲۵ افزایش معنی داری نسبت به تیمار شاهد نشان می دهد. به

جدول ۴. مقایسه میانگین جذب و غلظت عناصر N, P, Fe و Zn در گندم در تیمارهای سویه‌های مختلف از توباكتر کروکوکوم

	Zn (mg/kg)	غلهای جذب (μg/p)	Fe (mg/kg)	P		N	
				غلهای جذب (μg/p)	غلظت٪	جذب (mg/p)	غلظت٪
۲۶/۹	۵۸/۷	۵۸/۷ <sup>c</sup>	۴۸/۹ <sup>bcd</sup>	۹/۸ <sup>e</sup>	۹/۸ <sup>ef</sup>	۶۹/۸ <sup>d</sup>	۶۹/۸ <sup>d</sup>
۲۶/۱	۹۱/۴ <sup>bcd</sup>	bedf	/bcd	۰/ <sup>cd</sup>	/1/1 <sup>cd</sup>	۸۲/۳ <sup>fg</sup>	۸۲/۳ <sup>cd</sup>
۳۲/۹	۱۲۰/ <sup>a</sup>	abde	۹۹/۶ <sup>abc</sup>	۰/ <sup>b</sup>	۹/۴ <sup>bcd</sup>	۱۰۹/۵ <sup>a</sup>	۱۰۹/۵ <sup>a</sup>
۲۹/۱	۹۱/۴ <sup>bcd</sup>	def	۵۳۳/۱ <sup>cde</sup>	۰/ <sup>b</sup>	۸/۳ <sup>cd</sup>	۷۵/۷ <sup>d</sup>	۷۵/۷ <sup>d</sup>
۳۱/۹	۱۱۶/۵ <sup>abc</sup>	def	۵۱۳/۸ <sup>bcd</sup>	۰/ <sup>b</sup>	۹/۳ <sup>bc</sup>	۱۰۳/۲ <sup>a</sup>	۱۰۳/۲ <sup>a</sup>
۲۶/۰	۷۹/۱ <sup>cd</sup>	f	۴۲۸/۸ <sup>c</sup>	۰/ <sup>c</sup>	۶/۴ <sup>f</sup>	۷/۴ <sup>def</sup>	۷/۴ <sup>def</sup>
۳۲/۴	۱۰۰/۷ <sup>abc</sup>	abcd	۶۳۳/۷ <sup>bcd</sup>	۰/ <sup>cd</sup>	۸/۰ <sup>cd</sup>	۸۳/۰ <sup>cd</sup>	۸۳/۰ <sup>cd</sup>
۲۹/۹	۱۱۳/۹ <sup>abc</sup>	ab	۸۵۳/۳ <sup>a</sup>	۰/ <sup>b</sup>	۱۰/۰ <sup>abc</sup>	۱۰/۱/۱ <sup>abc</sup>	۱۰/۱/۱ <sup>abc</sup>
۲۵/۴	۸۶/۳ <sup>cde</sup>	abc	۷۴۹/۸ <sup>ab</sup>	۰/ <sup>b</sup>	۸/۴ <sup>cd</sup>	۷۳/۱ <sup>fg</sup>	۷۳/۱ <sup>fg</sup>
۳۱/۸	۱۰۰/۹ <sup>bcd</sup>	a	۷۳۶/۹ <sup>ab</sup>	۰/ <sup>b</sup>	۷/۷ <sup>def</sup>	۷/۳ <sup>ef</sup>	۷/۳ <sup>ef</sup>
۳۱/۰	۹۸/۷ <sup>bcd</sup>	f	۴۵۸/۸ <sup>e</sup>	۰/ <sup>cd</sup>	۷/۳ <sup>def</sup>	۷/۴ <sup>def</sup>	۷/۴ <sup>def</sup>
۲۶/۲	۸۵/۵ <sup>cde</sup>	f	/۱ <sup>de</sup>	۰/ <sup>bc</sup>	۸/۰ <sup>cd</sup>	۷/۳۳ <sup>fg</sup>	۷/۳۳ <sup>fg</sup>
۲۴/۰	۷۷/۴ <sup>ed</sup>	abcd	۶۸/۸/۲ <sup>abc</sup>	۰/ <sup>bed</sup>	۷/۸/۳ <sup>de</sup>	۷/۲/۱ <sup>g</sup>	۷/۲/۱ <sup>g</sup>
۳۱/۰	۱۰۴/۸ <sup>bcd</sup>	abcd	۶۳۷/۷ <sup>bcd</sup>	۰/ <sup>cd</sup>	۷/۸/۲ <sup>de</sup>	۷/۴/۹ <sup>bcd</sup> eebcde	۷/۴/۹ <sup>bcd</sup> eebcde
۳۵/۲	۱۴۱/۱ <sup>a</sup>	cdef	۶۹۹/۷/۱ <sup>abc</sup>	۰/ <sup>a</sup>	۱/۱/۲ <sup>fg</sup>	۱/۱/۲ <sup>fg</sup>	۱/۱/۲ <sup>fg</sup>
۱/	۲/۷/۲	۲/۶/۳	۳/۳/۹	۹/۴/۵	۷/۳ <sup>۰</sup>	۱/۱/۱	۱/۱/۱
۰/۱۳۷/۰	۰/۰۰۰۷	۰/۰۰۰۱<	< ۰/۰۰۰۱	< ۰/۰۰۰۱	< ۰/۰۰۰۱	< ۰/۰۰۰۱	< ۰/۰۰۰۱
N.S.	۳۲/۷/۸/۲	۴۲/	۱۷۵/۱۳	۰/	۱/۳۰۷۷	۰/۱۴۷۷	۱/۸۴۹۶
۱۷	۱۶	۱۸/۲	۲۰	۸/۲۷	۱/۸/۴	۱/۸/۱۳	۱/۷/۳۳
						CV	CV

- حروف مشابه در هر سوتون نشانه عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد می باشد.  
- جذب و غلظت به ازای یک بورده می باشد.

ریشه‌های نازک و شکننده که نقش عمدۀ ای در جذب عناصر غذایی دارند ناممکن و در تیمارهای مختلف متفاوت است. با این وجود مقایسات بیانگر افزایش وزن خشک ریشه به مقدار جزئی در تمامی تیمارها نسبت به تیمار شاهد می‌باشد ولی این افزایش معنی‌دار نیست. محققین نظری نارولا و همکاران، یاسمنی و همکاران، احمد و همکاران و همچنین راویکومار و همکاران نیز اثر تلقیح از توباكتر را روی وزن خشک، طول و سطح ریشه یک اثر مثبت گزارش نموده‌اند و آن را به تولید هورمون‌های محرك رشد توسط از توباكتر نسبت داده‌اند<sup>(۶)</sup>. نظرات متفاوتی در خصوص اثر IAA ۲۰ و ۲۵. میکروبی روی رشد ریشه وجود دارد. گروهی از محققین مانند باشان و دوبرووسکی و وسی و باس معتقد به افزایش رشد ریشه یعنی افزایش وزن ریشه می‌باشند<sup>(۷)</sup> و ۲۴). گروهی دیگر مانند ژرمان و همکاران و گلایک، افزایش سطح تماس ریشه و افزایش طول و تعداد ریشه‌های فرعی را به عنوان معیار رشد ریشه مطرح می‌کنند<sup>(۸)</sup> و ۱۱). فالیک و همکاران نیز افزایش تارهای کشنده و اثر آن روی افزایش سطح تماس را عنوان می‌کنند. طبق این گزارشات و بررسی‌های سایر پژوهشگران آنچه که در این مورد اهمیت خواهد داشت طول و سطح ریشه است زیرا افزایش این عوامل است که باعث نفوذ و جستجوی بیشتر ریشه در حجم وسیع‌تری از خاک می‌گردد. برای بررسی اثر باکتری‌های PGPR روی ریشه، علاوه بر بیomas لازم است طول و سطح ریشه نیز بررسی شود لذا استفاده از روش‌های کشت در محیط‌های مایع و نیمه جامد و همین طور آزمون‌های درون شیشه مانند آزمون طویل شدن ریشه در حضور باکتری ضروری به نظر می‌رسد<sup>(۹)</sup> و ۱۱). در مورد تعداد پنجه‌ها هر چند اثر تیمار معنی‌دار شده است اما این اختلاف ناشی از کاهش پنجه‌زنی در تعدادی از تیمارها نسبت به شاهد می‌باشد. در واقع اثر اعمال تیمار باکتری روی پنجه‌زنی منفی بوده است و بالاترین میزان پنجه‌زنی در خود تیمار شاهد مشاهده شد. این در حالی است که اثر تیمار روی تعداد سنبله معنی‌دار نشد و بین تیمار شاهد

عملکرد گیاه داشته باشد. تلقیح از توباكتر در کشت گندم روی صفاتی مانند ارتفاع نهایی بوته، تعداد و طول سنبله‌ها، وزن خشک ریشه، عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله اثری نداشت. هر چند میانگین‌ها اختلافاتی را نشان می‌دهد و تأثیر تلقیح مثبت بوده است لیکن این اختلاف به لحاظ آماری معنی‌دار نبود. از طرف دیگر تلقیح از توباكتر روی دیگر شاخص‌ها مانند سطح برگ بوته، ارتفاع گیاه جوان در مرحله رویشی، وزن هزار دانه، درصد پروتئین دانه، عملکرد بیولوژیک و جذب عناصر توسط گیاه تأثیر مثبت و معنی‌داری داشته است به گونه‌ای که نقش تعدادی از سویه‌های از توباكتر کروکوکوم در این میان بر جسته‌تر به نظر می‌رسد. در جدول ۱ تیمارهای انتخابی و دلایل انتخاب آنها مشخص شده است. در بین سویه‌های از توباكتر کروکوکوم جداسازی شده از خاک‌های استان چهار محال و بختیاری سویه‌های ۱۳، ۲۵ و ۷۲ دارای بالاترین توانایی تولید IAA بودند و در سویه ۵۳ میزان تولید اکسین در حدود نصف سویه‌های مذکور شده می‌باشد. در حالی که سویه ۵۷ قادر توانایی تولید IAA می‌باشد. بنابراین انتظار می‌رود سویه‌های ۱۳، ۲۵ و ۷۲ تأثیر بیشتری نسبت به سویه‌های ۵۳ و ۵۷ بر روی شاخص‌های رشد و عملکرد جذب گیاه داشته باشند. سویه‌های ۱۱ و ۴۸ سویه‌های تولید کننده HCN و سویه‌های ۲۳ و ۲۶ سویه‌های برتر از نظر تولید سیدروفور بودند که انتظار می‌رود این سویه‌ها به ویژه دو سویه اخیر بر روی جذب عناصری مانند آهن و روی تأثیر معنی‌داری داشته باشند و سویه‌های ۵، ۶۹ و ۸ به ترتیب دارای بالاترین پتانسیل ثبت بیولوژیک نیتروژن ملکولی بودند و سویه‌های ۱۷ و ۶۸ از توباكتر کروکوکوم قادر توانایی ثبت نیتروژن شناخته شدند.

در بررسی وزن خشک ریشه انتظار می‌رفت حداقل سویه‌های تولید کننده IAA تأثیر مثبتی روی وزن خشک ریشه داشته باشند اما تأثیر از توباكتر در این مورد معنی‌دار نشد. قضاؤت در این رابطه مشکل به نظر می‌رسد زیرا جدا نمودن کامل ریشه از خاک گلدان و همچنین جداسازی کامل

به تیمارهای ۸ و ۲۵ می‌باشد و تیمارهای ۵۳ و ۶۹ در رتبه بعدی قرار دارند. سویه شماره ۸ و ۶۹ سویه‌های برتر از نظر ثبیت نیتروژن و سویه ۲۵ دارای بالاترین پتانسیل تولید IAA در بین تمامی سویه‌ها می‌باشد. زامبر و همکاران افزایش درصد پروتئین دانه گندم را در اثر تلقیح از توباکتر در سطوح ۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هكتار کود نیتروژنی گزارش نمودند در حالی که زاید و همکاران اثر تلقیح از توباکتر را روی درصد پروتئین دانه گندم غیر معنی دار گزارش کردند(۲۶). مشابه با درصد پروتئین دانه میانگین وزن خشک اندام هوایی در تیمارهای ۷۲، ۲۵، ۸، ۱۳، ۲۵، ۸ و ۵ به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان می‌دهد. نتایج مشابهی در مورد افزایش معنی دار بیوماس اندام هوایی گندم در حضور از توباکتر کروکوکوم توسط زامبر و همکاران، حماد، راویکومار و همکاران، زاید و همکاران، یاسمین و همکاران، کادر و همکاران گزارش شده است(۱۲، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۲۶ و ۲۷). اثر مهم دیگری که از توباکتر کروکوکوم می‌تواند روی گیاه داشته باشد کمک به جذب بیشتر عناصر غذایی است. جذب عناصر غذایی اساس افزایش رشد و عملکرد گیاه خواهد بود. بالاترین مقدار جذب نیتروژن مربوط به تیمارهای ۸ و ۱۳ و در رده‌های بعدی ۲۵ و ۷۲ بوده است. بالاترین میزان جذب فسفر به ترتیب متعلق به تیمارهای ۷۲، ۲۵، ۸، ۲۶، ۱۳، ۱۱ و ۵ بود و در این میان نقش سویه ۷۲ برجسته‌تر می‌باشد. بیشترین جذب آهن به ترتیب مربوط به تیمارهای ۲۵، ۲۶، ۴۸، ۷۲ و ۸ و ۶۸ می‌باشد. تیمار شماره ۴۸ یک سویه از توباکتر کروکوکوم تولید کننده هیدروژن سیانید می‌باشد. سیانید یک لیگاند مناسب برای پیوند شدن با آهن است و یک کمپلکس پایدار تولید نموده، لذا قادر است تحرک آهن را در ریزوسفر افزایش دهد و در مجموع به نظر می‌رسد HCN رفتاری مشابه با سیدروفور از خود نشان می‌دهد(۵). جذب آهن در تیمار ۲۶ که توسط یک سویه تولید کننده سیدروفور تلقیح شده بود نیز نسبت به شاهد افزایش معنی دار نشان داد. ولی این مسأله در مورد تیمار ۲۳ صادق نمی‌باشد. هم‌چنین بیشترین مقدار جذب روی توسط گیاه به ترتیب مربوط به تیمارهای ۱۳، ۸، ۷۲، ۲۳، ۲۵، ۶۹ و ۴۸ می‌باشد. در کل می‌توان گفت در مورد جذب عناصر، اثر تعدادی از سویه‌های

و تیمارهای باکتری از نظر تعداد سنبله اختلاف معنی داری وجود نداشت. این مطلب بیانگر این نکته است که هر چند در تیمار شاهد تعداد پنجه‌ها بیشتر از سایر تیمارها می‌باشد اما پنجه‌های اضافه پنجه‌های نا بارور می‌باشند. چنانچه کاهش پنجه‌های نا بارور در اثر تلقیح از توباکتر باشد این مسأله ویژگی بسیار مثبتی تلقی می‌گردد زیرا حذف پنجه‌های نا بارور که فاقد سنبله می‌باشند می‌تواند منجر به تغذیه بهتر پنجه‌های بارور گردد.

در بین شاخص‌های رشد گیاه اثر تلقیح باکتری بر روی سطح برگ بوته معنی دار شد. گرچه سطح برگ بیشتر تحت تأثیر شرایط محیطی قرار می‌گیرد (۲۰) تا فعالیت باکتری‌ها در بخش ریزوسفر، لیکن با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق می‌توان گفت که باکتری‌های تولید کننده IAA و ثبیت کننده نیتروژن روی میزان سطح برگ تأثیر مثبت داشته‌اند. محققینی کلروفیل را به جای اندازه‌گیری میزان روی میزان سطح برگ توصیه نموده‌اند. اثر تلقیح از توباکتر روی ارتفاع بوته ۳۵ روزه معنی دار بود ولی این اثر روی ارتفاع نهایی بوته معنی دار نشد، در حالی که در یک بررسی کادر و همکاران اثر تلقیح از توباکتر را در سطح مختلف کود نیتروژنی بر روی ارتفاع نهایی بوته مثبت و معنی دار ارزیابی نمودند. بد- وی و آمر نیز ۲۴ درصد افزایش ارتفاع نهایی بوته را در اثر تلقیح باکتری، وزن هزار دانه فقط در تیمارهای ۲۵ و ۷۲ دارای بیشترین تفاوت معنی دار با شاهد بود. تیمارهای ۲۵ و ۷۲ سویه‌هایی با بالاترین پتانسیل تولید IAA می‌باشند و مطابق انتظار دارای اثر مثبت معنی داری بر روی وزن هزار دانه نسبت به سایر تیمارها و تیمار شاهد می‌باشند. زاید و همکاران نیز اثر مثبت سویه‌هایی از از توباکتر کروکوکوم دارای بیشترین پتانسیل تولید IAA را در حضور سطوح مختلف کودهای نیتروژنی، روی وزن هزار دانه مثبت و معنی دار گزارش نموده‌اند(۲۶).

بر طبق نتایج به دست آمده اثر تیمار باکتری روی درصد پروتئین دانه معنی دار شده است و بیشترین درصد پروتئین مربوط

## جدول ۵. خلاصه اثر سویه‌های برتر از توباکتر بر روی شاخص‌های رشد و عملکرد گندم در شرایط گلخانه

ردیف شماره تاریخ روزه	شاخص‌های معنی دار شده									
	آنتی‌ بیوتیک	آنتی‌ بیوتیک	وزن گلخانه	وزن گزارش	وزن نیتروژن	وزن پتیون	نیتروژن کل	نیتروژن نیتروز	نیتروژن نیتروز	نیتروژن نیتروز
۱۳	۷۲	۷۲	۲۵	۲۵	۸	۷۲	۲۵	۷۲	۷۲	۷۲
	۲۵	۲۵	۷۲	۸	۱۳	۲۵	۲۶	۸	۹	۹
	۶۹	۱۳		۵۳	۲۵	۸	۴۸	۱۳	۱۳	۱۳
	۸	۸		۶۹	۷۲	۱۳	۷۲	۲۵	۲۳	۲۳
		۵				۲۶	۸	۶۸	۶۹	۴۸
						۱۱				
										۵

سطح ریشه و در نتیجه افزایش جذب عناصر غذایی وجود دارد که پیشتر به آنها اشاره شد. احتمالاً سویه‌های ۱۳، ۷۲ و ۲۵ با تولید و ترشح هورمون‌های گیاهی مانند اکسین باعث افزایش سطح ریشه گیاه و متعاقباً افزایش جذب آب و عناصر و افزایش عملکرد گیاه می‌شوند. هم‌چنین سویه ۸ از توباکتر کروکوکوم یکی از سویه‌های برتر از نظر تثیت نیتروژن ملکولی بوده و مطابق انتظار اثر مثبتی روی شاخص‌های رشد و عملکرد گیاه، بویژه بر روی میزان جذب نیتروژن توسط گیاه، داشته است که منطقی به نظر می‌رسد. در حالی که سویه‌های ۵ و ۶۹ از توباکتر کروکوکوم دارای بالاترین پتانسیل تثیت نیتروژن ملکولی حتی بیشتر از سویه شماره ۸ می‌باشند و به جز در دو مورد اثر چشمگیری روی رشد گیاه نداشته‌اند. که علت آن را احتمالاً می‌توان به عدم کلونیزاسیون موفق باکتری در منطقه ریشه نسبت داد. در صورت وجود چنین احتمالی باکتری باید در منطقه ریزوسفر ردیابی شود تا از عدم وجود آن اطمینان حاصل گردد. البته این احتمال نیز وجود دارد که سویه ۸ از طریق مکانیسم‌های دیگری غیر از تثیت نیتروژن روی رشد گیاه تأثیر گذاشته است. فرضیه دیگر در این زمینه عدم سازگاری این سویه‌ها با ژنوتیپ گندم انتخاب شده در این طرح می‌باشد. راویکومار و همکاران نیز گزارش دادند پاسخ ژنوتیپ‌های مختلف یک گیاه به تلقیح یک سویه از توباکتر متفاوت

اکسینی و تثیت کننده نیتروژن چشمگیر می‌باشد. افزایش مقدار جذب عناصر در حضور سویه‌های مختلف از توباکتر کروکوکوم با نتایج به دست آمده توسط تعدادی از محققین از جمله نارولای و همکاران و حماد مطابقت نشان می‌دهد. طبق گزارش‌های این محققین تلقیح گندم توسط ازتو باکتر در سطوح مختلف کود نیتروژنی و فسفره مقدار جذب این عناصر را به صورت معنی‌داری نسبت به تیمار شاهد افزایش داده است. کشیرساگار و همکاران اثر تلقیح از توباکتر کروکوکوم را همراه با باکتری‌های حل کننده فسفات در افزایش جذب فسفر انجام یافته توسط باکتری‌های حل کننده فسفات مفید ارزیابی نمودند(۱۶). در جدول ۵ خلاصه اثر شاخص‌های معنی‌دار شده در این تحقیق و سویه‌های از توباکتر دارای آثار معنی‌دار روی این شاخص‌ها نشان داده شده است.

در این جدول سویه ۲۵ در درجه اول، سویه‌های ۷۲ و ۸ در درجه دوم و سویه ۱۳ در درجه سوم بیشترین آثار معنی‌دار را به خود اختصاص داده‌اند. سویه‌های ۷۲، ۱۳ و ۲۵ دارای بالاترین پتانسیل تولید هورمون اکسین در بین سایر سویه‌ها بودند. همان‌طور که در قبل اشاره شد مطالعات متعددی در مورد تولید فیتوهورمون‌هایی مانند اکسین توسط از توباکتر و اثر آنها روی افزایش

از از توباکتر کروکوکوم که دارای پتانسیل‌های محرک رشد گیاه می‌باشد نسبت به سویه‌های فاقد این پتانسیل‌ها اثر مثبتی روی برخی شاخص‌های رشد و عملکرد گندم خواهد داشت و فرایند غالب محرک رشد گیاه در سویه‌های مورد بررسی در آزمون گلخانه در درجه اول به تولید هورمون‌های محرک رشد گیاه توسط از توباکتر و افزایش سطح جذب ریشه‌ها و در درجه دوم ثبت نیز افزایش بیولوژیک نیتروژن نسبت داده می‌شود. به عنوان مثال سویه‌های ۱۳، ۲۵ و ۲۷ به خصوص دو سویه آخر در بسیاری از صفات مطالعه شده باعث افزایش معنی‌داری نسبت به شاهد شده‌اند. سویه‌های ۲۵ و ۲۶ دارای بالاترین پتانسیل تولید هورمون اکسین در بین سایر سویه‌ها بودند و سویه‌هایی مانند سویه‌ای ۱۷، ۶۸ و ۵۷ که فاقد یک سری پتانسیل‌های محرک رشد گیاه معرفی شدند در آزمون گلخانه‌ای نیز تأثیری روی رشد و عملکرد گیاه نداشتند. هم‌چنین در بین سویه‌های برتر نیز برخی سویه‌ها کارآبی لازم را در رشد گیاه نداشته‌اند. بنابراین ضرورت دارد که در تولید کودهای بیولوژیک حتماً از سویه‌هایی با پتانسیل‌های بالای محرک رشد گیاه مانند سویه‌های برتر تولید کننده IAA، سویه‌های برتر حل کننده فسفات و غیره استفاده شود. در غیر این صورت کود بیولوژیک تهیه شده بی اثر یا دارای کارآبی ناچیزی خواهد بود. هم‌چنین ضرورت دارد عملکرد سویه‌های برتر علاوه بر آزمون‌های درون شیشه‌ای و گلخانه‌ای توسط آزمایش‌های مزرعه‌ای در چند نوع خاک و انواع مختلف ارقام گندم بررسی شود. در پایان می‌توان به این نکته اشاره کرد که هر چند اثر تلقیح از توباکتر اثر معنی‌داری بر روی عملکرد دانه در گیاه که مهم‌ترین فاکتور عملکرد گیاه زراعی می‌باشد نداشته است ولی باعث افزایش جذب عناصر غذایی و درصد پروتئین دانه و در نهایت کیفیت محصول در سطح گلخانه شده است و تحقیقات کامل‌تر در این زمینه و به ویژه در سطوح مزرعه‌ای نتایج اقتصادی ارزشمندی را در رابطه با کودهای بیولوژیک در اختیار ما خواهد گذاشت.

می‌باشد. هم‌چنین زاید و همکاران نشان داند در بین ژنتیپ‌های مختلف گندم پاییزه تعدادی از ژنتیپ‌ها پاسخ بهتری به تلقیح از توباکتر نشان می‌دهند و پاسخ این ژنتیپ‌ها به سویه‌های مختلف از توباکتر متفاوت می‌باشد. ساریچ و همکاران رابطه بین ژنتیپ گیاهی و سویه وابسته را به ویژگی‌های مشارکتی در سیستم مشارکت نسبت دادند. در مورد مقدار آهن جذب شده توسط گیاه نیز یک سویه اکسینی پیش‌تاز می‌باشد. اما در تیمارهای ۴۸ و ۲۶ نیز افزایش جذب آهن نسبت به تیمار شاهد مشاهده می‌شود. این مطلب می‌تواند نشانگر نقش سویه‌های تولید کننده سیدروفور در افزایش جذب آهن توسط گیاه باشد. البته بر اساس نتایج به دست آمده قضاوت در مورد نقش سیدروفور در افزایش آهن جذب شده توسط گیاه عملاً امکان پذیر نیست و اثر سایر مکانیسم‌های مؤثر در مورد جذب آهن را نبایستی نادیده گرفت و لذا تحقیقات بسیار پیشتره و کامل‌تری برای اثبات این فرضیه رابطه بین آهن گیاه و سیدروفور میکروبی لازم است. اما آنچه که این جا حائز اهمیت است اثر مثبت باکتری روی جذب آهن می‌باشد. سویه ۱۱ مانند سویه ۴۸، تولید کننده HCN بوده ولی تأثیری روی جذب آهن نداشته است. سه دلیل احتمالی برای توجیه این اثر ممکن است وجود داشته باشد: احتمال اول این که سویه ۱۱ دارای قدرت کلینیزاسیون کمتری نسبت به سویه‌های مشابه با خود داشته و توانایی رقابت و رشد در محیط ریزوسفر نداشته است و احتمال دوم این که افزایش غلظت جذب آهن توسط گندم در تیمار ۴۸ ناشی از فرایندهای ذکر شده نباشد و در فرض سوم می‌توان به عدم سازگاری سویه ۱۱ با گیاه اشاره نمود که هر سه این احتمالات نیاز به بررسی‌های بیشتر در منطقه ریزوسفر خواهد داشت.

آنچه در جدول ۵ به وضوح دیده می‌شود این است که در این بررسی جذب عناصر در خاک بیشتر از سایر مؤلفه‌های رشد و عملکرد گیاه تحت تأثیر فعالیت‌های میکروبی قرار گرفته است. نتیجه‌گیری کلی از داده‌های به دست آمده نشان می‌دهد سویه‌هایی

#### منابع مورد استفاده

۱. چهارمین کتاب سال کشاورزی ایران. آمار تولیدات و عملکرد سال زراعی ۷۹-۱۰. انتشارات پارس گل، تهران.

۲. خسروی، ه.، ۱۳۸۰. تثیت ازت توسط میکروارگانیسم‌های آزادی. ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژیک در کشور مجموعه مقالات ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژیک در کشور. نشر آموزش کشاورزی، کرج.
۳. خسروی، ه.، ن. صالح راستین و م. محمدی. ۱۳۷۹. بررسی فراوانی، انتشار و برخی خصوصیات فیزیولوژیک از توباکتر کروکوکوم در خاک‌های زراعی استان تهران. مجله علوم خاک و آب (۷): ۸۶-۹۶.
۴. رجایی، س. ۱۳۸۴. پتانسیل کاربرد سویه‌های از توباکتر کروکوکوم بومی به عنوان کود بیولوژیک محرك رشد گیاه (PGPB) در برخی گندم زارهای استان چهارمحال و بختیاری. پایان نامه کارشناسی ارشد خاک‌شناسی، دانشگاه شهرکرد، کرج.
۵. علیخانی، ح.، و ن. صالح راستین. ۱۳۸۰. ضرورت تولید انبوه کودهای بیولوژیک محرك رشد گیاه PGPB در راستای نیل به کشاورزی پایدار. مجموعه مقالات ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژیک در کشور، نشر آموزش کشاورزی، کرج.
6. Ahmad, F., I. Ahmah and M. S. Khan. 2005. Indole acetic acid production by the indigenous isolated of *Azotobacter* and *Fluorescent Pseudomonas* in the presence and absence of Tryptophan. Turk. J. Biol. 29: 29-34.
  7. Badawy, F. H. and S. B. Amer. 1977. The effect of inoculation with *Azotobacter* on the growth of wheat and tomato plants. Libyan J. Agric. 3: 141-143.
  8. Bashan, Y. and J. G. Dubrovsky. 1996. *Azospirillum* spp. Participation in dry matter partitioning in grasses at the whole plant level. Biol. Fertil. Soils 23: 435-440.
  9. Fallik, E., S. Sarig and Y. Okon. 1994. Morphology and physiology of plant roots associated with *Azospirillum*. In *Azospirillum/plant associations*. Fertil. Soils 32: 259-264.
  10. German, M. A., S. Burdman, Y. Okon and J. Kigel. 2000. Effects of *Azospirillum brasiliense* on root morphology of common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) under different water regimes. Biol. Fertil. Soils 32: 259-264.
  11. Glick, B. R. 1995. The enhancement of plant growth by free-living bacteria. Can. J. Microbiol. 41: 109-117.
  12. Hammad, A. M. 1998. Evaluation of alginic-encapsulated *Azotobacter chroococcum* as a phage-resistant and an effective inoculum. J. Basic Microbiol. 38: 9-16.
  13. Idris, M. 2003. Effect of integrated use of mineral, organic N and *Azotobacter* on yield, yield components and N-nutrition of wheat (*Triticum aestivum* L.). P.J.B.S. 6: 539-543.
  14. Jones, B. J., Labratory Guide for Conducting Soil Tests and Plant Analysis. CRC Press., London.
  15. Kader, M. A., M. H. Main and M. S. Hoque. 2002. Effects of *Azotobacter* inoculant on the yield and nitrogen uptake by wheat. O. J. Biologic. Sci. 2: 259-261.
  16. Kshirsagar C. R., V.K. Mandhare, H. B. Kalbhor and P.L . Patil. 1994. Response of onion to *Azotobacter* and VA-mycorrhizal inoculation along with phosphorus levels. J. Maharashtra Agric. Univ. 19: 476-477.
  17. Kumar, V., A. N. Kumar and B. P. Singn. 2000. Performance and persistence of phosphate solubilizing *Azotobacter chroococcum* in wheat rhizosphere. Folia-Microbiol. 5: 343-347.
  18. Mrkovacki, N. and V. Milic. 2001. Use of *Azotobacter chroococcum* as potential useful in agricultural application. Ann. Microbiol. 51: 145- 158.
  19. Narula, N., V. Kumar, R. K. Behl, A. Deubel, A. Gransee and W. Merbach. 2000. Effect of P-solubilizing *Azotobacter chroococcum* on N, P and K uptake in P-responsive wheat genotypes grown under greenhouse conditions. J. Plant Nutr. 163: 393-398.
  20. Ravikumar, S., K. Kathiresan, S. T. M. Ignatiammal, M. B. Selvam and S. Shanthy. 2004. Nitrogen-fixation *Azotobacters* from mangrove habitat and their utility as marine biofertilizers. J. Exp. Marine Biol. and Ecol. 15: 157-160.
  21. Sarig, M. R., Z. Sarig M. Govedarica. 1988. Efficiency of strain combination of different genera of nitrogen fixing bacteria on sunflower genotypes. In: 12th Intern. Sunflower Conference, Novi Sad. pp: 187-191.
  22. Soliman, S., M. A. Seeda, S. S. M. Aly and A. M. Gadalla. 1995. Nitrogen fixation by wheat plant as affected by nitrogen fertilizer levels ana nonsymbiotic bacteria. Egypt. J. S. Sci. 35: 401-413.
  23. Vessey, J. K. 2003. Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. Plant Soil 255: 571-586.
  24. Vessey, J. K. and T. J. Buss. 2002. *Bacillus cereus* UW85 inoculation effects on growth, nodulation and N accumulation in grain legumes. Controlled-environment studies. Can. J. Plant Sci. 82: 282-290.
  25. Yasmin, S., M. A. R. Bakar, K. A. Malik and F. Hafeez. 2004. Isolation, characterization and benefical effects of rice associated plant growth promoting bacteria from Zanibar soils. J. Basic Microbiol. 44: 241-252.
  26. Zaied, K. A., A. H. Abd-El-Hady, A. H. Afify and M. A. Nassef. 2003. Yield and nitrogen assimilation of winter wheat inoculated with new recombinant inoculants of rhizobacteria. Pakistant J. Biologic. Sci. 6: 344-358.
  27. Zamber, M. A., B. K. Konde and K. R. Sonar. 1984. Effect of *Azotobacter chroococcum* and *Azospirillum brasiliense* inoculation under graded levels of nitrogen on growth and yeild of wheat. Plant Soil 79: 61-67.