

بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام لوبيا قرمز به تأخیر در کاشت در منطقه میانه (*Phaseolus vulgaris L.*)

محمد صالحی^{۱*}، رحیم اکبری^۲ و محمد باقرخورشیدی بنام^۳

(تاریخ دریافت: ۱۳۸۵/۱۲/۵؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۶/۵/۹)

چکیده

به منظور بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام لوبيا قرمز (*Phaseolus vulgaris L.*) به تأخیر در کاشت، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در ۳ تکرار در مزرعه تحقیقی ترویجی جهاد کشاورزی شهرستان میانه در سال زراعی ۱۳۸۴-۱۳۸۵ به اجرا درآمد. فاکتور اول شامل ۳ رقم لوبيا قرمز (نان، گلی و صیاد) و فاکتور دوم شامل سه تاریخ کاشت (۱۵ و ۳۰ اردیبهشت و ۱۵ خرداد) بودند. نتایج حاصل از تعزیزه واریانس صفات اندازه‌گیری شده نشان داد که تأثیر رقم و تاریخ کاشت روی تمامی صفات اندازه‌گیری شده معنی دار می‌باشد. اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت برای صفات ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، وزن ۱۰۰ دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در سطح احتمال ۱٪ و برای تعداد دانه در غلاف اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۵٪ مشاهده گردید. مقایسه میانگین صفات نشان داد که رقم صیاد در تاریخ کاشت اول با $4033/3$ کیلوگرم در هکتار بیشترین و رقم گلی در تاریخ کاشت سوم با $1500/2$ کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند و با تأخیر در کاشت تمامی صفات اندازه‌گیری شده کاهش پیدا کردند. مطالعه ضریب همبستگی صفات نشان داد که عملکرد دانه با تمامی صفات مورد بررسی به غیر از ارتفاع بوته، وزن صد دانه و درصد پروتئین، همبستگی مثبت و معنی داری داشت.

واژه‌های کلیدی: عملکرد و اجزای عملکرد دانه، تاریخ کاشت، ارقام لوبيا قرمز، درصد پروتئین

مقدمه

تولید گیاهان زراعی است. این اهمیت به دلیل شدت تأثیر عوامل روی ژنتیک‌های مختلف برای دستیابی به پتانسیل تولید می‌باشد. معمولاً تاریخ کاشت با سایر مدیریت‌های زراعی اثر متقابل نشان می‌دهد (۱۴ و ۱۶).

تصور آن است که انواع گوناگون لوبيای قرمز از نظر

لوبيا گیاهی با نام علمی *Phaseolus vulgaris L.* و متعلق به تیره Fabaceae است. تعیین زمان صحیح کاشت گیاهان زراعی تحت تأثیر عوامل اقلیمی مختلف از قبیل بارش، دما و طول روز قرار دارد و یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مدیریتی لازم برای

- دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و در حال حاضر عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
 - کارشناس ارشد زراعت، جهاد کشاورزی میانه
 - استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان شرقی
- * : مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: mohsale@gmail.com

تاریخ‌های مختلف کشت از نظر تأثیر روی وزن صد دانه و تعداد دانه در بوته تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (۶). موسوی اظهار نموده است که با تأخیر در کاشت لوبيا، طول دوره رشد گیاهان به دلیل افزایش دمای محیط، کوتاه شده و در نتیجه منجر به کاهش تعداد غلاف، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه و در نهایت کاهش عملکرد دانه گردید (۱۰). در بررسی به عمل آمده توسط صالحی مشخص گردید که تأخیر در کاشت موجب کاهش تعداد غلاف در بوته، وزن صد دانه و عملکرد دانه گردید در حالی که شاخص برداشت افزایش معنی‌داری از خود نشان داد (۴). وی اظهار نموده است که پایین بودن درجه حرارت در اوایل دوره رشد، سبب کندی رشد گیاه‌چه‌ها گردیده و آسیب‌پذیری آن را در برابر تنشهای زنده و غیر زنده افزایش می‌دهد. هم‌چنین مصادف شدن زمان رسیدن تاریخ کاشت چهارم با سرمای زودرس پائیزه (اوخر شهریور) علاوه بر کاهش میزان عملکرد، موجب سبز خشک ماندن دانه‌ها در غلاف شده و از بازار پستدی محصول کاسته می‌شود. در این مطالعه تعداد بذر در غلاف و درصد پروتئین دانه تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار نگرفت. هدف از این تحقیق، بررسی واکنش اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنتیک‌های مختلف لوبيا قرمز به افزایش دمای ناشی از تأخیر در کاشت می‌باشد.

مواد و روش‌ها

به منظور بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام لوبيا قرمز (*Phaseolus vulgaris* L.) به تأخیر در کاشت، در سال ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقی ترویجی جهاد کشاورزی شهرستان میانه واقع در ۳۷ تا ۳۷/۵۵ درجه عرض شمالی و ۴۷/۱۱ تا ۴۸/۱۸ درجه طول شرقی در دامنه رشته کوه‌های بزغوش و قافلانکوه در استان آذربایجان شرقی، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه بلوك‌های کامل تصادفی با ۳ تکرار و ۲ فاکتور شامل رقم در سه سطح (ناز، گلی و صیاد) که از ایستگاه تحقیقات ملی لوبيای خمین تهیه شده بود و تاریخ کشت در سه سطح (۱۵ و ۳۰ اردیبهشت و ۱۵ خرداد) اجرا

سازگاری به دمای زیاد متفاوت‌اند، از این رو ممکن است واکنش آنها به تأخیر در کاشت متفاوت باشد. هدف، یافتن زمان کاشت رقم یا گروهی از ارقام مشابه یک گیاه است، به طوری که مجموعه عوامل محیطی حادث در آن زمان برای سبز شدن، استقرار و بقای گیاه‌چه مناسب باشد و در ضمن حتی الامکان گیاه در هر مرحله از رشد با شرایط مطلوب رویه‌رو گردد و با شرایط نامساعد محیطی نیز برخورد نکند. بهترین تاریخ کاشت، منجر به حصول عملکرد بالاتری در مقایسه با سایر تاریخ‌های کاشت می‌گردد (۲). تعداد غلاف در بوته در گیاه لوبيا یکی از مهم‌ترین اجزای عملکرد می‌باشد. در آزمایش‌های به عمل آمده روی لوبيا، اثر تاریخ کاشت روی تعداد غلاف در بوته معنی‌دار بوده است و در بیشتر مواقع تاریخ‌های کشت زود، تعداد غلاف بیشتری در هر بوته داشتند (۶ و ۸). تعداد غلاف در لوبيا علاوه بر سایر عوامل، به تاریخ کاشت و رقم نیز بستگی دارد و تحت تأثیر عوامل فوق، ممکن است تا بیش از ۴ برابر تغییر کند. کن و همکاران اظهار داشتند که افزایش دما طی دوره رشد و تشکیل غلاف، سبب افزایش ارتفاع گیاه می‌شود. هم‌چنین در تاریخ‌های کاشت اواسط فصل نسبت به تاریخ‌های خیلی زود یا خیلی دیر، ارتفاع بوته‌ها بلندتر می‌شود (۱۵). در مطالعه این محققین، تجمع ماده خشک در چهار رقم مورد آزمایش، با تأخیر در کاشت (از اوایل اردیبهشت تا اوایل تیر) تقریباً نصف شد. میزان تجمع ماده خشک در دانه تحت تأثیر تاریخ کشت، ژنتیک و اثر متقابل آنها قرار می‌گیرد. با تأخیر در تاریخ کاشت به علت تغییر فتوپریود، تنفس رطوبتی و رقابت، اندازه گیاهان تغییر می‌کند، ولی شاخص برداشت تقریباً ثابت می‌ماند (۱۵). سینگ اظهار کرد که عملکرد لوبيا به ازای هر روز کاهش در مدت رسیدگی، حدود ۷۲ کیلوگرم در هکتار کاهش یافت و افزایش تعداد روز تا رسیدگی موجب افزایش عملکرد آن شد (۲۲). قبری و طاهری مازندرانی در آزمایشی روی لوبيا مشاهده کردند که ارتفاع گیاه و تعداد روز تا رسیدن کامل، با تأخیر در کاشت کاهش می‌یابد و عملکرد دانه در تاریخ کاشت زود (۳۰ اردیبهشت) بیشترین بود. در این آزمایش بین

(Harvest Index) نیز با استفاده از فرمول زیر در مورد هر

$$\text{تیمار تعیین گردید:} \\ \frac{\text{عملکرد اقتصادی}}{\text{عملکرد بیولوژیک}} \times 100 = \text{HI}$$

برای اندازه‌گیری میزان پروتئین دانه بخشی از بذرها به دست آمده از هر کرت آسیاب شده و با استفاده از دستگاه اینفرماتیک (Inframatic) که برای پروتئین کالبیره شده بود، درصد پروتئین آنها تعیین گردید.

در پایان به منظور تجزیه واریانس داده‌های خام، مقایسه میانگین‌ها و همبستگی بین صفات مورد مطالعه، از نرم افزارهای SPSS و MSTATC استفاده گردید.

نتایج و بحث

ارتفاع بوته

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم و تاریخ کاشت و نیز اثر متقابل رقم در تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد معنی دار می‌باشد (جدول ۲). بیشترین ارتفاع بوته در تاریخ کاشت ۱۵ اردیبهشت با ۸۸/۷ سانتی‌متر و کمترین آن در تاریخ کاشت ۱۵ خرداد با ارتفاع ۷۴ سانتی‌متر مشاهده گردید. هانگ و همکاران اظهار داشتند که کاهش ارتفاع ساقه عمده‌تا می‌تواند ناشی از کوتاه شدن فواصل میانگرهای در اثر تغییر طول روز باشد (۲۳). به طور کلی تأثیر در کاشت سبب کاهش ارتفاع بوته به علت کاهش طول دوره رشد رویشی گیاه شد. بالاترین ارتفاع بوته در بین ارقام مطالعه شده مربوط به رقم صیاد با ۱۰/۷۸ سانتی‌متر و پایین‌ترین آن مربوط به رقم ناز با ۵۲/۰۱ سانتی‌متر بود (جدول ۴). مقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم نشان داد که رقم صیاد در تاریخ کاشت اول و رقم ناز در تاریخ کاشت سوم به ترتیب با ۱۲۱/۶ و ۴۸/۸ سانتی‌متر، بالاترین و پایین‌ترین ارتفاع بوته را به خود اختصاص دادند (جدول ۳).

عملکرد بیولوژیک

تاریخ کاشت اول، بیشترین عملکرد بیولوژیک و تاریخ کاشت

گردید. مشخصات میانگین حداقل و حداکثر دما، رطوبت نسبی و میزان بارندگی در طول انجام آزمایش در جدول ۱، منعکس گردیده است. عملیات تهیه زمین به ترتیب شامل شخم عمیق پائیزه در سال قبل، شخم و دیسک بهاره و کودپاشی ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود ازت انجام شد. جهت جلوگیری از تاثیر کرت‌های مختلف روی یکدیگر بین هر کرت فاصله‌ای به عرض یک متر در نظر گرفته شد. فواصل ردیف‌های کاشت ۴۰ و ۵ سانتی‌متر براساس عرف زارع در نظر گرفته شد. عملیات کشت به صورت دستی انجام و بذرها قبل از کشت با قارچکش ویتاواکس به نسبت دو در هزار ضدعفونی شدند. در طول دوره رشد در مزرعه برای کترل علف‌های هرز دو بار وجین دستی صورت گرفت. جهت مبارزه با آفات و بیماری‌هایی احتمالی نظیر مینوز و سفیدک از سموم متاسیتوکس و بنومیل استفاده به عمل آمد.

صفات مربوط به عملکرد و اجزای عملکرد دانه

پس از رسیدگی فیزیولوژیک و قهوه‌ای شدن $\frac{3}{4}$ غلاف‌های گیاه در کلیه کرت‌ها با حذف ردیف‌های کناری هرکرت به عنوان اثر حاشیه و حذف یک متر از بالا و یک متر از پایین هر کرت از ۳ ردیف وسط انجام گردید. برای اندازه‌گیری صفات تعداد ۱۰ بوته از هر کرت به طور تصادفی انتخاب و صفات زیر در آنها تعیین گردید:

ارتفاع بوته، تعداد شاخه‌های فرعی، تعداد غلاف در بوته، طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، وزن ۱۰۰ دانه (میانگین ۳ نمونه ۱۰۰ تایی)، تعداد روز تا رسیدن کامل. برای اندازه‌گیری وزن خشک اندام‌های هوایی بوته (عملکرد بیولوژیک) ۰ بوته در مرحله رسیدگی به طور تصادفی انتخاب و از محل طوقة قطع نموده و برای خشک شدن به مدت حداقل ۲۴ ساعت در دمای ۷۵ درجه سانتی‌گراد داخل آون گذاشته شدند و بعد از توزین، وزن خشک اندام‌های هوایی برای هر کرت تعیین گردید. هم‌چنین دانه‌های بوجاری شده در زمان برداشت، توزین گردید و عملکرد دانه در بوته تعیین شد. شاخص برداشت

جدول ۱. مشخصات میانگین حداقل و حداکثر دما، رطوبت نسبی و میزان بارندگی در طول انجام آزمایش (سال ۸۴-۱۳۸۵)

ساعت آفتابی	میزان تبخیر از کلاس A (میلی متر)	میزان بارندگی (میلی متر)	میزان BX	میانگین حداقل			ماه
				درجه حرارت هوا (سانتی گراد)	رطوبت نسبی بر حسب درصد ۱۲/۳۰ ظهر / ۱۸/۳۰ عصر	میانگین حداقل ۱۱/۲	
۱۸۷/۴	-	۳۵	۳۶/۰	۳۰/۰	۸۱/۰	۱۱/۲	۲ فروردین
۲۶۷/۲	۱۴۳/۳	۲۶	۳۷/۳	۳۰/۵	۷۰/۹	۱۸/۳۰	۳/۲ اردیبهشت
۳۲۰/۷	۳۰۶	۳۸	۳۲/۱	۲۱/۱	۷۲/۷	۲۴/۶	۶/۸ خرداد
۳۳۴	۳۸۰	۲۲	۴۰/۴	۲۸/۹	۶۲/۱	۲۸/۱	۱۳/۹ تیر
۳۴۰/۱	۴۳۰	-	۲۵/۱	۱۸/۷	۶۱/۶	۳۰/۹	۱۳/۴ مرداد
۳۵۰/۳	۴۴۱/۱	۳/۵	۳۰/۷	۲۱/۱	۶۳/۵	۲۵/۵	۸/۱ شهریور

منبع: اداره سنتوپتیک و هواشناسی شهرستان میانه

وجود همیستگی مثبت و معنی دار بین صفات تعداد شاخه فرعی و طول غلاف، همچنان که در این تحقیق مشاهده شده (جدول ۶)، توسط سانتالا و همکاران نیز گزارش شده است (۲۱).

طول غلاف

از نظر طول غلاف، اثر رقم در سطح احتمال ۵ درصد و اثر تاریخ کاشت در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود، در حالی که اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت اختلاف معنی داری را نشان نداد (جدول ۲). نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که رقم صیاد با ۱۱/۱ سانتی متر بیشترین طول غلاف را در بین ارقام دیگر داشته است (جدول ۴). همچنان مشاهده می شود که با تأخیر در تاریخ کاشت، صفت طول غلاف نیز همانند صفات ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف کاهش یافته است (جدول ۵). با توجه به جدول مقایسه میانگین، اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم (جدول ۳)، که رقم صیاد در تاریخ کاشت اول با ۱۲/۳ سانتی متر بیشترین طول غلاف را داشته است و رقم گلی در تاریخ کاشت سوم با ۹/۶ سانتی متر کمترین طول غلاف را به خود اختصاص داده است و نیز در هر سه رقم با تأخیر در کاشت صفت طول غلاف به دلیل کاهش دوره رشد

سوم دارای کمترین عملکرد بیولوژیک بود (جدول ۵). چنین به نظر می رسد که تأخیر در کاشت سبب برخورد رشد رویشی گیاه با گرما و احتمالاً جلو افتادن مراحل رشد زایشی و کوتاه شدن دوره رشد رویشی و در نتیجه کاهش عملکرد بیولوژیک در لوبيا گردیده است. نتایج مشابهی توسط موسوی و قنبری و همکاران گزارش شده است (۶ و ۱۰). در تحقیق انجام شده توسط نظامی افزایش بیشتر عملکرد بیولوژیک در تاریخ کاشت اول، ناشی از رشد گیاه و شاخه های جانبی بوده است (۱۱). در بین سه رقم کاشته شده، عملکرد بیولوژیک در رقم صیاد نسبت به دو رقم دیگر بیشتر بود و رقم گلی کمترین مقدار عملکرد بیولوژیک را تولید کرد (جدول ۴).

تعداد شاخه فرعی اولیه

نتایج نشانگر اثر معنی دار رقم و تاریخ کاشت بر این صفت در سطح احتمال یک درصد بود (جدول ۲) و با تأخیر در کاشت از تعداد شاخه های فرعی کاسته شده است. احتمالاً کاهش تعداد شاخه های فرعی در بوته به زودرس بودن ارقام مورد آزمایش و اختلافات ژنتیکی آنها مربوط می شود. رقم صیاد در تاریخ کاشت اول و رقم گلی در تاریخ کاشت سوم بترتیب بیشترین و کمترین تعداد شاخه های فرعی را داشته است (جدول ۳).

جدول ۲. تجربه واریانس ناشر رقم و تاریخ کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه در لوپیا قرمز

میانگین مربعات

میانگین مربعات	تمیزی دانه در غلاف	تمیزی غلاف در بورتہ	طول غلاف	تمیزی شانه فرعی اولیه	عملکرد بیولوژیک	ارتفاع بورتہ	ارتفاع بورتہ	درجہ آزادی	منابع تغییرات
۰/۸۸۴ ns	۰/۹۹	۰/۷۴ ns	۰/۹۹	۱/۴۲*	۰/۸۰۶۰	۰/۸۳ ns	۰/۸۰۶۰	۲۹/۳۷**	نکار
۱/۵۹۳ **	۱/۴۵۷ **	۰/۹۱۴ *	۰/۹۱۴ *	۵/۸۱۵ **	۱/۱۷۸۲۷۷/۲۷/۲۷	۰/۳۵**	۰/۸۰۷۴**	۷۰/۳۵**	فакتور A (رقم)
۸/۴۲۶ **	۱/۳۷۱ **	۰/۴۵۱ **	۰/۴۵۱ **	۶/۳۰۷ **	۱/۲۵۴۴۰/۹/۶۲	۰/۴۰**	۰/۸۹۳۳**	۴۰/۵۵**	فакتور B (تاریخ کاشت)
۰/۴۸۱ *	۰/۶۳۴ **	۰/۱۶۸ *	۰/۱۶۸ *	۰/۲۵۹ ns	۰/۸۹۲۱۲۱/۱/۵۴	۰/۴۵**	۰/۷۷۸۸**	۷۷/۷۸**	اثر متقابل A × B
۰/۱۹۰	۰/۱۰۱	۰/۱۴۰	۰/۱۴۰	۰/۲۳۱	۰/۳۰۴۸/۷/۵۲۹	۰/۵۲۹	۰/۹۳۵۳	۹/۳۵۳	اشتباه آزمایشی
۸/۸۷۸	۱/۱۱۷	۱/۴۶	۱/۴۶	۱/۰/۶۵	۱/۱۲/۸/۶	۱/۰/۶۵	۱/۱۲/۸/۶	-	ضریب تغییرات (CV)

*، ** و ns : به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال ۱٪، ۵٪ و غیر معنی دار

ادامه جدول ۲. تجربه واریانس ناشر رقم و تاریخ کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه در لوپیا قرمز

میانگین مربعات

میانگین مربعات	درصد پرتوئین	تمیزی روز تا رسیدن کامل	شانص برداشت	تمیزی روز تا رسیدن کامل	عملکرد دانه	وزن ۱۰۰ دانه	ارتفاع بورتہ	درجہ آزادی	منابع تغییرات
۰/۰۰۳ ns	۰/۰۰۳ ns	۰/۰۰۳ ns	۰/۰۰۳ ns	۰/۰۰۳ ns	۰/۰۰۳ ns	۰/۰۰۳ ns	۰/۰۰۳ ns	۰/۰۰۳ ns	نکار
۰/۱۰۱ **	*	۰/۲/۴۸۱ *	۰/۳۳۵ **	۰/۱۸۲۶۳۴/۴۵ **	۰/۴۵**	۰/۴۴۸۸**	۰/۴۴۸۸**	۴۵/۰/۴۴۸۸**	فакتور A (رقم)
۰/۱۹۴ *	*	۰/۴۴۲/۸/۱۵ **	۰/۶۴۴ **	۰/۳۵۶۰۶۴/۰/۳۵۶۰۶۴ **	۰/۳۵۶۰۶۴ **	۰/۴۳۳۴ **	۰/۴۳۳۴ **	۴/۰/۴۳۳۴ **	فакتور B (تاریخ کاشت)
۰/۰۴۷ ns	*	۰/۰۵۹۳ ns	۰/۱۲/۲۷۹ ns	۰/۱۵۹/۸/۵۷۴ **	۰/۰/۷۸/۷۷/۴ **	۰/۰/۷۸/۷۷/۴ **	۰/۰/۷۸/۷۷/۴ **	۰/۰/۷۸/۷۷/۴ **	اثر متقابل A×B
۰/۰۴۸	*	۰/۷/۶۶۲	۰/۵۳۰	۰/۹۲۱/۰/۴۰۳	۰/۹۲۱/۰/۴۰۳	۰/۱۳۹	۰/۱۳۹	۰/۱۳۹	اشتباه آزمایشی
۱/۱۰۹	*	۱/۸/۷۷۸	۰/۱۵/۰/۰۵	۱/۱/۱۱	۱/۱/۱۱	۱/۰/۵۵	-	-	ضریب تغییرات (CV)

*، ** و ns : به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال ۱٪، ۵٪ و غیر معنی دار

غلاف کاهش می‌یابد^(۳). در آزمایش آندرسون و اسیلاس روی سویا، کاهش تعداد دانه در واحد سطح، مهم‌ترین عامل کاهش عملکرد در اثر تأخیر در کاشت شناخته شد^(۱۲). طبق جدول ۳، مشاهده می‌شود که رقم صیاد در تاریخ کاشت اول با تعداد ۶/۴ دانه در غلاف و رقم گلی در تاریخ کاشت سوم با تعداد ۳/۷ دانه در غلاف به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد دانه در غلاف را داشتند.

وزن صد دانه

مقایسه میانگین‌ها نشان داد که رقم صیاد در هر سه تاریخ کاشت دارای بیشترین وزن صد دانه و رقم گلی کمترین مقدار را داشت (جدول ۳). در بین تاریخ‌های کاشت، میانگین وزن صد دانه در تاریخ کاشت سوم از همه کمتر بود (جدول ۵). مطالعات نشان داده‌اند که تأخیر در کاشت از نیمه ارديبهشت تا اواخر خردادماه منجر به کاهش وزن صد دانه شده است^(۵) و^(۸). اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر وزن صد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود (جدول ۱). رقم صیاد در تاریخ کاشت اول با ۲۶/۲ گرم بیشترین وزن صد دانه را به خود اختصاص داده است (جدول ۳).

عملکرد دانه

تأخیر در کاشت باعث کاهش عملکرد در هکتار گردید (جدول ۵). به طوری که تاریخ کاشت اول دارای بیشترین و تاریخ کاشت سوم دارای کمترین عملکرد بود (جدول ۵). کاهش در عملکرد دانه لوبیا در اثر تأخیر در کاشت توسط قنبری و همکاران نیز گزارش شده است^(۷). پوپ و همکاران نیز گزارش کرده‌اند که عملکرد دانه سویا در ارقام رشد نامحدود در تاریخ‌های کاشت بعد از ارديبهشت ماه به نسبت تأخیر به طور معنی‌دار کاهش می‌یابد^(۱۹). بیشترین عملکرد دانه در رقم صیاد با ۳۳۰۷ کیلوگرم در هکتار و کمترین آن در رقم گلی با ۲۲۸۳/۲ کیلوگرم در هکتار به دست آمد (جدول ۴). دیررس بودن رقم، بالا بودن وزن دانه و تعداد

و نیز برخورد مراحل حسام رشدی گیاه مانند غلاف‌بندی و گل‌دهی با درجه حرارت بالا و شرایط نامساعد رشدی بوده، کاهش یافته است (جدول ۱). لذا احتمالاً در تاریخ کاشت زودتر شناس بقای اندام‌های فوقانی مثل شاخه‌های فرعی و غلاف‌ها بیشتر بوده است (۲۰).

تعداد غلاف در بوته

نتایج تجزیه واریانس تعداد غلاف در بوته نشانگر اثر معنی‌دار رقم، تاریخ کاشت و اثر متقابل رقم در تاریخ کاشت بر این صفت در سطح احتمال یک درصد بود (جدول ۲). نتایج آزمایش نشان داد که ارقام صیاد و ناز به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تعداد غلاف در بوته بودند (جدول ۴). بیشترین تعداد غلاف در بوته مربوط به تاریخ کاشت اول بوده و با تأخیر در تاریخ کاشت تعداد غلاف در هر سه رقم کاهش یافت (جدول ۵). البته باید توجه داشت که تعداد غلاف به تعداد کل گره در بوته و آن نیز به ارتفاع ساقه بستگی دارد و از طرفی با تأخیر در کاشت، طول دوره رشد و ارتفاع گیاه کاهش یافت که به دنبال آن تعداد غلاف کمتری در گیاه تولید گردید. در کل به نظر می‌رسد از نظر ژنتیکی رقم صیاد از نظر پتانسیل تشکیل غلاف، برتری نسبی نسبت به دو رقم دیگر نشان داد است.

تعداد دانه در غلاف

تأثیر تاریخ‌های مختلف کاشت، رقم و اثر متقابل آنها روی تعداد دانه در غلاف به ترتیب در سطوح احتمال ۱ و ۵ درصد معنی‌دار بود (جدول ۲). با تأخیر در کاشت تعداد دانه در غلاف کاهش یافت، به طوری که در تاریخ کاشت اول (۱۵ اردیبهشت) بیشترین و در تاریخ کاشت سوم (۱۵ خرداد) کمترین تعداد دانه در غلاف مشاهده گردید (جدول ۵). کم شدن تعداد دانه در غلاف را می‌توان به وجود دماهای بالاتر طی دوره گل‌دهی در تاریخ کاشت سوم ارتباط داد (جدول ۱). گزارش شهسواری نشان داده است که تأخیر در کاشت سبب برخورد دوران دانه‌بندی با هوای گرم شده و تعداد دانه در هر

جدول ۳. مقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم روی صفات اندازه‌گیری شده

د ردصل	تعداد تا رسیدن پیروشین	تعداد تا رسیدن کامل (درصد)	عملکرد دانه برداشت (درصد)	شاخص برداشت (درصد)	وزن ۰۰ دانه (گرم) کیلوگرم	تعداد غلاف در غلاف	تعداد غلاف در بورته	طول غلاف (سانتی متر)	تعداد شاخه (سانتی متر)	فرعی اولیه (سانتی متر)	عملکرد بیولوژیک (هکتار/اکیلوگرم)	ارتفاع بورته (سانتی متر)	تعداد تمهار
۱۹/۶ ab	۹۴/۳ a	۴۱ cd	۳۲۵/۴ c	۲۵/۴ ab	۱۰/۲ cd	۴/V bc	۱۱/۰ b	۷۰۹۴/۵ f	۵۵/V f	۷۰۹۴/۵ f	۵۱/۴ f	۵۱/۴ f	تاریخ کاشت اول ناز
۱۹/V ab	۸۶/۳ b	۳۵/۸ e	۲۵۷/۵ d	۲۴/۵ bc	۴/۴ de	۸/۴ f	۲/V d	۱۱/۱ bc	۵۶۴۵ c	۵۶۴۵ c	۴۸/V d	۴۸/V d	تاریخ کاشت دوم ناز
۱۹/۰ b	۷۸ d	۳۴/۹ e	۱۸۱۲/V f	۱۲۴/۰ c	۴ de	V/۴ y	۲/V d	۹/۹ e	۵۸۹۷/۵ d	۵۸۹۷/۵ d	۸۷/V d	۸۷/V d	تاریخ کاشت سوم ناز
۲۰ a	۹۴ a	۴۱/V c	۲۱۰/۵ c	۲۱۸/۴ d	۵ ab	۱/۱/۴ b	۵ b	۱/۱/۴ b	۷۶۹۳/۳ a	۷۶۹۳/۳ a	۸۷/V d	۸۷/V d	تاریخ کاشت اول، گلی
۲۰ a	۸۶ b	۳۷/۳ dc	۲۴۴۴/۴ e	۲۱/۴ c	۴/۴ de	۹/۱ e	۴ cd	۱۰/۹ cd	۶۶۷۶/۶ c	۶۶۷۶/۶ c	۸۱/۳ de	۸۱/۳ de	تاریخ کاشت دوم، گلی
۱۹/۹ ab	۷۹/۶ cd	۳۴/۰ e	۱۵۰۰/۲ g	۲۰/۴ f	۲/V e	V/۴ f	۳/۳ d	۹/۹ e	۴۴۰۴/۲ e	۴۴۰۴/۲ e	۷۷/۱ e	۷۷/۱ e	تاریخ کاشت سوم، گلی
۲۰/۰ a	۹۵/۳ a	۵۶/۸ a	۴۰۳۳/۳ a	۷۶/۲ a	۶/۴ a	۱۲۳/۳ a	۶/V a	۱۲۳/۳ a	۸۰۹۷/۳ a	۸۰۹۷/۳ a	۱۲۱/۶ a	۱۲۱/۶ a	تاریخ کاشت اول صیاد
۲۰/۰ a	۸۸ b	۴۸/۵ b	۳۳۴۴/۵ b	۷۵/N a	۴/V ed	۱۰/۴ c	۵/۰ b	۱۰/۹ bc	۷۲۱/۰/۸ b	۷۲۱/۰/۸ b	۱۰۶ b	۱۰۶ b	تاریخ کاشت دوم صیاد
۲۰/۰ a	۸۴ bc	۴۳/۳ c	۲۰۰۳/۳ d	۷۵/۵ a	۵/۴ bc	۱/۰ d	۴/V bc	۱۰/۰ de	۵۶۲۱/۱/۷ d	۵۶۲۱/۱/۷ d	۹۶ g	۹۶ g	تاریخ کاشت سوم، صیاد

میانگین هایی که حداقل در یک حرف مشترک هستند اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۵٪ ندارد.

جدول ۴. مقایسه میانگین تاثیر رقم روی صفات مورد مطالعه در ارقام مختلف لوپیا قرمز

د ردصل	تعداد روز پیروشین	تعداد دانه پیروشین کامل	عملکرد شاخص برداشت (درصد) تا رسیدن کامل	وزن دانه (هکتار کیلوگرم)	تعداد دانه در غلاف	تعداد در غلاف	طول در بورته	تعداد غلاف	تعداد شاخه (سانتی متر)	فرعی اولیه (سانتی متر)	عملکرد بیولوژیک (هکتار/اکیلوگرم)	ارتفاع بوته (سانتی متر)	رقم ناز گلی صیاد
۱۹/۶ b	۸۲/۲ b	۲۷/۲ b	۲۵۴۹/۴ b	۲۴/۷ b	۴/V b	۸/V c	۱۰/۸ ab	۴/V b	۴/V c	۴/V b	۵۴۵۴/۶ b	۵۴۵۴/۶ c	ناز
۲۰ a	۸۶/۵ b	۳۷/۶ c	۲۲۸۳/۲ c	۲۱/۵ c	۴/۹ b	۹/۲ b	۱/۰/۵ b	۱/۰/۵ b	۱/۰/۵ b	۱/۰/۵ b	۶۲۵۸/۰ c	۶۲۵۸/۰ c	گلی
۲۰ a	۸۹/۱ a	۴۹/۵ a	۲۳۰۰/۷/۰ a	۲۵/۸ a	۵/۴ a	۱۰/۸ a	۱/۱/۱ a	۱/۱/۱ a	۱/۱/۱ a	۱/۱/۱ a	۱۰/۷/۶/۹ a	۱۰/۷/۶/۹ a	صیاد

میانگین هایی که با حروف مشترک در هر سنتون مشخص شده اند، اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۵٪ ندارد.

جدول ۵. مقایسه میانگین تأثیر تاریخ کاشت روی صفات مورد مطالعه در ارقام مختلف لوپیا قرمز

درصد پرتوتین	تعادل روز تاریخ‌سینه کامل	شانصون برداشت	عملکرد برداشت	وزن دaneه (هکتار) (کیلوگرم)	تعادل دانه در غلاف	تعادل در غلاف در بروته	طول غلاف	تعادل شاخه فرعی اولیه (سانتی متر)	عملکرد بیولوژیک (هکتار اکیلوگرم)	ارتفاع تاریخ کاشت
۱۹/۸ ^b	۹۴/۵ ^a	۴۶/۵ ^a	۳۴۹۷/۷ ^a	۲۴/۸ ^a	۹/۱ ^a	۱۱/۳ ^a	۱۱/۸ ^a	۱۴/۵ ^a	۷۶۲۸/۷ ^a	۸۸/۷ ^a
۲۰/۱ ^a	۸۹/۷ ^b	۴۰/۵ ^b	۲۷۸۶/۱ ^b	۲۳/۸ ^b	۴/۴ ^b	۹/۳ ^b	۱۰/۸ ^b	۴/۲ ^b	۶۸۴۶/۱ ^b	۷۹/۶ ^b
۱۹/۸ ^b	۸۰/۵ ^b	۳۷/۴ ^b	۱۹۵۵/۷ ^c	۲۳/۴ ^b	۴/۳ ^b	۸/۲ ^c	۹/۸ ^c	۳/۹ ^b	۵۰۷۰/۷ ^c	۷۴/۰ ^c

میانگین‌هایی که با حروف مشترک در هر سترن مخصوص شده‌اند، اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۵٪ ندارد.

جدول ۶. ضرایب هم پستگی ساده بین عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام مختلف لوپیا قرمز

صفات	ارتفاع بروته	تعادل غلاف در بروته	تعادل دانه در غلاف	تعادل روز تا رسیان	درصد تعادل شاخه فرعی اولیه	عملکرد رسیان	وزن صد دانه	عملکرد بیولوژیک	شانصون برداشت	عملکرد دانه
ارتفاع بروته	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
تعادل غلاف در بروته	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
تعادل دانه در غلاف	۰/۹۱ ^{ns}	۰/۹۱ ^{ns}	۰/۹۱ ^{ns}	۰/۹۱ ^{ns}	۰/۹۱ ^{ns}	۰/۹۱ ^{ns}	۰/۹۱ ^{ns}	۰/۹۱ ^{ns}	۰/۹۱ ^{ns}	۰/۹۱ ^{ns}
عملکرد غلاف	۰/۳۵ ^{ns}	۰/۳۵ ^{ns}	۰/۳۵ ^{ns}	۰/۳۵ ^{ns}	۰/۳۵ ^{ns}	۰/۳۵ ^{ns}	۰/۳۵ ^{ns}	۰/۳۵ ^{ns}	۰/۳۵ ^{ns}	۰/۳۵ ^{ns}
تعادل شاخه فرعی اولیه	۰/۷۵ ^{ns}	۰/۷۵ ^{ns}	۰/۷۵ ^{ns}	۰/۷۵ ^{ns}	۰/۷۵ ^{ns}	۰/۷۵ ^{ns}	۰/۷۵ ^{ns}	۰/۷۵ ^{ns}	۰/۷۵ ^{ns}	۰/۷۵ ^{ns}
تعادل روز تاریخ‌سینه	۰/۴۰ ^{ns}	۰/۴۰ ^{ns}	۰/۴۰ ^{ns}	۰/۴۰ ^{ns}	۰/۴۰ ^{ns}	۰/۴۰ ^{ns}	۰/۴۰ ^{ns}	۰/۴۰ ^{ns}	۰/۴۰ ^{ns}	۰/۴۰ ^{ns}
درصد پرتوتین	۰/۸۶ ^{ns}	۰/۸۶ ^{ns}	۰/۸۶ ^{ns}	۰/۸۶ ^{ns}	۰/۸۶ ^{ns}	۰/۸۶ ^{ns}	۰/۸۶ ^{ns}	۰/۸۶ ^{ns}	۰/۸۶ ^{ns}	۰/۸۶ ^{ns}
وزن صد دانه	۰/۵۱ ^{ns}	۰/۵۱ ^{ns}	۰/۵۱ ^{ns}	۰/۵۱ ^{ns}	۰/۵۱ ^{ns}	۰/۵۱ ^{ns}	۰/۵۱ ^{ns}	۰/۵۱ ^{ns}	۰/۵۱ ^{ns}	۰/۵۱ ^{ns}
عملکرد بیولوژیک	۰/۷۷ ^{ns}	۰/۷۷ ^{ns}	۰/۷۷ ^{ns}	۰/۷۷ ^{ns}	۰/۷۷ ^{ns}	۰/۷۷ ^{ns}	۰/۷۷ ^{ns}	۰/۷۷ ^{ns}	۰/۷۷ ^{ns}	۰/۷۷ ^{ns}
شانصون برداشت	۰/۸۳ ^{ns}	۰/۸۳ ^{ns}	۰/۸۳ ^{ns}	۰/۸۳ ^{ns}	۰/۸۳ ^{ns}	۰/۸۳ ^{ns}	۰/۸۳ ^{ns}	۰/۸۳ ^{ns}	۰/۸۳ ^{ns}	۰/۸۳ ^{ns}
عملکرد دانه	۰/۴۸ ^{ns}	۰/۴۸ ^{ns}	۰/۴۸ ^{ns}	۰/۴۸ ^{ns}	۰/۴۸ ^{ns}	۰/۴۸ ^{ns}	۰/۴۸ ^{ns}	۰/۴۸ ^{ns}	۰/۴۸ ^{ns}	۰/۴۸ ^{ns}

*، ** و ns : به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال ۱٪ و ۵٪ و غیر معنی دار

دانه مربوط به رقم صیاد بود. بین درصد پروتئین دانه رقم صیاد در هر تاریخ کاشت اختلاف معنی دار مشاهده نگردید. چنین به نظر می رسد که درصد پروتئین دانه تابع حرارت محیط نمی باشد (جدول ۳). تلاوکی و همکاران در مطالعه روی سویا نیز گزارش کرده اند که با تأخیر در کاشت (به ویژه از ۳۵ اردیبهشت به بعد) درصد روغن دانه کاهش می یابد، درصد پروتئین دانه تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار نگرفت (۱).

ضرایب همبستگی

به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین صفات مختلف ضرایب همبستگی ساده بین آنها محاسبه گردید. عملکرد در هکتار با صفات ارتفاع گیاه، درصد پروتئین و وزن صد دانه، همبستگی مثبت و غیر معنی داری داشت و نیز عملکرد در هکتار با صفات تعداد غلاف در بوته بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار را نشان داد (جدول ۶). این امر به خوبی ارتباط بین کارایی فتوستزر و عملکرد دانه را نشان می دهد بدین ترتیب که گیاهانی دارای عملکرد دانه بالایی خواهند بود که مواد فتوستزری بیشتری را در اندام های خود تجمع کرده اند. میرزائی ندوشن نیز سهم تعداد غلاف در بوته را در تولید ارقام بر محصول، بالا گزارش کرده است. بین صفات تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته و طول غلاف همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده گردید (۹). این صفت جزء مهم ترین صفات دخیل در افزایش عملکرد در لوپیا می باشد. میرزائی ندوشن این صفات را به عنوان معیارهای عمدۀ انتخاب به منظور بالابردن عملکرد دانه گزارش کرده است (۹). عملکرد دانه با شاخص برداشت دارای همبستگی مثبت و بالا ($^{**} = ۰/۸۷۴$) می باشد. این رابطه را می توان چنین توجیه نمود که در کل عملکرد دانه از طریق افزایش در تعداد شاخه های فرعی، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در بوته افزایش یافته که در نهایت شاخص برداشت بالا را به وجود آورده است. لذا وجود تعداد شاخه های فرعی زیاد و تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در بوته نقش مهمی در افزایش عملکرد دانه داشته است. فرموند راد نیز در

غلاف در بوته و بیوماس کل، عواملی هستند که باعث افزایش عملکرد در رقم صیاد شده اند. رقم صیاد در تاریخ کاشت اول بیشترین و رقم گلی در تاریخ کاشت سوم کمترین عملکرد را به خود اختصاص دادند (جدول ۳). احتمالاً یکی از دلایل کاهش عملکرد دانه در کاشت های تأخیری، افزایش تنش های محیطی به خصوص بالا بودن دما طی فصل رشد و نیز کاهش طول دوره رشدی گیاه می باشد (جدول ۱).

شاخص برداشت

تاریخ کاشت ۱۵ اردیبهشت، بیشترین و تاریخ کاشت سوم، کمترین شاخص برداشت را به خود اختصاص دادند (جدول ۵). یکی از دلایل کاهش شاخص برداشت در تاریخ های کاشت دیرهنگام، داشتن تعداد غلاف کمتر در گیاه می باشد که باعث کاهش عملکرد اقتصادی شده است. در بین ارقام نیز رقم صیاد با ۴۹/۵ درصد دارای بیشترین و رقم ناز با $37/2$ درصد کمترین شاخص برداشت را داشتند (جدول ۴). یکی از علل کاهش شاخص برداشت در رقم ناز و گلی، کمتر بودن تعداد دانه در غلاف در گیاه است. گزارش هایی وجود دارند (بتري ۱۹۸۲، ماریونا ۱۹۹۰ و اسلر ۱۹۵۴) که بیان می کنند شاخص برداشت کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی است و بیشتر ژنتیکی می باشد و عمولاً با افزایش یا کاهش عملکرد بیولوژیکی، عملکرد اقتصادی نیز افزایش و یا کاهش می یابد (۱۳، ۱۷ و ۱۸). با توجه به مقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم، مشاهده گردید که رقم صیاد در هر سه تاریخ کاشت به ویژه در تاریخ کاشت ۱۵ اردیبهشت با $56/7$ درصد شاخص برداشت، شاخص برداشت بیشتری نسبت به سایر ارقام داشته است.

درصد پروتئین

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح احتمال یک درصد از نظر درصد پروتئین دانه بین ارقام وجود دارد و اثر تاریخ کاشت در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود (جدول ۱). در هر سه تاریخ کاشت بیشترین درصد پروتئین

نتایج این پژوهش گویای آن است که عملکرد دانه لوبيا قرمز با تأخیر در کاشت به شدت آسیب می بیند. لوبيا قرمز رقم صیاد ممکن است ظرفیت تولید بیشتری در کلیه تاریخ‌های کاشت، نسبت به دیگر ژنتیک‌های مورد بررسی در شرایط مشابه آزمایش حاضر داشته باشد.

مطالعه اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و شاخص‌های رشد لوبيا چشم بلبلی هم‌بستگی بین عملکرد بوته با صفات تعداد شاخه فرعی، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در هر بوته را بسیار معنی‌دار گزارش کرده است (۵). نتایج مشابه توسط صالحی نیز گزارش شده است (۴).

منابع مورد استفاده

۱. تلاوکی، م. ۱۳۷۶. تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی و مرفو‌لولوژیکی ارقام سویا در منطقه کوشک شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
۲. خواجه پور، محمد رضا. ۱۳۸۱. اصول و مبانی زراعت. انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
۳. شهسواری، م.ر. ۱۳۶۸. بررسی سهم فتوتیپی و ژنتیکی پارامترهای رشد در تشکیل عملکرد دانه و تعیین مشخصات تیپ ایدال در لوبيا معمولی. پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
۴. صالحی، پ. ۱۳۸۰. بررسی صفات کمی و کیفی ارقام جدید لوبيا در تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه اقلید فارس. طرح تحقیقاتی، ایستگاه تحقیقات کشاورزی اقلید.
۵. فرهمند راد، ش. ۱۳۷۶. بررسی اثر تاریخ و تراکم کشت بر عملکرد و شاخص‌های رشد لوبيا چشم بلبلی رقم ۲۹۰۰۵. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
۶. قنبری، ع. ا و م. طاهری مازندرانی. ۱۳۸۲. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد لوبيا چیتی. مجله نهال و بذر (۴): ۴۸۳-۴۹۶.
۷. قنبری، ع. ا. م. طاهری مازندرانی و م. دادیور. ۱۳۸۱. اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روی عملکرد لوبيا چیتی خمین. مجموعه مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج.
۸. محلوجی، م. س. ف. موسوی و م. کریمی. ۱۳۷۹. اثر تنش رطوبتی و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبيا چیتی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، (۱): ۵۳-۶۸.
۹. میرزایی ندوشن، ح. ۱۳۶۷. بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی در کلکسیون لوبياها ایرانی و خارجی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
۱۰. موسوی، س. ف. ۱۳۸۳. ارزیابی رابطه تراکم بوته و عملکرد سه رقم لوبيا چیتی در تاریخ‌های کشت متوالی. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی. دانشگاه تبریز.
۱۱. نظامی، الف. ۱۳۷۲. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در منطقه مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
12. Anderson., L. R. and B. L. Vasilas. 1985. Effects of planting date on two soybean cultivars: Seasonal dry matter accumulation and seed yield. *Crop Sci.* 25: 999-1004.
13. Beatty., K. D, I. L. Eldridge and A. M. Simpson. 1982. Soybean response to different planting patterns and dates. *Agron. J.* 74: 859-862.
14. Johnson, B. L., K. R. Mackay, A. A. Schneiter, B. K. Hanson and B. G. Schatz. 1995. Influence of planting date on canola and Crambe production. *Agron. J.* 8:594-599.
15. Kane, M. V., C. C. Steele and L. J. Grabau. 1997. Farly maturing soybean cropping system: Yield responses to

- planting date. Agron. J. 89: 454-458.
16. Knowles, P. F. 1989. Safflower. PP:363-373. In: Roe belen, G. (Ed.), Oil Crop of the World. MC Grow- Hill book Company, New York.
17. Mariorana, M., F. D. Giorgio and D. Rizzo. 1990. Effects of different planting dates on morphophysiological reproductive and qualitative characteristics of sunflower variations between hybrids and years. Annuali cell, instituto sperimentale. Agron. Bari (Italy). 21:71-90.
18. Osler, R. D. and J. L Cartter. 1954. Effect of planting dates on characteristics of Common bean. Agron. J: 267-270.
19. Pop, M.P.T.C, R.W.M. Keisling, L.R .Oliver, C.R. Dillon, and D.M. Wallace. 2002. Planting date, cultivar, and tillage system effects on dry land soybean production. Agron. J.84: 81-88.
20. Rabinowitch, H. D. and J. L. Brewster. 1990. Onion and Allied Crops. V.I. CRC Press., United States.
21. Santalla, M., M. R. Escribano and A. M. Deron. 1993. Correlation between agronomic and immature pod characters in populations of French bean. Plant Breed. Abs. 63: 4.
22. Singh, S. P. 1999. Common Bean Improvement in the Twenty-first Century. Kluwer Academic pub., Netherlands.
23. Huang, S. D., A. Ashley and H. R. Boerma.1993. Light intensity, row spacing, and photoperiod effects on express of branchytic stem in soybean. Crop Sci. 33: 29-36.