

مقاله پژوهشی

نقش نیتریک اکساید و ذخایر داخل سلولی کلسیم در اثر حفاظتی عصاره آبی گیاه درمنه بر پاسخ انقباضی حلقه های آئورتی به آگونیست آلفا ۱ - آدرنوسپتور در موشهای صحرایی دیابتی

دکتر توراندخت بلوج نژاد مجرد*، دکتر مهرداد روغنی**، فروزان صادقی محلی***

دریافت: ۸۵/۲/۱۲، پذیرش: ۸۵/۵/۲

چکیده:

مقدمه و هدف: دلیل اصلی مرگ و میر در بیماران دیابتی اختلالات عروقی است. با توجه به نقش گیاهان حاوی فلاونوئید در برطرف نمودن عوارض عروقی دیابت و اثر حفاظتی عصاره آبی گیاه درمنه (*Artemisia annua*) بر پاسخ انقباضی حلقه های آئورتی در موشهای دیابتی، در این مطالعه مکانیسم اثر گشادکنندگی عروقی عصاره این گیاه مورد بررسی قرار گرفته است.

روش کار: در این مطالعه تجربی موش های صحرایی نر از نژاد ویستار به تعداد ۳۶ راس بطور کاملاً تصادفی به سه گروه سالم، دیابتی درمان نشده و دیابتی تحت درمان با عصاره آبی درمنه تقسیم بندی شدند. برای دیابتی شدن حیوانات از استریتوزوتوبین به میزان ۶۰ میلی گرم به کیلوگرم بصورت داخل صفاقی استفاده شد. گروه تحت درمان نیز عصاره آبی درمنه را به میزان ۱۰۰ میلی گرم به کیلوگرم بصورت داخل صفاقی به مدت یک ماه دریافت کرد. پس از گذشت یک ماه، پاسخ انقباضی حلقه های آئورتی به فنیل افرین در حضور L-NAME و EGTA با استفاده از بساط بافت ایزووله مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: مقایسه پاسخ انقباضی حلقه های آئورتی دارای آندوتیلیوم به فنیل افرین، قبل و بعد از اضافه نمودن L-NAME در موشهای دیابتی درمان نشده و درمان شده، تفاوت معنی داری را نشان داد ($P<0.05$). از طرف دیگر، مقایسه پاسخ انقباضی حلقه های آئورتی دارای آندوتیلیوم و بدون آندوتیلیوم به فنیل افرین در کربس فاقد کلسیم و در حضور EGTA نشان داد که در دو گروه دیابتی درمان نشده و درمان شده تفاوت معنی دار است ($P<0.05$).

نتیجه نهائی: به طور کلی می توان گفت که اثر گشادکنندگی عروقی عصاره آبی درمنه در حیوانات دیابتی اثری وابسته به آندوتیلیوم است و از طریق افزایش در تولید و یا آزاد سازی نیتریک اکساید عمل می کند همچنین می تواند اثر خود را از طریق مهار آزاد سازی کلسیم از منابع داخل سلولی اعمال نماید.

: آئورت / دیابت شیرین / فنیل افرین / کلسیم / گیاه درمنه / نیتریک اکساید

بیماران دیابتی است . افزایش ضخامت غشاء پایه مویرگی (۱)، کاهش تراکم عروق کوچک (۲)، دژنه شدن سلولهای آندوتیلیال عروقی (۳) ، تغییر در پاسخهای وابسته به آندوتیلیوم عروق (۴) ، کاهش ظرفیت آندوتیلیال برای تولید و آزاد سازی نیتریک اکساید (NO) و کاهش عملکرد NO

مقدمه :

دیابت قندی (Diabetes Mellitus) یکی از شایعترین بیماریهای غدد درون ریز در ایران است . هیپرگلیسمی در دیابت موجب بروز عوارض متعددی از جمله اختلالات قلبی - عروقی می شود که علت اصلی مرگ و میر در

* دانشیار گروه فیزیولوژی مرکز علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران (tmojarad@yahoo.com)

** دانشیار گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

*** کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی مرکز علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

روش کار:

حیوانات: این مطالعه از نوع تجربی و به روش مداخله ای بر روی موشهای صحرایی نر نژاد ویستار به وزن ۲۵۰-۲۲۰ گرم انجام شد. حیوانات در حیوانخانه مرکز علوم پایه نگهداری و آب و غذای مخصوص (Pellete) بدون هیجکونه محدودیتی در اختیار آنها قرار داده می شد. قبل از شروع آزمایش گلوکز سرم موشهای به روش آنزیمی گلوکز اکسیداز با استفاده از اسپیکتروفتومتر اندازه گیری شده و تنها موشهایی که گلوکز سرم آنها کمتر از ۱۵۰ mg/dl بود برای این مطالعه انتخاب می شدند. در این مطالعه، حیوانات بطور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند.

(۱) حیوانات سالم (n=۱۲) که به مدت یک ماه بصورت داخل صفاقی سرم فیزیولوژی (عنوان حلال عصاره آبی گیاه درمنه) دریافت می کردند (Vehicle-treated rats)

(۲) حیوانات دیابتی درمان نشده (n=۱۲) که به مدت یک ماه بصورت داخل صفاقی سرم فیزیولوژی دریافت می کردند

(۳) حیوانات دیابتی درمان شده (n=۱۲) که ۳ روز پس از دیابتی شدن، روزانه به مدت یک ماه ۱۰۰ میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن عصاره آبی گیاه درمنه دریافت می کردند

Extract-treated diabetic rats) موشها با تزریق داخل صفاقی ۶۰ میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن استرپتوزوتوسین دیابتی می شدند. در این مطالعه حیواناتی دیابتی محسوب می شدند که گلوکز سرم آنها بیشتر از ۲۵۰ mg /dl بود.

روش تهیه عصاره و انجام کار: برای تهیه عصاره آبی گیاه Artemisia annua سر شاخه های این گیاه از جنگلهای مناطق شمالی کشور (بابلسر) جمع آوری شده و پس از تایید سیستمیک، ۱۰۰ گرم از پودر این گیاه که در معرض هوا خشک شده بود را به یک لیتر آب مقطر جوشیده اضافه کرده و در دمای ۶۰ درجه به مدت ۱۵ دقیقه قرار می دادیم. مایع بدست آمده پس از سه بار صاف کردن با فیلتر کاغذی، در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد خشک می شد تا بصورت عصاره عسلی با غلظت ۶۲٪ (w/w) در آید. سپس عصاره بدست آمده در ۲۰- درجه سانتیگراد نگهداری و برای تهیه غلظتها مورد نظر از سرم فیزیو لوژی استفاده می شد. پس از ۴ هفته دریافت عصاره آبی Artemisia annua، آئورت سینه ای موشهای صحرایی را داخل پتی دیش که حاوی محلول

بدنبال واکنش با رادیکالهای آزاد که در مسیر سیکلو اکسیژناز در عروق دیابتی آزاد می شوند(۵) از جمله عوارض عروقی بیماران دیابتی است. در حال حاضر استفاده از گیاهان دارویی حاوی فلاونوئید، بدليل دارا بودن خواص درمانی و فارماکولوژیکی جهت درمان و پیشگیری از عوارض قلبی - عروقی بیماری دیابت مورد توجه محققین قرار گرفته است(۶). فلاونوئیدها، پلی فنولهایی هستند که دارای فعالیتهای بیولوژیکی گوناگون از قبیل مهار تجمع پلاکتی، جمع کردن رادیکالهای آزاد، بهبود عملکرد NO و کاهش لیپو پروتئینهای با دانسیته پایین در پلاسمای می باشند(۷). در میان گیاهان دارویی ، گونه آرتمیس که در جنوب شرقی آسیا و مناطق شمالی ایران یافت میشود، غنی از موادی است که دارای اثرات گوناگونی از جمله اثر ضد التهاب (۸)، ضد تومور (۹)، ضد زخم معده (۱۰)، مدر (۱۱)، آنتی آکسیدان (۱۲)، ضد مالاریا (۱۳)، کاهش دهنده سوء هاضمه (۱۴)، ضد پرولیفراسیون سلولی (۱۵)، می باشد. این گونه گیاهی دارای اثراست که تجویز داخل وریدی آرتمیس دارای اثرات قابل ملاحظه ای بر انقباض کیسه صفراء می باشد(۱۶). مطالعات اولترا سونیک نشان داده است که تجویز داخل وریدی آرتمیس دارای اثرات قابل ملاحظه ای بر انقباض کیسه صفراء می باشد(۱۷). در این گونه گیاهی آکالولوئیدی شناسایی شده است که براحتی از سد خونی- مغزی عبور کرده و می تواند عنوان مهار کننده استیل کولین استراز مانع نورو توکسیسیتی در مغز انسان شود (۱۸). مطالعات اخیر نشان داده است که تجویز ساب کرونیک عصاره آبی گیاه درمنه (Artemisia annua) نه تنها گلوکز سرم را در حیوانات دیابتی در حد نرمال نگه می دارد بلکه قادر است قبل از وقوع تغییرات ساختمانی و بیوشیمیایی در عروق مانع اثرات مخرب دیابت بر عملکرد فیزیولوژیکی آنها شود و از افزایش پاسخ انقباضی آئورت به آگونیست α - آدرنرژیک جلوگیری می کند(۱۹). از آنجایی که مهمترین عارضه بیماری دیابت، اختلالات عروقی است و عصاره آبی گیاه درمنه بطور قابل ملاحظه ای از بروز چنین عارضی پیشگیری می نماید لذا هدف از اثر حفاظتی این گیاه بر پاسخ انقباضی حلقه های آئورتی به آگونیست α- آدرنرژیک در موشهای دیابتی است.

که بمدت یک ماه عصاره آبی *Artemisia annua* دریافت کرده اند وزن حیوانات افزایش معنی داری نشان می دهد($P<0.0001$). از طرف دیگر مقایسه گلوکز سرم در حیوانات دیابتی درمان نشده و حیوانات دیابتی درمان شده با عصاره آبی این گیاه نشان می دهد که ۴ هفته تیمار حیوانات با عصاره آبی درمنه موجب کاهش معنی داری در میزان گلوکز سرم می شود($P<0.0001$) (جدول ۱).

جدول ۱: وزن بدن و گلوکز سرم حیوانات سالم، دیابتی درمان نشده و درمان شده

وزن بدن (گرم)	گلوکز سرم (mg/dl)	نحوه آزمایش	شروع آزمایش	انتهای آزمایش
$230/18 \pm 4/25$	$96/89 \pm 1$	VD	$210/55 \pm 5/48$	
$**178 \pm 2/53$	$*56.0 \pm 40/20$	ED	$227/90 \pm 9/33$	
$260/2 \pm 8/30$	$102.0/1 \pm 3/82$	ED	$220 \pm 4/56$	

مقادیر بصورت Mean \pm SEM بیان شده اند. VT و ED هریک Vehicle-treated diabetic و Extract-treated diabetic می باشد.

(مقایسه گلوکز سرم در دو گروه VD و ED ($P<0.0001$) و (مقایسه وزن بدن در دو گروه VD و ED در انتهای آزمایش ($P<0.001$))

نقش NO بر پاسخ انقباضی آئورت در موش های صحرایی سالم: برای بررسی نقش NO بر پاسخ انقباضی حلقه های آئورتی دارای آندوتیلیوم، نتایج حاصل از تاثیر تجمعی فنیل افرین بر حلقه های آئورتی در غلظت های 10^{-4} تا 10^{-9} مولار قبل و بعد از اضافه کردن L-NAME بصورت نمودار Log غلظت فنیل افرین- پاسخ انقباضی آئورت ثبت شد. نتایج حاصل نشان داد که پس از اضافه کردن L-NAME به حمام بافت، افزایش قابل ملاحظه ای در پاسخ انقباضی حلقه های آئورتی با آندوتیلیوم در موشهای سالم ($P<0.001$ - $P<0.05$) وجود می آید (نمودار ۱A).

نقش NO بر پاسخ انقباضی آئورت در موش های صحرایی دیابتی درمان نشده و دیابتی درمان شده: نتایج حاصل از تاثیر تجمعی فنیل افرین بر حلقه های آئورتی موش های صحرایی دیابتی درمان نشده و دیابتی درمان شده قبل و بعد از اضافه کردن L-NAME نشان داد که پس از اضافه کردن L-NAME به حمام بافت، افزایش قابل ملاحظه ای در پاسخ انقباضی حلقه های آئورتی با آندوتیلیوم موشهای دیابتی درمان نشده ($P<0.001$ - $P<0.05$) و درمان شده ($P<0.001$ - $P<0.01$) بوقوع می پیوندد (نمودار ۱B,C).

کربس(; KCl , 4.6 ; MgSO₄, 1.2 ; KH₂PO₄ , 11.1 ; NaHCO₃ , 27.2; NaCl , 118 Glucose , ۰.۹٪ اکسیژن + ۰.۵٪ دی اکسید کربن) نیز بطور دائم بداخل آن دمیده می شد، قرار داده و آنرا به حلقه های ۳-۴ میلی متری تقسیم کرده و یک در میان آندوتیلیوم حلقه ها را با استفاده از روش مکانیکی جدا می نمودیم. برای ثبت پاسخ انقباضی حلقه ها به فنیل افرین از ترانسیدیوسر ایزوتونیک F60 استفاده شده و کشش استراحت اعمال شده ۲ گرم در نظر گرفته شد. نیم ساعت پس از ثبت پاسخ انقباضی حلقه های آئورتی به فنیل افرین (با غلظت تجمعی 10^{-9} تا 10^{-4} میلی مول) و شستشوی حلقه های دارای آندوتیلیوم، به حمام بافت (L-nitro Arginin methyl ester) L-NAME میکرومول جهت مهار آنزیم نیتریک اکساید سنتاز(NOS) اضافه نموده و مجددا پاسخ انقباضی حلقه های آئورتی را به فنیل افرین ثبت می کردیم. برای بررسی نقش ذخایر داخل سلولی کلسیم در اثر حفاظتی عصاره گیاه Artemisia annua، حلقه های آئورتی دارای آندوتیلیوم و بدون آندوتیلیوم را در محلول کربس فاقد کلسیم Calcium-free PSS (کلرید منیزیوم جایگزین کلرید کلسیم می شد) قرار می دادیم و پس از ۴-۵ (Ethylene EGTA با راشستشوی حلقه ها، ۵۰ میکرومول glycol tetraacetic acid) جهت بافرینگ کلسیم به کربس فاقد کلسیم اضافه نموده و پس از آن پاسخ انقباضی حلقه های آئورتی را به غلظت 10^{-6} مولار فنیل افرین ثبت می کردیم. استرپتوزوتونین از هلال احمر، L-NAME و EGTA از سیگما و فنیل افرین هیدرو کلراید از شرکت داروسازی دارو پخش تهیه شد. تمامی مقادیر بدست آمده در این مطالعه بصورت Mean \pm S.E.M و پاسخ انقباضی به فنیل افرین بصورت Tension(g) بیان شده است.


آنالیز آماری داده ها با استفاده از آزمون تی زوجی و مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه انجام گردید و P کمتر از ۰.۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.

نتایج:

وزن بدن و گلوکز سرم: مقایسه نتایج حاصل از ثبت وزن و گلوکز سرم موش های صحرایی قبل و بعد از مدت آزمایش (۴ هفته) نشان داد که وزن موشهای دیابتی درمان نشده یک ماه پس از دیابتی شدن کاهش می یابد ($P<0.0001$) ولی در حیوانات دیابتی درمان شده


نقش ذخایر داخل سلولی کلسیم در اثر حفاظتی گیاه درمنه بر پاسخ انقباضی حلقه های آئورتی با آندوتلیوم: برای بررسی نقش ذخایر داخل سلولی کلسیم در اثر گشادکنندگی عروقی درمنه، مرحله اول پاسخ انقباضی حلقه های آئورتی دارای آندوتلیوم به غلظت 10^{-6} فنیل افرین در حضور EGTA در موشهای دیابتی درمان نشده و درمان شده ثبت گردید (نمودار A). نتایج بدست آمده نشان داد پاسخ انقباضی حلقه های آئورتی دارای آندوتلیوم در حضور EGTA در موش های دیابتی درمان شده نسبت به موشهای دیابتی درمان نشده کاهاش معنی داری می یابد ($P < 0.05$).

می یابد (P < 0.5)



نومودار ۲: اثر گشادکنندگی عصاره *Artemisia annua* بر پاسخ انقباضی آنورت به فنیل افرین^۵ (۱۰ مولار) با آندوتیلوم (A) و بدون آندوتیلوم (B) در حضور EGTA در گروه های سالم و دیابتی درمان نشده و درمان شده (گروه ED) در مقایسه با VD در A و B ($P < 0.05$)

نقش ذخایر داخل سلولی کلسیم در اثر حفاظتی گیاه درمنه بر پاسخ انقباضی حلقه های آئورتی بدون آندوتیلوم: مقایسه نتایج بدست آمده از ثبت مرحله اول پاسخ انقباضی



نمودار ۱: اثر گشادکنندگی عصاره *Artemisia annua* بر پاسخ انقباضی آئورت به فنیل افرین قبل و بعد از اضافه کردن (A) در گروه سالم و دیابتی درمان نشده(B) و (B) در گروه سالم و دیابتی درمان شده(C). ED و VT و VD هر یک بتریب معاوی گروههای Vehicle-treated و Extract-treated diabetic و diabetic است.

در نمودار A : مقایسه پاسخ انقباضی در گروه VT قبل و بعد از اضافه کردن $P \leq 0.05$ $^{**}P \leq 0.01$ $^{***}P \leq 0.001$ (L-NAME)

در نمودار B : مقایسه پاسخ انقباضی در گروه VD قبل و بعد از اضافه L-NAME کردن $P<0.001$ $P<0.05$

در نمودار C : مقایسه پاسخ انقباضی در گروه ED قبیل و بعد از اضافه کردن ${}^+P<0.001$, ${}^{++}P<0.0001$ (L-NAME)

کننده‌های آنزیم نیتریک اکساید سنتاز یعنی L-NNA انجام شده است نیز مؤید این یافته می‌باشد (۲۴). از این‌رو، بعید بنظر می‌رسد اثر گشادکنندگی این عصاره از طریق فعال نمودن مستقیم گوانیلات سیکلаз و یا مهار فسفودی استراز در عضلات صاف باشد. از آنجایی که در حیوانات دیابتی درمان نشده نیز L-NAME پاسخ انقباضی آئورت به فنیل افرين را کاهش داد بنابر این می‌توان نتیجه گرفت که مدت آزمایش یعنی یک ماه پس از دیابتی کردن حیوانات، برای تخریب آندوتلیوم آئورت کافی نبوده و NO کماکان از آن آزاد شده است. بعلاوه نتایج حاصل از مطالعات بیوآسای نشان داده است که میزان NO در سلول‌های آندوتلیال عروق حیوانات سالم و دیابتی همانندیکر است و در حیوانات دیابتی هیچگونه کاهشی در فعالیت آنزیم نیتریک اکساید سنتاز آندوتلیومی دیده نمی‌شود. از این رو پیشنهاد شده است که در حیوانات دیابتی آزاد شدن H_2O_2 از آندوتلیوم عروق و افزایش رادیکالهای آزاد و واکنش آنها با NO، بعلاوه بر محدودیت عملکرد NO، حساسیت عروق رابه NO کاهش می‌دهد (۲۸). از طرف دیگر در آئورت موش صحرایی، آگونیست‌های α_1 -ادرنو سپتور مانند فنیل افرين و نور آدرنالین علاوه بر القای یک انقباض اولیه و کوتاه مدت موجب انقباض ثانویه تونیک نیز می‌شوند. انقباض اولیه با آزاد سازی کلسیم از منابع داخل سلولی در ارتباط می‌باشد در حالیکه انقباض تونیک ثانویه وابسته به جریان رو بداخل کلسیم از کanal‌های کلسیمی وابسته به لیگاند است (۲۹). در مطالعه حاضر، نقش آزادسازی کلسیم از منابع داخل سلولی بر اثر واژودیلاتوری عصاره آبی گیاه درمنه بطور غیر مستقیم با ارزیابی اثر آن بر انقباض القاء شده بوسیله فنیل افرين در کربس فاقد کلسیم در حضور EGTA مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره این گیاه قادر است بطور قابل توجهی پاسخ انقباضی اولیه به فنیل افرين را تخفیف دهد. بنظر می‌رسد غلظت بکار گرفته شده از عصاره آبی گیاه توانسته است موجب مهار آزادسازی کلسیم از منابع داخل سلولی از قبیل رتیکولوم سارکوپلاسمیک شود.

با توجه به نتایج بدست آمده، از آنجایی که اثر واژودیلاتوری عصاره آبی گیاه درمنه با غلظت ۱۰۰ میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن حتی پس از حذف آندوتلیوم نیز مشاهده شده است (۱۹)، بنابراین بخشی از اثر گشادکنندگی عصاره این گیاه مستقیم و غیر وابسته به آندوتلیوم است.

حلقه‌های آئورتی بدون آندوتلیوم فنیل افرين در حضور EGTA در موشهای دیابتی درمان نشده و درمان شده نشان داد که پاسخ انقباضی حلقه‌های آئورتی بدون آندوتلیوم نیز در حضور EGTA در موش‌های دیابتی درمان شده نسبت به موشهای دیابتی درمان نشده کاهش معنی داری می‌یابد ($P < 0.05$) (نمودار B).

بحث:

در این مطالعه، نقش NO و ذخایر داخل سلولی کلسیم در اثر گشادکنندگی عروقی عصاره آبی گیاه درمنه مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از مطالعات اخیر بدون اشاره به مکانیسم‌های در گیر نشان می‌دهند که در حیوانات سالم و دیابتی عصاره آبی گیاه درمنه موجب کاهش پاسخ انقباضی آئورت به فنیل افرين می‌شود (۱۹). نتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که L-NAME پاسخ انقباضی آئورت را به فنیل افرين در موشهای دیابتی درمان نشده و درمان شده باعصاره آبی گیاه درمنه افزایش می‌دهد. بعلاوه عصاره این گیاه پس از حذف کلسیم و اضافه نمودن EGTA به حمام بافت توانست تنها مرحله اول پاسخ انقباضی حلقه‌های آئورتی به فنیل افرين را تا حد معنی داری کاهش دهد تاثیری بر مرحله دوم پاسخ انقباضی (انقباض ثانویه تونیک) آئورت به فنیل افرين ندارد. با توجه به نتایج حاصل بنظر می‌رسد NO و ذخایر داخل سلولی کلسیم نقش مهمی در بروز اثر واژودیلاتوری عصاره آبی گیاه داشته باشد. سایر مطالعات نیز حاکی از وابسته بودن اثر گشادکنندگی عروقی بسیاری از گیاهان دارویی به آندوتلیوم است. تحقیقات نشان داده است که آندوتلیوم عروق با آزاد کردن NO از سلول‌های آندوتلیال نقش مهمی در کنترل تونیتیه عروق دارد (۲۰-۲۴). چنانکه عصاره برگ گیاه لوبوما، فلاون مشتق از سلاجینلا، عصاره آبی اوکومیا علاوه بر این که از طریق آزاد کردن عوامل هیپر پلاریزه کننده مشتق از آندوتلیوم که منجر به فعال شدن کanal‌های پتاسیم می‌شوند اثر واژودیلاتوری خود را اعمال می‌کنند، با تولید و آزاد کردن NO نیز این اثر را تشدید می‌نمایند (۲۵-۲۷). در این مطالعه اثر واژودیلاتوری القاء شده بوسیله عصاره آبی گیاه درمنه وابسته به وجود سلولهای آندوتلیال با عملکرد طبیعی می‌باشد چنانکه بعد از مهار آنزیم نیتریک اکساید سنتاز با استفاده از L-NAME، این اثر کاهش چشمگیری می‌یابد. مطالعات مشابه که با استفاده از یکی دیگر از مهار

- circ 2000;23(2-4):159-65.
9. Kim DH, Na HK, Oh TY, Kim WB, Surh YJ. Eupatilin, a pharmacologically active flavone derived from Artemisia plants, induces cell cycle arrest in ras-transformed human mammary epithelial cells. *Biochem Pharmacol* 2004; 15;68(6):1081-7.
 10. Foglio MA, Dias PC, Antonio MA, Possenti A, Rodrigues RA, da Silva EF, et al. Antiuclcerogenic activity of some sesquiterp lactones isolated from Artemisia annua. *Planta Med* 2002, 68(6):515-8.
 11. Tagawa C, Kagawa T, Nakazawa Y, Onizuka S, Nishibe S, Kawasaki H. Studies on antihypertensive effect of Luobuma (*Apocynum venetum L.*) leaf extract *Yakugaku Zasshi* 2004;124(11):851-6.
 12. Kim KS, Lee S, Lee YS, Jung SH, Park Y, Shin KH, Kim BK. Antioxidant activities of the extracts from the herbs of *Artemisia apiacea*, *J Ethnopharmacol* 2003; 85(1): 69-72.
 13. Mueller MS, Runyambo N, Wagner I, Borrmann S, Dietz K, Heide L. Randomized controlled trial of a traditional preparation of *Artemisia annua L.* (Annual Wormwood) in the treatment of malaria. *Trans R Soc Trop Med Hyg* 2004; 98(5): 318-21.
 14. Gharzouli K, Khennouf S, Amira S, Gharzouli A. Effects of aqueous extracts from *Quercus ilex L.* root bark, *Punica granatum L.* fruit peel and *Artemisia herba-alba Asso* leaves on ethanol-induced gastric damage in rats. *Phytother Res* 1999; 13(1):42-5.
 15. Pan SL, Huang YW, Guh JH, Chang YL, Peng CY, Teng CM. Esculetin inhibits Ras-mediated cell proliferation and attenuates vascular restenosis following angioplasty in rats. *Biochem Pharmacol* 2003;65(11): 1897-905.
 16. Bergendorff O, Sterner O. Spasmolytic flavonols from *Artemisia abrotanum*. *Planta Med* 1995; 61(4): 370-1
 17. Yu ZF, Wu XS. Ultrasonic studies of the effect of artemisia decoction on the volume and dynamics of gallbladder. *Chin Med J (Engl)* 1993;106(2):145-8.
 18. Heo HJ, Yang HC, Cho HY, Hong B, Lim ST, Park HJ. Inhibitory effect of *Artemisia asiatica* alkaloids on acetylcholinesterase activity from rat PC12 cells. *Mol Cells* 2000; 10(3):253-62.
 19. Baluchnejadmojarad T, Roghani M, Zare N. Effect of subchronic administration of aqueous *Artemisia annua* extract on α -1-adrenoceptor agonist-induced contraction of isolated aorta in rat. *IBJ* 2005;9(2): 57-62.

نتیجه نهائی :

در مجموع عصاره آبی گیاه درمنه می تواند هم در مراحل اولیه بیماری دیابت که هنوز آندوتلیوم عروق آسیب ندیده است و هم در مراحل پیشرفته بیماری که آندوتلیوم عروق از بین رفته است اثر واژودیلاتوری خود را بترتیب از طریق تولید واژادسازی NO ، مهار آزادسازی کلسیم از منابع داخل سلولی و یا با اعمال اثر مستقیم خود بر عروق به انجام برساند. بدیهی است مطالعات بیشتر در این ارتباط می تواند سایر مکانیسمهای در گیر در اثرات عصاره گیاه درمنه را مشخص نماید.

سپاسگزاری :

بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران که کلیه هزینه های مربوط به این طرح را تقبل نموده اند نهایت تشکر را دارد. همچنین نویسندها این مقاله از همکاری صمیمانه ریاست مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی و پرسنل آن سپاسگزار می باشند.

منابع :

1. Beisswenger PG, Spiro RG. Human glomerular basement membrane: chemical alteration in diabetes mellitus, *Science* 1970, 168(931):596-8.
2. Bohlen HG, Niggl BA. Arteriolar anatomical and functional abnormalities in juvenile mice with genetic or streptozotocin-induced diabetes mellitus. *Circ Res* 1979, 45(3):390-6.
3. Hayos D, Ziegler T, Bruner HR, Ruise J. Diabetes mellitus and vascular lesions. *Metabolism* 1998;47(12): Suppl 1:16-19.
4. Durante W, Sen AK, Sunahara FA. Impairment of endothelium-dependent relaxation in aortae from spontaneously diabetic rats. *Br J Pharmacol* 1988, 94(2):463-8.
5. Pieper GM, Langenstroer P, Siebeneich W. Diabetic-induced endothelial dysfunction in rat aorta: role of hydroxyl radicals, *Cardiovasc Res* 1997;34(1):145-56.
6. Mashour NH, Lin GJ, Frishman WH. Herbal medicine for the treatment of cardiovascular disease. *Arch Intern Med* 1998;158(20): 2225-34.
7. Roghani M, Baluchnejadmojarad T, Vaez-Mahdavi MR, Roghani-Dehkordi F. Mechanisms underlying quercetin-induced vasorelaxation in aorta of subchronic diabetic rats: an in vitro study. *Vascul Pharmacol* 2004; 42(1):31-5.
8. Tigno XT, Gumila E. In vivo microvascular actions of *Artemisia vulgaris L.* in a model of ischemia-reperfusion injury in the rat intestinal mesentery, *Clin Hemorheol Micro-*

20. Peach MJ, Singer HA, Loeb AL. Mechanisms of endothelium-dependent vascular smooth muscle relaxation. *Biochem Pharmacol* 1985; 34(11):1867-74.
21. Konishi M, Su C. Role of endothelium in dilator responses of spontaneously hypertensive rat arteries. *Hypertension* 1983; 5(6): 881-6.
22. Perez-Vizcaino F, Ibarra M, Cogolludo AL, Duarte J, Zaragoza-Arnaez F, Moreno L, et al. Vasorelaxing activity of resveratrol and quercetin in isolated rat aorta. *Gen Pharmacol* 1996; 27(2):363-6.
23. Ajay M, Gilani AU, Mustafa MR. Effects of flavonoids on vascular smooth muscle of the isolated rat thoracic aorta. *Life Sci* 2003; 74(5):603-12.
24. Chan EC, Pannangpetch P, Woodman OL. Relaxation to flavones and flavonols in rat isolated thoracic aorta: mechanism of action and structure-activity relationships. *J Cardiovasc Pharmacol* 2000;35(2):326-33.
25. Ghayur MN, Gilani AH. Ginger lowers blood pressure through blockade of voltage-dependent calcium channels. *J Cardiovasc Pharmacol* 2005; 45(1): 74-80.
26. Kang DG, Yin MH, Oh H, Lee DH, Lee HS. Vasorelaxation by amentoflavone isolated from *Selaginella tamariscina*. *Planta Med* 2004; 70(8):718-22.
27. Kwan CY, Chen CX, Deyama T, Nishibe S. Endothelium-dependent vasorelaxant effects of the aqueous extracts of the *Euccommia ulmoides* Oliv leaf and bark: implications on their antihypertensive action. *Vascul Pharmacol* 2003;40(5):229-35.
28. Pieper GM, Mei DA, Langenstroer P, O'Rourke ST. Bioassay of endothelium-derived relaxing factor in diabetic rat aorta. *Am J Physiol* 1992; 263(3 Pt 2): H676-80.
29. Abebe W, Harris KH, MacLeod KM. Enhanced contractile responses of arteries from diabetic rats to alpha 1-adrenoceptor stimulation in the absence and presence of extracellular calcium. *J Cardiovasc Pharmacol* 1990;16(2):239-48.