

مقاله پژوهشی

پاسخ متفاوت سلولهای قلبی به اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع

دکتر ایرج خدادادی*, **دکتر آلفرد تامسر****

دریافت: ۸۵/۱۲/۱۴ ، پذیرش: ۸۵/۳/۲

چکیده:

مقدمه و هدف: امروزه نقش چربی‌های غذایی در شکل گیری بیماریهای قلبی-عروقی مورد قبول عموم پژوهشگران بوده و مکانیسم اثر آنها از طریق تنظیم بیان ژنها طی مرحله رونویسی به اثبات رسیده است. در این پژوهش به منظور مطالعه اثر این ترکیبات بر میزان رونویسی ژنها در سلولهای قلبی رده سلولی P19CL6 مورد استفاده قرار گرفت و اثر اسیدهای چرب و کلوفیرات بر میزان رونویسی برخی ژنها مرتب با متabolیسم چربیها از قبیل H-FABP, PPAR α , PPAR β و PPAR γ بر بیان گلوبال ژنهای (transcriptome) سلولهای قلبی با استفاده از روش microarray cDNA سنجیده شد.

روش کار: پس از کشت سلولها با اسیدهای چرب با کلوفیرات، RNA سلولها استخراج و میزان بیان ژنهای H-FABP و (PPAR α, β, γ) به روش RT-PCR سنجیده شد. همچنین بیان گلوبال ژنی سلولهای کشت شده به روش microarray مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: اسیدهای چرب بصورت معناداری موجب افزایش P19CL6 و PPAR γ در سلولهای H-FABP و PPAR α گردیدند. از سوی دیگر نتایج حاصل از میکروواری (microarray) نشان داد که اثرات لینولئیک و لینولنیک اسید و کلوفیرات مشابه هم اما متفاوت از اثر پالمیتیک و اولئیک اسید است.

نتیجه نهائی: این یافته‌ها نشانگر آن است که پاسخ سلولها به اسیدهای چرب غیر اشباع متفاوت از پاسخ مربوط به اسیدهای چرب اشباع و اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه می‌باشد.

کلید واژه‌ها: اسید چرب / ژن / کاردیومیوسیت / میکروواری

و دیگر چربیهای موجود در مواد غذایی نه تنها از نظر تغذیه‌ای حائز اهمیت هستند بلکه با اتصال به فاکتورهای رونویسی در هسته سلولی موجب تنظیم مثبت و یا منفی در بیان ژنهای می‌گردند که اغلب آنها پروتئینهایی را که در متabolیسم اسیدهای چرب و یا انتقال درون سلولی آنها، از قبیل پروتئین قلبی متصل شونده به اسید چرب (H-FABP)، ایفای نقش می‌کنند حاصل می‌نمایند(۷-۵). در همین راستا و بمنظور بررسی اثر اسیدهای چرب و فیراتها بر سطح بیان ژنهای مدل‌های آزمایشگاهی متعددی نیز مورد استفاده قرار گرفته است(۱۱-۸). رده سلولی P19CL6 بکار رفته در این پژوهش زیر شاخه‌ای از سلولهای P19 جنیتی موش است

مقدمه:

امروزه نقش اسیدهای چرب اشباع (SFA; saturated fatty acid) غذایی در گسترش بیماریهای قلبی-عروقی به اثبات رسیده است در حالیکه اسیدهای PUFA (polyunsaturated fatty acid) به عنوان عوامل بازدارنده بیماری شناخته می‌شوند(۴-۱). در واقع بسیاری از اثرات پیشگیرانه اسیدهای چرب غیر اشباع بر پیشرفت بیماریهای قلبی - عروقی با تنظیم بیان ژنهای در طی مرحله رونویسی واژ طریق کنترل غلظت و فعالیت فاکتورهای رونویسی مانند PPAR β , PPAR α , SREBP و (sterol regulatory element binding protein) مانند P19CL6 به عبارت دیگر اسیدهای چرب حاصل می‌گردد(۵-۷).

* استادیار گروه بیوشیمی و تغذیه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان (khodadadi@umsha.ac.ir)

** استاد گروه تغذیه دانشکده زیست پزشکی و علوم مولکولی دانشگاه ساری انگلستان

شرکت Qiagen Ltd. (Crawley, UK) و لوازم یکبار مصرف Nunclon Products (Roskilde, Denmark) کشت سلولی از (P19CL6) خریداری شده تهیه شد.

کشت سلولی: سلولهای P19CL6 خریداری شده α-MEM (Riken Cell Bank; Ibaraki, Japan) حاوی ۱۰٪ FBS و پنی سیلین-استرپتومایسین (۰.۱٪) کشت داده شدند(۱۲). سپس بمنظور تمایز به سلولهای کاردیومیوسمیت، بمدت ۱۴ روز در محیط کشت حاوی ۱۵۰ cm² DMSO ۰.۱٪ و با دانسیته ۲×۱۰⁶ سلول در هر cm² کشت داده شده و پس از آن بمدت ۲۴ ساعت در محیطی عاری از FBS قرار گرفتند. در ادامه سلولها بمدت ۲۴ ساعت یکی از محیطهای کشت حاوی (الف) سرم آلبومن گاوی (BSA) (۰.۱۵ mM BSA)، (ب) ۰.۰۴ mM FA-BSA کمپلکس اسید چرب-BSA/۰.۱۵ mM BSA/۰.۰۱۵ mM BSA/۰.۰۱۵ mM BSA/۰.۰۴ mM BSA را دریافت کردند. استخراج و تخلیص RNA: بمنظور استخراج RNA تمام سلولها با افزایش مستقیم معرف Trizol ۱ بازی هر ۱۰ cm² از سطح کشت) لیز شده و هرگونه ناخالصی احتمالی از منشاء DNA مطابق دستورالعمل شرکت سازنده زدوده شد. با اینهمه بمنظور دستیابی به درجه خلوص مورد نیاز آزمایشات microarray، نمونه های حاصله RNeasy MinElute Cleanup با استفاده از ستونهای "Trizol" مجدداً تخلیص و درجه خلوص و غلظت RNA توسط NanoDrop-1000 دستگاه اسپکتروفوتومتر (NanoDrop Technologies, Montchanin, USA) در طول موجه های ۲۶۰ و ۲۸۰ نانومتر سنجیده شد و نسبتی از A260/A280 معادل ۱/۸-۲ بعنوان محدوده خلوص قابل قبول RNA در نظر گرفته شد(۱۵,۱۶).

تعیین مقدار بیان ژنهای: میزان رونویسی ژنهای از طریق سنجش مقدار mRNA مربوطه بروش RT-PCR تعیین گردید و در برخی مواقع به دلیل مقدار بسیار پایین mRNA، سطح مخصوصات RT-PCR با اجرای PCR ثانویه (nested PCR) تا حصول مقادیر قابل اندازه گیری ترا فرازیش داده شد(۱۷,۱۸). پرایمرهای اختصاصی مورد نیاز Primer-3 هر دو مرحله با استفاده از نرم افزار Primer3 (http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3) و بر اساس توالی ژن مورد نظر طراحی گردید. برای اندازه گیری

که می تواند در مجاورت دی متیل سولفوکسید (DMSO) بصورت مؤثری به سلولهای قلبی کاردیومیوسمیت تمایز یابد(۱۲) و بر اساس اثر اسیدهای چرب و فیراتها بر دیگر مدلها قلبی بنظر می رسد که این ترکیبات در سلولهای mRNA P19CL6 نیز بر مقدار ژنهای مرتبط با متابولیسم PPAR γ و PPAR β , H-FABP و PPAR α مؤثر باشند. همچنین از آنجا که اثر اسیدهای چرب به طول زنجیره و درجه اشباع شدگی آن بستگی دارد (۱۳,۱۴) پیش بینی می گردد که اسیدهای چرب مختلف اثر تمایزی را بر بیان ژنهای یاد شده داشته باشند. علاوه بر این بمنظور دستیابی به تصویری جامع تراز تاثیر اسیدهای چرب و فیراتها بر بیان ژنهای اثر این ترکیبات بر بیان گلوبال ژنهای سلولهای P19CL6 نیز مورد بررسی قرار گرفت.

بنابراین هدف از این پژوهش تعیین اثر اسیدهای چرب شامل پالمیتیک (اشباع شده; PA)، اولئیک (با یک پیوند غیر اشباع: OA)، لینولئیک (LA; n-6 PUFA) و آلفا-لینولنیک (ALA; n-3 PUFA) اسید و کلوفیبرات بر میزان بیان ژنهای در سلولهای P19CL6 است.

روش کار:

این پژوهش بصورت مطالعه مداخله ای - تجربی اجرا گردید. پنی سیلین-استرپتومایسین، سرم آلبومن گاوی (BSA)، پالمیتیک، اولئیک، لینولئیک و آلفا-لینولنیک اسید، کلوفیبرات و دی متیل سولفوکسید از (Sigma-Aldrich Ltd. Pool, UK) معرف Trizol، محیط کشت α-MEM و FBS، Invitrogen Corporation (Paisley, UK) nested PCR گردید. پودر آگاروز برای الکتروفورز و کیت Promega Corporation (Southampton, UK) از طریق MWG (Milton Keynes, UK) پرایمرهای الیگونوکلئوتیدی را فراهم ساخت. کیت Ready-To-Go RT-PCR اسالایدهای Cy5-dCTP و Cy3-dCTP و رنگهای فلورسانس Amersham Biosciences (Chalfont St. Giles, UK) از خریداری گردید و شرکت Corning Life Sciences (Schiphol-Rijk, Netherlands) کیت ProntoPlus microarray را برای آزمایشات تامین نمود. همچنین کیتهای RNeasy MinElute Cleanup و RNase-free DNase و MinElute PCR Purification از

سلولهای P19CL6 بمدت ۱۴ روز در حضور ۰.۱٪ DMSO کشت داده شده و پس از آن یک روز در محیطی عاری از سرم (FBS) قرار گرفتند. سلولها سپس بمدت ۲۴ ساعت با اسیدهای چرب یا کلوفیبرات انکوبه شده و RNA تام آنها استخراج گردید. زنجیره های RNA با استفاده از mRNA موجود در RNA تام cDNA سلولی سنتز و مطابق طرح مقایسه ای حلقه مانند ابتدا با رنگهای فلورسانس نشاندار شده و پس از تخلیص cDNA بر روی اسلایدها هیبرید شدند (۱۵).


تصاویر اسلایدهای حاصله بوسیله اسکنر Affymetrix 428 (Santa Clara, USA) BlueFuse (BlueGenome Ltd., افزار Great Shalford, UK) بررسی شد و متعاقب آن اطلاعات GeneSpring-7 (Silicon Genetics Redwood City, USA) بدست آمده به کمک نرم افزار LLAMA (Live Linear Analysis of Microarray) بیشتر قرار گرفت. پس از آن، یافته های حاصل از مقایسه نمونه ها به کمک نرم افزار LLAMA (تحت برنامه clustering اینترنتی http://rana.lbl.gov/) برای ایجاد یک ارتباط شجره ای بین نوع محیط کشت بکار رفته و میزان بیان ژنهای گرفته شد.

نتایج:

میزان بیان mRNA مربوط به ژنهای PPAR γ , PPAR β , PPAR α , H-FABP بروش RT-PCR اندازه گیری و بصورت P19CL6 نیمه-کمی نسبت به بیان ژن GAPDH محاسبه گردید. آنالیز واریانس یکطرفه برای تعیین میزان تاثیر اسیدهای چرب و کلوفیبرات بر رونویسی ژنهای نشان داد که این ترکیبات اثر قابل ملاحظه ای بر بیان ژنهای H-FABP و PPAR β ندارند، اگرچه میزان رونویسی ژنهای PPAR α و PPAR γ بطور چشمگیری تحت تاثیر اسیدهای چرب افزایش یافته است، بعلاوه، مقدار mRNA دو ژن اخیر در حضور تمامی اسیدهای چرب (اما نه کلوفیبرات) به کار رفته در آزمایش افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد (جدول ۱).

نیمه-کمی میزان بیان ژنهای ZL آگاروز (۰.۲٪) محتوی ethidium bromide PCR بروش الکتروفورز جداسازی شدند. سپس از ژلهای عکسبرداری صورت گرفت و تصاویر تهیه شده به کمک نرم افزار Scion Image (<http://www.scioncorp.com/>) دیجیتال تبدیل و مقدار بیان ژنهای نسبت به بیان ژن GAPDH (ژن کنترل) تعیین گردید (۱۶).

آزمایشات microarray: بمنظور بررسی بیان گلوبال ژنی در سلولها، اسلایدهایی که بر روی آنها probe مربوط به ۷۵۰۰ ژن مختلف نشانده شده است مورد استفاده قرار گرفت تا امکان مقایسه همزمان میزان رونویسی ۷۵۰۰ ژن مختلف در سلولهای قلبی فراهم گردد. همچنین برای ایجاد امکان مقایسه بین نمونه ها، فرم مقایسه ای حلقه مانندی (شکل ۱) با هیبریداسیون دوسری (dual-hybridisation) و به کمک نرم افزار MARIE:ExGen; (<http://exgen.ma.umist.ac.uk>) اینترنتی (۲۰) و هیبریداسیون بدین شرح به انجام رسید.




شکل ۱: طراحی حلقه مانند برای مقایسه بیان گلوبال ژنی در سلولهای کشت شده با اسیدهای چرب با کلوفیبرات بروش microarray (A) طرح حلقه مانند برای مقایسه ۶ محیط کشت مختلف. نمونه ابتدایی هر بردار با Cy3 و نمونه هدف واقع در انتهای بردار با Cy5 شناساند شده است. (B) نمونه ها و نوع رنگ فلورسانس بکار رفته بر روی هر اسلايد را نشان می دهد. ALA: آلفا-لینولنیک اسید، BSA: سرم آلبومین گاوی، Clo: کلوفیبرات، LA: لینولنیک اسید، OA: اولنیک اسید، PA: پالمیتیک اسید.

جدول ۱: مقایسه میزان نسبی بیان ژنهای P19CL6 کشته شده با اسیدهای چرب و کلوفیبرات

کلوفیبرات	بیان ژنهای نسبت به GAPDH (میانگین \pm انحراف معیار)					ژن
	ALA	LA	OA	PA	BSA	
۱/۲۳ \pm ۰/۱۶	۱/۲۷ \pm ۰/۲۳	۱/۲۲ \pm ۰/۲۷	۱/۲۲ \pm ۰/۱۲	۱/۱۵ \pm ۰/۱۸	۱/۲۲ \pm ۰/۱۱	H-FABP
۱/۴۹ \pm ۰/۱۵	^b ۲/۰ \pm ۰/۲۴	^b ۱/۹۹ \pm ۰/۱۶	^b ۱/۸۹ \pm ۰/۱۹	^a ۱/۷۰ \pm ۰/۴۰	۱/۲۷ \pm ۰/۱۴	PPAR α
۱/۱۱ \pm ۰/۱۷	۱/۳۵ \pm ۰/۱۷	۱/۳۷ \pm ۰/۳۳	۱/۱۶ \pm ۰/۲۳	۱/۰۹ \pm ۰/۱۶	۰/۹۷ \pm ۰/۳۷	PPAR β
۱/۲۴ \pm ۰/۲۰	^a ۱/۸۰ \pm ۰/۲۶	^b ۲/۱ \pm ۰/۲۶	^b ۱/۹۶ \pm ۰/۲۲	^a ۱/۷۸ \pm ۰/۲۱	۱/۲۱ \pm ۰/۲۳	PPAR γ

سلولهای P19CL6 در حضور اسیدهای چرب یا کلوفیبرات (۰/۴ mM) کشته داده شده و میزان بیان ژنهای طی سه نمونه بیولوژیکی و با استفاده از RT-PCR (۰/۴ mM) کشته داده شده و میزان بیان ژنهای طی سه نمونه بیولوژیکی و با استفاده از PCR بر روی ژل آگاروز جاذبازی شده و از ژل تصویربرداری بعمل آمد. پس از تخمین نیمه-کمی میزان بیان ژنهای، آنالیز واریانس یکطرفه بمنظور تعیین اثر اسیدهای چرب و کلوفیبرات بر میزان رونویسی ژنهای انجام گردید. یافته ها بصورت Mean \pm SD و تفاوت معنادار در بیان ژنهای در حضور اسیدهای چرب یا کلوفیبرات نسبت به محیط کشته حاوی BSA بصورت $P < 0.05$ و $P < 0.001$ نشان داده شده است. ALA: آلفا-لینولنیک اسید، LA: کلوفیبرات، OA: سرم آلبومین گاوی، Clo: پالمیتیک اسید.

نتیجه متشابهی نیز از طریق principal component analysis (PCA) (شکل ۳) که بیانگر این نکته است که اثرات ALA، LA و کلوفیبرات ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته ولی متفاوت از اثرات پالمیتیک (PA) و اولئیک اسید (OA) میباشد.




شکل ۳: نمودار principal component analysis (PCA) حاصل از مقایسه بیان گلوبال ژنهای در سلولهای P19CL6 کشته شده با اسیدهای چرب یا کلوفیبرات. منحنی نشانگر مشابهت اثر نمونه ها است. PC1 و PC2 به ترتیب معرف %۶۶ و %۱۹ از توتال واریانس می باشند. ALA: آلفا-لینولنیک اسید، BSA: سرم آلبومین گاوی، Clo: کلوفیبرات، LA: لینولئیک اسید، OA: اولئیک اسید، PA: پالمیتیک اسید

بحث:

بمنظور تعیین اثر اسیدهای چرب و کلوفیبرات بر بیان ژنهای در سلولهای P19CL6، ابتدا منحصراً "میزان mRNA برخی ژنهای وابسته به متابولیسم چربیها از قبیل PPAR γ , PPAR β , PPAR α , H-FABP و PPAR γ برروش

هر چند که این یافته ها بعنوان نتایج مقدماتی در بهترین حالت نیمه-کمی حاصل شده و تا حدودی می تواند نشانگر پاسخهای بیولوژیک سلولی باشد با اینهمه برای حصول به نتایج جامع تری از تاثیر اسیدهای چرب و کلوفیبرات بر بیان گلوبال ژنی آزمایشات microarray طراحی و به انجام رسید.

تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمایشات microarray نشان داد که سطح بیان ژنهای در سلولهای که لینولئیک (LA) و یا آلفا-لینولنیک اسید (ALA) دریافت کرده اند شبیه به هم بوده و ارتباط نزدیکی را با اثر حاصل از کلوفیبرات نشان می دهد (شکل ۲).



شکل ۲: آنالیز شجره ای حاصل از آزمایشات microarray برای مقایسه میزان بیان گلوبال ژنهای در سلولهای P19CL6 کشته شده با اسیدهای چرب یا کلوفیبرات. نمونه ها بر اساس میزان شباهت در بیان گلوبال ژنهای دو به دو مقایسه و به فرم شجره ای دسته بندی گردیدند. هر خط افقی بیانگر یک ژن بوده و محیط کشته های مختلف بصورت ستونی نشان داده شده اند. ALA: آلفا-لینولنیک اسید، BSA: سرم آلبومین گاوی، Clo: کلوفیبرات، LA: لینولئیک اسید، OA: اولئیک اسید، PA: پالمیتیک اسید.

مؤثر نیست، همانگونه که این امر در سلولهای مخاطی (rat colon) و سلولهای اندوتیال (انسان) به اثبات رسیده است (۳۱، ۳۲).

اگرچه افزایش سنتز mRNA خاص PPAR α بوسیله کلوفیرات در دیگر سیستمهای سلولی پیشتر به اثبات رسیده است (۳۳-۳۵) در این مطالعه تغییر قابل ملاحظه ای در میزان بیان ژن ایزوفرمهای مختلف PPAR در سلولهای P19CL6 کشت داده شده با کلوفیرات مشاهده نگردید. عدم پاسخ دهی ژن PPAR α به حضور کلوفیرات، آنگونه که در این پژوهش مشاهده شد، می تواند ناشی از زمان کوتاه انکوباسیون باشد چرا که انکوباسیونهای طولانی تر استفاده شده در دیگر مطالعات عموماً "با افزایش بیان ژن PPAR α همراه بوده است (۳۳، ۳۵، ۳۶).

گذشته از بررسی اثر اسیدهای چرب و کلوفیرات بر میزان بیان ژنهای PPAR β , PPAR α , H-FABP و PPAR γ , اثر این ترکیبات بر بیان گلوبال ژنی سلولهای P19CL6 نیز با استفاده از روش microarray مورد بررسی قرار گرفت. همانگونه که در نتایج حاصل از آنالیز H-FABP و کلوفیرات clustering و PCA مشهود است LA, ALA و PA اثر مشابهی را بر سلولها داشته اند و بنظر می رسد که PA و OA اثری متفاوت از آنها را بر جای گذاشته اند. این مشاهدات در تایید مطالعات قبلی است که نشان می دهد اسیدهای چرب اشباع شده و غیر اشباع غذایی اثر متفاوتی را بر بیان ژنهای اعمال می نمایند (۳۷-۴۱). که این امر می تواند ناشی از تفاوت در تمایل SFA و PUFA به اتصال و فعال سازی فاکتورهای رونویسی باشد (۴۲، ۶).

همچنین اثر کلوفیرات بر وضعیت بیان گلوبال ژنی سلولها شباهت بسیاری به اثرات LA و ALA داشته و موید این نکته است که اثر PUFA شبیه کلوفیرات بوده و متفاوت از اسیدهای چرب اشباع (SFA) و یا اسیدهای با یک پیوند غیر اشباع (MUFA) است.

نتیجه نهائی:

با توجه به مشاهدات انجام شده می توان نتیجه گرفت که هر دو آزمایش RT-PCR و microarray نشان دادند که کشت سلولهای P19CL6 با اسیدهای چرب و یا کلوفیرات بر میزان بیان ژنهای مؤثر است. آزمایشات PCR اثبات نمود که تحت شرایط آزمایشی به کار رفته اسیدهای چرب بر فرآونی مقیدار PPAR α و

PCR اندازه گیری گردید و متعاقب آن سطح بیان گلوبال ژنی سلولها بروش microarray آنالیز شده و مورد بررسی قرار گرفت.

در این مطالعه اندازه گیری میزان بیان ژنهای با استفاده از RT-PCR، تفاوت معناداری را در بیان نسبی ژن H-FABP در سلولهای کشت شده با اسیدهای چرب یا کلوفیرات نشان نداد. اگرچه مطالعات قبلی حاکی از آن است که اسیدهای چرب یا کلوفیرات بیان ژن H-FABP را در کاردیومیوسیت ها افزایش می دهند (۹، ۲۲، ۲۳)، گروهی دیگر از مطالعات تغییری در میزان mRNA مربوط به H-FABP را حتی پس از مصرف غذای پر چرب گزارش نکرده اند (۱۱، ۲۴، ۲۵). گزارشات متناقض مشابهی نیز در مورد میزان بیان ژن H-FABP در سلولهای عضلات اسکلتی ارائه شده است که بیانگر عدم تغییر موثر در محتوای H-FABP سلولی پس از یک هفته مصرف غذای پر چرب است (۲۴، ۲۶)، در حالیکه مصرف طولانی مدت (۴ هفته) بطور چشمگیری بیان ژن را افزایش می دهد (۲۶). بنابراین عدم تغییر در میزان ژن H-FABP، آنگونه که در این پژوهش مشاهده گردید، احتمالاً "بدلیل زمان نسبتاً" کوتاه انکوباسیون سلولها (۲۴ ساعت) است. پس چنین استنتاج می گردد که پاسخ ژن H-FABP به حضور اسیدهای چرب یا کلوفیرات آهسته بوده و برای مشاهده هر گونه تاثیر این ترکیبات بر ژن H-FABP احتمالاً انکوباسیونی طولانی تر از ۲۴ ساعت مورد نیاز است.

اسیدهای چرب یا کلوفیرات تاثیر قابل ملاحظه ای بر میزان رونویسی ژن PPAR β در سلولهای P19CL6 نداشتند در حالیکه مقدار mRNA مربوط به ژنهای PPAR γ و PPAR α در حضور اسیدهای چرب و بدون در نظر گرفتن طول زنجیره و یا درجه اشباع شدگی آن افزایش معناداری یافت. بنابراین، مشاهدات انجام شده در این آزمایش در توافق با مطالعات گذشته است که نشان داد چربیهای غذایی و فیبرتها بیان ژنهای PPAR α و PPAR γ را در بافت‌های مختلف افزایش می دهند (۳۰-۳۷). برخلاف افزایش چشمگیر مشاهده شده در میزان PPAR α و PPAR γ ، انکوباسیون سلولها با اسیدهای چرب یا کلوفیرات تاثیری بر میزان PPAR β نداشت. این مشاهده نیز در تأیید نتایج گزارش یافته پیشین است که نشان PPAR β می دهد مصرف غذای چرب بر سطح بیان ژن

- plasmic fatty acid binding protein in rat skeletal muscles and heart. Eur J Appl Physiol 2002;87:193-201
10. Marti A, Vaquerizo J, Zulet MA, Moreno-Aliaga MJ, Martinez JA. Down-regulation of heart HFABP and UCP γ gene expression in diet-induced(cafeteria) obese rats. J Physiol Biochem 2002;58:69-74
 11. Garnier A, Poizat C, Keriel C, Cuchet P, Vork MM, de Jong YF, et al. Modulation of fatty acid-binding protein content of adult rat heart in response to chronic changes in plasma lipid levels. Mol Cell Biochem 1993; 123:107-112
 12. Habara-Ohkubo A. Differentiation of beating cardiac muscle cells from a derivative of P19 embryonal carcinoma cells. Cell Struct Funct 1996;21:101-110
 13. Ntambi JM, Bene H. Polyunsaturated fatty acid regulation of gene expression. J Mol Neurosci 2001;16:273-278
 14. Jump DB. Fatty acid regulation of gene transcription. Crit Rev Clin Lab Sci 2004; 41: 41-78
 15. Yu J, Othman MI, Farjo R, Zareparsi S, MacNee SP, Yoshida S, et al. Evaluation and optimization of procedures for target labelling and hybridization of cDNA microarrays. Mol Vis 2002;8:130-137
 16. Brown TA. Gene cloning and DNA analysis: An introduction, 4th ed. Oxford: Blackwell Science, 2001.
 17. Newton CA ,Graham A. PCR. 2nd ed. Oxford: BIOS Scientific, 1997
 18. McPherson MJ, Hames BD, Taylor GR. PCR2: A Practical Approach. New York, USA: Oxford University , 1995
 19. Ullmannova V, Haskovec C. The use of housekeeping genes (HKG) as an internal control for the detection of gene expression by quantitative real-time RT-PCR. Folia Biol 2003;49:211-216
 20. Vinciotti V, Khanin R, D'Alimonte D, Liu X, Cattini N, Hotchkiss G, et al. An experimental evaluation of a loop versus a reference design for two-channel microarrays. Bioinformatics 2005;21:492-501
 21. Wit E, McClure J. Statistics for microarrays: design, analysis, and inference. 1st ed. Chichester: Jone Wiley & Sons, 2004
 22. Chang W, Rickers-Haunerland J, Haunerland NH. Induction of cardiac FABP gene expression by long chain fatty acids in cultured rat muscle cells. Mol Cell Biochem 2001;221:127-132
 23. van der Lee KA, Vork MM, De Vries JE, Willemse PH, Glatz JF, Reneman RS, et al. Long-chain fatty acid-induced changes in gene expression in neonatal cardiac myocytes. J Lipid Res 2000;41:41-47

(اما نه PPAR γ یا H-FABP) تاثیر دارد. از سوی دیگر آزمایشات microarray نشان داد که اثر LA از گروه اسیدهای چرب غیر اشباع (PUFA) و کلوفیرات شبیه هم بوده و متمایز از اثربال PA و OA دارد. بعلاوه بنظر می رسد که نحوه تاثیر کلوفیرات در مقایسه با SFA شباهت بیشتری را به PUFA نشان می دهد.

سپاسگزاری:

بدینوسیله بر خود لازم می دانیم که از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی همدان که امکان اجرای این پروژه را فراهم ساختند سپاسگزاری نمائیم.

منابع :

1. Dyerberg J, Eskesen DC, Andersen PW, Astrup A, Buemann B, Christensen JH, et al. Effects of *trans*- and n-3 unsaturated fatty acids on cardiovascular risk markers in healthy males .An 8 weeks dietary intervention study. Eur J Clin Nutr 2004; 58: 1062-1070
2. Calder PC. Long-chain n-3 fatty acids and cardiovascular disease: further evidence and insights. Nutr Res 2004;24:761-772
3. Calder PC. n-3 Fatty acids and cardiovascular disease: evidence explained and mechanisms explored. Clin Sci 2004;107:1-11
4. Mesa MD, Buckley R, Minihane AM, Yaqoob P. Effects of oils rich in eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids on the oxidizability and thrombogenicity of low-density lipoprotein. Atherosclerosis 2004; 175:333-343
5. Sampath H, Ntambi JM. Polyunsaturated fatty acid regulation of gene expression. Nutr Rev 2004;62:333-339
6. Khan SA, Vanden Heuvel JP. Role of nuclear receptors in the regulation of gene expression by dietary fatty acids. J Nutr Biochem 2003;14:554-567
7. Clarke SD. Polyunsaturated fatty acid regulation of gene transcription: a molecular mechanism to improve the metabolic syndrome. J Nutr 2001;131:1129
8. Cameron-Smith D, Burke LM, Angus DJ, Tunstall RJ, Cox GR, Bonen A, et al. A short-term high-fat diet up-regulates lipid metabolism and gene expression in human skeletal muscle. Am J Clin Nutr 2003;77: 313-318
9. Clavel S, Farout L, Briand M, Briand Y, Jouanel P. Effect of endurance training and/or fish oil supplemented diet on cyto-

- دوره چهاردهم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۶، شماره مسلسل ۴۳
24. Veerkamp JH, van Moerkerk HT. Fatty acid-binding protein and its relation to fatty acid oxidation. *Mol Cell Biochem* 1993; 123:101-106
 25. Coe NR, Bernlohr DA. Physiological properties and functions of intracellular fatty acid-binding proteins. *Biochim Biophys Acta* 1998;1391:287-306
 26. Roepstorff C, Helge JW, Vistisen B, Kiens B .Studies of plasma membrane fatty acid-binding protein and other lipid-binding proteins in human skeletal muscle. *Proc Nutr Soc* 2004;63:239-244
 27. Vidal-Puig A, Jimenez-Linan M, Lowell BB, Hamann A, Hu E, Spiegelman B, et al. Regulation of PPAR γ gene expression by nutrition and obesity in rodents. *J Clin Invest* 1996;97:2553-2561
 28. Moral R, Solanas M, Manzanares EM, Haro D, Escrich E. Influence of DMBA-induced mammary cancer on the liver CPT-I, mitochondrial HMG-CoA synthase and PPAR α mRNA expression in rats fed a low or high corn oil diet. *Int J Mol Med* 2004;14:283-287
 29. Chambrier C, Bastard JP, Rieusset J, Chevillotte E, Bonnefont-Rousselot D, Therond P, et al. Eicosapentaenoic acid induces mRNA expression of PPAR γ . *Obes Res* 2002;10:518-525
 30. Madsen L, Petersen RK, Kristiansen K. Regulation of adipocyte differentiation and function by polyunsaturated fatty acids. *Biochim Biophys Acta* 2005;1740:266-286
 31. Delage B, Bairras C, Buaud B, Pallet V, Cassand P. A high-fat diet generates alterations in nuclear receptor expression: prevention by vitamin A and links with cyclooxygenase-2 and β -catenin. *Int J Cancer* 2005;116:839-846
 32. Ye P, Hu X, Zhao Y. The increase in plasminogen activator inhibitor type-1 expression by stimulation of activators for peroxisome proliferator-activated receptors in human endothelial cells. *Chin Med Sci J* 2002;17:112-116
 33. Guan JZ, Tamasawa N, Murakami H, Matsui J, Yamato K, Suda T. Clofibrate, a peroxisome-proliferator, enhances reverse cholesterol transport through cytochrome P450 activation and oxysterol generation. *Tohoku J Exp Med* 2003;201:251-259
 34. Akbiyik F, Ray DM, Bozkaya H, Demirpence E. Ligand- and species-dependent activation of PPAR α . *Cell Physiol Biochem* 2004;14:269-276
 35. Amsaguine-Safir S, Bianchi A, Collet P, Huin-Schohn C, Jeanvoine A, Becuwe P, et al. Induction of the expression of the PPAR α by clofibrate in jerboa tissues. *Microsc Res Tech* 2003;61:185-190
 36. Akbiyik F, Cinar K, Demirpence E, Ozsullu T, Tunca R, Haziroglu R, et al. Ligand-induced expression of PPAR α and activation of fatty acid oxidation enzymes in fatty liver. *Eur J Clin Invest* 2004;34:429-435
 37. Siculella L, Sabetta S, Damiano F, Giudetti AM, Gnoni GV. Different dietary fatty acids have dissimilar effects on activity and gene expression of mitochondrial tricarboxylate carrier in rat liver. *FEBS Lett* 2004; 578: 280-284
 38. Giudetti AM, Sabetta S, di Summa R, Leo M, Damiano F, Siculella L, et al. Differential effects of coconut oil- and fish oil-enriched diets on tricarboxylate carrier in rat liver mitochondria. *J Lipid Res* 2003;44:2135-2141
 39. Garcia-Pelayo MC, Garcia-Peregrin E, Martinez-Cayuela M. Differential translational effects of myristic acid and eicosapentaenoic acid on 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase from Reuber H35 hepatoma cells. *Exp Biol Med* 2004; 229:781-786
 40. Zhao A, Yu J, Lew JL, Huang L ,Wright SD, Cui J. Polyunsaturated fatty acids are FXR ligands and differentially regulate expression of FXR targets. *DNA Cell Biol* 2004;23:519-526
 41. Weigert C, Brodbeck K, Staiger H, Kausch C, Machicao F, Haring HU, et al. Palmitate, but not unsaturated fatty acids, induces the expression of interleukin-6 in human myotubes through proteasome-dependent activation of nuclear factor-kB. *J Biol Chem* 2004;279:23942-23952
 42. Gilde AJ, van Bilsen M. Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs): regulators of gene expression in heart and skeletal muscle. *Acta Physiol Scand* 2003;178:425-434