

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر تجویز دکسترومتروفان خوراکی قبل از عمل بر روی درد حاد پس از عمل جراحی بستن لوله های رحمی در دوره پس از زایمان

دکتر ناهید منوچهریان*، دکتر سید مجید هاشمی فشارکی**، دکتر پوران حاجیان*، دکتر ابراهیم خوشرفتار*

دریافت: ۸۷/۱۰/۱۵ ، پذیرش: ۸۸/۵/۷

چکیده:

مقدمه و هدف : در اغلب اعمال جراحی با درد پس از عمل مواجه هستیم که می توانند آثار سوئی را بر سیستم های مختلف بدن داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر دکسترومتروفان خوراکی بر کاهش درد پس از عمل جراحی لوله بستن تحت بیهوشی عمومی می باشد.

روش کار : در این مطالعه ۴ زائوی (ASA Class I,II) کاندید عمل جراحی بستن لوله های رحمی در یک کارآزمایی بالینی دوسوکور در دو گروه ۲۰ نفری مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از اخذ رضایت نامه کتبی حدوداً ۹۰ دقیقه قبل از شروع عمل جراحی، مقدار ۹۰ mg دکسترومتروفان خوراکی و پلاسبو در حجم و شکل های یکسان برای بیماران تجویز شد. سپس بیماران تحت بیهوشی عمومی با تزریق فنتانیل $1/5 \mu\text{g/kg}$ ، تیوپنتان $1/5 \mu\text{g/kg}$ و سوکسینیل کولین $1/5 \text{mg/kg}$ قرار گرفته و با لوله شماره ۷ اینتوویه شدند. برای نگهداری بیهوشی نیز از O_2 (%) و هالوتان (۰.۵%) استفاده شد. در پایان عمل شدت درد بر حسب VAS در ریکاوری و نیز در ساعتیا ۲، ۴، ۸ و ۲۴ ساعت پس از عمل جراحی بررسی و ثبت شد، همچنین نیاز به مسکن، تهوع و استفراغ، دپرسیون تنفسی و احتباس ادراری نیز ارزیابی گردید. اطلاعات بدست آمده با نرم افزار SPSS 10 و توسط آزمونهای χ^2 و من ویتنی یو آنالیز گردید.

نتایج : دو گروه از نظر سن و تحصیلات تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. میزان درد در ریکاوری و ساعتهاي دوم و چهارم پس از عمل جراحی در گروه دارو کمتر از پلاسبو بود و میزان درد در ساعتهاي ۸ و ۲۴ پس از جراحی در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. همچنین میزان مصرف مسکن (پتیدین) نیز در گروه دارو کمتر بود.

نتیجه نهایی : تجویز خوراکی ۹۰ mg دکسترومتروفان خوراکی، قبل از عمل جراحی می تواند درد پس از عمل را بخصوص در دوره بلفاراصله و ساعتهاي دوم و چهارم پس از عمل کاهش دهد.

کلید واژه ها : درد / دکسترومتروفان / عقیم سازی لوله ای

جراحی به منظور به حداقل رساندن تروما به بیماران و کاهش موربیدیتی و مورتالیتی و کوتاه ساختن مدت اقامت در بیمارستان و تقلیل هزینه های بهداشتی پیشرفت‌های زیاد کرده اند (۱).

پیشگیری از بارداری توسط روش‌های متعددی صورت می گیرد که یکی از مؤثرترین آنها بستن لوله های رحمی بطريقه جراحی است که روشی مطمئن و غیر قابل برگشت می باشد. برای اولین بار توسط لانگرن در سال

مقدمه :

در اغلب اعمال جراحی با درد پس از عمل مواجه هستیم. درد یک احساس نامطبوع و یک تجربه ناخوشایند روانی است که با تخریب واقعی بافت‌ها همراه می باشد (۱). درد پس از عمل آثار سوئی را بر سیستم های مختلف بدن از قبیل سیستم های تنفسی، قلبی عروقی، گوارشی و ادراری بر جا می گذارد و سبب ایجاد تغییرات متابولیک و عصبی - هورمونی نیز می گردد (۱). امروزه اغلب اعمال

* استادیار گروه بیهوشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان (manouchehrian@umsha.ac.ir)

** متخصص بیهوشی

حدود ۹۰ دقیقه قبل از عمل ، مقدار ۹۰ میلی گرم دکسترومتورفان خوراکی (به شکل شربت) و پلاسبو (شربت زعفران) با حجم و شکل یکسان توسط یک نفر به بیماران دو گروه داده شد ، سپس بیماران تحت اينداكشن ۵ mg/kg بهوشی عمومی با فنتانیل $\mu\text{g}/\text{kg}$ ۱/۵ قرار گرفته و با لوله سوکسینیل کولین mg/kg ۱/۵ با اینتوهه شدند. نگهداری بهوشی با گازهای اکسیژن و نیترو اکساید با نسبت ۵۰٪ و هالوتان ۸٪ صورت گرفت.

در انتهای عمل جراحی ، پس از خارج نمودن لوله تراشه ، بیمار به ریکاوری منتقل گردید. سپس شدت درد بیمار توسط شخص دیگری در ریکاوری و همچنین در ساعتهاي دوم ، چهارم ، هشتم و بیست و چهار ساعت پس از عمل بر حسب VAS بررسی شده و ثبت گردید.

در صورت ≥ 6 VAS ، ۲۵ میلی گرم پتیدین داخل وریدی نیز تزریق می شد. همچنین بیماران از نظر وجود علائمی مثل تهوع ، استفراغ ، دپرسیون تنفسی و احتباس ادراری و خارش نیز بررسی می شدند. اطلاعات بدست آمده در پرسشنامه هایی جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار ۱۰ SPSS و توسط آزمون Mann-withney U test آنالیز شد و $P < 0.05$ از نظر آماری معنی دار تلقی گردید.

نتایج :

توزيع سنی در دو گروه یکسان بود و بیماران در طیف سنی ۳۰-۳۵ ساله قرار داشتند. دو گروه از نظر میزان تحصیلات و محل سکونت (روستایی یا شهری) نیز تفاوتی با یکدیگر نداشتند.

همانطور که در جدول ۱ مشاهده می شود بررسی درد در زمان ریکاوری نشان داد که ۷ نفر از گروه دارو (۳۵٪) در مقایسه با یک نفر (۵٪) از گروه شاهد (پلاسبو) کاملاً بیدرد بودند ($VAS=0$) ، همچنین میانگین رتبه درد در زمان ریکاوری در گروه دارو ۱۴/۰ و در گروه پلاسبو ۲۶/۹۵ بود که اختلاف دو گروه از نظر آماری نیز معنی دار می باشد ($P.v=0.000$). میانگین رتبه درد در ۲ ساعت پس از جراحی در گروه دارو ۱۶/۵ و در گروه پلاسبو ۲۴/۸۵ بود و اختلاف دو گروه از نظر آماری نیز معنی دار می باشد ($P.v=0.15$). میانگین رتبه درد در ۴ ساعت پس از جراحی در گروه دارو ۱۶/۵ و در گروه پلاسبو ۲۴/۴۵ بود و اختلاف آنها از نظر آماری معنی دار

۱۸۸۰ انجام شد و هم اکنون یکی از شایعترین و مؤثرترین راههای پیشگیری از بارداری در زنان می باشد(۲). لوله های رحمی تا چند روز پس از زایمان بطور مستقیم در زیر دیواره شکم در دسترس هستند بنابراین انجام جراحی ، در این زمان راحت تر بوده و با دستکاری و خطرات کمتری همراه می باشد. همانند سایر اعمال جراحی ، جراحی بستن لوله های رحمی نیز با درد نسبتاً شدید پس از عمل همراه می باشد که برای درمان آن می توان از مخدراها استفاده نمود. عوارض جانبی مخدراها شامل تهوع ، استفراغ ، خارش ، دپرسیون تنفسی ، احتباس ادراری و خواب آلودگی می باشند(۱) این داروها همچنین قابلیت عبور از شیر مادر را نیز دارا هستند. بنابراین با توجه به عوارض فوق الذکر بهتر است برای درمان درد پس از عمل از داروهای دیگری استفاده شود مانند داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی ، NSAID ها یا دکسترومتورفان و ... (۱).

دکسترومتورفان یک آنتاگونیست رسپتورهای N- متیل دی آسپارتیک اسید است که می تواند سبب کاهش درد پس از عمل شود و نسبت به مخدراها ارزان قیمت تر بوده و با عوارض جانبی کمتری نیز همراه می باشد(۱). عوارض جانبی دکسترومتورفان شامل تهوع و استفراغ ، خواب آلودگی و شکم درد می باشد(۳) لذا این مطالعه صورت گرفته تا تأثیر تجویز خوراکی قبل از عمل دکسترومتورفان را بر روی درد حاد پس از عمل جراحی بستن لوله های رحمی در دوره پس از زایمان بررسی نماید.

روش کار :

این مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی و از نوع دو سوکور می باشد. در این مطالعه از بین زنان بسته در بخش پس از زایمان بیمارستان فاطمیه همدان که خواهان بستن لوله های رحمی بودند تعداد ۴۰ بیمار انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه ۲۰ نفری تقسیم گردیدند. بیماران قبل از جراحی توسط متخصص بهوشی ویزیت شده و پس از دادن توضیحات شفاهی و اخذ رضایت نامه کتبی جهت شرکت در طرح آماده شدند. همچنین آموزش‌های لازم در رابطه با نحوه اندازه گیری درد به روش Visual Analogue Scale (VAS) با استفاده از خط کش ده سانتیمتری نیز به آنها داده شده و از آنها خواسته شد که بر روی یک خط کش مدرج که از صفر تا ده درجه بندی شده ، میزان درد خود را به نسبت شدت آن ، در ساعتهاي مشخصی علامت گذاري نمایند.

گروه پلاسیو (۰/۵۵٪) مشاهده شد که اختلاف بین آنها معنی دار بود (۰/۰۲٪).

بحث:

درد پس از عمل می تواند سبب ایجاد اثرات سوء فیزیولوژیک شود که تظاهرات آن در ارگانهای مختلف بدن ظاهر می شود و بعنوان مثال اعمال جراحی در قسمتهای فوقانی شکم اغلب سبب هیپوونتیلاسیون (کاهش تلاش تنفسی) ناشی از درد و عدم حرکت و اشکال در سرفه کردن بیمار می شود (۱). این تغییرات به نوبه خود موجب احتباس ترشحات، آلتکتاژی، اختلال در نسبت تهویه به جریان خون ریوی و افزایش بروز هیپوکسمی شریانی و پنومونی می گردد (۱).

دردی که باعث محدودیت در حرکت پس از عمل شود با افزایش قابلیت انعقاد پذیری همراه بوده و ممکن است سبب بالا رفتن شیوع ترمومیوز وریدهای عمقی شود. درد پس از عمل همچنین می تواند سبب بروز تهوع، استفراغ و احتباس ادراری گردد. کاتکول آمین های آزاد شده به علت درد باعث ایجاد تاکیکاردی و هیپرتانسیون می شوند که در بیماران مستعد می تواند منجر به بروز ایسکمی میوکارد و دیس ریتمی های قلبی شود، بنابراین کنترل مؤثر درد پس از عمل برای ارائه مراقبتهای ایده آل به بیماران ضروری است (۱).

روشهای مختلفی برای کنترل درد پس از عمل وجود دارد که شامل: روشهای تجویز خوراکی، عضلانی و وریدی مخدراها، استفاده از مخدراها با روش بیدردی تحت کنترل بیمار (P.C.A) با استفاده از پمپهای مخصوص، تجویز موضعی بیحس کننده های موضعی، بلوکهای عصبی و استفاده از داروهای کنترل کننده درد مثل NSAID و یا دکسترومتروفان ... می باشد (۱,۳,۴).

مطالعه حاضر که اثرات دکسترومتروفان بر درد پس از عمل جراحی بستن لوله های رحمی تحت بیهوشی عمومی را مورد بررسی قرار داده نشان داده است که مصرف ۹۰ mg دکسترومتروفان خوراکی ۹۰ دقیقه قبل از عمل جراحی بستن لوله های رحمی سبب کاهش درد پس از عمل در زمان ریکاوری و ساعتها دوم و چهارم پس از عمل شده است. اما در ساعتها هشتم و بیست و چهار ساعت پس از عمل تأثیر چندانی نداشته است. همچنین استفاده از دکسترومتروفان میزان مصرف پتیدین را بطور قابل توجهی کاهش داده است. مطالعات متعددی با نتایج

بود (۰/۰۲٪). میانگین رتبه درد در ۸ ساعت پس از جراحی در گروه دارو ۱۹/۸۳ و در گروه پلاسیو ۲۱/۱۷ بود که اختلاف آنها از نظر آماری معنی دار نمی باشد (۰/۰۷٪). بررسی درد در ۲۴ ساعت پس از جراحی نیز نشان می دهد که ۵ نفر در گروه دارو (۰/۲۵٪) و ۲ نفر در گروه پلاسیو (۰/۱۰٪) کاملاً بیدردند. میانگین رتبه درد در ۲۴ ساعت پس از جراحی در گروه دارو ۱۹/۷۳ و در گروه پلاسیو ۲۷/۲۷ بود و اختلاف آنها از نظر آماری معنی دار نبود (۰/۰۶٪).

جدول ۱: مقایسه میانگین رتبه درد در زمانهای مختلف پس از عمل بر حسب گروههای مورد مطالعه

گروه	تعداد	متغیر	ارش P *
دکسترومتروفان پلاسیو	۲۰	در ریکاوری	۰/۰۰۰۰۰
	۲۰	دکسترومتروفان پلاسیو	۰/۰۱۵
دکسترومتروفان پلاسیو	۲۰	۲ ساعت بعد از عمل	۰/۰۲۷
	۲۰	دکسترومتروفان پلاسیو	۰/۰۲۷
دکسترومتروفان پلاسیو	۲۰	۴ ساعت بعد از عمل	۰/۰۷۰
	۲۰	دکسترومتروفان پلاسیو	۰/۰۶۷
دکسترومتروفان پلاسیو	۲۰	۸ ساعت بعد از عمل	۰/۰۷۰
	۲۰	دکسترومتروفان پلاسیو	۰/۰۶۷
دکسترومتروفان پلاسیو	۲۰	۲۴ ساعت بعد از عمل	۰/۰۷۰
	۲۰	دکسترومتروفان پلاسیو	۰/۰۶۷

*Mann-Withney U test

میزان مصرف پتیدین بعد از عمل در گروه دارو ۶ نفر (۰/۳۰٪) و در گروه پلاسیو ۱۵ نفر (۰/۷۵٪) بود و اختلاف آنها از نظر آماری معنی دار بود (۰/۰۰۴٪). در ۶ نفری که در گروه دکسترومتروفان نیاز به پتیدین داشتند یک نفر در طی ۲ ساعت پس از عمل، یک نفر در طی ۴ ساعت پس از عمل و ۲ نفر در طی ۸ ساعت پس از عمل و ۲ نفر در طی ۲۴ ساعت پس از عمل نیاز به آن داشتند که در همه آنها نیز این نیاز یک بار بوده است. اما در ۱۵ نفر گروه پلاسیو در ساعتها مختلف و گاهاً برخی از آنها ۲ تا ۳ بار در طی ۲۴ ساعت نیاز به پتیدین داشتند.

دو گروه از نظر وجود عوارضی همانند احتباس ادراری، دپرسیون تنفسی و خارش تفاوتی با یکدیگر نداشتند. اما تهوع و استفراغ در ۴ نفر از گروه دارو (۰/۲۰٪) و ۱۱ نفر از

صرف مورفين نيز در گروه دکسترومتروفان کمتر بوده است (۱۲).

مطالعه حاضر تائيد کننده اکثر مطالعات انجام گرفته در زمينه بررسی اثر دکسترومتروفان بر درد پس از عمل می باشد (۱۳، ۱۰-۷، ۴).

نتيجه نهايى :

صرف ۹۰ mg دکسترومتروفان خوراکی ۹۰ دقيقه قبل از عمل جراحی سبب کاهش قابل توجه درد و کاهش صرف مخدرا و افزايش رضایت بيماران در زمان ریكاوري و ساعتهاي دوم و چهارم پس از عمل شده و با تهوع و استفراغ کمتری نيز طی ۲۴ ساعت پس از عمل همراه بوده است. توصيه مى شود جهت اثربخشی مطلوب تر صرف آن در دوره پس از عمل نيز بعنوان داروي مسكن ادامه يابد.

منابع :

- Miller RD. Anesthesia. 5th ed. Philadelphia : W.B. Saunders , 2005.
- Williams C. Obstetric. 21st ed. New York , 2001.
- Brunton LB, Lazo JS, Parker KL. Goodman & Gillman basis of clinical pharmacology. 11th ed. New York: McGraw-Hill, 2006.
- Weinbroum AA, Ba-Abruham R. Dextrometorphan and dexmedetomidine : New agents for control of perioperative pain. Eur J Surg 2001 Aug; 167(8): 563-9.
- Weinbroum AA, Gorodutzky A. Dextrometorphan for the reduction of immediate and late postoperative pain and morphine consumption in orthopedic oncology patients. Cancer 2002 Sep; 95(5): 1164-70.
- Weinbroum AA. Dextrometorphan reduces immediate and late post operative pain analgesic requirement and improves patients subjective scoring after epidural lidocaine and general anesthesia. Anesth Analg 2002 Jun; 94(6):1547-52.
- Ching-Tang WU. Preincisional dextrometorphan treatment decreases post operative pain and opioid requirement after laparoscopic cholecystectomy. Anesth Analg 1999; 88: 1331-4.
- Talakoub R, Molaeinasab F. Premedication with oral dextromethorphan reduces intraoperative morphine requirement. J Res Med Sci 2005 Oct; 10(5): 281-5.
- Rose JB, Cay R. Preoperative oral dextromethorphan reduce post operative pain after hysterectomy. Acta Anesthesiol Scand 2006; 50: 1-13.
- Yel CC , Host. Absence of the preemptive analgesic effect of dextrometorphan in total knee replacement under epidural anesthesia. Anesthesiology 2000 Dec; 38(4): 187-93.
- Dawson GS, Sediman P, Ramadon HH. Unimpaired post operative pain control in pediatric

مختلف در اين زمينه وجود دارد (۵-۱۳).

در مطالعه اي که بر روی ۷۵ بيمار ارتوپدي در دانشگاه تل آويو صورت گرفته است بيماران به ۳ گروه ۲۵ نفری تقسيم شده اند. گروه اول ۶۰ mg دکسترومتروفان خوراکی ، گروه دوم ۹۰ mg دکسترومتروفان خوراکی و گروه سوم پلاسيبو را در دوره قبل از عمل درياافت كرده اند. گروههای ۶۰ mg و ۹۰ mg دکسترومتروفان ميانگين درد کمتری را به ميزان ۸۰-۵۰٪ در دوره بالافاصله پس از عمل و تا ۳ روز پس از عمل نسبت به گروه پلاسيبو داشته اند. همچنانين ميزان صرف مورفين نيز در گروه دکسترومتروفان به ميزان ۷۰-۵۰٪ کمتر از گروه پلاسيبو بوده است (۵) که تائيد کننده مطالعه حاضر مى باشد.

مطالعه اي مشابه مطالعه حاضر در دانشگاه اتاواي کانادا بر روی ۸۰ بيمار کاندид عمل جراحی هرنى اينگويتال صورت گرفته است که در آن ميانگين شدت درد در طی ۶ ساعت اقامت در ریكاوري در گروه درياافت کننده ۹۰ mg دکسترومتروفان ۹۰ دقيقه قبل از عمل بطور قابل توجهی کمتر از گروه پلاسيبو بوده است و همچنانين مقدار کلى مورفين صرف شده توسط بيمار نيز در گروه دکسترومتروفان کمتر از گروه پلاسيبو بوده است (۶) که تائيد کننده مطالعه حاضر مى باشد.

در مطالعات مشابه ديگري نيز نتایج مشابهی بدست آمده است که همگی تائيد کننده مطالعه حاضر می باشد (۷-۹). اما مطالعاتی نيز وجود دارند که نتایج متناقضی با مطالعه حاضر را داشته اند (۱۰-۱۳).

در مطالعه اي که در آمريكا بر روی ۴۰ کودک ۳-۱۳ ساله کاندید عمل جراحی آدنوتونسيكتومي صورت گرفته نشان داده شده است که نياز به مورفين در گروه دکسترومتروفان اختلاف چشمگيری با گروه پلاسيبو نداشته است (۱۱).

در مطالعه ديگري که بر روی ۶۰ بيمار کاندید عمل جراحی هيسيركتومي ابدمينال صورت گرفته است درد در ساعتهاي ۴ ، ۲۴ ، ۴۸ و ۷۲ پس از عمل در گروههای دکسترومتروفان و پلاسيبو مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که در گروه دکسترومتروفان درد در ساعتهاي ۴۸ و ۷۲ پس از عمل کاهش چشمگيری نسبت به گروه پلاسيبو داشته در حاليكه در مطالعه حاضر دکسترومتروفان سبب کاهش درد در زمانهاي ریكاوري و ساعتهاي دوم و چهارم پس از عمل شده است ولی ميزان

- adenotonsillectomy with dextrometorphan. Anesth Analg 2001 Jun; 111(7): 1223-6.
12. Helmg SA, Baldi A. The effect of dextromethorphan , alone or in combination with ibuprofen on post operative pain after minor gynecological surgery. Acta Anesthesiol Scand 2000 Aug; 44(7): 873-7.
13. Wappler F, Elssel N, Baerke H. Dextromethorphan does not reduce postoperative pain after orthopedic survey under spinal anesthesia. Anesthesiology 2007; 107: A1173.

Archive of SID