

تأثیر ورزش اجباری تردمیل بر وضعیت استرس اکسیداتیو در قلب رتهای دیابتیک

دکتر ایرج صالحی^{*}، دکتر مصطفی محمدی^{**}، امیر اسدی فخر^{***}

دریافت: ۸۸/۷/۲۹، پذیرش: ۸۸/۲/۳۰

چکیده:

مقدمه و هدف: بیماری دیابت یک اختلال متابولیک است که بدن بال کاهش در ترشح انسولین و با مقاومت به عمل انسولین ایجاد می‌گردد. استرس اکسیداتیو حاصل عدم تعادل بین تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن و ظرفیت دفاع آتنی اکسیدانی به شدت با دیابت و عوارض آن در ارتباط می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین اثرات دیابت تجربی بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو و تأثیر ورزش تردمیل بر آن در بافت قلب می‌باشد.

روش کار: مطالعه تجربی - کاربردی حاضر، بر روی ۴۰ عدد موش صحرایی نر (200 ± 20 گرم) که در چهار گروه (کنترل، کنترل سالم ورزش کرده، دیابتی بدون ورزش و دیابتی ورزش کرده) تقسیم شده بودند انجام گرفت. دیابت بوسیله تزریق تک دوز استرپتوفیتوسین (۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، داخل صفاقی) ایجاد گردید. مدت مطالعه ۸ هفته و ورزش تردمیل به مدت ۱ ساعت، ۵ روز در هفته انجام شد. پس از پایان دوره ورزش، ابتدا حیوانات با تیوبنپتال سدیم (۵۰ mg/kg) بیهوش، قلب خارج و بطن چپ در روی بخ جدا و در ۰-۸ درجه سانتیگراد تا زمان آزمایش نگهداری گردید. قسمت رویی بدست آمده حاصل از هموژنیزاسیون بافت قلب برای تعیین فعالیت آنزیم‌های سوپراکساید دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)، گلوتاتیون ردوکتاز (GR) و کاتالاز (CAT) (بعنوان وضعیت آتنی اکسیدانی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین میزان مالونیل دی‌آلدیید (MDA) بعنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدی و گلوتاتیون توتال بعنوان شاخص ظرفیت آتنی اکسیدانی بافت قلبی نیز اندازه‌گیری شدند.

نتایج: القای دیابت با کاهش در میزان فعالیت آنزیم‌های گلوتاتیون ردوکتاز و کاتالاز و عدم تغییر در فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز، در بافت قلب رتهای دیابتیک نسبت به گروه کنترل همراه بود. همچنین القای دیابت موجب افزایش میزان MDA در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل گردید. ورزش در گروه دیابتی موجب افزایش میزان MDA و فعالیت آنزیم‌های GR و CAT در بافت قلب رتهای دیابتی ورزش کرده نسبت به گروه رتهای دیابتی ورزش نکرده گردید. میزان گلوتاتیون توتال بافت قلب در تمامی گروه‌ها یکسان بود.

نتیجه نهایی: تردمیل اجباری با شدت متوسط دارای اثرات مضر بر سیستم قلبی-عروقی در دیابت به دلیل افزایش سطح MDA در بافت قلب رتهای دیابتی ورزش کرده می‌باشد.

کلید واژه‌ها: استرس اکسیداتیو / پراکسیداسیون لیپیدی / دیابت شیرین / ورزش تردمیل

اصلی ایجاد اکثریت عوارض مزمن دیابت محسوب می‌گردد (۳). قلب دیابتی دچار اختلالات در متابولیسم بینابینی (۴) فیبروز قلبی (۵) عملکرد سلولهای عضلانی صاف عروقی (۶) و کارآبی انقباضی می‌باشد (۴). دیابت و عوارض آن همراه با افزایش استرس اکسیداتیو می‌باشد (۷). مکانیسمهای متعددی برای آسیب

مقدمه: دیابت ریسک فاکتور اصلی پیشرفت عوارض قلبی-عروقی متعددی می‌باشد که دلیل اصلی مرگ و میر در مبتلایان به بیماری دیابت محسوب می‌گردد (۱). بیماران دیابتی دارای پیش‌آگهی بد بدن بال انفارکتوس قلبی بدليل ابتلاء به نارسایی قلبی می‌باشند (۲). هیپرگلیسمی دلیل

* استادیار گروه هوشیاری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان (Irsalehi@yahoo.com)

** استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

*** مربي گروه هوشیاری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

(۵۰ میلی گرم به ازای هر گیلوگرم وزن بدن، داخل صفاقی) ایجاد گردید. طبق این روش ۴۸ ساعت بعد از تزریق، دیابت در موش‌های صحرایی ایجاد شده و جهت تایید دیابت، با ایجاد یک جراحت کوچک توسط لانست در دم حیوانات، یک قطره خون بر روی نوار گلوكومتری قرار گرفته و سپس توسط دستگاه گلوكومتر (Boehringer Mannheim Indianapolis, IN) نوار قرائت و قندخون بالای 300 mg/dl معنوان شاخص دیابتی شدن در نظر گرفته شد(۱۴).

گروه‌های آزمایشی: گروه‌های مختلف به شرح زیر مورد استفاده بودند: گروه کنترل بدون تزریق استرپتوزوتوسین و ورزش (C)-۲- گروه کنترل با انجام ورزش بدون تزریق استرپتوزوتوسین (CE)-۳- گروه دیابتی، تزریق استرپتوزوتوسین و بدون ورزش (D)-۴- گروه دیابتی، تزریق استرپتوزوتوسین و انجام ورزش (DE). شروع آزمایش بعد از دو هفته از القاء دیابت و نگهداری رت‌ها صورت گرفت.

بروتکل ورزشی: موش‌های صحرایی در گروه‌های ورزش، ۵ روز در هفته بمدت ۶۰ دقیقه با سرعت ۲۵ متر در دقیقه، در طول ۸ هفته توسط دستگاه ترمیل در شب صفر درجه ورزش داده شدند. به منظور سازگاری حیوانات، سرعت دستگاه بتدریج از ۵ متر به ۲۵ متر در دقیقه و زمان دویden از ۱۰ به ۶۰ دقیقه در در طول هفته اول رسانده شد. جهت اجبار حیوانات به دویden از شوک الکتریکی توسط یک صفحه میله ای در پشت دستگاه، استفاده گردید. از هفته دوم به منظور گرم شدن ابتدا به طور تدریجی در مدت ۵ دقیقه سرعت از ۵ به ۲۵ متر رسانده شده و سپس حیوانات بمدت ۶۰ دقیقه با سرعت ۲۵ متر در دقیقه ورزش کردند. موش‌های صحرایی در گروه‌های غیر ورزش نیز همانند گروه‌های ورزش در حالی که دستگاه خاموش بود به همان مدت در دستگاه ترمیل قرار داده شدند(۱۵).

هموژنیزاسیون بافت قلب: در انتهای آزمایش، ۴۸ ساعت بعد از آخرین ورزش بدبناه بیهوشی حیوانات با تیوبنیتال سدیم (50 mg/kg)، قلب خارج و پس از جدا کردن بطن چپ در روی یخ در نیتروژن مایع منجمد و به یخچال ۸۰- درجه سانتیگراد تا زمان آزمایش منتقل گردید. جهت هموژنیزاسیون نمونه جدا شده از بطن چپ به نسبت ۱۰ به ۱، در بافر لیز کننده به منظور بررسی استرس

اکسیداتیو در طی هیپرگلیسمی مزمن شامل تولید بیش از اندازه انواع اکسیژن واکنشی (ROS) (۸) اکسیداسیون خودبخودی گلوكز(۹) و سنتز محصولات انتهایی گلیکاسیون پیشرفت(۱۰) فرض گردیده است. ان-استیل ال سیستئین (NAC) دفع کننده رادیکالهای حاوی تیول و پیش ساز گلوتاتیون بطور موقفيت‌آمیزی در پیش گیری از آسیب کلیوی و نوروپاتی محیطی در مدل‌های تجربی دیابت مورد استفاده قرار گرفته است(۱۱).

بافت‌هایی که به مدت طولانی در معرض افزایش استرس اکسیداتیو قرار دارند دچار تطابق در سیستم آنتی‌اکسیدانی از طریق تحریک فعالیت آنزیماتیک می‌گردد که شامل افزایش فعالیت آنزیم‌های GSH-PX و SOD در رت‌های ورزش کرده نسبت به رت‌های ورزش نکرده می‌باشد(۱۲). نشان داده شده است که استرس اکسیداتیو القاء شده با ورزش حاد می‌تواند اریتروسیت رت‌های ورزش نکرده را تحت تاثیر قرار دهد در حالیکه بر اریتروسیت رت‌های ورزش کرده به صورت مزمن تاثیری ندارد که نشان‌دهنده نقش سیستم‌های آنتی‌اکسیدانی در حفاظت از سلول‌ها می‌باشد. اگرچه ورزش حاد و شدید منجر به افزایش استرس اکسیداتیو می‌گردد، اما ورزش منظم و متوسط از طریق افزایش دفاع آنتی‌اکسیدانی منجر به کاهش استرس اکسیداتیو و کاهش عوارض دیابت خواهد شد(۱۳). هدف از مطالعه حاضر تعیین اثرات دیابت تجربی بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو در بافت قلب و تاثیر ورزش طولانی و منظم ترد میل بر آن می‌باشد.

روش کار:

حیوانات مورد آزمایش: در این مطالعه تجربی-کاربردی از ۴۰ موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار (Wistar) با محدوده وزنی 200 ± 20 گرم تهیه شده از مرکز پرورش حیوانات دانشگاه علوم پزشکی تبریز که بطور تصادفی در گروه‌های حداقل ۱۰ تایی قرار گرفته بودند استفاده شد، حیوانات محدودیتی در دسترسی به آب و غذا نداشتند و در شرایط نوری ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی با درجه حرارت 22 ± 3 درجه سانتیگراد نگهداری می‌شدند. تمامی آزمایشات و تجربیات صورت گرفته بر اساس دستورالعمل کمیته کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز طراحی و بکار گرفته شد.

روش دیابتی کردن: دیابت بوسیله تزریق تک دوز استرپتوزوتوسین حل شده در نرمال سالین استریل

کاتالاز: فعالیت آنزیم کاتالاز بوسیله روش ابی (۲۳) اندازه گیری گردید. اندازه گیری بر اساس میزان تجزیه H₂O₂ در طول موج ۲۴۰ nm و در ۲۰ درجه سانتیگراد انجام گردید. محلول رویی بدست آمده از هموژن اولیه بافت قلبی در دور ۱۰۰۰g ۱۰۰ بندت ۱۰ دقیقه در ۴°C سانتریفوژ و مقادیر مساوی از محلول رویی (معادل ۱/۵ میلی گرم بافت مرطوب) به مخلوط حاوی ۰/۰۰۲ درصد تریتون X-100، ۰/۰۰۱ میلی مول EDTA، بافر فسفات ۰/۵ میلی مولار (pH ۷.۰) و ۱۵ H₂O₂ میلی مولار در حجم نهایی یک میلی لیتر اضافه گردید. فعالیت آنزیم از طریق محاسبه میزان جذب نوری نمونه‌ها در طول موج ۲۴۰ نانومتر و در فاصله زمانی صفر و ۱۵ ثانیه محاسبه و فعالیت آنزیم از طریق فرمول مربوطه، $K=0.153$ ($\log A_{240t=0} / \log A_{240t=15}$) بدست آمده و فعالیت آنزیم به صورت واحد بر میلی گرم پروتئین بیان شد.

اندازه گیری پروتئین: محتوا پروتئین هموژن‌ها با استفاده از کیت پروتئین تام (Randox labs. Crumlin, UK)،

طبق روش توصیه شده در کیت انجام گرفت.

آنالیز آماری: نتایج بصورت میانگین \pm انحراف معیار ارائه شده‌اند. حداقل تعداد حیوانات در گروه‌های مورد مطالعه برای محاسبات آماری ۸ عدد بود. تفاوت بین میانگین میزان پراکسیداسیون لیپیدی، گلوتاتیون توtal بافتی و سطوح فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در بین گروه‌های مختلف با کمک آزمون توکی برآورد شد. مقادیر ($P < 0.05$) (عنوان حداقل سطح معنی‌دار بودن تفاوت میانگین‌ها مورد استفاده قرار گرفته است).

نتایج:

اثر ورزش بر میزان قند خون: میزان قند خون در انتهای هفته‌های اول و هشتم در گروه‌های کنترل و سالم ورزش کرده تفاوتی نداشت، در حالیکه در دو گروه دیابتی بدون ورزش و دیابتی ورزش کرده در طول دوره آزمایش افزایش یافته بود. میزان افزایش قند خون در طول دوره آزمایش بین دو گروه فوق با همدیگر تفاوت معنی داری نداشت (شکل ۱).


اکسیداتیو توسط هموژنایزر شیشه‌ای با ۱۰ ضربه، بر روی بخ هموژن شده و در سانتریفوژ یخچال دار سانتریفوژ و از محلول رویی جهت اندازه گیری MDA و آنزیمهای SOD، GPX و CAT و GR استفاده گردید (۱۶).

آنالیز شیمیایی: اندازه گیری پراکسیداسیون لیپیدی: میزان محصولات حاصل از پراکسیداسیون لیپیدی (TBARS) بر اساس واکنش با معرف TBA با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری در طول موج ۵۳۲ nm مقایسه میزان TBARS جذب با منحنی استاندارد تعیین گردید. میزان TBARS بافت قلب بشرح ذیل اندازه گیری شد. ۰/۵ میلی لیتر از محلول رویی حاصل از هموژنیزاسیون بافت قلب به ۳ میلی لیتر اسید فسفوریک ۱٪ و ۱ میلی لیتر TBA ۰/۰۶٪ و ۰/۰۱۵ میلی لیتر از هیدروکسی تولون بوتیره ۰/۲۰٪ در متانول ۹۵٪ اضافه گردید و پس از حرارت دادن در آب جوشیده به مدت ۴۵ دقیقه سرد شده و ۴ میلی لیتر ۱- بوتائل اضافه گردید. سپس فاز بوتانول با سانتریفوژ جداشد. نتایج بصورت نانومول در میلی لیتر سرم بیان گردیدند (۲۱).

اندازه گیری گلوتاتیون توtal بافتی: محتوا گلوتاتیون بطی بوسیله متدرگریفیس (۲۲) در هموژن بافتی تهیه شده اندازه گرفته شد. برای تهیه هموژن بافت قلبی، قسمت نوک قلب در ۵ حجم از محلول TCA ۱ درصد، هموژن و سپس سانتریفوژ (18000g for 10 min) گردید. محلول رویی جمع‌آوری و به نسبت ۱/۵۰ رقیق و ۱۰۰ میکرولیتر از آن به مخلوط حاوی ۰/۰۱ میلی مول NADPH، ۰/۶ میلی مول DTNB، ۵ میلی مول EDTA و ۰/۵ واحد گلوتاتیون ردکتاز در ۱۰۰ میلی مول بافر سدیم فسفات در pH ۷/۵ در حجم کلی ۱ میلی لیتر اضافه و میزان جذب نور (Y) در طول موج ۴۱۲ نانومتر ثبت گردید. میزان گلوتاتیون توtal بافت قلب (X) با استفاده از فرمول $Y = 0.6611 - 0.0421X$ پروتئین در محلول رویی بر حسب نانومول بر میلی گرم پروتئین گزارش گردید.

اندازه گیری آنزیمهای آنتی‌اکسیدان: فعالیت آنزیم‌های SOD، GPX، GR در محلول رویی تهیه شده از هموژنیزاسیون بافت قلب توسط کیت‌های تهیه شده از شرکت رانسود (Randox labs. Crumlin UK) و بر اساس دستورالعمل ارایه شده در کیت اندازه گیری و نتایج بصورت واحد بر میلی گرم پروتئین بیان گردید.


فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در بافت قلب: القای دیابت موجب کاهش در فعالیت آنزیم‌های CAT و GR بافت قلب در گروه دیابتی گردید. انجام ورزش ترمیل موجب افزایش فعالیت آنزیم‌های CAT و SOD در بافت قلب مشاهده شد. القای دیابتی ورزش کرده نسبت به گروه دیابتی بدون ورزش شد. القای دیابت اثری بر فعالیت آنزیم‌های بدون ورزش نداشت. القای دیابت اثری بر میزان فعالیت آنزیمهای آنتی‌اکسیدان در بافت قلب مشاهده شد. ورزش ترمیل موجب افزایش فعالیت آنزیم SOD بافت قلبی گروه دیابتی ورزش کرده در مقایسه با گروه دیابتی ورزش نکرده گردید (شکل ۳ و ۴).



شکل ۳: میانگین و انحراف معیار تغییرات فعالیت آنزیم‌های سوپر اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز در گروه‌های مورد مطالعه

* اختلاف معنی دار را نسبت به گروه C نشان می‌دهد.


** اختلاف معنی دار گروه DE را نسبت به D نشان می‌دهد.



شکل ۴: میانگین و انحراف معیار تغییرات فعالیت آنزیم‌های گلوتاتیون ردکتاز و کاتالاز بافت قلب در گروه‌های مورد مطالعه

* اختلاف معنی دار را نسبت به گروه C نشان می‌دهد.

** اختلاف معنی دار گروه DE را نسبت به D نشان می‌دهد.



شکل ۱- میانگین و انحراف معیار تاثیر تزریق استرپتوز توسین


بر میزان قند خون در دو گروه دیابتی و سالم بدون ورزش

* اختلاف معنی دار را نسبت به گروه C نشان می‌دهد.

C - رت‌های سالم بدون ورزش D - رت‌های دیابتی بدون ورزش

میزان پراکسیداسیون لیپیدی بافت قلب: القای دیابت موجب تغییر معنی داری در میزان MDA بافت قلب در گروه دیابتی بدون ورزش گردید. ورزش ترمیل منظم در گروه سالم ورزش کرده نسبت به گروه کنترل باعث تغییر معنی داری در سطح MDA بافت قلبی نگردید، در حالیکه انجام ورزش ترمیل در گروه دیابتی ورزش کرده نسبت به گروه دیابتی بدون ورزش موجب افزایش سطح MDA در بافت قلبی گردید (شکل ۲).

گلوتاتیون توتال بافت قلب: القای دیابت موجب تغییر معنی داری در میزان گلوتاتیون توتال بافت قلب (T.GSH) در گروه رت‌های دیابتی بدون ورزش نگردید. ورزش ترمیل در گروه سالم ورزش کرده نسبت به گروه کنترل باعث تغییر معنی داری در میزان T.GSH بافت قلبی نگردید، همچنین انجام ورزش در گروه دیابتی ورزش کرده نسبت به گروه دیابتی بدون ورزش موجب تغییر معنی داری در سطح T.GSH بافت قلبی نگردید (شکل ۲).



شکل ۲: میانگین و انحراف معیار تغییرات سطح پراکسیداسیون لیپیدی و گلوتاتیون توتال بافت قلب در گروه‌های مورد مطالعه

* اختلاف معنی دار را نسبت به گروه C نشان می‌دهد.

** اختلاف معنی دار گروه DE را نسبت به گروه D نشان می‌دهد.

C - رت‌های سالم بدون ورزش CE - رت‌های سالم همراه با ورزش

DE - رت‌های دیابتی بدون ورزش

بحث:

قلب بدنیال القای دیابت تجربی می‌باشد. گلوتاتیون احیا به عنوان سوبوسترا برای آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و کوفاکتور برای بسیاری از آنزیمهای بوده و در خنثی‌سازی رادیکال‌های آزاد به عنوان آنتی‌اکسیدان نقش مهمی دارد. طبق اطلاعات ما، مطالعات در خصوص تاثیر دیابت بر میزان گلوتاتیون بافتی در قلب بسیار محدود بوده و تنها در یک مطالعه القای دیابت بعد از ۶ هفته موجب افزایش GSH بافت قلب گردیده است (۲۷). در حالیکه در مطالعه دیگری دیابت موجب کاهش در میزان گلوتاتیون احیا در بافت قلبی شده است (۲۸). به نظر می‌رسد اختلاف در نتایج مطالعات می‌تواند بدلیل اختلاف در مدت نگهداری حیوانات مورد مطالعه و روش اندازه گیری GSH باشد.

آنزیم SOD بافت‌ها را در برابر اثرات توکسیک رادیکال‌های سوبراکساید محافظت مینماید. آنزیم GPX مسئول متabolیسم پراکسیدهای لیپیدی و تجزیه می‌باشد. آنزیم کاتالاز بعنوان مهمترین آنزیم پاک کننده رادیکالهای H₂O₂ هیدروکسیل، و آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز احیای گلوتاتیون اکسید شده را به عهده دارد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فعالیت آنزیم کاتالاز و گلوتاتیون ردوکتاز در بافت قلب بدنیال القای دیابت با استرپتوزوتوسین نسبت به گروه کنترل کاهش یافته در حالیکه القای دیابت اثری بر فعالیت آنزیم‌های سوبراکسیدیدیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز در بافت قلبی نداشت. نتایج مطالعات قبلی در خصوص فعالیت آنزیم SOD نشاندهنده کاهش (۲۶) افزایش (۲۹) و عدم تغییر (۳۰، ۳۱)، در فعالیت این آنزیم می‌باشدند. همچنین نتایج مطالعات قبلی در خصوص تاثیر دیابت بر فعالیت آنزیم GPX نشاندهنده کاهش (۳۲) افزایش (۳۳) و عدم تغییر (۳۴) فعالیت این آنزیم می‌باشد. فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز بر اساس مطالعات قبلی بدنیال القای دیابت در بافت قلبی کاهش (۳۵) و افزایش (۳۶) یافته گزارش شده است. همچنین نتایج گزارشات قبلی در خصوص تاثیر دیابت تجربی بر فعالیت آنزیم کاتالاز در بافت قلبی نشاندهنده کاهش (۳۷) افزایش (۳۸) و عدم تغییر (۳۹) فعالیت آن دارند.

بنظر می‌رسد اختلافات موجود در نتایج مطالعات مربوط به تفاوت در زمان نگهداری حیوانات بعد از القای دیابت، تفاوت‌های تکنیکی در روش اندازه گیری فعالیت آنزیمی و حتی اختلاف در سن و جنس آنها باشد. کاهش در فعالیت آنزیم کاتالاز باعث تجمع پراکسید هیدروژن در

تأثیر دیابت بر استرس اکسیداتیو در قلب : نتایج مطالعه نشاندهنده کاهش وزن، افزایش دفع ادرار و پراشتہایی در حیوانات مورد مطالعه نسبت به گروه کنترل بدنیال القای دیابت می‌باشند. این نتایج مطابق با نتایج مطالعات قبلی گزارش شده در خصوص اثرات درمان با استرپتوزوتوسین می‌باشد (۲۰).

در مطالعه حاضر، القای دیابت همراه با افزایش پراکسیداسیون لیپیدی در بافت قلبی بود. القای دیابت همچنین موجب کاهش در فعالیت آنزیم کاتالاز و گلوتاتیون ردوکتاز گردید، در حالیکه در فعالیت سایر آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی شامل GPX و SOD تغییری مشاهده نگردید. بعلاوه القای دیابت اثری بر میزان گلوتاتیون توتال بافت قلب نداشته است.

کاهش میزان انسولین در بیماری دیابت موجب افزایش فعالیت آنزیم fatty acyl coenzyme A oxidase می‌گردد که نتیجه آن القای اکسیداسیون اسیدهای چرب و در نهایت پراکسیداسیون لیپیدی می‌باشد (۲۱). افزایش پراکسیداسیون لیپیدی عملکرد غشای سلولی را از طریق کاهش سیالیت غشاء و تغییر فعالیت آنزیم‌های باند شده به غشاء و رسپتورهای غشایی مختلف می‌نماید. محصولات حاصل از پراکسیداسیون لیپیدی برای اکثربت سلول‌های بدن مضر بوده و همراه با ایجاد بیمارهای مختلف می‌باشند (۲۲).

افزایش استرس اکسیداتیو و اختلال در ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در مطالعات کلینیکی و تجربی در طی بیماری دیابت نشان داده شده است (۲۳). مطالعات قبلی افزایش (۲۴) و کاهش (۲۵) MDA را در بافت قلبی بدنیال القای دیابت تجربی نشان داده‌اند. در تائید با برخی از مطالعات قبلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطح MDA بافت قلب در رت‌های دیابتی در مقایسه با گروه کنترل بطور معنی‌داری افزایش یافت، این افزایش نشاندهنده القای واکنش‌های پراکسیداتیو لیپیدی در حیوانات دیابتی می‌باشد (۲۶). به نظر می‌رسد عامل اختلالات بوجود آمده در جریان بیماری دیابت بطور اصلی مربوط به واکنش رادیکالهای آزاد با محتويات سلولی و غشای سلولی و تولید پراکسیداسیون لیپیدی باشد.

از طرف دیگر نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر نشان‌دهنده عدم تغییر در میزان گلوتاتیون توتال بافت

رفتن توانایی بافت قلبی برای مقابله با یون سوپراکساید در طی بیماری دیابت و ورزش مرتبط داشت.

نتیجه نهایی :

نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر میتواند دلیل احتمالی آسیب های قلبی مشاهده شده در بیماری دیابت را توجیه نماید. همچنین نتایج حاصله نشاندهنده تاثیرات مخرب ورزش تردیمیل با شدت بکاربرده شده در جریان بیماری دیابت بر بافت قلبی و تشدید عوارض ناشی از این بیماری میباشد.

منابع :

- Stamler J, Vaccaro O, Neaton JD. The Multiple Risk Factor Intervention Trial Research Group. Diabetes, other risk factors and 12-year cardiovascular mortality for men screened in the Multiple Risk Factor Intervention Trial. *Diabetes Care* 1993; 16:434-44.
- The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. *N Engl J Med* 1993; 329:977-86.
- Penpargkul S, Schaible T, Yipintsoi T, Scheuer J. The effect of diabetes on performance and metabolism of rat hearts. *Circ Res* 1980; 47:911-21.
- Paulson DJ, Crass 3rd MF. Endogenous triacylglycerol metabolism in Diabetic heart. *Am J Physiol* 1982; 242:H1084-H1094.
- Martinez-Nieves B, Collins HL, Dicarlo S. Autonomic and endothelial dysfunction in experimental diabetes. *Clin Exp Hypertens* 2000; 22: 623-34.
- Fein FS, Kornstein LB, Strobeck JE, Capasso JM, Sonnenblick EH. Altered myocardial mechanics in diabetic rats. *Circ Res* 1980;47:922-33.
- Nishikawa T, Edelstein D, Du XL, Yamagishi S, Matsumura T, Kaneda Y. Normalizing mitochondrial superoxide production blocks three pathways of hyperglycaemic damage. *Nature* 2000; 404:787-90.
- Beckman JA, Goldfine AB, Gordon MB, Creager MA. Ascorbate restores endothelium-dependent vasodilation impaired by acute hyperglycemia in humans. *Circulation* 2001; 103:1618-23.
- Tan KC, Chow WS, Ai VH, Metz C, Bucala R, Lam KS. Advanced glycation end products and endothelial dysfunction in type 2 diabetes. *Diabetes Care* 2002; 25:1055-9.
- Odetti P, Pesce C, Traverso N, Menini S, Mainenti EP, Cossio L .Comparative trial of N-acetylcysteine, taurine, and oxerutin on skin and kidney damage in long-term experimental diabetes. *Diabetes* 2003; 52:499-505.

سلول میگردد. همچنین کاهش در فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز میتواند نشاندهنده کاهش ظرفیت سلولی در تبدیل گلوتاتیون اکسید به گلوتاتیون احیا باشد. کاهش در فعالیت آنزیم‌های فوق میتواند بدلیل کاهش در تولید و یا ناشی از فقدان فعالیت آنزیمی در آنزیم تولید شده بدلیل گلیکاسیون باشد. به نظر میرسد افزایش پراکسیداسیون لیپیدی در مطالعه حاضر میتواند بدلیل کاهش فعالیت آنزیم‌های فوق در بافت قلبی باشد.

تأثیر ورزش بر استرس اکسیداتیو در بافت قلبی رتهای دیابتی: نتایج مطالعه حاضر در خصوص تاثیر ورزش بر استرس اکسیداتیو در بافت قلبی موش‌های صحرایی دیابتی با STZ نشاندهنده افزایش فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، گلوتاتیون ردوکتاز و SOD در گروه دیابتی ورزش کرده نسبت به گروه دیابتی بدون ورزش و عدم تغییر در فعالیت آنزیم GPX بدنیال ورزش میباشد. از طرف دیگر ورزش ترد میل اجباری موجب افزایش میزان MDA در گروه دیابتی ورزش کرده نسبت به گروه دیابتی بدون ورزش گردید. به نظر میرسد افزایش فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و گلوتاتیون ردوکتاز و SOD در تأثیر با مطالعات قبلی در جهت تطابق با ورزش منظم برای جلوگیری از آسیب واردہ توسط استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت میباشد (۴۰). از طرف دیگر نتایج مطالعه نشان دهنده افزایش MDA بدنیال ورزش در گروه دیابتی ورزش کرده نسبت به گروه دیابتی بدون ورزش میباشد. این نتیجه در تأثیر برقی از مطالعات در خصوص اثر ورزش در بیمار دیابت بوده و میتواند نشاندهنده تاثیرات زیان‌آور ورزش باشد. همچنین برده شده بر بافت قلبی در دیابت تجری باشد. همچنین افزایش فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و گلوتاتیون ردوکتاز در پروتکل ورزشی حاضر میتواند نشاندهنده تاثیرات مثبت ورزش در افزایش مقاومت بدن در برابر استرس اکسیداتیو حاصل از دیابت و شروع روند تطابقی با ورزش منظم باشد. در حالیکه افزایش فعالیت آنزیم‌های فوق در کنار افزایش سطح MDA میتواند دلیلی بر اثرات زیان آور رژیم ورزشی مورد استفاده در مطالعه حاضر بر روند بیماری دیابت در بافت قلبی باشد. افزایش فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز همراه با عدم تغییر در فعالیت آنزیم GPX نشاندهنده افزایش تبدیل گلوتاتیون اکسید به احیا و افزایش توان آنتیاکسیدانی قلب بدنیال ورزش میباشد. همچنین افزایش فعالیت کاتالاز را میتوان به بالا

- care of the patient with diabetes: review and recommendations. *Gend Med* 2006;3(2):131-58.
- diabetic rats with N-acetylcysteine. *Diabetologia* 1996; 39:263-9.
12. Cesquini M, Torsoni MA, Ogo H. Adaptive response to swimming exercise: antioxidant system and lipid peroxidation. *J Anti-Aging Med* 1999; 2:357-363
 13. Jornot L and Juont AF. Response of human endothelialcell antiopxidant enzymes to hyperoxia. *Am J of Res Cell and Mole Biol* 1992; 6: 107-115.
 14. Baydas G, Nedzvetskii VS, Nerush PA, Kirichenko SV, Yoldas T. Altered expression of NCAM in hippocampus and cortex may underlie memory and learning deficits in rats with streptozocin-induced diabetes mellitus. *Life Science* 2003; 73:1907-16.
 15. Lee MH. Treadmill exercise enhances nitric oxide synthase expression in the hippocampus of food-deprived rats. *Nutr Res* 2005, 771-779
 16. Ulusu NN. Pentose phosphate pathway, glutathione-dependent enzymes and antioxidant defense during oxidative stress in diabetic rodent brain and peripheral organs: effects of stobadine and vitamin E. *Neurochem Res* 2003; 28(6): 815-23.
 17. Meagher EA and Fitz Gerald GA. Indices of lipid peroxidation in vivo: strengths and limitations. *Free Radic Biol Med* 2000;28:1745-1750.
 18. Griffith OW. Determination of glutathione and glutathione disulfide using glutathione reductase and 2-vinylpyridine. *Anal Biochem* 1980;106: 207-212.
 19. Aebi H. Catalase in vitro. *Methods Enzymol* 1984;105:121-126.
 20. Laaksonen DE, Sen CK. Exercise and oxidative stress in diabetes mellitus. In: *Handbook of oxidants and antioxidants in exercise*. Edited by: Sen CK, Packer L, Hanninen O. Amsterdam: Elsevier 2000; 1105-1136.
 21. American Diabetes Association: clinical practice recommendations. *Diabetes Care* 1998; 1:S1-95.
 22. Sen, CK. Oxidants and antioxidants in exercise. *J Appl Physiol* 1995;79:675-686.
 23. Kim JD, Yu BP, McCarter RJM, Lee SY, Herlihy JT. Exercise and diet modulate cardiac lipid peroxidation and antioxidant defenses. *Free Radical Biol Med* 1996; 20:83-88.
 24. Vincent AM, Brownlee M, Russell JW. Oxidative stress and programmed cell death in diabetic neuropathy. *Ann. N Y Acad Sci* 2002; 959 (4):368-383.
 25. Pieper GM, Jordan M, Dondlinger LA, Adams MB, Roza AM. Peroxidative stress in diabetic blood vessels. Reversal by pancreatic islet transplantation. *Diabetes* 1995;44(8):884-889.
 11. Sagara M. Inhibition of development of peripheral neuropathy in streptozotocin-induced oxidant status of diabetic rats. *Diabetes Metab* 2002;28(5):377-84.
 28. Lappalainen Z. Diabetes impairs exercise training-associated thioredoxin response and glutathione status in rat brain. *J Appl Physiol* 2009; 106(2):461-7.
 29. Matkovics B, Kotorman M, Varga IS, Hai DQ, Varga C. Oxidative stress in experimental diabetes induced by streptozotocin. *Acta Physiol Hung* 1997-1998; 85(1):29-38
 30. Noyan T, Balaharoğlu R, Kömüroğlu U. The oxidant and antioxidant effects of 25-hydroxyvitamin D3 in liver, kidney and heart tissues of diabetic rats. *Clin Exp Med* 2005; 5(1): 31-6
 31. Wohaieb SA, Godin DV. Alterations in free radical tissue-defense mechanisms in streptozocin-induced diabetes in rat. Effects of insulin treatment. *Diabetes* 1987;36(9):1014-8
 32. Okutan H, Ozcelik N, Yilmaz HR, Uz E. Effects of caffeic acid phenethyl ester on lipid peroxidation and antioxidant enzymes in diabetic rat heart. *Clin Biochem* 2005;38(2):191-6
 33. Aksoy N, Vural H, Sabuncu T, Aksoy S. Effects of melatonin on oxidative-antioxidative status of tissues in streptozotocin-induced diabetic rats. *Cell Biochem Funct* 2003;21(2):121-5
 34. Qi MY, Liu HR, Dai DZ, Li N, Dai Y. Total triterpene acids, active ingredients from *Fructus Corni*, attenuate diabetic cardiomyopathy by normalizing ET pathway and expression of FKBP12.6 and SERCA2a in streptozotocin-rats. *J Pharm Pharmacol* 2008;60(12):1687-94.
 35. Yildirim O, Büyükbengöl Z. Effect of cobalt on the oxidative status in heart and aorta of streptozotocin-induced diabetic rats. *Cell Biochem Funct* 2003;21(1):27-33
 36. Kakkar R, Kalra J, Mantha SV, Prasad K. Lipid peroxidation and activity of antioxidant enzymes in diabetic rats. *Mol Cell Biochem* 1995; 151(2):113-9
 37. Okutan H, Ozcelik N, Yilmaz HR, Uz E. Effects of caffeic acid phenethyl ester on lipid peroxidation and antioxidant enzymes in diabetic rat heart. *Clin Biochem* 2005;38(2):191-6
 38. Wohaieb SA, Godin DV. Alterations in free radical tissue-defense mechanisms in streptozocin-induced diabetes in rat. Effects of insulin treatment. *Diabetes* 1987; 36: 1014-1018.
 39. Stefek M. Effect of dietary supplementation with the pyridoindole antioxidant stobadine on antioxidant state and ultrastructure of diabetic rat myocardium. *Acta Diabetol* 2000; 37 (3): 111-7.
 40. Legato MJ. Writing Group for the partnership for gender-specific medicine. Gender-specific

26. Huang. Carvedilol protected diabetic rat hearts via reducing oxidative stress. *J Zhejiang Univ Sci B* 2006; 7(9):725-731
27. Ozkaya YG. The effect of exercise on brain anti-

Archive of SID