

مقاله پژوهشی

بررسی اپیدمیولوژیک ترومahuای چشمی منجر به بستری در بیماران مراجعه کننده به بخش چشم بیمارستان فرشچیان همدان در سال ۱۳۹۱

دکتر نوشین بزازی*، دکتر سیامک اکبرزاده*، مینو یاوری کیا**، دکتر زینب حسین پور***

دریافت: ۹۲/۷/۲۹ ، پذیرش: ۹۲/۱۱/۱۵

چکیده:

مقدمه و هدف: ترومahuای چشمی یکی از علل مهم کاهش دید بوده و میتواند سبب بروز آسیب‌های متعدد کرده چشم، پلک و ضمایم آن شود همچنین ترومahuای چشم از علل مهم کوری‌های یکطرفه و سومین علت بستری بیماران چشمی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع ترومahuای چشمی، انواع و علل شایع آن در بیماران مراجعه کننده به بخش چشم بیمارستان فرشچیان همدان در سال ۱۳۹۱ انجام شد.

روش کار: در این مطالعه توصیفی - مقطعي، ۷ بیماری که به علت ترومahuای چشم بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. سن، جنس، شغل، میزان تحصیلات، محل اقامت، عامل تروما، نوع تروما، نوع ضایعه، چشم آسیب دیده، محل رخداد آسیب چشمی و ... مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای χ^2 و توسط نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج: میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 40.1 ± 16.0 سال بود. از میان ۷ بیمار مورد بررسی ۵۸ بیمار (۸۲٪) مرد و ۱۲ بیمار (۱۷٪) زن بودند. بیشترین علت تروما برخورد اجسام تیز بود که در ۱۹ بیمار (۴٪) دیده شد. شایعترین مکان برای رخداد تروما منزل بیماران بود که در ۲۸ بیمار (۶٪) دیده شد. از کل بیماران مورد بررسی ۲۹ بیمار (۴٪) ترومای نافذ چشم، ۲۵ بیمار (۳۵٪) ترومای غیر نافذ چشم، ۵ بیمار (۷٪) سوختگی چشم و ۱۱ بیمار (۱۵٪) آسیب ضمایم چشم داشتند.

نتیجه نهایی: مطالعه حاضر نشان داد که اکثر ترومahuای چشمی در سنین پایین و در افراد مذکور اتفاق می‌افتد. شایعترین عامل ایجاد کننده تروما اجسام تیز و شایعترین نوع آسیب پارگی قرنیه بود.

کلید واژه‌ها: حوادث / صدمه‌های چشم / همه گیری شناسی

برمی گیرد ولی در ترومahuای غیر نافذ کل ضخامت دیواره چشم در گیر نمی‌شود.

تروماهای چشمی یک آسیب با توزیع دوگانه سنی می‌باشد. اولین توزیع سنی آن در انتهای جوانی و ابتدای بزرگسالی و دومین توزیع آن در سنین بالای ۷۰ سال است (۳-۵).

میزان بستری به علت ترومای چشمی در امریکا ۱۳/۲ به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر در سال است (۳). این میزان در سنگاپور ۱۲/۶ و در کشورهای سوئد و استرالیا ۱۵/۵

مقدمه:

تروماهای چشمی از علل مهم کاهش دید بوده و می‌توانند سبب بروز آسیب‌های متعدد کرده چشم، پلک و ضمایم آن شوند (۱، ۲).

بر اساس تقسیم بندی ترمینولوژی صدمات چشمی (Birmingham Eye Trauma Terminology; BETT) ترومahuای چشمی به دو دسته کلی ترومahuای نافذ و غیر نافذ تقسیم می‌شوند. ترومahuای نافذ چشم به صدماتی گفته می‌شود که تمامی ضخامت دیواره کره چشم را در

* استادیار گروه چشم پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان (siakbarzadeh65@yahoo.com)

** دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

*** دکتری حرفة ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

۶/۶٪ از کل بیماری‌های چشمی را شامل می‌شود. نسبت مرد به زن ۳/۲ به ۱ است. ۶۳/۸٪ بیماران سن زیر ۳۰ سال داشتند. بیشتر آسیب‌ها از نوع آسیب غیرنافذ بوده و در نتیجه خشونت رخ داده است. چوب با ۴۰/۹٪ شایع ترین عامل آسیب است و قرنیه بیشتر از سایر بخش‌های چشم آسیب دیده است (۲۵). در مطالعه‌ای که توسط سوری و همکارانش در تهران با هدف بررسی شیوع و نیز علل کم بینایی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های تهران در سال ۲۰۰۶ انجام گرفت نتایج نشان داد که ترومای چشمی دهمین علت کم بینایی یا نابینایی است (۲۶).

تروماهای چشمی از جمله علل عمدۀ مراجعه بیماران به بیمارستان‌ها یا کلینیک‌های چشم پزشکی و یکی از علل مهم کوری‌های یکطرفه و سومین علت بستره شدن بیماران چشمی است (۲۷). اکثر تروماهای چشمی به کمک وسایل محافظتی قابل پیشگیری است. در امریکا سالانه نزدیک ۵۵ میلیون صدمه چشمی که باعث محدودیت فعالیت بیش از یک روز می‌شوند رخ میدهد (۲۸). تروماهای چشمی علاوه بر بار اجتماعی و اقتصادی از نظر روانی نیز بر زندگی بیمار تاثیر سوء دارند. با توجه به اینکه از شیوع تروماهای چشمی در جامعه اطلاعات زیادی در دسترس نیست و نیز بعلت تنافض های فراوانی که در زمینه اپیدمیولوژی تروماهای چشمی در مناطق مختلف وجود دارد تحقیق و بررسی بیشتر در این زمینه ضروری به نظر میرسد. بهمین منظور این مطالعه با هدف تعیین شیوع تروماهای چشمی، انواع و علل شایع آن در بیماران مراجعه کننده به بخش چشم بیمارستان فرشچیان همدان در سال ۱۳۹۱ انجام گرفت.

روش کار:

این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی بوده و به روش سرشماری انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه عبارت بودند از بیمارانی که به علت ترومای چشم در بخش چشم بیمارستان فرشچیان همدان در سال ۱۳۹۱ بستره شدند. در طی اجرای این طرح کلیه بیمارانی که به علت ترومای چشمی بستره گردیدند وارد مطالعه شدند. اطلاعات با پرسش از بیمار یا خانواده‌ی وی، معاینه و پرونده‌ی پزشکی تکمیل گردید و در چک لیست از قبل تعیین شده ثبت شد. اطلاعات موجود در این چک لیست عبارت بودند از: شماره پرونده، سن، جنس، شغل، میزان تحصیلات، محل

می باشد (۷-۵). با در نظر گرفتن این موضوع که ترومای چشم ممکن است در هر فردی رخ دهد ریسک فاکتورهای مشخصی برای آن وجود دارد. این ریسک فاکتورها شامل موارد ذیل می‌شوند:

۱. سن: اکثر افراد صدمه دیده بزرگسالان با میانگین سنی ۳۰ سال هستند (۸-۱۰).
۲. جنس: نسبت درگیری مرد به زن ۶ به ۱ است (۱۱-۱۳).
۳. شرایط اجتماعی - اقتصادی: هر چه سطح اجتماعی - اقتصادی پایین تر و تخلفات رانندگی، سوءصرف الکل و دارو بیشتر باشد، ریسک صدمات چشمی بیشتر است (۱۴، ۱۵).

۴. نژاد: در ایالات متحده امریکا سیاهپوستان ۲ برابر سفیدپوستان در معرض خطر هستند و امکان اختلال بینایی بدنیال تروما نیز در این گروه ۲ برابر است (۱۶، ۱۷). شیفت محل رخداد آسیب از محل کار به خانه اولین بار توسط محققین پایگاه داده‌های مربوط به خدمات چشمی امریکا مشخص شده است (۸) و در چندین مطالعه دیگر نیز تأیید گردیده است (۱۸-۲۱) لیکن در بعضی مناطق روستایی در کشورهای در حال پیشرفت، محل کار به عنوان شایع ترین مکان آسیب باقی مانده است (۲۲).

شایع ترین عامل ترومای چشمی بستگی به محل انجام مطالعه دارد به عنوان مثال در یک بررسی در هند سر سوزن شایع ترین علت بوده است (۲۳). در بررسی پایگاه داده‌های مربوط به خدمات چشمی امریکا شایع ترین عامل اشیا غیر نوک تیز بوده است. از میان اشیاء تیز، ۲۱٪ موارد را میخ تشکیل داده که علت آن استفاده وسیع از چوب در ساخت و ساز است (۲۴).

در ۹۹٪ موارد آسیب‌ها بطور ناخواسته رخ داده و تنها در ۱٪ موارد عامل آسیب خود فرد بوده است. آتش بازی مسئول اکثر مواردی است که شخص عامل تروما است و میزان تخلیه چشم در این گروه ۳ برابر موارد ناشی از نزاع بوده است (۲۴).

تروماهای چشمی عمدتاً باعث ضایعات شدید و جبران ناپذیر چشم نظیر پارگی پلک، قرنیه و اسکلرا، هایفما، کاتاراکت، گلوکوم، خونریزی شبکیه، جداسدگی شبکیه و آسیب عصب می‌شود (۱).

در سال ۲۰۰۶ مطالعه‌ای توسط آسامینو و همکارانش، با هدف بررسی تروماهای چشمی در اتیوپی به انجام رسید. نتایج مطالعه مشخص کرد که تروماهای چشمی

جدول ۲: تشخیص اولیه آسیب های چشمی به تفکیک جنس

کل	مؤنث	مذکور	تشخیص اولیه
تعداد (درصد)	تعداد	تعداد	
۲۹ (۴۱/۴)	۴	۲۵	آسیب کره چشم ترومایک نافذ (open globe)
۲۵ (۳۵/۷)	۵	۲۰	غیرنافذ (closed globe)
۵ (۷/۱)	۰	۵	آسیب کره چشم غیر ترومایک حرارتی - شیمیابی
۱۱ (۱۵/۷)	۳	۸	پلکها و دستگاه اشکی
۷۰ (۱۰۰)	۱۲	۵۸	کل

مطالعه حاضر نشان داد که بیشترین علت ترومما برخورد اجسام تیز به چشم بود که شامل ۱۹ بیمار (۲۷٪) می‌شد (جدو، ۳).

جدول ۳: علل تروماهای چشمی در بیماران مورد مطالعه

درصد	تعداد	علت تروما
۲۷/۱	۱۹	چاقو
۲۰	۱۴	چوب
۱۲/۹	۹	نزاع
۷/۱	۵	شیشه
۷/۱	۵	اجسام تیز
۵/۷	۴	سوختگی
۴/۳	۳	سنگ
۲/۹	۲	برخورد شیلینگ
۱۴/۴	۹	سایر علل

بررسی محل اقامت بیماران نشان داد که
بیمار(۷۲٪/۱) ساکن روستاهای و ۵۱ بیمار(۹٪/۷۲) ساکن
شهرها بودند.

شایعترین مکان رخداد تروما ، منزل بود که در ۲۸
بیمار(٪۴۰) دیده شد و بعد از آن به ترتیب مکان های
صنعتی ۱۴ نفر، مکان های عمومی ۱۳ نفر، جاده و بزرگراه
۷ نفر، مزرعه ۴ نفر، مدرسه ۳ نفر و اماكن ورزشی ۱ نفر
قا، داشتند.

از نظر سطح تحصیلات ۸ بیمار (۱۱/۵٪) بیسواند، ۳۷ نفر (۵/۳٪) زیر دیپلم، ۲۰ نفر (۲۸/۵٪) دیپلم و فقط ۱۶ نفر (۷٪) تحصیلات دانشگاهی داشتند.

بیشترین آسیب چشمی در ترومای نافذ پارگی قرنیه
در ۱۸ نفر (۲۵٪) بود، در ترومای غیر نافذ چشم
بیشترین آسیب، هایفما با فراؤانی ۱۰ نفر (۳٪) بود.

بررسی چشم آسیب دیده نشان داد که ۳۱ بیمار (۴۴/۳٪) دچار آسیب چشم راست، ۳۷ بیمار (۵۲/۹٪) دچار آسیب چشم چپ و ۲ بیمار (۰/۲٪) دچار آسیب هر دو چشم بودند.

اقامت، مدت زمان سپری شده از ترومما تا مراجعته به بیمارستان، عامل ترومما، مکان رخداد آسیب، چشم آسیب دیده، دید هنگام مراجعه و هنگام ترخیص، تشخیص اولیه

در نهایت اطلاعات حاصل از تمامی چک لیست‌ها جمع‌آوری گشته و با استفاده از نرم افزار SPSS 16 اطلاعات توصیفی ارایه شد و تحلیل آماری با استفاده از آزمون‌های Chi-square و t-test انجام گردید. جهت بررسی رابطه متغیرها سطح معنی دار آزمون 0.05 در نظر گرفته شد.

نتائج:

در این مطالعه ۷۰ بیمار که به علت ترومای چشمی بستری شده بودند مورد ارزیابی قرار گرفتند. میانگین سنی بیماران مورد مطالعه ۱۴/۰ سال بود (SD=۰/۴). این میانگین در بیماران با ترومای نافذ ۲۳/۳۷ سال (SD=۱۱/۱) و در بیماران با ترومای غیر نافذ ۲۴/۰/۸ (SD=۱۷/۱) بود.

یافته ها نشان داد که بیشترین فراوانی ترومها در بازه سنی ۲۱-۳۰ سال یعنی دهه سوم زندگی دیده می شود. شایعترین نوع تروما در بازه سنی ۱۰-۱۴ سال ترومای نافذ (۳۴٪/۵) بود (جدول ۱).

جدول ۱: فراوانی انواع ترومماهای چشمی به تفکیک گروه های سنی در بیماران مورد مطالعه

آسیب		ترومای غیر نافذ		ترومای نافذ		گروه سنی
جمع	ضمائی چشم	سوختگی	تعداد	تعداد	تعداد	(سال)
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
۱۸	۱	۰	۷	۱۰		۱-۱۰
(۲۵/۷)	(۹/۱)	(۰)	(۲۸)	(۳۴/۵)		
۱۳	۴	۱	۴	۴		۱۱-۲۰
(۱۸/۶)	(۳۶/۴)	(۲۰)	(۱۶)	(۱۲/۸)		
۱۹	۴	۲	۶	۷		۲۱-۳۰
(۲۷/۱)	(۳۶/۴)	(۴۰)	(۲۴)	(۲۴/۱)		
۷	۱	۱	۳	۲		۳۱-۴۰
(۱۰)	(۹/۱)	(۲۰)	(۱۲)	(۶/۹)		
۱۳	۱	۱	۵	۶		
(۱۸/۶)	(۹/۱)	(۲۰)	(۲۰)	(۲۰/۷)		
						بیش از ۴۰

از میان ۷۰ بیمار مورد بررسی ۵۸ بیمار (۸۲٪) مرد و ۱۲ بیمار (۱۷٪) زن بودند. در همه انواع ترمومترها فرداوی در مردان بیشتر بود و در آسیب ناشی از سوتگی تمام بیماران مورد مطالعه مرد بودند (جدول ۲).

از لحاظ جنس از میان ۷۰ بیمار مورد بررسی این مطالعه ۵۸ بیمار مرد و ۱۲ بیمار زن بودند. علیشیری و همکاران نیز در دو مطالعه خود نشان دادند که اکثر بیماران مذکور بوده اند. در مطالعه مک گوین در آمریکا هم بیشترین آسیب ها در مردان و در سن ۲۰ سال رخ داده است^(۳۱) احتمالاً علت این امر بیشتر بودن مشاغل پرخطر در مردان است.

بیشترین علت تروما در مطالعه حاضر برخورد اجسام تیز بود که در ۱۹ بیمار دیده شد در مطالعه علیشیری و همکارانش بیشترین علت تروما در یک بررسی چوب و در بررسی دیگر تصادفات جاده ای بوده است و اجسام تیز در هر دو بررسی در رتبه دوم قرار داشتند.

بررسی محل اقامت بیماران در مطالعه حاضر نشان داد که بیشتر بیماران ساکن شهرها هستند. مطالعه سیلینو و همکارانش نیز^(۳۲) با مطالعه حاضر همخوانی دارد.

بررسی محل رخداد تروما نشان داد که شایعترین مکان، منزل (۲۸ بیمار) و دومین مکان شایع برای وقوع تروما مکان های صنعتی بوده است که در ۱۴ بیمار دیده شد. در مطالعه جهانگیری و همکارانش بیشترین محل وقوع ترومای چشم، خانه و بعد از آن مکان های صنعتی بوده است^(۳۳) که با مطالعه حاضر همخوانی دارد.

درصد ترومماهای نافذ چشمی در مطالعه حاضر بیشتر از ترومماهای غیر نافذ بود. در مطالعه سیلینو و علیشیری هم ترومماهای نافذ چشمی بیشتر از موارد غیر نافذ بود (۲۹,۳۲).

در مجموع شایع ترین آسیب ایجاد شده، آسیب نافذ منجر به پارگی قرنیه بود که در ۲۵٪ از بیماران دیده شد و بعد از آن هایفما قرار داشت. در مطالعات مشابه که در کشورهای کویت و کره به انجام رسیده است، شایعترین ضایعه ایجاد شده در هردو مطالعه پارگی قرنیه بود^(۳۴,۳۵).

بررسی مدت زمان بستری در بیماران مورد مطالعه نشان داد که ۹۰٪ بیماران ۱-۵ روز بستری بوده اند که با نتایج حاصل از مطالعه علیشیری و همکارانش همخوانی دارد. در مطالعات مشابه مشخص شده دوره درمانی در سوختگی ها بیش از سایر ترومماهای چشمی است^(۲۴,۳۴). در این مطالعه تفاوت معنی داری بین نوع تروما و مدت بستری دیده نشد که می توان علت آن را کم بودن حجم نمونه دانست.

مدت زمان بستری بیماران به دو دوره زمانی ۱ تا ۵ روز و بیشتر از ۵ روز تقسیم گردید. ۹۰٪ از بیماران مورد بررسی به مدت ۵-۱۰ روز بستری بودند و ۱۰٪ باقیمانده بیش از ۵ روز بستری شدند^(P=۰/۸۷).

بجز کودکان زیر ۵ سال که بدليل عدم همکاری دید آنها کنترل نشده بود میانگین حدت بینایی در بیماران آسیب نافذ Log MAR ۱.۲ و پس از درمان Log MAR ۱.۰ بود. در بیماران با آسیب غیر نافذ میانگین حدت بینایی Log MAR ۰.۷۰ بود. بررسی دید نهایی نشان داد که پس از درمان ۴۸٪ از بیماران با ترومای باز دید بهتری نسبت به زمان مراجعه داشتند. این در حالی بود که در گروه بیماران با ترومای بسته چشم در نهایت ۷۲ درصد از بیماران دید بهتری نسبت به قبل از درمان داشتند که از نظر آماری معنی دار بود^(P=۰/۰۲۵).

بررسی مدت زمان سپری شده از تروما تا مراجعه به بیمارستان نشان داد که حدود ۷۲٪ از بیماران طی ۲۴ ساعت پس از بروز تروما به بیمارستان مراجعه داشتند اما بین مدت زمان سپری شده از تروما تا مراجعه به بیمارستان و عوارض ایجاد شده از نظر آماری ارتباطی مشاهده نشد^(P=۰/۳۵).

از کل بیماران مورد مطالعه ۲۳ بیمار (۳۲/۹٪) درمان طبی دریافت داشتند. ۴۰ بیمار (۵۷/۱٪) درنهایت جراحی را تجربه کردند و ۷ بیمار (۱۰٪) به مراکز مجهزتر اعزام شدند که (Intra Ocular Foreign Body) IOFB بیمار از این تعداد ۴ بیمار داشتند.

بحث:

آسیب های چشمی از علل مهم نابینایی یکطرفه قابل پیشگیری در سراسر جهان است ولی اطلاعات اپیدمیولوژیک اندکی پیرامون آن در کشورهای در حال پیشرفت در دسترس می باشد. عنوان شده است که ترومماهای چشمی در افراد با میانگین سنی پایین اتفاق می افتد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیشترین فراوانی ترومماهای (حدود یک چهارم) در بازه سنی ۲۱-۳۰ سال یعنی دهه سوم زندگی دیده می شود؛ علیشیری و همکاران دردو مطالعه در سال های ۷۸ و ۸۴ در بندر عباس نشان دادند که اکثر ترومماهای چشمی در سنین کمتر از ۴۰ سال اتفاق می افتد^(۲۹). در مطالعه سنتی در پاکستان نیز میانگین سنی بیماران کمتر از ۳۰ سال بود^(۳۰).

- logy of serious ocular trauma: The United States Eye Injury Registry (USEIR) and the Hungarian Eye Injury Registry (HEIR). *Ophthalmology* 1998; 95: 332–343.
9. Kanoff JM, Turalba AV, Andreoli MT. Characteristics and outcomes of work –related open globe injuries .*Am J Ophthalmol* 2010; 150:265
 10. Schein O, Hibberd P, Shingleton B. The spectrum and burden of ocular injury. *Ophthalmology* 1988; 95: 300–395.
 11. Casson R, Walker J, Newland H .Four-year review of open eye injuries at the Royal Adelaide Hospital. *Clin Exp Ophthalmol* 2002; 30(1):15-8.
 12. Koo L, Kapadia MK, Singh RP. Gender differences in etiology and outcome of open globe injuries. *J Trauma* 2005; 59:175
 13. Framme C, Roider J. Epidemiology of open globe injuries. *Klin Monatsbl Augenheilk* 1999; 215:287-293.
 14. Rufer F, Peters A ,Klettner A. Influence of alcohol consumption on incidence and severity of open –globe injuries in adults. *Arch Clin Exp Ophthalmol* 2011; 249:1765.
 15. Liggett P, Pince K, Barlow W, Ragen M, Ryan S .Ocular trauma in an urban population. *Ophthalmology* 1990; 97: 581–584.
 16. Beb Simon GJ, Moisseiev J, Rosen N, Alhalel A. Gunshot wound to the eye and orbit :a descriptive case series and literature review. *J Trauma* 2011; 71:771.
 17. Katz J, Tielsch J. Lifetime prevalence of ocular injuries from the Baltimore eye survey. *Arch Ophthalmol* 1993; 111: 1564–1568.
 18. Karaman K, Gverovic-Antunica A, Rogosic V, Lakos-Krzelj V, Rozga A, Radocaj-Perko S. Epidemiology of adult eye injuries in Split-Dalmatian County. *Croatian Med J* 2004; 45: 304–309.
 19. Khatry S, Lewis A, Schein O, Thapa M, Pradhan E, Katz J. The epidemiology of ocular trauma in rural Nepal. *Br J Ophthalmol* 2004; 88: 456–460.
 20. McGwin GJ, Hall T, Xie A, Owsley C. Gun-related eye injury in the United States, 1993–2002. *Ophthalmic Epidemiol* 2006; 13: 15–21.
 21. Schrader W .Epidemiology of open globe eye injuries: Analysis of 1026 cases in 18 years. *Klin Monatsbl Augenheilk* 2004; 221: 629–635.
 22. Krishnaiah S, Nirmalan PK, Shamanna BR, Srinivas M, Rao GN, Thomas R .Ocular trauma in a rural population of southern India: The Andhra Pradesh eye disease study. *Ophthalmology* 2006; 113: 1159–1164.
 23. Jalali S, Das T, Majji A. Hypodermic needles: A new source of penetrating oculartrauma in Indian children. *Retina* 1999; 19: 213–217.
 24. Kuhn F .Clinical epidemiology, prevention, and rehabilitation. In: Philipp M (ed). *Ocular tra-*

در این مطالعه ۷۲٪ بیماران در عرض ۲۴ ساعت پس از تروما به بیمارستان مراجعه کرده بودند که نشانگر باور عمومی بر درمان سریع آسیب های چشمی است و این امر می تواند بستر مناسبی جهت برنامه ریزی های پیشگیرانه باشد.

نتیجه نهایی:

در مجموع نتایج نشان داد که اکثر ترومahuای چشمی در سنین پایین و نیز در افراد مذکر اتفاق می افتد که یکی از علل احتمالی آن بیشتر بودن رفتار های خطرناک و نیز مشاغل پر خطر در این گروه از افراد می باشد. همچنین شایعترین عامل ایجاد کننده ترومahuها اشیاء تیز بودند که به نظر می رسد در این خصوص آموزش به افراد شاغل در صنایع برای استفاده از عینک های محافظ و تلاش جهت افزایش ایمنی محیط کار می تواند منجر به کاهش این دسته از ترموماها گردد.

سپاسگزاری :

این مقاله برگرفته از پایان نامه دوره دکتری عمومی پزشکی میباشد. نویسندهای از همکاران چشم پزشک شاغل در بیمارستان فرشچیان همدان ، مشاور آماری طرح جناب آقای دکتر سعادت ترابیان و کارورزان محترم که در انجام آن ما را یاری نمودند تشکر می نمایند.

منابع :

1. Nili-Ahmabadi M, Karkhane R, Ebrahimi E, Alaei NV, Najaran A. Four hundred cases of ocular traumain Farabi hospital. *Iranian J Ophthalmol* 2003; 16(4):40-4.
2. Asbury T, Sanitato J. Ocular& orbital trauma. In: Reinhardt S, Ransom J, Ryan E (eds).*General ophthalmology*. New York: Appleton & Lange, 1999:347.
3. Klopfer J, Tielsch JM, Vitale S. Ocular trauma in the United States: Eye injuries resulting in hospitalization 1984 through 1987. *Arch Ophthalmol* 1992; 110:838-842.
4. Wong TY, Tielsch JM. A population-based study on the incidence of severe ocular trauma in Singapore. *Am J Ophthalmol* 1999; 128:345-351
5. Lesniak SP, Bauza A, Son JH .Twelve-year review of pediatric traumatic open globe injuries in an urban U.S population. *J Pediatr Ophthalmol Strabismus* 2012;49:73
6. Blomdahl S, Norell S .Perforating eye injury in the Stockholm population: An epidemiological study. *Acta Ophthalmol* 1984; 62: 378–390.
7. Fong L. Eye injuries in Victoria, Australia. *Med J Aust* 1995; 162: 64–68.
8. Kuhn F, Mester V, Berta A, Morris R. Epidemi-

- matology. Berlin: Spring-Velberg, 2008:58.
25. Asaminew T, Gelaw T, Alemseged F. A 2-year review of ocular trauma in Jimma University specialized hospital. *Ethiopian J Health Sci* 2009; 19(2): 67-74.
 26. Soori H, Javadi MA, Rafati N. Prevalence and causes of low vision and blindness in Tehran province, Iran. *J Pak Med Assoc* 2011; 61(6): 544-9.
 27. Taylefors B. Epidemiologic patterns of ocular trauma. *Aust N Z J Ophthalmol* 1992; 20: 95-8.
 28. Negrel AD, Thylefors B. The global impact of eye injuries. *Ophthalmic Epidemiol* 1998; 5(3): 143-169.
 29. Alishiri AA, Saeidifar MR, Pakdel F, Farshadi M. [Comparative study of the rate and causes of eye injuries in patients admitted to Shahid Mokhammadi hospital in Bandar Abbas during 1998-1999 and 2004-2005]. *Hormozgan Med J* 2007; 11(3): 195-200. (Persian)
 30. Sethi MJ, Sethi S, Khan T, Iqbal R. Occurrence of ocular trauma in patients admitted in eye department Khyber teaching hospital Peshawar. *J Med Sci Peshawar* 2009; 17(2):106-9.
 31. McGwin G, Xie A, Owsley C. Rate of eye injury in the United States. *Arch Ophthalmol* 2005; 123 (7):970-6.
 32. Cillino S, CasuccioA, Di Pace F, Pillitteri F, Cillino G. A five year retrospective study of the epidemiological characteristics and visual outcomes of patients hospitalized for ocular trauma in a Mediterranean area. *BMC Ophthalmol* 2008; 8:6.
 33. Jahangir T, Butt NH, Hamza U, Tayyab H, Jahangir S. Pattern of presentation and factors leading to ocular trauma. *Pak J Ophthalmol* 2011; 27(2): 96-102.
 34. Tomazzoli L, Renzi G, Mansoldo C. Eye injuries in childhood: a retrospective investigation of 88 cases from1988 to 2000. *Eur J Ophthalmol* 2003; 13(8):710-713.
 35. Oum BS, Lee JS, Han YS. Clinical features of ocular trauma in emergency department. *Korean J Ophthalmol* 2004; 18(1):70-78.

Original Article

Epidemiologic Evaluation of Ocular Trauma in Patients Admitted to Ophthalmology Ward of Farshchian Hospital in Hamadan in 2012

N. Bazzazi, M.D.^{*}; S. Akbarzadeh, M.D.^{*}; M. Yavarikia^{**}; Z. Hosseinpour, G.P.^{***}

Received: 21.10.2013 Accepted: 4.2.2014

Abstract

Introduction & Objective: Ocular trauma is one of the important reasons of visual loss which can cause multiple damages to eyelid, eyeball and adenexal tissues. Furthermore, ocular trauma is one of the major causes of unilateral blindness and the third leading cause of hospitalization in ophthalmology wards. The aim of this study is to determine the prevalence and characteristics of eye trauma at Farshchian hospital in Hamadan in 2012.

Material & Methods: In this cross-sectional descriptive study, 70 patients with ocular trauma, admitted to Farshchian hospital, were studied. We assessed the age, sex, job, educational level, location, cause of trauma, its type and site of injury. The data was analyzed by SPSS 16 software and t, χ^2 statistical tests.

Results: The mean age of patients in this study was 24.01 years (SD= 16.04). Among 70 patients, 58 people (82.1%) were males and 12 patients (17.1%) were females. The most common cause of trauma was observed in 19 patients (27.1%). The most common location of the trauma in this study was homing, seen in 28 patients (40%). Among the 70 patients, 29 people (41.4%) had open globe injuries, 25 people had (35.7%) closed globe injuries, 5 patients (7.1%) had burning and 11 patients (15.7%) had adenexal injury.

Conclusions: The results showed that most ocular traumas occur in the early ages and in males. The most common type of them is open globe injury and the most common cause is a sharp object.

(*Sci J Hamadan Univ Med Sci 2014; 21 (1):25-31*)

Keywords: Accidents / Epidemiology / Eye Injuries

* Assistant Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine
Hamadan University of Medical Sciences & Health Services, Hamadan, Iran. (siakbarzadeh65@yahoo.com)

** Dental Student, Hamadan University of Medical Sciences & Health Services, Hamadan, Iran.

*** General Practitioner.