



تولید و تخلیص نسبی از Streptavidin از محیط کشت باکتری توسط کروماتوگرافی تعویض یونی بوسیله DEAE - سلولز

• رشید جامعی، • منوچهر میرشاھی و • حسین نادری منش،
گروه بیوشیمی دانشکدة علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ دریافت: آذر ماه ۱۳۸۲ تاریخ پذیرش: اسفند ماه ۱۳۸۲

چکیده

پروتئینی است که توسط *Streptomyces avidini* ترشح شده و مرکب از چهار زیر واحد یکسان می‌باشد. هر کدام از این زیر واحدها با تمایل زیادی می‌توانند به یک ملکول بیوتین متصل شوند. در پژوهش حاضر شرایط کشت باکتری در محیط‌های کشت معین (B) و (A) و نامعین (LB + LB + آسپاراژن)، و نیز مقدار پروتئین ترشح شده توسط آن مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا SA موجود در محیط کشت باکتری با سولفات آمونیم تغییظ شد و سپس با استفاده از ستون DEAE - سلولز به طور نسبی خالص گردید. بررسی درجه خلوص پروتئین توسط SDS-PAGE و ایمunoبلوتینگ انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بهترین شرایط کشت در محیط LB به مدت ۱۰ روز و دمای ۳۲ درجه سانتیگراد می‌باشد و میزان SA خالص شده در این روش حدود ۱۳ میلی گرم در لیتر بود و SA خالص شده را می‌توان مستقیماً مورد استفاده قرار داد.

کلمات کلیدی : استرپت آویدین، *Streptomyces avidini*، تخلیص، DEAE - سلولز

Pajouhesh & Sazandegi No:62 pp: 21-26

Production and partial purification of Streptavidin(SA) from bacterial supernatant by DEAE-cellulose ionexchange chromatography

By: R. Jameei,M. Mirshahi and H. Naderimanesh Department of Biochemistry, Faculty of Basic Science, University of Tarbiat Modarres.

Streptavidin (SA) is a protein secreted by *Streptomyces avidini*. It has four subunits and each subunit has high affinity for biotin. In the present research ,we have analysed the effect of the defined (A&B) and undefined (LB&LB+Asn) culture media on the growth of *S.avidini* and the amount of protein secreted.SA in bacterial supernatant was concentrated with ammonium sulfate and then partially purified using a DEAE-cellulose column. The purity of SA was evaluated by SDS-PAGE and immunoblotting. Our results showed that the best culture conditions was in LB medium at 32°C for ten days where the yield of SA was about 13mg/l and the purified SA could be used directly .

Keywords:Streptavidin,*Streptomyces avidini*,Purification,DEAE-cellulose

استفاده در تهیه محیط‌های کشت، تخلیص، الکتروفورز و ایمونوبلوتینگ^{۱۲} از MERCK تهیه شدند.

کشت باکتری

ابتدا مخلوط نمکها و عناصر نادر^(۵) به صورت زیر تهیه گردید: اسیدبوریک ۵۰۰ گرم، سولفات مس آبدار ۴۰ میکروگرم، یدید پتاسیم ۱ میکروگرم، کلرید آهن آبدار ۲۰۰ میکروگرم، سولفات منگنز آبدار ۴۰۰ میکروگرم، مولیبدات سدیم آبدار ۲۰۰ میکروگرم، سولفات روی آبدار ۴۰۰ میکروگرم، فسفات دی هیدروژن پتاسیم (KH₂PO₄) ۱ گرم، سولفات منیزیم آبدار ۵/۵ گرم، کلرید سدیم ۱/۱ گرم، و کلرید کلسیم آبدار ۰/۰ گرم. همه این مواد در هاون چینی به خوبی مخلوط شدند. محیط‌های کشت به صورت زیر تهیه شدند:

(الف) محیط کشت مایع مصنوعی A: مخلوط نمکها و عناصر نادر ۱/۷ گرم، L-آسپارازین ۷ گرم، گلوكز ۱۰ گرم و فسفات هیدروژن پتاسیم (KHPO₄) ۱ گرم. حجم این مواد با آب دوبار تقطیر به یک لیتر رسانده شد. pH محلول حاصل بعداز اتوکلاو ۶/۵ بود.

(ب) محیط کشت مایع مصنوعی B: مواد موجود در محیط کشت مایع مصنوعی A به اضافه: فسفات دی هیدروژن پتاسیم ۱ گرم، سولفات منیزیم آبدار ۰/۵ گرم، کلرید سدیم ۱/۱ گرم و کلرید کلسیم آبدار ۰/۰ گرم. حجم این مواد مزبور با آب دوبار تقطیر به یک لیتر رسانده شد. pH این محیط کشت بعداز اتوکلاو ۶/۱ بود.

(ج) محیط کشت LB^{۱۳}: تریپتون ۱۰ گرم، عصاره مخمر ۵ گرم و کلرید سدیم ۵ گرم. حجم مخلوط به یک لیتر رسانده شد و pH محلول حاصل بعداز اتوکلاو ۷/۱ بود.

(د) محیط کشت LB^{۱۴}-آسپارازین: ۷ گرم L-آسپارازین به مواد موجود در محیط کشت LB اضافه گردید و حجم محیط کشت به یک لیتر رسانده شد. pH این محیط کشت بعداز اتوکلاو ۷/۳ بود. اتوکلاو محیط‌های کشت به مدت ۱۵ دقیقه و در فشارهای ۱۵-۱۶ انجام شد^(۱۴).

برای کشت از سویه S.avidini ۲۷۴۱۹ استفاده شد که همین سویه قبلاً بوسیله Cazin^(۵) نیز استفاده شده است. محیط‌های کشت مصنوعی A و B قبلاً برای کشت S.avidini به وسیله ایشان استفاده شده اند، ولی محیط‌های کشت مغذی LB و LB + آسپارازین اولین بار برای کشت باکتری مزبور در این تحقیق استفاده گردیدند. برای تهیه محیط کشت پیش کشت به منظور تلقیح در محیط‌های کشت ۰/۴ میلی لیتر از سوپانسیون باکتری خردیاری شده در کنار شعله در ۱۰ میلی لیتر محیط کشت LB استریل تلقیح شد. لوله داخل انکوباتور (دما ۳۲°C) و سرعت همزمان ۱۵۰ دور در دقیقه) قرار داده شد. بعد از ۲۴ ساعت، رشد باکتری مشاهده گردید^(۱۵). برای کشت باکتری در حجم زیاد به هر ارلن یک لیتری، ۴۰۰ میلی لیتر از محیط‌های کشت مذکور اضافه شد. پس از انجام اتوکلاو در کنار شعله به هر ارلن ۱۷ میلی لیتر از محیط کشت حاوی باکتری اضافه گردید. ارلنها داخل انکوباتور (دما ۳۲°C) و سرعت همزمان ۱۵۰ دور در دقیقه) قرار گرفتند. با توجه به گزارش Cazin و همکاران^(۵) روز دهم که حداقل رشد لکاریتمی این باکتری است، ارلنها از انکوباتور خارج گردیدند و به هر ارلن برای توقف رشد باکتری و جلوگیری از آلودگی به غلظت ۰.۱٪ (۴ گرم) آزید سدیم اضافه شد. سپس محتويات ارلنها بوسیله قیف بوخرن با صافی ۰/۴۵ میکرون به کمک پمپ خلاه صاف گردید

مقدمه

مطالعه در مورد جنبه‌های مختلف پروتئین^۱ از سال ۱۹۶۳ SA^۲ و همکاران^(۱۷) آغاز شده است. اولین مطالعات به وسیله Stapley کشت آبگوشت^۳ Streptomyces avidini در محیط کشت آبگوشت انجام شد. آنها در بررسی هایشان دریافتند که محصول تولید شده به وسیله این باکتری، قسمتی از ترکیب آنتی بیوتیک توأمان-^۳ MSD ۲۳۵ می باشد که می تواند هم در محیط کشت طبیعی با توان تغذیه‌ای بالا و هم در محیط کشت مصنوعی با توان تغذیه‌ای پایین تولید شود.

Chaiet و همکاران^(۶) در مطالعاتشان دریافتند که آنتی بیوتیک مذکور دارای دو جزء توأمان است: جزء کوچک با وزن مولکولی کمتر از ۴۰۰ دالتون که در محیط کشت استفاده شده از نظر شیمیایی فعال بوده و قادر به مهار سنتز بیوتین به وسیله باکتریهای گرم منفی است، جزء دیگر این آنتی بیوتیک پروتئین بزرگی با وزن مولکولی حدود ۶۰۰۰ دالتون می باشد و چون جزء اخیر مانند آبیدین سفیده تخمر مرغ با تمایل شدید به بیوتین خارج سلولی متصل می شود، آن را SA نامیدند.

SA مانند آبیدین دارای چهارزیر واحد یکسان بوده که هر زیر واحد آن دارای یک مکان اتصال برای بیوتین میباشد. میل ترکیبی بالای آن بایوتین^(۱۵) (M^{-۱}) و پایداری ترکیب SA - بیوتین به کاربردهای بسیار زیاد این سیستم در زمینه های مختلف منجر شده است. این سیستم به عنوان ابزار اصلی برای جداسازی (در کروماتوگرافی میل ترکیبی^۴، جایابی^۵ در سیتوشیمی میل ترکیبی^۶ و فناوری بلوتینگ^۷) و تشخیص (در سنجش‌های اینمنی، آسیب شناسی بافتی و پروفیل^۸) مورد استفاده قرار گرفته است^(۹). با توجه به کاربردهای مذکور واستفاده گسترده این پروتئین و کونثوگه^۹ های آن در آزمایشگاههای تشخیص طبی و مراکز تحقیقاتی دنیا و با عنایت به ناشناخته بودن آن در مجامعت علمی و مراکز تحقیقاتی داخل، لزوم انجام تحقیقی در مورد آن احساس می شد. لذا در تحقیق حاضر ابتدا با انتخاب چهار محیط کشت مختلف و کشت Dr.avidini با آنها بهترین محیط کشت از نظر تولید مقداری بیشتر SA با مقایسه ضخامت باند های پروتئین توسط الکتروفورز به صورت کیفی مشخص شد و سپس با کشت باکتری مزبور به صورت انبوه در این محیط کشت، SA ترشح شده با کروماتوگرافی تعویض یونی به طور نسبی خالص گردید. به اميد اینکه تحقیق حاضر راه گشائی برای انجام تحقیقات گسترده‌تر بر روی این پروتئین باشد.

مواد و روشها

مواد

ATCc ۲۷۴۱۹^۱ تهیه شد، تریپتون و عصاره مخمر ساخت شرکت DIFCO بود.^{۱۱} DEAE سلولز، IgG بیوتینه بامنشا موشی، IgM + IgG با منشأ خرگوشی کنثوگه شده با پراکسیداز و مارکر SA (با وزن مولکولی ۶۰۰۰ دالتون) از SIGMA و بقیه مواد مورد

IgG موشی) با غلظت 100 mg/ml قرارداده شد و پتری دیش به مدت یک ساعت روی همزن گذاشته شد. ۶- کاغذنیتروسلولز با 10 mL PBS شسته شد و سپس داخل پتری دیش حاوی محلول رنگ آمیزی 25 PBS میلی لیتر آب اکسیژنه 1 میکرولیتر و دی آمینوبنیزیدین 4 میلی گرم به مدت 15 دقیقه داخل حمام آبی 37°C گذاشته شد. ۷- درنهایت کاغذ نیتروسلولز با آب مقطر شسته شد تا ذرات اضافی رنگ از کاغذ حذف شده و فقط باندهای پروتئین باقی بماند.

تخلیص نسبی SA


برای تخلیص، باکتری در محیط LB به میزان 10 mL کشت داده شد. تخلیص نسبی بوسیله کروماتوگرافی تعویض یونی و با استفاده از زین DEAE - سلولز، که یک تعویض کننده یون منفی است، انجام شد. فعال سازی زین با استفاده از اسید کلریدریک $5\text{ g/نرمال و سود ۵/۰}$ نرمال صورت گرفت و ستونی به ابعاد $2 \times 55\text{ سانتیمتر}$ آماده گردید. بافرهای مورد استفاده شامل بافر اولیه تریس- اسید کلریدریک $0/0\text{ g/نرمال}$ با $\text{pH}=7/3$ و بافر اولیه در کلرید سدیم 7 g/نرمال بود. 70 mL میلی لیتر از محیط کشت LB حاوی SA از ستون عبور داده شد، این حجم از محیط کشت حاصل تغليظ یک لیتر محیط کشت LB با سولفات آمونیوم $0/8\%$ بود که قبلاً بوسیله صافی 45 mL میکرون به کمک پمپ خلاء صاف گردیده و یک شب در دمای 10°C درجه سانتیگراد در مقابل بافر تریس- اسید کلریدریک دیالیز شده بود. در هر لوله شماره گذاری شده حدود 3 mL لیتر از خروجی ستون جمع آوری، و جذب هرنمونه در $280\text{ نانومتر} / \text{قرات}$ گردید.^(۳) برای اطمینان از خارج شدن تمامی SA موجود در نمونه پس از اینکه حدود 150 mL میلی لیتر بافر اولیه از ستون عبور کرد، ارتباط بین ظرف بافر اولیه و محلول کلریدسدیم 7 mL نرمال در بافر اولیه برقرارشد تا بتدریج قدرت یونی بافر افزایش پیدا کند. از اولین لحظه اجرای این مرحله دوباره خروجی ستون در لوله های آزمایش شماره گذاری شده جمع آوری گردید و دوباره جذب هر لوله در $280\text{ نانومتر} / \text{قرات}$ گردید.^(۴) کروماتوگرام نمونه های جمع آوری شده در مقابل جذبهای خوانده شده رسم گردید. کروماتوگرام شامل دو پیک بود. برای مشخص شدن اینکه SA در کدام نمونه های خارج شده است، آزمایش الکتروفورز (با زل زیرین 10°C و زل بالائی 5°C) روی تعدادی از نمونه های هر پیک که جذبهای بالایی داشتند به همراه مارکر SA انجام شد و برای اثبات وجود SA در نمونه های جمع آوری شده آزمایش ایمونوبلوتینگ انجام گردید.

نتایج

بررسی زل حاصل از الکتروفورز چهار محیط کشت تغليظ شده نشان داد که در محیط کشت LB نسبت به سه محیط دیگر SA بیشتری تولید شده است ولی در نمونه لیز شده باکتری باندی مشاهده نگردید (شکل ۱). آزمایش ایمونوبلوتینگ روی محیط های کشت حاوی باکتری وجود SA را تأیید کرد، ولی در نمونه لیز شده باکتری باندی دیده نشد (شکل ۲). کروماتوگرام حاصل از کروماتوگرافی تعویض یونی وجود دو پیک را نشان داد (شکل ۳)، زل حاصل از الکتروفورز تعدادی از نمونه های خارج شده در هر دو پیک (شکل ۴)، مشخص کرد که قسمت اعظم و خالص SA در پیک اول خارج شده و در نمونه های حاصل از پیک دوم میزان SA خارج شده جزئی و همراه با ناخالصی (حدود $5/8\text{ میلی گرم در لیتر}$) با توجه

وهرمحیط کشت صاف شده به صورت جداگانه با سولفات آمونیوم $8/0\%$ طی مراحل زیر تغليظ شد^(۵): ۱- حجم مساوی از محیط های کشت در 150 mL به مدت 20 دقیقه سانتریفوژ شد. بر روی 5 mL لیتر از محلول رویی حاصل از سانتریفوژ هرمحیط کشت، ضمن بهم زدن ملایم، به تدریج سولفات آمونیوم (به غلظت 60 g/L در لیتر) اضافه شد تا با توجه به وزن مولکولی A، $8/0\%$ اشباع شدگی حاصل شود و بهم زدن در طول شب در 4°C درجه سانتیگراد ادامه یافت. برای جدا کردن رسوب تشکیل شده، عمل سانتریفوژ به مدت 20 دقیقه در دمای 4°C درجه سانتیگراد و در 10000 g انجام شد. بعد از اتمام سانتریفوژ مایع رویی لوله ها دور ریخته شد و رسوب هر لوله در 4 mL لیتر آب مقطر حل گردید محلول های حاصل به مدت 24 ساعت در دمای 10°C درجه سانتیگراد در یک لیتر آب دوباره تقطیر (تعویض سه بار آب مقطر) دیالیز گردیدند. محلول های دیالیز شده به مدت یک ساعت در دمای 4°C درجه سانتیگراد و در 40000 g سانتریفوژ شدند. در نهایت محلول رویی لوله ها که حاوی SA بود در آزمایش الکتروفورز زل پلی اکریل آمید مورد استفاده قرار گرفت.

برای مشخص کردن این مسئله که در کدام محیط کشت SA بیشتری تولید شده است، روی چهار محیط کشت تغليظ شده، مارکر SA و نمونه لیز شده باکتری توسط هموژنیزیر در 5 mL لیتر با فرسفت نمکی (دارای فسفات سدیم $15/0\text{ mM}$ و کلرید سدیم $20/7\text{ mM}$) آزمایش الکتروفورز با زل زیرین 10°C و زل بالائی 5°C به روش Laemmli انجام شد^(۶). با فرنمنوه دارای $7/8\text{ mL}$ میلی لیتر مخلوط A و $1/2\text{ mL}$ میلی لیتر $2/2\text{ pH}$ مارکر $2/2\text{ SDS}$ ، $2/6\text{ g/L}$ برموفنل آبی $1/2\text{ mL}$ میلی لیتر آزمایش A شامل $7/8\text{ mL}$ میلی لیتر تریس- اسید کلریدریک M با $8/6\text{ pH}$ ، $16/8\text{ mL}$ میلی لیتر گلیسرول، $2/6\text{ g/L}$ برموفنل آبی $3/2\text{ mL}$ میلی لیتر مقطر بود. هر نمونه به نسبت $1:1$ مارکر SA به نسبت $1:5$ با فرنمنوه در لوله های پلاستیکی در دارای 15°C و لوله های به مدت 2 دقیقه در حمام آبی 100°C درجه سانتیگراد قرار داده شدند. از هر نمونه 20 mL میکرولیتر واژمارکر SA میکرولیتر داخل چاهکها تزریق شد. عمل الکتروفورز با ولتاژ 2000 V و لدت 20 g/cm^2 ساعت طول کشید. در نهایت زل به ترتیب: دو ساعت در محلول تثبیت کننده حاوی اسیداستیک $5/4\text{ M}$ و متانول $7/2\text{ M}$ ، دو ساعت در محلول رنگ آمیزی دارای آبی کماسی $0/025\text{ M}$ و ایزوپروپانول $2/5\text{ M}$ و اسیداستیک 10 mL قرار داده شد. بعد جهت شفاف شدن زمینه زل و نمایان شدن باندها زل در محلول رنگ بر حاوی اسیداستیک 10 mL و متانول 10 mL گذاشته شد. برای اثبات وجود SA آزمایش اختصاصی ایمونوبلوتینگ انجام شد^(۷). برای این منظور ابتدا آزمایش الکتروفورز به طریقی که ذکر شد، انجام گردید. بعد از رسیدن رنگ نشانه به حدود نیم سانتیمتری انتهای زل، پروتئین های تغییک شده روی زل با اعمال شدت جریان 100 mL امپره غشاء نیتروسلولز منتقل شدند. غشاء نیتروسلولز از زل جدا شد و مراحل زل به ترتیب انجام گردید: ۱- کاغذ نیترو سلولز داخل پتری دیش حاوی آلبومین 1 mg/mL به مدت 1 دقیقه با محلول $20/0\text{ mL TWEEN 20}$ (دارای $0/05\text{ % PBS}$) با فرسفت سدیم $15/0\text{ mM}$ و کلرید سدیم $20/7\text{ mL}$ شستشو داده شد. ۲- کاغذ نیترو سلولز داخل پتری دیش حاوی IgG بیوتینه با منشأ موشی با غلظت $2/0\text{ mg/mL}$ قرار داده شد و پتری دیش به مدت 1 دقیقه به مدت 1 دقیقه با محلول $2/0\text{ mg/mL}$ قرار گردید. ۳- مرحله 2 تکرار گردید. ۴- مرحله 2 غشاء نیتروسلولز داخل پتری دیش حاوی IgG+IgM با منشأ خرگوشی کوتروگشی شده با پراکسیداز (آنتی



شکل ۱- ژل حاصل از الکتروفورز روی محیط های کشت حاوی باکتری تغليط شده به ترتیب از چپ به راست: مارکر SA (با وزن ملکولی ۶۰۰۰۰ دالتون)، محیط های کشت LB، LB+Asn، LB+Asn+LB (تکراری A، B، و نمونه لیز شده باکتری (فاقد باند پروتئینی است). ضخامت باند SA در نمونه های LB بیشتر از سایر محیط های کشت است


کشت LB در مقایسه با سه محیط کشت دیگر بیشتر بوده است. پس رشد باکتری در محیط کشت LB نسبت به محیط کشت های دیگر بهتر بوده است. در محیط کشت LB + آسپاراژین، آسپاراژین به غلظت ۰/۷ گرم در صد استفاده شد، که به نظرمی رسید غلظت مذبور بعنوان عامل محدود کننده رشد باکتری عمل کرده است و میزان تولید SA در این محیط کشت نسبت به محیط کشت LB کمتر بود. در صورتی که آسپاراژین با همین غلظت بوسیله Cazin و همکاران (۵) در محیط های کشت مصنوعی A و B به عنوان منع تأمین کننده ازت استفاده شده و در رشد باکتری و میزان

به جزئی و ناخالص بودن SA در پیک دوم از آن صرف نظر گردید) بوده است و آزمایش ایمونوبلوتینگ روی تعدادی از نمونه های جمع آوری شده از هر دو پیک، وجود SA و خالص و یا ناخالص بودن آن را در این نمونه ها تأثیر دارد (شکل ۵).


با توجه به جذبهای خوانده شده برای ۵۰ لوله جمع آوری شده در پیک A و با توجه به خلوص SA در این نمونه ها با استفاده از رابطه $A = E_{cl}/E_{l}$ (جذب نمونه ها = A، ضریب جذب = E_{cl}، ضخامت سل = l) و ضریب جذب $E_{cl}/E_l = ۳/۴$ (SA میزان SA خالص شده در این روش حدود ۱۳ میلیگرم در لیتر محیط کشت LB بود.

بحث و نتیجه گیری

از چهار محیط کشت استفاده شده در این تحقیق، دو محیط A و B مصنوعی بوده و جزو محیط های معین می باشند که این محیط ها حاوی مخلوطی از مواد غذایی غیرآلی شامل عناصر اصلی مثل ازت، منیزیم و کلسیم و همچنین گلوكز جهت تأمین کربن و انرژی هستند. عامل اعوامی رشد دیگری مانند عناصر نادر هم به این محیطها اضافه می شود تا رشد باکتری میسر شود. دو محیط کشت LB و LB+Asn+Aspargine مذکور بوده و جزو محیط های نامعین می باشند که مقدار و خصوصیات دقیق مواد در این محیطها مشخص نیست. عصاره مخمر و تریپتون موجود در محیط های کشت اخیر مخلوط پیچیده ای از ترکیبات شیمیایی نامشخص می باشند، که تریپتون، اسید های آمینه و پپتید های کوچک را تأمین، در حالیکه عصاره مخمر (سلولهای مخمر نیمه هضم شده خشک) نیاز ازت را همراه با قندها و مواد غذایی آلی و غیرآلی فراهم می کند (۱۶). بررسی ژل حاصل از آزمایش الکتروفورز روی چهار محیط کشت مذکور و نمونه لیز شده باکتری نشان داد که میزان SA تولید شده در محیط



شکل ۲ - آزمایش ایمونوبلوتینگ. به ترتیب از چپ به راست: نمونه لیز شده باکتری، مارکر SA و محیط های کشت LB، LB+Asn، A و LB+Asn+LB




شکل ۳ - کروماتوگرام تعداد نمونه های جمع آوری شده علیه جذبه های خوانده شده در ۲۸۰ نانومتر در کروماتوگرافی تعویض یونی . SA خالص شده در پیک اول حدود ۱۳ میلی گرم در لیتر و کل پروتئین خارج شده در پیک دوم (SA) جزئی به همراه پروتئینهای دیگر حدود ۵۸ میلی گرم در لیتر بود

مارکر موثر می باشدند و این حرکت متفاوت روی ژل با نتایج تحقیقات Diamandis و همکاران همخوانی دارد (۱۰). اشکال ۴ و ۵ نتیجه آزمایشات بوده که در آنها بین عمل کشت باکتری و آزمایشات تغییط و تخلیص به علت دیررسیدن تعدادی از مواد لازم فاصله افتاد. لذا در این اشکال SA تخلیص شده برخلاف اشکال ۶۰۰۰۰، با مارکر ۶۱، با دالتونی SA در یک سطح قرار گرفته اند که ناشی از هضم پروتولیتیک SA نمونه ها در همین فاصله زمانی بوده است. در خاتمه با توجه به کارآئی پروتئین SA در مقایسه با پروتئین مشابهش آبیدین (۱) استفاده از محیط های کشت دیگر، مطالعات رُنتگنی در مورد بیان ژن SA، بررسی کاربردهای این پروتئین و کوئنزوگه های آن، و نیز استفاده از روش های اختصاصی تخلیص همچون کروماتوگرافی میل ترکیبی توصیه می شود تا با بدست آوردن شرایط تولید خالص تر و بیشتر این پروتئین بتوان آن را در مقایس صنعتی تولید نمود که می تواند گامی درجهت بی نیازی و حتی ارزآوری برای کشور باشد.

سپاسگزاری

از آقایان دکتر رضا حیدری، دکتر مجید صادقی زاده، دکتر بیژن رنجبر، خانم زرندی و آقای میرلطیف غیبی به خاطر همکاریهای صمیمانه شان تشکر و قدردانی می شود.



شکل ۴ - ژل حاصل از الکتروفورز روی تعدادی از نمونه های جمع آوری شده از کروماتوگرافی تعویض یونی . به ترتیب از چپ به راست : مارکر SA، نمونه های جمع آوری شده شماره ۹، ۷، ۱۰، ۹، ۱۳، ۲۸، ۲۶، ۲۵، ۲۳، ۲۱، ۱۹، ۱۳، ۱۱۳، ۱۱۵ و ۱۱۶ .

تولید SA تأثیر مطلوبی داشته است. نتایج مطالعات Chaiet و همکاران (۷) نشان می دهد که SA یک پروتئین مترشحه خارج سلولی است و مشاهده نشدن باند در نمونه لیزشده باکتری در تحقیق حاضر مovid این مسئله است. برای تخلیص نسی SA از کروماتوگرافی DEAE-تعویض یونی بارزین سلولز استفاده شد، که یک روش تخلیص غیراختصاصی است. کروماتوگرام حاصل از این آزمایش وجود دو پیک را نشان داد. قسمت اعظم (SA) ۱۳ میلی گرم در لیتر در


پیک اول و مقدار جزئی نیز در پیک دوم و همراه با ناخالصی (۵۸ میلی گرم در لیتر) خارج شد. پس این پروتئین به صورت ایزوفرم بوده که در قدرت های یونی متفاوت با فرخارج می شود و این مسئله با گزارشات Hofmann و همکاران (۱۳) مطابقت دارد. به طور کلی در این روش غیراختصاصی میزان SA خالص شده حدود ۱۳ میلی گرم در لیتر محیط کشت LB بود که این میزان در مقایسه با گزارشات Hofmann و همکاران که با روش اختصاصی کروماتوگرافی میل ترکیبی از چهار لیتر محیط کشت ۱۰ تا ۱۵ میلی گرم SA خالص کرده اند، مقدار مطلوبی می باشد.

نتایج آزمایش های الکتروفورز و ایمونوبلوتینگ روی نمونه های SA تخلیص شده نشان داد که SA خالص شده و نیز مارکر SA به صورت دو باند دیده می شوند که این امر مovid گزارشات Bayer و همکاران (۳) است و به این صورت توجیه شده است که پس از ترشح SA در محیط کشت دو واقعه ملکولی رخ می دهد: زیر واحد سالم ۱۸۰۰۰ دالتونی در اثر هضم پروتولیتیک به زیر واحد ۱۴۰۰۰ دالتونی تبدیل، و نیز تراامر طبیعی به صورت اشکال الیگومری مجتمع می شود.

مشاهده حركت متفاوت مارکر SA در مقایسه با تخلیص شده در آزمایشات الکتروفورز انجام شده به این دلیل است که معمولاً SA طبیعی (با وزن ملکولی ۶۶ تا ۷۵ کیلو دالتون) در اثر هضم پروتولیتیک در دو انتهای آمینی و کربوکسیلی می تواند به فرمی با وزن کمتر (حدود ۶۰ کیلو دالتون) تبدیل شود که در بازار مارکرهای SA با وزن ملکولی ۱۷۰۰۰ دالتون تحت عنوان کر ۱۷ SA یا استرپت آویدین بریده شده ۱۸ موجود است که تمایل SA بریده شده برای اتصال به بیوتین بیشتر از طبیعی است. از طرفی SA علاوه بر *S.avidini* در تعداد دیگری از اکتینومیستها و نیز اوومیستها دیده شده است. لذا روش تخلیص، فاصله زمانی بین برداشت کشت و تخلیص و نیز منبع استفاده شده برای تولید مارکر، عواملی هستند که بر وزن ملکولی

ارشد، گروه بیوشیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس.
۲-بیزان پرست، راضیه. ۱۳۷۱. راهنمای آزمایشگاه بیوشیمی، نشرندا، ص
.۴۴-۴۷

- 3-Bayer, E.A.and Benhur, H.,1990,Isolation and properties of SA.Methods in Enzymology. 184:80-88.
- 4-Boyer,R.,2000,Modern experimental biochemistry.published by Hope College,Sanfrancisco,pp:74-79.
- 5-Cazin, J.and Suter, M.,1988,Production of SA in a synthetic medium.Journal of Immunological Methods.113:75-81.
- 6-Chaiet,L. and Miller,T.W.,1963,Antibiotic MSD-235.II. separation and purification of synergistic components. Antimicrob. Agents Chemother. 3:28-32.
- 7-Chaiet,L.and Wolf,F.J.,1964,The properties of SA, a biotin-binding protein produced by streptomycetes. Arch.Biochem.Biophys.106:1-5.
- 8-Chart,H.,1994,Methods in practical laboratory bacteriology.CRC Press,Florida,pp:35-45.
- 9-Creighton,T.E.,1997,Protein structure:A practical approach.IRL Press,Oxford,pp:79-85.
- 10-Diamondis,E.P.and Christopoulos,T.K.,1991,The biotin-(SA)avidin system: principles and applications in biotechnology. Clinical Chemistry.37: 625-636.
- 11-Green, N.M., 1975, Avidin. Advances in protein chemistry. 29: 85-133.
- 12-Hayes, P. and Wolf, C., 1989, Blotting techniques for the study of DNA, RNA and proteins. Bed. Jr.M. 299:965-968.
- 13-Hofmann, K. and Wood, S.W., 1980, Immunobiotin affinity columns and their application to retrieval of SA. Proc. Natl. Acad. Sci. 77: 4666-4668.
- 14-Laemmli,U.K., 1970,The discontinous SDS-PAGE system.Nature. 227:680.
- 15-Leboffe,M. and Pierce,B.,1995,Atlas for the microbiology laboratory.Morton Company,Colorado, pp:91-93.
- 16-Nester,E.W.and Roberts,C.E.,1983,Microbiology.published by Saunders College,Japan,pp:277-278.
- 17-Stapley, E.O. and Mata, J.M., 1963, Antibiotic MSD-235. I.Production by *S.avidini* and *S. Lavendulae*. Antimicrob.Agents Chemother. 3:20-27.
- 18-Suter,M.and Cazin, J.,1988, Isolation and characterization of highly purified SA obtained in a two- step purification procedure from *S.avidini* grown in a synthetic medium.J.Immunol.Methods. 113: 83-91.
- 19-Wilchek, M.and Bayer, E.A.,1988,The avidin-biotin complex in bioanalytical applications.Analytical Biochemistry. 171: 1-32.



شکل ۵ - آزمایش ایمونوبلوتینگ روی تعدادی از نمونه های جمع آوری شده از کروماتوگرافی تعویض یونی . به ترتیب از چپ به راست : مارکر SA . نمونه های جمع آوری شده شماره ۲۳ ، ۲۵ ، ۱۱۳ و ۱۱۵ .

پاورقی ها

- 1-Streptavidin
- 2-Broth
- 3-Synergistic
- 4-Affinity Chromatography
- 5-Localization
- 6-Affinity Cytochemistry
- 7-Blotting Technology
- 8-Gene Probes
- 9-Conjugated
- 10-American Type Culture Collection
- 11-Diethylaminoethyl
- 12-Immunoblotting
- 13-Luria Bertani
- 14-Sodium Dodecyl Sulfate
- 15-Ependorf
- 16-Phosphate Buffer Saline
- 17-Core
- 18-Truncated

منابع مورد استفاده

- ۱- جامعی، رشید. ۱۳۷۸. تخلیص SA از باکتری *S.avidini*. پایان نامه کارشناسی