



مطالعه آلودگی مخفی جرب در گوسفند *Psoroptes ovis*

- سید مصطفی رضوی، استادیار دانشکده دامپژوهشکی دانشگاه شیراز
- مهرام شکر فروش، دانشیار دانشکده دامپژوهشکی دانشگاه شیراز
- عفر زاده، دانش آموخته دانشکده دامپژوهشکی دانشگاه شیراز
- باقر سادات شیجاعی، کارشناس اداره دامپژوهشکی شیراز.

تاریخ دریافت: ۱۳۸۲ مهرماه ۱۳۸۲ تاریخ پذیرش: بهمن ماه ۱۳۸۲

مطالعه آلودگی مخفی جرب در گوسفند

چکیده

به منظور بررسی میزان شیوع رمزنگاری ج ب *Psoroptes ovis* در فصل تابستان ۲۰۰ رأس گوسفند سالم شامل ۱۱۵ رأس نر و ۸۵ رأس ماده در ۲۷ نوارگاه شیراز مورد بررسی قرار گرفتند. از هر گوسفند چهار نمونه پوستی شامل حفره زیر حدقه ای، پیه شاخ، کاناال گوش خارجی و چین ناحیه مغابنی با روش هضمی مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج هیچ مورد آلودگی را نشان نداد. طبق نتایج مطالعه حاضر، وقوع فرم مخفی حداقل در این منطقه تأیید نمی شود.

یک مراجعتی فرایند را کات نیز وجود دارد که در همه گزینشناهی بیماری اهمیت ویژه ای دارد. در این مرحله گوسفندان ظاهرآ سالم می توانند جرب را در نقاط خاص از بدن مانند زیر بغل، پایه شاخها، چین کشان ایان، حفره های زیر حدقه ای (Infra-orbital fossa) و کanal خارجی گوش (External ear canal) حمل نمایند. بدین ترتیب، گوسفندان آلوده به فرم مخفی می توانند جمعیت کوچکی از جربها را حفظ کرده و سایر حیوانات را در فصول سرد سال آلووده سازند (۳).

با توجه به وجود فرم بالینی گری پژوروبیتیک در منطقه، تحقیق حاضر با انگیزه مطالعه میزان آلودگی مخفی در گوسفندان انجام گردید تا اطلاعات لازم در مورد بیولوژی و همه گیرشناسی این جرب بدست آید.

مقدمه

گری پژوروبیتیک (*Psoroptic mange*) یکی از مهمترین بیماریهای انگلی گوسفند است که هم اکنون در کشورهای پیشرفته ریشه کن شده اما هنوز در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد (۱، ۳، ۹). نادعلیان و همکاران در بررسی انگلهای خارجی گوسفند در دو استان تهران و مرکزی، آلودگی به جرب *Psoroptes ovis* را شایع ترین آلودگی انگلی در گوسفندان گزارش کردند. در این تحقیق آلودگی بالینی در فصول سرد بالاتر اعلام شده اما به آلودگی مخفی و میزان شیوع آن اشارهای نشده است (۶).

پراکنش *Psoroptes ovis* روی دام در فصل های مختلف سال، متفاوت است. اگر چه ابتلا اکثر گوسفندان در زمستان صورت می گیرد اما

مواد و روشها

مطالعه حاضر در فصل تابستان بر روی ۲۰۰ رأس گوسفند سالم در کشتارگاه مجتمع صنعتی گوشت فارس انجام گرفت. در هر بار مراجعه به کشتارگاه ۱۵-۱۰ راس گوسفند بطور تصادفی انتخاب می شدند و پس از تعیین سن و جنس، پایه شاخ، حفره زیر حدقه ای، کانال گوش خارجی و چین ناحیه مغاینی (هر کدام شامل دو نمونه چپ و راست) آنها مورد بررسی ظاهری قرار می گرفت و برای حصول اطمینان بیشتر، پوست و پوشش محلهای مذکور به طور جداگانه با روش هضمی (محلول پتاس ۱۰ درصد) آزمایش می شدند.

نتایج

از مجموع ۲۰۰ رأس گوسفند مورد آزمایش شامل ۱۱۵ رأس گوسفند نر و ۸۵ رأس گوسفند ماده در پنجه روده سنی زیر یکسال، ۱/۵-۱ سال، ۲-۱/۵ سال، ۳-۱/۵ سال و ۵ سال و بزرگتر در هیچکدام آلودگی با جرب *Psoroptes ovis* مشاهده نگردید.

بحث

از نظر همه گیر شناسی، آلودگی مخفی با جرب پژوروپیتس بسا، حائز اهمیت شناخته شده است (۹، ۲، ۷، ۴). بسیاری از محققان از جمله Watson, Kutzer, Babcock & Black اعلام کرده اند که عفونت مخفی جرب پژوروپیتس عامل اصلی شیوع بیماری در فصو سرد سال است (۱۰، ۵). Watson و Tarry در تحقیقات خود، علت شیوع مجدد اسکاب گوسفندی در انگلستان را پس از اینکه به مدت ۲۰ سال بیماری ریشه کن شده بود عفونت مخفی جرب پژوروپیتس دانسته اند (۱۰، ۸).

Pfister طی تحقیقی نشان داد که وقوع بیماری در سوئیس یک تکرار موجی شکل داشته است. وی در فاصله زمانی آوریل ۱۹۷۵ تا ژوئن ۱۹۷۶، در ۲۵ واحد گوسفندداری در منطقه Berne طی سه مرحله، نمونه گیری پوستی کرد و با روش هضمی مورد آزمایش قرار داد. از مجموع ۸۳۱ نمونه اخذ شده از گوسفندان سالم طی سه مرحله، در هیچکدام آلودگی مخفی با جرب پژوروپیتس مشاهده نگرد (۷). هر چند در مطالعه حاضر هیچ مورد آلودگی مخفی پژوروپیتس تشخیص داده نشد اما در هر حال نمی توان به طور قطع ابراز کرد که آلودگی مخفی در منطقه وجود نداشته است لذا در تفسیر کل نتایج حاصله احتمالات زیر مطرح است:

۱- آلودگی مخفی در بدن میزانهایی غیراز میزان اصلی (گوسفند) اتفاق افتاد که این خود نیاز به بررسی و تحقیقی جداگانه بر روی سایر میزانهای دارد.

۲- مراحلی از جرب (غیر از مرحله بالغ که به شرایط محیطی حساس است) بتواند در جایگاه یا جایی غیر از بدن میزان زنده بماند. یقیناً این شکل از آلودگی را نمی توان آلودگی مخفی نامید. زیرا محل

