

## معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان دره دام گاهان مهریز (استان یزد)

- عباس زارعزاده، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
  - سید محمد میروکیلی، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
  - علی میرحسینی، کارشناس ارشد علوم گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
- تاریخ دریافت: مهر ماه ۱۳۸۴      تاریخ پذیرش: فروردین ماه ۱۳۸۵

Email: azrshafie@yahoo.com

### چکیده

دره دام گاهان با وسعت تقریبی ۲۱۰۰ هکتار در ۱۲ کیلومتری جنوب غربی شهرستان مهریز واقع شده است. حداقل ارتفاع این منطقه ۱۸۸۰ متر و حداکثر آن ۳۸۷۳ متر از سطح دریا می‌باشد. میزان متوسط بارندگی سالیانه منطقه ۱۹۵ میلیمتر است که در ارتفاعات بیشتر به صورت برف می‌باشد. بررسی به عمل آمده (۱۳۷۲-۱۳۸۳) نشان داد که در منطقه موردنظر مطالعه ۱۷۵ گونه گیاهی متعلق به ۱۳۴ جنس و ۴۶ خانواده وجود دارد. بیشترین تعداد گونه به ترتیب مربوط به خانواده‌های Asteraceae با ۳۴ گونه (۱۹/۴ درصد)، Poaceae با ۲۳ گونه (۱۳/۱ درصد) Lamiaceae با ۱۵ گونه (۸/۶ درصد)، Rosaceae با ۱۲ گونه (۶/۹ درصد)، Apiaceae با ۹ گونه (۵ درصد) و Papilionaceae با ۸ گونه (۴/۵ درصد) است. از نظر شکل زیستی، ۴۲/۴ درصد گونه‌ها همی‌کرپیتوفیت، ۲۱/۱ درصد کرپیتوفیت، ۱۶ درصد تروفیت، ۱۳/۱ درصد فانروفیت و ۷/۴ درصد کامفیت هستند. در بین گیاهان منطقه همی‌کرپیتوفیتها (۴۲/۴ درصد) و کرپیتوفیتها (۲۱/۱ درصد) مهمترین شکل زیستی منطقه را تشکیل می‌دهند. از نظر عناصر رویشی منطقه ۷۲/۶ درصد عنصر ایران (۲۱/۱ درصد کامفیت) هست. در بین گیاهان منطقه همی‌کرپیتوفیتها (۴۲/۴ درصد) و کرپیتوفیتها (۲۱/۱ درصد) مهمنت‌ترین عناصر ایران - تورانی و اروپا - سیبری، ۴ درصد عنصر جهانی، ۳/۴ درصد ایران - تورانی، ۹/۷ درصد عنصر ایران - تورانی و اروپا - سیبری، ۳/۴ درصد عنصر ایران - تورانی و مدیترانه‌ای، ۳/۴ درصد عنصر ایران - تورانی و مدیترانه‌ای و اروپا - سیبری، ۳/۶ درصد عنصر ایران - تورانی و صحراء - سندی و ۰/۵ درصد عنصر اروپا - سیبری می‌باشد. از ۱۷۵ گونه فلور منطقه ۴۵ گونه (۲۵/۷ درصد) گیاه دارویی، ۳۱ گونه (۱۷/۷ درصد) گیاه انسانس دار، ۲۲ گونه (۱۲/۶ درصد) انحصاری ایران و ۳ گونه انحصاری یزد می‌باشد.

**کلمات کلیدی:** فلور، شکل زیستی، جغرافیای گیاهی، مهریز، یزد

Pajouhesh &amp; Sazandegi No 74 pp: 129-137

## Introduction to the flora, Life form and plant geographical distribution of Darrah Damgahan in Mehriz (Yazd province)

By: A.Zarezadeh, Member of Scientific Board of Natural Resources and Agricultural Research Center of Yazd Province.

S.M.Mirvakili, Member of Scientific Board of Natural Resources and Agricultural Research Center of Yazd Province.

A.Mirhossaini , Msc of Natural Resources and Agricultural Research Center of Yazd Province.

Darrah Damgahan with an area of 2100 hectares is located in 12 km SW of Mehriz in Yazd province. The lowest and highest of its height are 1880 and 3873 meters. Average annual precipitation reaches to 195mm. Flora of this region includes 175 plant species that belong to 134 genera and 46 families. The important families are respectively, Asteraceae with 34 species (19.4%), Poaceae with 23 species (13.1%), Lamiaceae with 15 species(8.6%) , Rosaceae with 12 species (6.9%), Apiaceae with 9 species (5%) and Papilionaceae with 8 species(4.5%). Life forms of the plant species of region include: Hemicryptophytes 42.4%,cryptophytes 21.1%, therophytes 16% , phanerophytes 13.1% and chamaephytes 7.4% . From the view point of regional elements plants of This region include: 72.6% Irano-Turanian, 9.7% Irano- Turanian and Euro- Siberian , 4% cosmopolitan , 3.4% Irano- Turanian and Mediterranean , 3.4% Irano-Turanian and Mediterranean and Euro- Siberian , 6.3% Irano- Turanian and Saharo- Sindian determined. From the 175 species of flora this region 45 species (25.7%) are medicinal plants, 31 species (17.7%) essential oil plants , 22 species (12.6%) endemic in Iran and 3 species Endemic in Yazd.

**Keywords:** Flora, Life from, Plant geography, Mehriz,Yazd.

### مقدمه

است . این دره به علت قرق کمتر مورد چرای دام قرار گرفته است . در وسط دره آب چشمه به همراه آب حاصل از ذوب برفهای نقاط مرتفع بوسیله کanal سیمانی که در اوایل انقلاب توسط جهادسازندگی احداث شده به طرف شهرستان مهریز هدایت و جهت کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. بیشترین دبی آب در اوایل بهار و کمترین مقدار آن در شهریورماه است . به همین علت این دره دارای میکروکلیماتی خاصی میباشد و یکی از جالب ترین دره های شیرکوه از نظر تنوع گونه گیاهی میباشد. شرایط ویژه اقلیمی دره دام گاهان موجب شده تا تعداد قابل توجهی از گونه های گیاهی انحصاری ایران در این منطقه برویند. به علاوه این دره محل رویش سه گونه انحصاری بزد است که در سایر مناطق امکان رویش آنها وجود ندارد .

شکل زیستی گیاهان علاوه بر وابسته بودن به خصوصیات ژنتیکی به عوامل محیطی نیز بستگی دارد ، زیرا محیط نیز میتواند در شکل گیری اشکال مختلف حیاتی گیاهان اثر انکار ناپذیری داشته باشد . بر این اساس گیاهان میتوانند در اجتماعات مختلف و اقلیم های متفاوت از شکل زیستی گوناگونی برخودار باشند . طیف شکل زیستی غالب در یک اقلیم معرف چگونگی سازش گیاهان به این اقلیم خاص است (۵) .

شکل زیستی گیاهان منطقه به روش رونکیه تعیین گردید . در این روش اشکال زیستی گونه های گیاهی بر مبنای موقعیت جوانه ها یا اندام های بنا شده است که شاخه ها و برگ های جدید بعد از فصل نامساعد از آنها منشاء میگیرند (۱۲) .

رویش های مختلف استان یزد از جنبه فلورستیک توسط برخی از پژوهشگران از جمله مظفریان ، باستانی ، زارع زاده ، میرجلیلی و قوچانی مورد مطالعه قرار گرفته است (۱۴، ۹، ۳، ۲) . دره دام گاهان مهریز با وسعت تقریبی ۲۱۰۰ هکتار در فاصله بین عرض های ۳۱ درجه و ۲۸ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۳۲ دقیقه شمالی و طول های ۵۴ درجه و ۱۸ دقیقه تا ۵۴ درجه و ۲۱ دقیقه شرقی قرار گرفته است. از نظر زمین شناسی در این منطقه تنوع لیتوژئیکی تشکیلات به چشم نمی خورد و رختمنون های زمین شناسی عمدتاً شامل آهک های خاکستر رنگ سازند تفت متعلق به کرتاسه و گرانیت شیرکوه میباشد. سازند تنگستان نیز در وسعت بسیار محدود رخنمون دارد . توهد نفوذی گرانیت شیرکوه قدیمی ترین واحد سنگی حوزه میباشد که در نواحی جنوب زیر حوزه وسعت قابل ملاحظه ای دارد. این توهد نفوذی از نظر لیتوژئیکی شامل گرانیت و گرانودیبوریت میباشد . وجود سیستم های شکستگی و درز و شکاف های موجود در این توهد گرانیتی از نظر تغذیه سفره آب های زیر زمینی منطقه بسیار موثر میباشد . درز و شکاف های موجود در این توهد آذرین از عمق قابل توجهی برخودار بوده و نفوذ پذیری آنرا افزایش می دهد . به طور کلی می توان اذعان داشت که گرانیت شیرکوه پتانسیل سیل خیزی حوزه را کاهش داده و درز و شکاف های موجود در آن امکان نفوذ پذیری بیشتر نزولات جوی و تغذیه چشمی ها و قنوات منطقه را فراهم آورده

## روش تحقیق

نتایج نشان داد از نظر شکل زیستی همی کریپتوفتیت ها با ۷۴ گونه (۴۲/۴ درصد) مهمترین شکل زیستی منطقه مورد مطالعه است و پس از آن کریپتوفتیت ها با ۳۷ گونه (۲۱/۱ درصد) و تروفیتیت ها با ۲۸ گونه (۱۶ درصد) بیشترین تعداد گونه ها را به خود اختصاص داده اند (شکل ۱). منطقه مورد مطالعه بر طبق تقسیم بندهی نواحی رویشی جهانی توسعه Irano-Takhtajan در قلمرو Holarctic ، زیر قلمرو Armenian - Turanian زیر ناحیه Western Asiatic حوزه ایران و زیر Central Iranian قرار می گیرد.

از نظر پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه ۷۲/۶ درصد عنصر ایران - تورانی ، ۹/۷ درصد ایران - تورانی و اروپا - سیبری ، ۴ درصد عنصر جهانی ، ۳/۴ درصد ایران - تورانی و مدیترانه‌ای ، ۳/۴ درصد عنصر ایران - تورانی و مدیترانه‌ای و اروپا - سیبری می باشد(شکل ۲). از میان گونه‌های منطقه ۲۲ گونه انحصاری ایران و ۳ گونه انحصاری یزد شامل:

*Dionysia khatami, Cerasus yazdiana, Helichrysum davisiannum*

۴۵ گونه گیاه دارویی و ۳۱ گونه گیاه انسان‌دار می باشند.

## بحث

بررسی شکل زیستی گیاهان منطقه بیانگر وجود تنوع نسبتاً خوب در اشکال زیستی آن است که به دلیل سازگاری گیاهان منطقه به شرایط اقلیمی و حاکمی است. نتایج حاصل از طبقه بندی شکل زیستی نشان دهنده این است که گیاهان همی کریپتوفتیت فراوان ترین شکل زیستی منطقه می باشد که طبق نظر Archibold (۱۵) فراوانی گیاهان همی کریپتوفتیت در یک منطقه نشان دهنده اقلیم سرد و کوهستانی می باشد. با توجه به اینکه اقلیم این منطقه نیز با استفاده از روش آمبرژه سرد و نیمه خشک می باشد


به منظور معرفی فلور دره دامگاهان ، ضمن عملیات صحرایی اجرای طرح های تحقیقاتی فلور استان یزد و جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان یزد (۱۳۸۳-۱۳۷۲) گونه های گیاهی منطقه، جمع آوری، خشک و پرس شدن و سپس با استفاده از منابع علمی شامل : فلور ایرانیکا (۱۸) ، فلور ترکیه (۱۷) ، فلور رنگی ایران (۸) ، فلور استان یزد (۱۲) ، گونه های ایران (۱۳) ، فرهنگ نامهای گیاهان ایران (۱۱) و با تایید کارشناسان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع مورد شناسایی دقیق قرار گرفتند.

شکل زیستی گیاهان بر اساس سیستم رونکیه تعیین گردید. در این سیستم گیاهان بر اساس موقعیت جوانه های تجدید حیات کننده به ۵ دسته فابروفت ها ، کامفتیت ها ، همی کریپتوفتیت ها ، کامفتیت ها و تروفیت ها تقسیم می شوند (۱۰).

مناطق انتشار گونه های گیاهی با استفاده از فلورهای مذکور و سایر منابع (۱۶،۷۶) تشخیص داده شد. سپس کوروژی گونه های اساس تقسیم بندهی نواحی رویشی توسط Takhtajan (۲۱،۲۰) و Zohary (۱۹) تعیین گردید.


## نتایج

به طور کلی ۱۷۵ گونه گیاهی در منطقه دره دامگاهان شناسایی شد که نمونه های هرباریومی آن در هرباریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بزد نگهداری می شود. از این تعداد یک گونه از نهان زادان آوندی (دم اسب) و ۱۷۴ گونه نهان دانه (۱۴۲ گونه دو لپهای و ۳۲ گونه تک لپهای) است. فهرست گونه های گیاهی منطقه در جدول ۱ ارائه شده است . مهمترین خانواده های منطقه عبارتند از Asteraceae با ۳۴ گونه ، Poaceae با ۲۳ گونه ، Lamiaceae با ۱۵ گونه و Rosaceae با ۱۲ گونه می باشد.



شکل شماره ۱- هیستوگرام درصد فراوانی شکل های زیستی گیاهان منطقه

شکل شماره ۲- هیستوگرام درصد  
فراوانی پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه



- موسسه تحقیقات جنگلهای و مراتع، شماره انتشار ۱۹۱، ۱۹۲۲ ص
- ۶- عصری، یونس، ۱۳۸۲؛ تنوع گیاهی در ذخیرگاه بیوسفر کویر، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلهای و مراتع، شماره انتشار ۳۲۶، ۳۰۵ ص
- ۷- قربانی، مه لقا، ۱۳۸۰؛ نگرشی بر فلور و پوشش گیاهی بیابان‌های ایران، تالیف لئونارد، جی. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلهای و مراتع، شماره انتشار ۲۹۰، ۲۰۸ ص
- ۸- قهرمان، احمد. فلور رنگی ایران جلد های ۱-۲۵
- انتشارات موسسه تحقیقات جنگلهای و مراتع.
- ۹- قوچانی، رزا، ۱۳۸۳؛ مطالعه فلور و جوامع گیاهی منطقه خضرآباد یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد تهران.
- ۱۰- مبین، صادق، ۱۳۶۰؛ جغرافیای گیاهی. انتشارات دانشگاه تهران شماره ۹۰۲، ۲۷۱ ص
- ۱۱- مظفریان، ولی الله. ۱۳۷۵؛ فرهنگ نامهای گیاهان ایران. انتشارات فرهنگ معاصر ایران.
- ۱۲- مظفریان، ولی الله. ۱۳۷۹؛ فلور استان یزد. انتشارات موسسه انتشارات یزد. ۴۷۳ ص.
- ۱۳- مصوصی، علی اصغر، ۱۳۶۵-۱۳۷۹؛ گونهای ایران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلهای و مراتع جلد ۴-۱.
- ۱۴- میر جلیلی، سید عباس، ۱۳۷۶؛ مطالعه فلورستیک و بررسی جوامع گیاهی منطقه هرات و مروست یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
- 15-Archibold,O.W., 1995; Ecology of world vegetation. Chapman and Hall Inc.London.509p.
- 16- Jalili.A.& Jamzad.Z.1999; Red Data Book of Iran. Research Institute of Forests and Rangelands, No-215.748p.
- 17- Davis,P.H.(ed.)1965-1988; Flora of Turkey,voles.1-10.Edinburgh University Press,Edinburgh.
- 18- Rechinger,K.H.(ed.)1963-1998; Flora Iranica , voles,1-173.Akademische Druck-u Verlagsanstalt,Graz.
- 19- Takhtajan,A. 1986; Floristic regions of the world.University of California Press,552p.
- 20- Zohary,M. 1973; Geobotanical foundations of the Middle East, 2vols.Stuttgart,739p.
- 21-Zohary M. 1963; On the geobotanical structure of Iran . Bulletin of the Research Council of Israel,section D,Botany supplement.113p.

بیشتر بودن همی‌کریتوفیت‌ها از سایر اشکال زیستی (۴۲/۴ درصد) در این منطقه تحت تاثیر این اقلیم می‌باشد.

## سپاسگزاری

بدینوسیله از زحمات آقایان دکتر اسدی، دکتر مظفریان، خانم دکتر جمزاد و مهندس بهنام حمزه ای که در شناسایی گونه‌ها و همکاری آقایان مهندس دشتکیان، مهندس سلطانی و عرب زاده در جمع آوری گونه‌ها و خانم کاظمی که تایپ این مقاله را به عهده داشته اند صمیمانه تشکر می‌نمایم.

## پاورقی‌ها

- 1 -Phanerophytes
- 2 - Chamaephytes
- 3 -Hemicryptophytes
- 4 - Geophytes
- 5 - Therophytes

## منابع مورد استفاده

- ۱- اسدی ، مصطفی ، معصومی ، علی اصغر ، خاتم ساز ، محبوبه و مظفریان ، ولی الله ( ویراستاران ) ۱۳۷۶-۱۳۸۴ . فلور ایران شماره های ۴۵، ۴۳، ۳۳، ۱۳۱، ۰۸، ۶۵
- ۲- باگستانی ، ناصر . ۱۳۷۹؛ گزارش نهایی طرح تحقیقاتی جمع آوری و شناسایی گیاهان استان یزد و تشکیل هر بار یوم . ۱۳۰ ص.
- ۳- زارع زاده ، عباس . ۱۳۷۹. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی جمع آوری و شناسایی و اهلی کردن گیاهان داوری استان یزد . ۴۲۳ ص.
- ۴- عصری ، یونس . ۱۳۷۴؛ جامعه شناسی گیاهی. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلهای و مراتع شماره انتشار ۱۳۴ ، ۲۸۵ ص.
- ۵- عصری ، یونس ، ۱۳۷۷؛ پوشش گیاهی شوره زارهای دریاچه ارومیه ، انتشارات

جدول شماره ۱ - فهرست، شکلهای زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه دام گاهان مهریز

اسم فارسی	کوروتیپ	شکل زیستی	تاغزون
خینچوک	IT	ph	<b>Anacardiaceae</b>
			<i>Pistacia khinjuk</i> Stocks
زیره سیاه	IT	G.b	<b>Apiaceae</b>
			<i>Bunium persicum</i> (Boiss.) B.Fedtsch*
مشگک	IT,SS	He	<i>Ducrosia anethifolia</i> (DC) Boiss.
زول خراسانی	IT	He	* <i>Eryngium Bungei</i> Boiss
آنغوزه	IT	He	* <i>Ferula assa - foetida</i> L
کما	IT	He	<i>Ferula ovina</i> ( Boiss.) Boiss.
چوبی خوشه ای	IT	He	<i>Ferulago contracta</i> Boiss.& Hausskn
جعفری کوهی اصفهانی	IT	He	<i>Pimpinella dichotoma</i> Boiss .et Hausskn*
شانه و نویس ستاره ای	IT,MS,ES	Th	<i>Scandix stellata</i> Banks & Soland.
دانه قفسی	IT	He	<i>Thecocarpus meifolius</i> Boiss.
			<b>Asteraceae</b>
بومادرن	IT, ES	He	* <i>Achillea wilhelmsii</i> C.Koc
بابونه تاج دندانی	IT,SS	Th	<i>Anthemis odontostephana</i> Boiss.
درمنه کوهی	IT	Ch	* <i>Artemisia aucheri</i> Boiss
درمنه دوساله	IT	Th	<i>Artemisia biennis</i> Willd.
درمنه ایرانی	IT	Gr	* <i>Artemisia persica</i> Boiss.
گل گندم اصفهانی	IT	He	<i>Centaurea ispahanica</i> Boiss.
گل گندم بوته ای	IT,ES	He	<i>Centaurea virgata</i> Lam.
کنگر هرز	Cosm	Gr	<i>Cirsium arvense</i> (L.)Scop.
هزار خار حجمی	IT	He	<i>Cousinia amplissima</i> (Boiss.)Boiss.
هزار خار پا پنبه ای	IT	He	<i>Cousinsa eriobasis</i> Bunge
هزار خار خنجری	IT	He	<i>Cousinia sicigera</i> C.Winkl.& Bornm.
ریش قوش برازجانی	IT	Th	<i>Crepis kotschyana</i> (Boiss.) Boiss
شکر تیغال بوته ای	IT	He	<i>Echinops Aucheri</i> Boiss
شکر تیغال یزدی	IT	He	<i>Echinops jazdianus</i> Boiss & Buhse
کک گریز	IT	He	<i>Francoeuria undulata</i> (L.)Lack
گل بی مرگ شیر کوهی	IT	He	<i>Helichrysum Davisianum</i> Rech.f.
گل بی مرگ گنوئی	IT	He	<i>Helichrysum leucocephalum</i> Boiss
کریچیج بیانی	IT	Ch	<i>Hertia angustifolia</i> (DC.)O.Kuntze
سوگند یزدی	IT	He	<i>Jurinea stenocalathia</i> Rech.f.
هزار پایی ظریف	IT	Th	<i>Koelpinia tenuissima</i> Pavl.& Lipsch
بابونه ای	IT	Th	<i>Microcephala lamellata</i> (Bunge)Pobed
تلخک	IT	He	<i>Picris strigosa</i> M.B.
کک کش	IT,ES	Gr	<i>Pulicaria dysentrica</i> (L.)Benth.
گاو چاق کن	IT	He	<i>Scariola orientalis</i> (Boiss.)Sojak
شنگ اسپی کپکی	IT	Gr	<i>Scorzonera mucida</i> Rech.f.&Esfand.
شنگ اسپی بیانی	IT	Ge	<i>Scorzonera tortuosissima</i> Boiss.
پیرگیاه زرد کوهی	IT	He	<i>Senecio paucilobus</i> DC.
مینای دیررس	IT	He	<i>Tanacetum fruticosum</i> Ledeb.
بابونه گاوی	IT	He	* <i>Tanacetum parthenium</i> (L.)Schultz-Bip

<i>Tanacetum persicum</i> (Boiss.)Mozaffarian	He	IT	مینای ایرانی
<i>Tragopogon caricifolius</i> Boiss.	He	IT	شنگ نی ماند
<i>Tragopogon Jezdianus</i> Boiss.& Buhse	He	IT	شنگ بزدی
<i>Varthemia persica</i> DC.	He	IT	عطر سنگ
<i>Zoegea purpurea</i> Fresen.	Th	IT,SS	خوشید صبح ارغوانی
<b>Berberidaceae</b>			
* <i>Berberis integerrima</i> Bung	ph	IT	زرشک زرافشانی
<b>Brassicaceae</b>			
* <i>Alyssum marginatum</i> Steud. Ex Boiss	Th	IT	قدومه پا کوتاه
<i>Cardaria Draba</i> (L.)Desv.	He	Cosm	ازمک
<i>Fibigia umbellata</i> (Boiss.)Boiss.	He	IT	
<i>Graelsia saxifragifolia</i> (DC.)Boiss.	He	IT	صخره دری
<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	He	IT,ES	ترتیزک ساقه آغوش
<i>Torularia aculeolata</i> (Boiss)O.E.Schulz	Th	IT	تسیبیجی خارک دار
<b>Campanulaceae</b>			
<i>Campanula incanescens</i> Boiss.	He	IT	گل استکانی صخره ای
<b>Capparidaceae</b>			
<i>Cleome quinquenervia</i> DC.	Th	IT	علف مارگچ دوست
<b>Caprifoliaceae</b>			
<i>Lonicera nummulariifolia</i> Jaub.& Spach	ph	IT	شن
<b>Caryophyllaceae</b>			
<i>Acanthophyllum spinosum</i> (Desf.)C.A..Mey.	Ch	IT	چوبک خاردار
<i>Acanthophyllum squarrosum</i> Boiss.	Ch	IT	چوبک زبر
<i>Dianthus crinitus</i> Sm.	He	IT	میخک کرکی کرمانی
<i>Paronychia caespitosa</i> Stapf	He	IT	عقربک پشتہ ای
<i>Silene spergulifolia</i> (Willd.)M.B.	Gr	IT	سیلن پر برگ - سیلن ارمانتانی
<i>Silene stapfii</i> Melzh.	He	IT	سیلن بکرائی
<i>Silene viscosa</i> (L.)pers.	He	IT,ES	سیلن چسبناک
<b>Chenopodiaceae</b>			
<i>Noaea mucronata</i> (forssk.)Aschers.et schweinf.	Ch	IT,M	خارکو
<b>Cucurbitaceae</b>			
<i>Bryonia aspera</i> Stev. exLdeb	He	IT	فاسراتی زبر
<b>Cyperaceae</b>			
<i>Carex physodes</i> M.B.	Gr	IT	
<b>Dipsaceae</b>			
<i>Pterocephallus gedrosiacus</i> Rech.f. Aell. & Esfand	Ch	IT	سربال بلوجستانی
<i>Scabiosa olivieri</i> Coul.	Th	IT	طوسک زاگرسی
<b>Ephedraceae</b>			
* <i>Ephedra procera</i> Fisch & Me	Ch	IT,SS	ارمک - ریش بز
<b>Euphorbiaceae</b>			
<i>Euphorbia gedrosiaca</i> Rech.f.,Aell.& Esfand	He	IT,SS	شیر سگ بلوجستانی
<i>Euphorbia heteradenia</i> Jaub.& Spach	He	IT	شیر سگ اصفهانی

Equisetaceae			
* <i>Equisetum arvense</i> L.	Gr	ES	دم اسب
Fumariaceae			
<i>Hypecoum Pendulum</i> L.	Th	(IT,M, SS)	شاه ترهاي - زرده شاه ترہ
Gentianaceae			
<i>Centaurium pulchellum</i> (Swartz)Druce	Th	IT	قطوريون زیبا
Geraniaceae			
<i>Biebersteinia multifida</i> Dc.	He	IT	آدمک
* <i>Geranium rotundifolium</i> L.	Th	IT,M,ES	سوزن چوپان برگ دایره ای
Hypericaceae			
* <i>Hypericum helianthemooides</i> (spach) Boiss	He	IT	گل راعی آفتایی
Juglandaceae			
<i>Juglans regia</i> L.	Ph	IT	گردو
Juncaceae			
<i>Juncus inflexus</i> L.	Gr	Cosm	سازوی شلاقی
<i>Juncus punctorius</i> L.	Gr	IT	سازوی منقوط
Juncaginaceae			
<i>Triglochin palustris</i> L.	Gr	IT,ES	چمن پیکانی
Lamiaceae			
* <i>Lallemantia Royleana</i> (Benth. ) Benth.	Th	IT	بالنگو
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	TH	IT,M,ES	گزنه سای ساقه آغوش
<i>Marrubium vulgare</i> L.	He	IT,M	فراسین
* <i>Mentha longifolia</i> (L.) Hudso	Gr	IT,ES,M,SS	پونه
<i>Phlomis olivieri</i> Benth.	He	IT	گوش بره
<i>Salvia eremophila</i> Boiss.	He	IT	مریم گلی بیابانی
<i>Salvia macrosiphon</i> Boiss.	He	IT,SS	مریم گلی لوله ای
<i>Salvia syriaca</i> L.	Gr	IT	مریم گلی سوری
<i>Satureja bachtiarica</i> Bunge.	He	IT	مرزه بختیاری
<i>Scutellaria multicaulis</i> Boiss.	He	IT	بشقانی کوهستانی
<i>Stachys inflata</i> Benth.	Ch	IT	سنبله ای بادکنکی
<i>Stachys obtusicrepia</i> Boiss.	He	IT	سنبله ای طنار
<i>Teucrium polium</i> L.	He	IT,M	مریم نخودی
<i>Teucrium scordium</i> L.	Gr	IT	مریم نخودی باتلاقی
* <i>Zataria multiflora</i> Boiss.	Ph	IT,SS	آویشن شیرازی
<i>Ziziphora chlinopodioides</i> Lam.	He	IT	کاکوتی کوهی
* <i>Ziziphora tenuir</i> L.	Th	IT	کاکوتی
Liliaceae			
* <i>Colchicum persicum</i> Bake	G,b	IT	گل حسرت
<i>Gagea olgae</i> Regel	G,b	IT	نجم طلایی تماشایی
<i>Nectaroscordum tripedale</i> (trautv.) Grossh.	G,b	IT	پیاز تابستانه

<b>Linaceae</b>			
<i>Linum album ky.ex Boiss.</i>	He	IT	کتان سفید
<b>Moraceae</b>			
<i>Ficus johannis Boiss.</i>	Ph	IT,M	انجیر وحشی دالکی
<b>Onagraceae</b>			
<i>Epilobium palustre L.</i>	G.r	IT,ES	بید علفی مردابی
<i>Epilobium minutiflorum Hausskn.</i>	G.r	IT,ES	بید علفی فروتن
<b>Orchidaceae</b>			
<i>Dactylorrhiza iberica(Bieb.ex willd.)Soo</i>	G.b	IT,ES	غده انگشتی برگ باریک
<i>Dactylorrhiza umbrosa(Kar. &amp; Kir.)Nevski</i>	G.b	IT	غده انگشتی سایه پسند
<b>Papaveraceae</b>			
* <i>Glaucium oxylobum</i> Boiss. & Buhse	Th	IT	شقایق لوب تیز
<b>Papilionaceae</b>			
<i>Astragalus(caprini)multijugus</i> DC.	He	IT	
<i>Astragalus (malacothrix) spachianus</i> Boiss.& Buhse	He	IT	
<i>Astragalus(Micropysa)cephalanthus</i> DC.	Ch	IT	
<i>Astragalus (poterium)calliphysa</i> Bunge.	Ph	IT	
<i>Cicer spiroceras</i> Jaub.& Spach.	He	IT	نخود پیچکی
<i>Ebenus stellata</i> Boiss.	Ph	IT	جو سیخ
* <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	He	IT	شیرین بیان
<i>Trigonella monantha</i> C.A.Mey.	Th	IT	شنبلیله کک گل
<b>Plantaginaceae</b>			
* <i>Plantago lanceolata</i> L.	He	Cosm	کاردی
<b>Plumbaginaceae</b>			
<i>Acantholimon flexuosum</i> Boiss.	Ch	IT	کلاه میرحسن زیکرگی
<i>Acantholimon incomptum</i> Boiss.& Buhse.	Ch	IT	کلاه میرحسن نفتی
<b>Poaceae</b>			
<i>Agropyrum repens</i> (L.)P.Beauv.	Gr	IT,ES	چمن گندمی رونده
<i>Arrhenatherum kotschyii</i> Boiss.	Gr	IT	بولافک پرسیوپیسی
<i>Boissiera squarrosa</i> (Banks & soland.)Nevski.	Th	IT	گندمی بکساله
<i>Bothrichloa ischaemum</i> (L.)Keng	He	Cosm	جاروینجه ای
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Hudson)p.Beauv.	He	IT,ES	چمن جاروی جنگلی
<i>Bromus Danthoniae</i> Trin.	Th	IT	جارو علفی هرز
<i>Bromus tectorum</i> L.	Th	IT	جارو علفی بامی
<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.)Beauv.	G.r	IT,ES	موئین گیاه
<i>Eremopoa persica</i> (Trin.)Roshev.	Th	Cosm	-----
<i>Festuca arundinacea</i> schreb.	He	IT	علف بره نی مانند
<i>Melica persica</i> kunth.	G.r	IT	ملیکا
<i>Oryzopsis holciformis</i> (M.B.)Hack.	He	IT,M	برنجی زاگرسی
<i>Pennisetum orientale</i> L. c.Rich.	Gr	IT	ریش پری
<i>Poa bulbosa</i> L.	G.b	IT,M,ES	چمن پیازک دار

<i>Poa pratensis</i> L.	Gr	IT,ES	-----
<b>Poa sinica</b> steud.	G.b	IT,SS	چمن سینایی
<i>Psathyrostachys fragilis</i> (Boiss.)Nevski.	Gr	IT	چمن جو
<i>Saccharum Ravennae</i> (L.)Murray	Gr	IT,SS,Es	تباسیر هندی
<i>Stipa barbata</i> Desf.	He	IT	استی ریش دار
<i>Stipa Hohenackeriana</i> Trin .& Rupr.	He	IT	استپی بیبانی
<i>Stipa parviflora</i> Desf.	He	IT,M	استپی کویری
<i>Taeniatherum crinitum</i> (Schreb.)Nevski	Th	IT	گیسو چمن
<i>Vulpia persica</i> (Boiss. & Buhse)V.Krecz.&Bobrov	Th	IT	دم رو باهک جندقی
<b>Polygonaceae</b>			
<i>Atraphaxis spinosa</i> L.	Ph	IT	کاروان کش
<i>Polygonum dumosum</i> Boiss.	Ch	IT	هفت بند بوته ای
<i>Rumex chalepensis</i> Miller.	He	IT	ترشک حلی
<i>Rumex deritatus</i> L.	Th	IT	ترشک دندانه دار
* <i>Rheum Ribes</i> L.	Gr	IT	ریواس
<b>Primulaceae</b>			
<i>Dionysia janthina</i>	He	IT	عروس سنگ شیرکوهی
<i>Dionysia khatamii mozaffarian</i>	He	IT	عروس سنگ مهریزی
<i>Primula capitellata</i> Boiss.	He	IT	پامچال یچجالی
<b>Ranunculaceae</b>			
* <i>Clematis ispanica</i> Boiss	Ph	IT	کلماتیس اصفهانی
<i>Ranunculus macropodioides</i> Briq.	G.b	IT	آلله پادرشت
<b>Resedaceae</b>			
* <i>Reseda Buhseana</i> Mull.Arg	He	IT	ورث ایرانی
<b>Rhamnaceae</b>			
<i>Rhamnus Persica</i> Boiss.& Hohen	Ph	IT	سیاه تنگرس فارسی