



امور دام و آبیان شماره ۷۵ تابستان ۱۳۸۶

پژوهش‌های دامپزشکی

بررسی مقایسه‌ای الگوی الکتروفوریک پادگن‌های بدنی فاسیولا در میزبان‌های مختلف

• بهنام مشگی، علی اسلامی و سیدحسین حسینی

گروه انگل‌شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

• فرهید همت‌زاده

گروه میکروب‌شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

• الهام هوشمند

دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

تاریخ دریافت: آذرماه ۱۳۸۴ تاریخ پذیرش: شهریورماه ۱۳۸۵

Email: bmeshgi@ut.ac.ir

چکیده

هدف از بررسی حاضر تعیین الگوی الکتروفوریک پادگن‌های بدنی دو گونه ترماتود شایع در ایران شامل *Fasciola hepatica* و *F. gigantica* بود. بدین منظوری بازرسی کشتارگاهی اقدام به تهیه گونه‌های فاسیولا از میزبانهای مختلف شامل: فاسیولا ژبگانتیکا از دو میزبان گاو و شتر و *Fasciola hepatica* از گوسفند و گاومیش گردید. بعد از جداسازی ترماتودهای بالغ و انتقال به آزمایشگاه هر نمونه ۳ تا ۴ بار در محلول فسفات بافر سالین (PBS, pH=7.2) شسته شد. پادگن بدنی هر ترماتود به طور جداگانه توسط هموزنی‌اسیون و سپس سانتریفوژ استخراج گردید. پادگن‌های مربوطه (۴ نمونه) بعد از تنظیم میزان پروتئین، به روش سدیم دودسیل سولفات پلی‌اکریلامید ژل الکتروفورز (SDS-PAGE) در مجاورت نشان‌دار با وزن مولکولی مشخص تحت الکتروفورز قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی الگوی الکتروفوریک پادگن‌های بدنی ۴ نمونه نشان داد هر دو گونه دارای پروتئین‌هایی با وزن مولکولی حدود ۱۸ تا ۷۰ کیلو دالتون هستند. پادگن بدنی *F. gigantica* شتر و گاو باند مشخصی با وزن مولکولی ۵۷ کیلو دالتون دارند ولی گونه دیگر فاقد آن است. پادگن بدنی *F. hepatica* در گوسفند و گاومیش با داشتن دو باند ۵۴ و ۶۸ کیلو دالتونی از گونه دیگر فاسیولا قابل تفریق می‌باشد در حالیکه *F. hepatica* گاومیش دارای باند نسبتاً ضعیفی با وزن مولکولی ۶۴ کیلو دالتون می‌باشد. لذا با توجه به اختلافاتی که در پروتئین‌های بدنی فاسیولا نه تنها بین گونه‌ها که بین یک گونه همسان ولی در دو میزبان متفاوت وجود دارد لازم است در روش‌های نوین ایمنولوژیک جهت تشخیص آلودگی با فاسیولا که معمولاً از پادگن‌های مختلف بدنی ترماتود بالغ استفاده می‌گردد، حیوان میزبان و تاثیر آن بر ویژگی‌های مولکولی ارگانسیم مربوطه مورد نظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی: *Fasciola hepatica*، *Fasciola gigantica*، پادگن بدنی، الکتروفورز

Pajouhesh & Sazandegi: No 75 pp: 156-159

Comparative assessment of electrophoretic patterns of fasciola somatic antigens in different hosts

By: B. Meshgi, Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran.

Eslami, A., Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran

Hossieni, S.H., Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran

Hemmatzadeh, F., Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran

Hooshmand, E, Faculty of Agriculture, Eslamic Azad University, Rasht, Iran.

To determine the electrophoretic patterns of *Fasciola hepatica* and *F. gigantica*, the former was collected from sheep and buffalo infected liver and the latter from that of cattle and camel and were washed in PBS. Somatic antigens of both species were prepared though homogenization and centrifugation of adult flukes. To show the electrophoretic patterns of somatic antigens, the prepared antigens were electrophoresed using SDS-PAGE. Our findings revealed that proteins of 18-70 kDa molecular weights were present in both species in different hosts. Although a 57 kDa protein was seen in *Fasciola gigantica* of cattle and camel only. Meanwhile two bands of 54 and 68 kDa were seen exclusively in *F. hepatica* of sheep and buffalo. A band of 64 kDa was shown in *F. hepatica* of buffalo. According to our results in any study on immunological or immunodiagnostic of *Fasciola* spp, the species trematode as well as their hosts should be taken in consideration.

Keywords: *Fasciola hepatica*, *Fasciola gigantica*, Somatic antigen, SDS-PAGE**مقدمه**

فاسیولوزیس بیماری انگلی کرمی با گستردگی جهانی است که در مناطق با آب و هوای معتدل دنیا در انسان و حیوان اهمیت قابل توجهی دارد. سازمان بهداشت جهانی از این بیماری تحت عنوان بیماری انگلی قدیمی یاد می کند (۷)، به طوریکه در اروپا معتقدند حضور آلودگی به ادوار مزولیتیک و نئولیتیک که حدود ۵۱۰۰-۵۰۰۰ سال پیش از این بوده است بر می گردد (۱۱)، ولی با وجود قدمت این بیماری و با توجه به خسران اقتصادی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر صنعت دام و دامپروری وارد می سازد، دنیای علم حاضر هنوز شاهد سئوالات و ابهامات زیادی در جنبه های مختلف آن میباشد. در انگل شناسی نوین امروزی سیاست های مختلفی جهت مبارزه با آلودگی های انگلی بر پایه کنترل و پیشگیری اعمال شده است و در این مسیر است که روش های تشخیص سرم شناسی و راهکارهای واکسیناسیون علیه آلودگی های مربوطه جلوه گر شده اند (۱۴). در راستای استفاده از روش های سرم شناسی در تشخیص فاسیولوزیس از پادگن های مختلف بدنی و دفعی ترشحي فلوک های بالغ استفاده می گردد. مسلم است که عوامل گونه ای ممکن است خصوصیات پادگن های مختلف را در یک ارگانسیم واحد تحت تأثیر قرار دهند. در این مورد با بررسی الگوی الکتروفوریتیک پروتئین های استخراج شده و استفاده از آنها در روش های سرم شناسی می توان کارایی پادگن های مختلف را در تشخیص سرمی آلودگی مورد بحث و ارزیابی قرار داد.

شناسایی گونه های فاسیولا بر اساس خصوصیات مورفولوژیک، مورفوناتومیک و مورفومتريک توسط لطفی و همکاران (۹) و با استفاده از روش ایزوالکتريک فوکوسینگ پروتئین های محلول توسط Lee و Zimmerman (۸) مؤید بر وجود دو گونه مشخص *F. hepatica* و *F. gigantica* می باشد. در بررسی حاضر با توجه به استفاده وسیع از پادگن های بدنی در تشخیص سرمی آلودگی با گونه های فاسیولا، الگوی الکتروفوریتیک این نوع پادگن در هر دو گونه فاسیولا در میزبان های مختلف تحت بررسی قرار خواهد گرفت.

۵۱ کشور دنیا در ۲۵ سال اخیر ۳۵۴ مورد از قاره آسیا و از این تعداد ۲۴۴ مورد مربوط به ایران بوده است (۱۱). در بعضی کشورها نظیر مصر و ایران که مناطق بومی آلودگی به هر دو گونه فاسیولا وجود دارد شناسایی موارد آلودگی بدون تفریق گونه ائی صورت می‌پذیرد (۹، ۱۳) و این در حالی است که اختلاف بین ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و تفاوت در میزبان‌های واسط دو گونه فاسیولا بر لزوم تفریق بین گونه‌ها تاکید دارد (۳). اگر چه تفریق بین گونه‌های مختلف بر اساس خصوصیات ریختی فلوک‌های بالغ و تخم کرم امکان‌پذیر است (۱۲) ولی بررسی‌های اخیر چه در آلودگی طبیعی و چه به صورت تجربی حاکی از تاثیر قطعی نوع میزبان اصلی بر خصوصیات ریخت شناسی کرم بالغ و تخم فاسیولا دارد (۱۶) و چه بسا که چنین وضعیتی بر ساختار پروتئین‌های بدنی و متابولیک فلوک‌های بالغ در میزبان‌های مختلف نیز تاثیر گذار باشد. مطابق با نظر Zimmerman, Lee (۸) گونه‌های فاسیولا ترما تودهای پلی مورفیک هستند که ویژگی‌های ریخت شناسی آنها می‌تواند بستگی به میزبان‌شان داشته باشد، به طوریکه طیفی

مواد و روش کار

پژوهش حاضر طی دو مرحله شامل تهیه پادگن بدنی از ترما تود بالغ و بررسی الگوی الکتروفور تیک آنها به شرح زیر صورت پذیرفت:

تهیه پادگن بدنی

جهت جداسازی پادگن بدنی ترما تود بالغ گونه‌های فاسیولا از روش Farrell و همکاران (۵) استفاده گردید، بدین منظور فلوک‌های بالغ ضمن بازرسی کشتارگاهی از مجاری صفراوی میزبان‌های مختلف جمع‌آوری شدند. همه نمونه‌ها از کشتارگاه بندر انزلی تهیه گردید و شامل: *F. gigantica* از گاو و شتر و *F. hepatica* از گوسفند و گاومیش بود. نمونه‌ها پس از انتقال به آزمایشگاه، ۳-۴ نوبت در فسفات بافر سالین (۰/۰۵ مولار) شسته شدند، پس از هموژنیزاسیون کرم بالغ، محلول حاصل در ۱۲۰۰۰g به مدت ۳۰ دقیقه در ۴ درجه سانتیگراد سانتریفوژ گردید و مایع روئی حاصل از سانتریفوژ به عنوان پادگن بدنی تا زمان استفاده در ۷۰- درجه سانتیگراد نگهداری شد. پروتئین سنجی پادگن‌های استخراج شده توسط روش Lowry و همکاران (۱۰) انجام گرفت و در حد ۳۰۰۰ میکروگرم در میلی لیتر تنظیم گردید.

تعیین الگوی الکتروفور تیک


به منظور الکتروفورز نمونه‌ها از دستگاه ۳ Mini-Protein ساخت Bio-Rad با ضخامت ژل ۰/۷۵ میلی‌متر و مطابق با روش توضیح داده شده توسط مصطفایی (۱) استفاده گردید. ژل جداکننده ۱۲٪ و ژل متراکم‌کننده ۵٪ در نظر گرفته شد. پس از اطمینان از انعقاد ژل پلی اکریلامید، نمونه‌ها به نسبت هم حجم با بافر نمونه مخلوط گردید و به مدت ۸-۱۰ دقیقه در حرارت ۹۵ درجه سانتیگراد قرار داده شد و سپس ۲۵ میکرولیتر از هر نمونه به چاهک انتقال یافت. الکتروفورز نمونه‌ها در مجاورت نشاندار با وزن مولکولی مشخص در ولتاژ ۷۰ و سپس ۱۱۰ ولت صورت پذیرفت. پس از اتمام الکتروفورز ژل مربوطه توسط رنگ کوماسی بریلیانت بلو رنگ آمیزی شد و جهت مشاهده باندهای پروتئینی به محلول رنگبر انتقال یافت و بعد از قرائت نتایج از ژل‌های بدست آمده عکسبرداری صورت گرفت.

نتایج

نتایج حاصل از بررسی الگوی الکتروفور تیک پادگن‌های بدنی ۴ نمونه شامل: *F. gigantica* از گاو و شتر و *F. hepatica* از گوسفند و گاومیش در برابر نشاندار با وزن مولکولی مشخص در تصویر ۱ نشان داده شده است. پادگن بدنی *F. hepatica* در گوسفند و گاومیش با داشتن دو باند ۶۸ و ۵۴ کیلو دالتونی از گونه دیگر فاسیولا قابل تفریق می‌باشد در حالیکه *F. hepatica* گاومیش دارای باند نسبتاً ضعیفی با وزن مولکولی ۶۴ کیلو دالتون بود. در مورد الکتروفورز پادگن بدنی *F. gigantica* شتر و گاو باند مشخصی با وزن مولکولی ۵۷ کیلو دالتون دیده شد ولی گونه دیگر فاقد آن بود.

بحث

سازمان بهداشت جهانی فاسیولوزیس را دومین بیماری مشترک بین انسان و دام میدانند و بر لزوم اهمیت بیماری در هر دو طب انسانی و حیوانی تاکید می‌نماید، تخمین بالغ بر حدود ۱۷ میلیون نفر جمعیت انسانی مبتلا در دنیا بیانگر این مدعا می‌باشد (۶)، از ۷۰۷۱ مورد انسانی گزارش شده از



تصویر ۱- الگوی الکتروفور تیک پادگن‌های بدنی *F. gigantica* و *F. hepatica* در میزبان‌های مختلف (M: نشاندار وزنی، F1: پادگن بدنی *F. gigantica* در گاو، F2: پادگن بدنی *F. gigantica* در شتر، F3: پادگن بدنی *F. hepatica* در گوسفند، F4: پادگن بدنی *F. hepatica* در گاومیش)

- hepatic infection in cattle. American Journal Veterinary Research. 42, 237-240.
- 6- Hopkins, D.R. .1992; Homing in on helminthes. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 46, 626-634.
- 7- Kendall, S.B. .1965; Relationships between the species of fasciola and their molluscan hosts. Advance in Parasitology.3, 59-98.
- 8- Lee, C.G., and Zimmerman, G.L., .1993; Banding patterns of *Fasciola hepatica* and *Fasciola gigantica* (Trematoda; by Isoelectric Focusing. Journal of Parasitology. 79, 1, 120-123.
- 9- Lotfy, W.M., El-Morshedy, H.N., Abou El-Hoda, M., El-Tawila, M.M., Omar, E.A., and Farag, H.F. .2002; Identification of the Egyptian species of fasciola. Veterinary Parasitology. 103, 323-332.
- 10- Lowry, O.H., Rosenbrough, N.J., Farr, A.I., and Randall, R.J. .1951; Protein measurement with folin phenol reagent. Journal of Biological chemistry. 193, 265-275.
- 11- Mas-coma, S. .2003; Human fascioliasis: Epidemiological Patterns in human endemic areas of south America, Africa and Asia. 4th Seminar on food and water-borne parasitic zoonoses, 2th International meeting on Genathostomiasis joint International Tropical Medicine Meeting. 2-4 December 2003, Bangkok, Thailand.
- 12- Mas-Coma, S., Esteban, J.G., and Bargues, M.D. .1999; Epidemiology of human fascioliasis: A review and proposed new classification. Bulletin of the World Health Organization. 77, 340-346.
- 13- Sahba, G.H., Arfaa, F., Farahmandian, I., and Jalali, H. .1972; Animal fascioliasis in Khuzestan, southwestern Iran. Journal of Parasitology. 58, 712-716.
- 14- Spithill, T.W., Piedrafito, D., Smooker, P.M., .1997; Immunological approaches for the control of fasciolosis. Int. J. Parasitol. 27 (10), 1221-1235.
- 15- Upadhyay, A.K., Kumar, M., .2002; SDS-PAGE analysis of *Fasciola gigantica* antigen. Journal Immunology and Immunopathology. 4 (1/2), 91-92.
- 16- Valero, M.A., Darce, N.A., Pavova, M., and Mas-Coma, S. .2001; Relationships between host species and morphometric patterns in *Fasciola hepatica* adults and eggs from the Northern Bolivian Altiplano hyperendemic region. Veterinary Parasitology. 102, 85-100.
- 17- World Health Organization .1995; Control of foodborne trematode infections. WHO Technical Report Series. 849.

از تنوع ریختی فاسیولا در کشورهای جنوب شرقی آسیا نظیر ژاپن، تایوان و فیلیپین (۷) و کره (۴) گزارش شده است. بررسی‌های مختلف انجام گرفته در مورد تعیین الکتروفوریتیک این دو نوع پادگن هم نشان دهنده اختلاف بین آنها میباشد (۲، ۱۵).

در بررسی الگوی الکتروفوریتیک پادگن‌های بدنی هر دو گونه فاسیولا پروتئین‌های با وزن مولکولی حدود ۱۸ تا ۷۰ کیلو دالتون مشاهده شد ولی نه تنها بین گونه‌ها که بین یک گونه همسان ولی در دو میزبان متفاوت نیز اختلا فاتی وجود داشت. پادگن بدنی *F. gigantica* شتر در مقایسه با گاو دارای باند با وزن مولکولی ۲۰ کیلو دالتون و *F. hepatica* گاو میش با داشتن باند ۶۴ کیلو دالتون از گونه همسان تفریق می‌گردد. در بررسی پادگن‌های ترما تود بالغ *F. gigantica* توسط Upadhyay و Kumar (۱۵) (۷) باندهای پروتئینی ۶۷-۱۶ کیلو دالتون شناسائی گردید. Allam و همکاران (۲) ضمن تاکید بر تفریق ویژگی‌های ایمنولوژیک گونه‌های فاسیولا، سنگین‌ترین پروتئین را در دو گونه *F. hepatica* و *F. gigantica* به ترتیب ۴۸ و ۵۷/۶ کیلو دالتون تشخیص دادند در صورتیکه در بررسی حاضر در هر دو گونه (۴ نمونه) باند مشخصی با وزن مولکولی ۷۰ کیلو دالتون مشاهده شد، در این بررسی وجود دو باند با وزن مولکولی ۵۴ و ۶۸ کیلو دالتون صرفاً مربوط به *F. hepatica* و باند ۵۷ کیلو دالتون منحصرأ در *F. gigantica* بر لزوم تفریق پادگن‌های بدنی دو گونه فاسیولا تاکید دارد، از طرفی حضور باند پروتئینی ۶۴ کیلو دالتونی در *F. hepatica* گاو میش و باند حدود ۲۰ کیلو دالتون در *F. gigantica* شتر بر لزوم در نظر گرفتن میزبان نهائی این فلوک کبدی در جداسازی و خالص سازی پادگن‌های بدنی اصرار می‌ورزد. در پایان خاطر نشان می‌سازد با توجه به روش‌های نوین ایمنولوژیک جهت تشخیص آلودگی با فاسیولا که معمولاً از پادگن‌های مختلف بدنی و یا دفعی ترشخی کرم بالغ استفاده می‌گردد، می‌بایستی حیوان میزبان و تاثیر آن بر ویژگی‌های مولکولی ارگانسیم مربوطه مورد نظر قرار گیرد.

منابع مورد استفاده

- ۱ - مصطفائی، ع. ۱۳۷۸؛ الکتروفورز پروتئین در ژل، راهنمای عملی و نظری.
- 2- Allam, A.F., El-Agamy, E.S.I., Helmy, M.H., .2002; Molecular and immunological characterisation of fasciola species. British Journal Biomedical Science. 59 (4), 191-195
- 3- Bargues, M.D., and Mas-Coma, S. .1997; Phylogenetic analysis of lymnaeid snails based on 18S rDNA sequences. Molecular Biology and Evolution. 14, 569-577.
- 4- Chu, J.K., and Kim, Y.K. .1967; Taxonomical study on the fasciolidae in Korea. Korea Journal of Parasitology. 5, 139-146.
- 5- Farrell, C.J., Shen, D.T., Wescott, R.B., and Lang, B.Z. .1981; An enzyme-linked immunosorbent assay for diagnosis of *Fasciola*

