

معرفی کنجد، رقم یکتا

Registration of Sesame (*Sesamum indicum*) Cultivar, Yekta

پدید آورندگان: محمدرضا احمدی، ابراهیم فرخی، بدری آقارخ،
مجید خیاوی، غلامحسین عرب و اسماعیل محمدی

تاریخ دریافت: ۱۳۷۹/۸/۲۳

۱۳۶۰ در کرج است که پس از پنج سال انتخاب به روش پدیگری، این رقم به همراه ۳۱ لاین انتخابی از بین سایر تلاقی‌ها در سال ۱۳۶۸ در آزمایش مقایسه مقدماتی عملکرد قرار گرفتند. با بررسی نتایج حاصل از این آزمایش ۱۳ لاین برتر برگزیده و همراه با شاهد از سال ۱۳۶۹ به مدت دو سال با همدیگر در کرج مقایسه شدند (احمدی، ۱۳۷۱). در این آزمایش رقم یکتا با عملکرد ۱۹۵۵ کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد و نیز نسبت به سایر رقم‌ها برتری نشان داد (جدول ۱). در آزمایش مقایسه عملکرد ملی و تعیین پایداری عملکرد که همزمان با آزمایش قبلی از سال ۱۳۶۹ به مدت سه سال در سه منطقه کرج، ساری و معان انجام شد، این رقم با عملکرد ۱۳۳۱ کیلوگرم در هکتار جزو ارقام برتر و پایدار بود (فرخی و احمدی، ۱۳۷۵). کشت این رقم زودرس برای مناطقی از نیمه شمالی کشور با ارتفاع بیش از هزار متر از سطح دریا و نیز مناطق دیگری از نیمه شمالی (از محور اصفهان به طرف شمال خراسان و

زراعت کنجد در ایران از قدیم الایام مرسوم بوده و تحمل آن به خشکی، آشنایی کشاورزان با زراعت این نبات، امکان کشت آن پس از برداشت گندم و جو در مناطق گرسیر و بالا بودن کمیت و کیفیت روغن آن از جمله عواملی به شمار می‌آیند که کوشش همه جانبی برای گسترش و تهیه رقم‌های اصلاح شده جدید برای این محصول را الزامی می‌سازد. بخش تحقیقات دانه‌های روغنی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با درک این نیاز برنامه مدونی را برای اصلاح کنجد از دو دهه قبل آغاز کرده است. محور بهزادی کنجد بر ارزیابی و شناخت صحیح صفات زراعی توده‌های کنجد بومی ایران انتخاب از داخل این توده‌ها، وارد کردن رقم‌های خارجی و مقایسه آن‌ها با توده‌ها و رقم‌های بومی ایران و دورگ‌گیری بین لاین‌های انتخاب شده از توده‌های محلی با رقم‌های خارجی استوار بوده است.

لاین کرج ۲۹ لاین حاصل تلاقی بین رقم δ M7 و یک لاین زودرس فلسطینی در سال

جدول ۱ - ویژگی های زراعی و کیفی گیجگرد رقم یکتا

Table 1. Agronomic and qualitative characteristics of sesame cultivar Yekta

مکان	نوع برگ	تعداد گپرول	تعداد ردیب	میزان روغن	میزان روغن	وزن خواردارانه	دوره روش	نوع شاخه بندی	Duration	Branching type	Carpels/leaf axil	Carpels/pod
Location	Cultivar	Plant height (cm)	Seed yield (Kg ha ⁻¹)	Oil content (%)	Oil yield (gr)	1000 Sw (gr)						
Moghan	Yekta	126.5	1640	51.7	847.9	3.0	112	Non branched	3	3	4	4
Local		145.2	1028	54.2	557.2	3.1	110	Branched	1	1	2	2
Karaj	Yekta	125.0	1227	56.47	692.9	2.6	118	Non branched	3	3	4	4
IS		135.0	609	55.84	340.1	2.3	95	Branched	1	1	4	4
Sari	Yekta	113.1	1127	55.0	619.9	-	104	Non branched	3	3	4	4
Loc.Bashnaz		139.6	559	53.3	297.9	-	98	Branched	1	1	4	4

آذربایجان) که کشت رقمهای کنجد به دلیل کوتاه بودن فصل زراعی در آنجا مقدور نیست، توصیه شده است.

۷۸/۶/۱۳ شورای عالی تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مطرح و با نام یکتا برای لاین کرج ۲۹ موافقت گردید.

گزارش معرفی این رقم در جلسه ۴۵۸ مورخ

منابع مورد استفاده

- احمدی، م.ر. ۱۳۷۱. مقایسه عملکرد و سایر صفات اگرونومیکی لاینهای اصلاح شده کنجد در منطقه کرج. سمینار بررسی مسائل دانه‌های روغنی. تهران. صفحه ۶۶.
- فرخی، ا. و احمدی، م.ر. ۱۳۷۵. تجزیه پایداری عملکرد کنجد در نیمه شمالی ایران. چکیده مقالات چهارمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان. صفحه ۱۵۵ - ۱۵۴.

آدرس:

بخش تحقیقات دانه‌های روغنی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، صندوق پستی ۴۱۱۹، کرج ۳۱۵۸۵.

www.SID.ir