

معرفی رقم جدید گندم نان، کوهدهشت

Introduction of a New Bread Wheat Cultivar, Kohdasht

پدید آورندگان: مظفر روستایی، سید کریم حسینی، طهماسب حسین پور، مهدی کلاتنه، مقصود حسپور حسینی، عارف امیری، غلامرضا خلیل زاده، محتشم محمدی، فرج اله نارکی، بهنام محفوظی، محمد ترابی، ناصر بنی صدر، حسن مختارپور و مجتبی و هابزاده

تاریخ دریافت: ۱۳۸۰/۸/۲۰

بیشتر از رقم شاهد منطقه (رقم زاگرس) بوده بلکه به تنش‌های محیطی از جمله خشکی و گرما و همچنین به بیماری‌های زنگ زرد و زنگ قهوه‌ای مقاوم می‌باشد.

لاین جدید گندم 29R-1R-1R-6R-0R در سال زراعی ۷۰ - ۱۳۶۹ در Screening Nursery بین المللی ۹th Semi Arid Area بخش تحقیقات غلات مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر گردید و همزمان در آزمایش‌های مشاهده‌ای ایستگاه‌های تحقیقاتی دیم گچساران و کوهدهشت لرستان شرکت داده شد. این لاین به دلیل دارا بودن خصوصیات مناسب زراعی و برتری عملکرد نسبت به شاهد انتخاب و وارد آزمایش‌های مقایسه عملکرد A و B و سپس یک‌نواخت سراسری گندم در ایستگاه‌های گچساران، کوهدهشت، معان، گرگان و گندگردید. نتایج حاصل از بررسی این رقم به ویژه در سال‌های خشکسالی نشان داد که مقاومت بسیار خوبی در

سالیانه حدود ۴ میلیون هکتار از اراضی دیم کشور زیرکشت گندم قرار دارد که حدود یک میلیون هکتار آن در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر واقع شده است. از جمله عواملی که در نقاط دیم گرمسیر و نیمه گرمسیر موجب کاهش راندمان محصول می‌شود کمبود بارندگی (خشکی)، توزیع نامناسب بارندگی، کمبود رطوبت خاک و گرمی هوا به خصوص در دوره زایشی گیاه می‌باشد. از تنش‌های زنده می‌توان به بیماری‌های زنگ زرد، زنگ قهوه‌ای، سفیدک پودری، فوزاریوم و سیاهک‌ها اشاره نمود (Macas *et al.*, 1996) که همه ساله خسارت زیادی را به محصول وارد می‌کند. با توجه به اهمیت و نقش عمدہ‌ای که گندم در جیره غذایی مردم ایران دارد، بخش تحقیقات غلات مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم همواره سعی در انتخاب و معرفی ارقام مناسب برای مناطق مختلف دیم کشور داشته و پس از سال‌ها تحقیق موفق به معرفی رقمی گردیدند که نه تنها دارای عملکرد

گندم کوهدشت دارای تیپ رشد بهاره متوسط ارتفاع بوته آن حدود ۹۰ سانتی‌متر و به بیماری زنگ زرد و زنگ قهوه‌ای مقاوم می‌باشد. رنگ دانه آن سفید و متوسط وزن هزار دانه آن ۳۷ گرم است (جدول ۱). کوهدشت رقمی است زودرس، مقاوم به ورس و نیمه مقاوم به ریزش دانه.

نتایج حاصل از تجزیه پایداری بر اساس Rank روش‌های واریانس درون مکانی و متند نشان داد که پایدارترین و پرمحصول‌ترین لاین در بین ۲۴ ژنوتیپ مورد مطالعه گندم کوهدشت بوده است (روستایی و همکاران، ۱۳۷۹). نتایج آزمایش‌های تجزیه کیفی نیز نشان داد که کیفیت نانوایی این رقم متوسط (با پروتئین ۱۰/۵ درصد) و نسبت به شاهد زاگرس (۹/۵ درصد) برتری دارد.

میزان بذر مورد نیاز برای کشت به موقع این رقم ۳۰۰ دانه در متر مربع و با توجه به وزن هزار دانه آن تعیین می‌شود. تاریخ کاشت این رقم بستگی به زمان نزول باران مؤثر در مناطق مورد توصیه دارد که به طور کلی در صورت نزول باران کافی و به موقع امکان کشت آن از دهه سوم آبان ماه تا اوخر آذر ماه در مناطق مذکور وجود دارد (حسینی و نارکی، ۱۳۷۸؛ محمدی، ۱۳۷۸).

برای به دست آوردن عملکرد مطلوب از این رقم توصیه می‌شود بعد از انجام تجزیه خاک و در نظر گرفتن نوع خاک و زراعت قبلی، میزان بارندگی و نحوه پراکنش آن در هر منطقه مطابق توصیه‌های فنی نسبت به مصرف کودهای شیمیایی در زمان کاشت اقدام گردد.

گندم کوهدشت برای کاشت در مناطق دیم

مقایسه با شاهد زاگرس نسبت به تنفس خشکی دارد (روستایی و همکاران، ۱۳۸۸). نتایج بررسی رقم کوهدشت در کلیه ایستگاه‌های تحقیقاتی دیم مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر نشان داد که میانگین عملکرد رقم جدید (کوهدشت) در طول ۹ سال بررسی ۳۷۶۸ کیلوگرم در هکتار بوده است که نسبت به شاهد زاگرس ۱۰/۳ درصد از نظر عملکرد دانه برتری داشت. نتایج بررسی‌های انجام شده در ایستگاه‌های تحقیقاتی گچساران، گرگان، کوهدشت و معان در شرایط مزرعه‌ای و در واحد پاتولوژی غلات مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در شرایط آلودگی مصنوعی در گلخانه و مزرعه نشان داد که این رقم نسبت به بیماری زنگ زرد و قهوه‌ای مقاوم می‌باشد (روستایی و همکاران، ۱۳۷۸).

ارزیابی ارقام جدید در ایستگاه کوهدشت از نظر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه نشان داد که این رقم در طول ۹ سال بررسی در آزمایش‌های مشاهده‌ای، مقدماتی و مقایسه عملکرد A و B و یکسواخت سراسری دارای میانگین عملکرد ۳۱۹۷ کیلوگرم در هکتار بود و نسبت به شاهد زاگرس ۱۲ درصد برتری عملکرد داشت. در ایستگاه تحقیقاتی معان، در آزمایش‌های مقایسه عملکرد دیم، به ویژه در سال‌های وقوع خشکسالی از نظر تولید محصول نسبت به شاهد زاگرس ۸ درصد برتری داشت که این برتری در سطح ۱٪ معنی دار بود. میانگین عملکرد این رقم جدید در ایستگاه گرگان ۵۳۷۲ کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به شاهد ۵٪ برتری داشت. (امیری و همکاران، ۱۳۷۷ رrostایی و همکاران، ۱۳۷۸).

جدول ۱- خصوصیات زراعی رقم جدید گندم کوهدهشت در مقایسه با رقم زاگرس در سال های زراعی

جیزه ٠١٣١٦٩٧٣١ در مناطق مختلف

Table 1. Agronomic characteristics of the new bread wheat cultivar, Kohdasht, in comparison with Zagros

Comparison of different seasons in 2005 cropping season									
Location	Cultivar	Height (cm)	Maturity	Root system	Root system	Yellow rust	Leaf rust	Lodging	Grain yield (t/ha ⁻¹)
Gachsaran	Kohdasht	95	Early	زیگزازد	ورزن هزارده	زیگزازد	زیگزازد	زیگزازد	3871
Gachsaran	Zagros	92	Early	زیگزازد	ورزن هزارده	زیگزازد	زیگزازد	زیگزازد	3484
Kohdasht	Kohdasht	82	Early	زیگزازد	ورزن هزارده	زیگزازد	زیگزازد	زیگزازد	3197
Kohdasht	Zagros	80	Early	زیگزازد	ورزن هزارده	R-MR	R	R	2813
Gorgan and Gonbad	Kohdasht	98	Early	زیگزازد	ورزن هزارده	41.3	R	R	5257
Gorgan and Gonbad	Zagros	110	Early	زیگزازد	ورزن هزارده	41	R	R	4311
Moghann	Kohdasht	83	Early	زیگزازد	ورزن هزارده	34	MR	R	2748
Moghann	Zagros	84	Early	زیگزازد	ورزن هزارده	34	MR	R	2635

S = Spring
MR = Moderately Resistant
R = Resistant
نیزه مقاوم

اوخر سال ۱۳۷۸ طی گزارش مفصلی از مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم جهت نامگذاری به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی معرفی و بعد از تصویب در شورای عالی تحقیقات آن طی نامه شماره ۰۱۱/۱/۱۶۴۲۱-۲۴ مورخ ۹/۱۴ ۱۳۷۹ و موافقت مقام عالی وزارت این رقم با نام کوهدشت معرفی گردید. بذر این رقم در ایستگاه‌های تحقیقات گچساران، لرستان (کوهدشت)، مغان، گرگان و گنبد قابل دسترسی است.

گرمسیری و نیمه گرمسیری کشور از جمله نواحی که دارای میزان بارندگی کم با پراکنش نامناسب می‌باشند توصیه می‌شود. به طور کلی می‌توان این رقم را برای کاشت در نواحی عمدہ‌ای از استان‌های گلستان، خوزستان، معان و نواحی گرمسیری استان کهگیلویه و بویراحمد نواحی جنوب و جنوب غربی استان لرستان و همچنین استان ایلام و مناطقی از استان‌های کرمانشاه و فارس توصیه نمود (حسینی و نارکی، ۱۳۷۸؛ محمدی، ۱۳۷۸). گندم کوهدشت به عنوان یک رقم جدید در

References

منابع مورد استفاده

- امیری، ع.، حسنپور حسنی، م.، روستایی، م.، انصاری، ی. و نادر محمودی، ک. ۱۳۷۷. نتایج تحقیقات به نژادی غلات دیم. انتشارات مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم.
- حسینی ک. و نارکی، ف. ۱۳۷۸. دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه گندم شرایط دیم. انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد.
- روستایی، م.، انصاری، ی. و حسنپور حسنی، م. ۱۳۷۸. نتایج تحقیقات به نژادی گندم دیم. انتشارات مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم.
- روستایی، م.، حسینی، ک.، حسین‌پور، ط.، کلاته، م.، خلیل‌زاده، غ. و مختارپور، ح. ۱۳۷۹. بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ارقام و لاین‌های گندم در آزمایشات یکنواخت سراسری مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم کشور. انتشارات مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم.
- محمدی، م. ۱۳۷۸. زمان مناسب کشت گندم و جو در دیمزارهای گرمسیری. انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد.

Macas, B., Bayulho, F., Coutinho, J., and Gomes, M.G. 1996. Bread wheat selection for specific environmental conditions of South Portugal. 5th International wheat conference. June 10-14, Ankara, Turkey.

آدرس:

مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم، صندوق پستی ۱۱۱۹، مراغه.