

علل پایین بودن کیفیت بیماریابی سرطان گردن رحم در نظام خدمات بهداشتی درمانی استان همدان

دکتر مرضیه فریمانی^{*}، دکتر ناهید انواری^{**}

چکیده

سابقه و هدف: پاپ اسمیر از سال ۱۳۷۰ در کشور ما در سیستم بهداشتی انجام می‌شود، ولی متأسفانه موارد غیرطبیعی این آزمایش بسیار پایین است (۶٪ در سال ۱۳۷۸)، در حالی که طی بررسی سیمای مرگ در سال ۱۳۷۸ این سرطان نهمین علت مرگ در ۴ استان نمونه کشواری بوده است. هدف از این مطالعه که با مشارکت مرکز بهداشت همدان صورت گرفت، تعیین علل پایین بودن کیفیت پاپ اسمیر در استان همدان بوده است.

مواد و روش‌ها: از کلیه نمونه‌های تهیه شده در سیستم بهداشتی استان همدان که توسط سیتوولوژیست‌ها تفسیر شده بود، ۱۲۲۴ نمونه در طول سال ۱۳۷۹ به طور تصادفی سیستماتیک انتخاب شد و توسط پاتولوژیست بازبینی گردید و به دو پرسشن پاسخ داده شد: آیا نمونه‌ها به درستی تهیه شده‌اند؟ و آیا نمونه‌ها به درستی تفسیر شده‌اند؟ سپس نتایج با آمار توصیفی ارایه شد.

یافته‌ها: به طور کلی مشکلات در ۳ دسته اصلی طبقه‌بندی شدند: دسته اول، اشکال توسط نمونه گیران که ۱۱٪ درصد از کل مشکلات مربوط به این قسمت بود و از آن میان ۴۳٪ درصد مربوط به نبودن سلول‌های آندوسرویکس، ۳۴٪ درصد مربوط به سلولاً ریته کم، ۲۸٪ درصد مربوط به پوشیده‌شدن لام با سلول‌های التهابی و ۴٪ درصد مربوط به فیکساسیون ضعیف بود. دسته دوم، مشکلات مربوط به آماده‌سازی نمونه توسط سیتوولوژیست‌ها شامل رنگ آمیزی و چسباندن لام روی آن بود. ۷۶٪ درصد مشکلات مربوط به این قسمت بود که در ۴٪ درصد کل لام‌ها این مشکل به حدی بود که لام به طور کلی قابل ارزیابی نبود. این اشکالات به ترتیب اهمیت شامل استفاده از چسب نامناسب در ۳۰٪ درصد از کل نمونه‌ها، ۱۶٪ درصد مربوط به استفاده از رنگ آمیزی نامناسب و ۲٪ درصد مربوط به اشکالات قرار دادن لام روی لام بود. دسته سوم، مربوط به تفسیر نمونه‌ها توسط سیتوولوژیست بود که از این نظر پس از حذف نمونه‌های با کیفیت نامناسب بین سیتوولوژیست و پاتولوژیست ۹۶٪ درصد مطابقت وجود داشت.

بحث: مهم‌ترین نکته در کیفیت پایین غربال‌گری در این مطالعه مربوط به تفسیر نمونه‌ها بود. حساسیت این آزمایش در ایران بسیار پایین تراز حد استاندارد جهانی است (حساسیت ۱۱٪ در مقابل ۷۰٪) که نیاز به تحول اساسی در نوع نمونه گیری دارد.

کلیدواژه‌ها: بیماریابی، پاپ اسمیر، سرطان گردن رحم، همدان

« دریافت: ۱۱/۱۱/۱۲ پذیرش: ۱۱/۰۵/۱۸ »

*استادیار گروه زنان و مامایی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

**استادیار گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان www.SID.ir

پاکستان حدود ۱۴ درصد است (۸).

مقدمه

طبق آمار سال ۱۳۷۸ در بخش دولتی حدود ۷۰۰۰۰۰ لام دیده شد، و ۱۱۵۴ مورد دیسپلازی گزارش شده است؛ بنابراین شیوع دیسپلازی قابل تشخیص با پاپ اسمایر در کل کشور حدود ۰/۱۶ درصد بوده است (۹). اگر میزان شیوع دیسپلازی را در کشور ایران، معادل پاکستان در نظر بگیریم که از نظر مذهبی و فرهنگی و اقلیمی مشابهت بیشتری با کشور ما دارد، حساسیت پاپ اسمایر در کشور ما در حدود ۱/۱۷ درصد خواهد بود که با حساسیت استاندارد حداقل ۷۰ درصد اختلاف واضح دارد (۱۰). آمار پاپ اسمایر کشوری طی سال‌های ۱۳۷۵-۷۹ نشان می‌دهد که میزان زنان واجد شرایط تحت پوشش از ۷ درصد در سال ۱۳۷۵ با رشد کنندی به حدود ۱۹ درصد در سال ۱۳۷۹ رسیده است، ولی میزان نتایج غیرطبیعی آن از ۰/۰۸۷ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۰/۱۴۶ درصد رسیده است (۹).

در استان همدان در سال ۱۳۷۹ جمعیت در حدود ۱۶۹۶۸۳۷ نفر بود. ۲۰ درصد آن شامل زنان در سنین ۲۰-۶۵ سال واجد شرایط بودند و اگر بپذیریم که این زنان همگی باید هر ۳ سال یکبار آزمایش پاپ اسمایر بدهند، باید حدود ۱۱۳۱۲۲ نفر مورد غربالگری قرار می‌گرفتند، ولی تنها ۳۷۳۵۲ مورد لام در سال ۱۳۷۹ بررسی شده است. از این تعداد ۲۲۳۳ مورد طبق گزارش مرکز بهداشت به دلایل مختلف غیرقابل روئیت بودند و از این تعداد یک مورد کارسینوم و ۵ مورد دیسپلازی گزارش شده که با شیوع ۰/۰۱۶ درصد حتی از آمار کشوری در همان سال بسیار کمتر است (یک نهم آمار کشوری) در حالی که در همان سال از نظر تعداد زنانی که

با معرفی پاپ اسمایر به عنوان یک اقدام برای غربالگری سرطان گردن رحم، از سال ۱۹۵۰ شیوع این بیماری حدود ۷۹ درصد کاهش داشته و همچنین موجب ۷۰ درصد کاهش در مرگ و میر شده است و هم‌اکنون در رده ششم از علل مرگ و میر زنان قرار دارد (۱و۲).

چنانچه لام‌های تهیه شده از کیفیت خوبی برخوردار نباشند، از حساسیت آن کاسته خواهد شد (۲). اغلب مطالعات اخیر افزایش درصد موادر کاذب منفی را حاصل پایین بودن حساسیت پاپ اسمایر عنوان نمودند (۳). در یک مطالعه، حساسیت، اختصاصی بودن و ارزش پیش‌گویی مثبت آن به ترتیب ۹۵، ۵۳ و ۴۷ درصد ذکر گردیده است (۳). دلایل زیادی برای عدم تشخیص سلول‌های غیرطبیعی در اسمایر بیان شده است که یکی از آن‌ها اشتباه در نمونه‌گیری است (۳-۵). همچنین روش‌های بسیاری برای بهبود کیفیت این آزمایش پیشنهاد شده که شامل آموزش در نحوه نمونه‌گیری است (۶). تغییر در تکنیک نمونه‌گیری، وسایل مورد استفاده، تکنیک‌های رنگ‌آمیزی و حتی تغییر در تفسیر آن می‌باشد (۱و۳).

درمان ضایعات پرهاینوزیو کاملاً مؤثر است و در صورت عدم درمان ۴۰-۶۰ درصد ضایعات به سمت سرطان مهاجم پیشرفت می‌کنند. طی یک بررسی در سال ۱۳۷۸ مربوط به سیمای مرگ در ۴ استان کشور این بیماری نهمین علت مرگ در ایران بوده است (۷).

طبق گزارش‌ها میزان بروز سرطان گردن رحم در منطقه غرب آسیا، عربستان و پاکستان به ترتیب ۱۰۷، ۳۰ و ۱۲۰۰ در ۱۰۰۰۰ می‌باشد. میزان شیوع دیسپلازی در

نداشته و به تدریج کدر شده است). این اشکال در بعضی از شهرستان‌ها قسمت عمده‌ای از لام‌ها را شامل می‌شد. پس از مشورت با همکار متخصص آمار قرار شد این مسئله به عنوان یکی از مشکلات طرح مطرح شود و نمونه‌های انتخابی تغییر نکند. مسئله دیگر عدم نگهداری نمونه‌ها در شهرستان تویسرکان بود؛ بنابراین نمونه‌های این شهرستان وارد بررسی نشدند. در هنگام بررسی مجدد، پاتولوژیست به دو نکته در مورد هر لام اشاره می‌کرد. ابتدا نحوه تهیه صحیح نمونه توسط نمونه‌گیران، مورد بررسی قرار می‌گرفت (وجود سلول‌های آندوسرویکال، سلولاریته مناسب، عدم وجود اتوپلیز و مواد لوبریکانت یا خارجی در نمونه و همچنین عدم پوشانیده شدن کامل لام توسط سلول‌های التهابی به عنوان نمونه‌گیری صحیح تلقی می‌شد) و سپس چگونگی آمادگی لام و تفسیر آن توسط سیتولوژیست بررسی می‌شد (کدرشدن لام بر اثر استفاده از چسب نامناسب در لام یا لام، رنگ‌آمیزی نامناسب و همچنین عدم گزارش سلول‌های آتیپیک و یا دیسپلاستیک در نمونه به عنوان اشکالات کار سیتولوژیست مورد توجه بود). در نهایت، موارد تحت بررسی در چکلیست وارد و ارایه گردید و نتایج حاصل با آمار توصیفی ارایه گردید.

یافته‌ها

از مجموع ۱۲۲۴ نمونه لام مورد بررسی، ۲۶۰ مورد به حدی اشکالات تکنیکی از نظر چسب موردادستفاده و یا رنگ‌آمیزی داشتند که نمونه‌ها قابل بررسی نبودند. از ۹۶۴ لام باقیمانده تنها ۶۱۸ مورد بدون اشکال بودند و بقیه به رغم داشتن اشکالات، قابل بررسی بودند.

تحت پوشش انجام پاپ اسمیر قرار داشتند، نسبت به آمار کشوری در همان سال بیشتر بوده است (۳۳٪ در مقابله ۱۹٪).

از این آمار می‌توان نتیجه گرفت که یا شیوع سرطان گردن رحم در کشور ما فوق العاده ناچیز است که در این صورت، غربال‌گری آن مقرن به صرفه نیست و یا ابزار ما برای کشف زودرس بیماری به دلایلی قابلیت لازم را ندارد. آمار مرگ و میر ناشی از بیماری مؤید این است که پاپ اسمیرهای انجام شده در کشور ما یا از جمعیت‌های در معرض خطر اخذ نمی‌شود، یا نحوه گرفتن آن صحیح نمی‌باشد و یا به درستی تفسیر نمی‌شوند. این مطالعه برآن است تا به سوالات مذکور در صورت امکان پاسخ دهد. از این رو برآن شدیم تا کیفیت بررسی لام‌ها را مورد بازبینی قرار دهیم و مشکلات آن را با همکاری مرکز بهداشت استان همدان بررسی نماییم.

مواد و روش‌ها

از میان کل ۳۷۳۵۳ مورد پاپ اسمیرهای انجام شده در نیمه اول سال ۱۳۷۹ که توسط تکنسین در مراکز بهداشت استان تفسیر شده بود، از طریق جدول اعداد تصادفی تعداد ۱۲۲۴ مورد لام به نسبت پاپ اسمیرهای انجام شده در هر شهرستان انتخاب شد و توسط پاتولوژیست همکار طرح مورد بازبینی قرار گرفت. از ابتدای کار بازبینی توسط پاتولوژیست متوجه شدیم که اشکالات تکنیکی در تهیه لام شامل چسب به کار رفته و نوع رنگ‌آمیزی در تعدادی از لام‌ها به اندازه‌ای است که لام قابل بررسی نمی‌باشد (البته شاید چسب لام در حالت تازه که مورد استفاده سیتولوژیست قرار گرفته، مشکلی www.SID.ir

نمونه‌ها مربوط به این قسمت بوده که در ۴۷ درصد کل لام‌ها این مشکل به حدی بوده است که نمونه‌ها قابل استفاده نبوده است. این اشکالات به ترتیب اهمیت شامل اشکالات آماده‌سازی مربوط به استفاده از چسب نامناسب (۱٪)، رنگ‌آمیزی نامطلوب (۲٪) و اشکالات مربوط به قراردادن لام روی لام (۷٪) بوده است. از اشکالات مربوط به چسب، اسدآباد با ۹۸٪ درصد چسب نامطلوب و کدر بیشترین درصد شیوع و همدان با صفر درصد کمترین میزان اشکال را در میان شهرستان‌های استان دارا بودند. نتایج مربوط به کیفیت چسب نمونه‌های مورد بررسی به تفکیک شهرستان‌ها در جدول ۲ آورده شده است.

به طور کلی، مشکلات در سه دسته اصلی طبقه‌بندی شدن: ۱- اشکالات مربوط به نحوه نحوه نمونه‌گیری: ۱۱٪ درصد از کل نمونه‌ها دارای این مشکل بودند که از میان اشکالات مربوط به نمونه‌گیران، ۴۳٪ درصد مربوط به نبودن سلول‌های آندوسرویکس، ۳۴٪ درصد مربوط به سلولاریته کم، ۲۸٪ درصد مربوط به پوشیده شدن لام با سلول‌های التهابی و ۴٪ درصد مربوط به فیکساسیون ضعیف بود.

نتایج فراوانی کیفیت تهیه نمونه پاپ اسمیر تهیه شده در جدول ۱ آورده شده است.

۲- اشکالات مربوط به آماده‌سازی نمونه‌ها توسط سیتولوژیست‌ها: ۷۴٪ درصد از کل اشکالات

جدول ۱- فراوانی کیفیت تهیه نمونه پاپ اسمیر تهیه شده در نیمه اول سال ۱۳۷۹ بر حسب شهرستان‌های استان همدان

جمع	کیفیت نمونه						شهرستان
	نامطلوب**	مطلوب*	نامطلوب**	مطلوب*	درصد	تعداد	
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۱۰۰	۶	۱۶٪	۱	۸۳٪	۵		اسدآباد
۱۰۰	۵۶	۲۶٪	۱۵	۷۳٪	۴۱		بهار
۱۰۰	۲۱	۹٪	۲	۹۰٪	۱۹		رزن
۱۰۰	۶۵	۹٪	۶	۹۰٪	۵۹		کبودرآهنگ
۱۰۰	۸۸	۲۳٪	۲۱	۷۶٪	۶۷		ملایر
۱۰۰	۶	۱۶٪	۱	۸۳٪	۵		نهاوند
۱۰۰	۳۷۶	۶٪	۲۶	۹۳٪	۳۵۰		همدان
۱۰۰	۶۱۸	۱۱٪	۷۲	۸۸٪	۵۹۱		جمع کل

* وجود سلول‌های آندوسرویکال یا متاپلاستیک در نمونه، سلولاریته مناسب، عدم وجود اتوپلیز و مواد لوبریکانت یا خارجی در نمونه

** عدم وجود سلول‌های آندوسرویکال یا متاپلاستیک در نمونه، سلولاریته کم، وجود اتوپلیز و مواد لوبریکانت در نمونه و پوشانده شدن کامل اسمیر

جدول ۲- توزیع فراوانی کیفیت چسب نمونه‌های پاپ اسمری تهیه شده در نیمه اول سال ۱۳۷۹ بر حسب شهرستان‌های تابعه استان همدان

جمع		کیفیت چسب لام نمونه‌های پاپ اسمری						شهرستان‌های محل تهیه نمونه‌های پاپ اسمری	
		مطلوب		غیرقابل دسترسی (کدر)		نامطلوب			
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۱۰۰	۹۱	۱/۱	۱	۶۵/۹	۶۰	۳۳	۳۰	اسدآباد	
۱۰۰	۸۳	۸/۴	۷	۳۳/۷	۲۸	۵۷/۸	۴۸	بهار	
۱۰۰	۶۷	۱۱/۹	۸	۴۰/۳	۲۷	۴۷/۸	۳۲	رزن	
۱۰۰	۶۹	۴۳/۵	۳۰	۵/۸	۴	۵۰/۷	۳۵	کبودرهنگ	
۱۰۰	۱۸۲	۳۶/۸	۶۷	۴۵/۱	۸۲	۱۸/۱	۳۳	ملایر	
۱۰۰	۹۵	۶/۳	۶	۹۳/۷	۸۹	۰	۰	نهاوند	
۱۰۰	۳۷۶	۱۰۰	۳۷۶	۰	۰	۰	۰	همدان	
۱۰۰	۹۶۳	۵۴/۴	۴۹۵	۳۰/۱	۲۹۰	۱۸/۵	۱۷۸	جمع کل	

کم رنگبودن اسمریها ناشی از مصرف رنگ‌های غیراستاندارد، رنگ‌های تاریخ مصرف گذشته و یا عدم رعایت زمان لازم برای رنگ‌آمیزی بوده است.

کدرشدن چسب لام پس از ۶-۱۲ ماه می‌تواند ناشی از رقیق کردن و یا کم مصرف کردن چسب باشد. در مراکز

دانشگاهی استان، چسب ایرانی مشابه برای نمونه‌های

سیتولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرد و کدرشدن آن گرچه پیش از موعد روی می‌دهد، ولی با این سرعت و شدت نیست. در حالی که نظام بهداشتی درمانی بر بایگانی لام‌های سیتولوژی به مدت ۳ سال برای ارزیابی مجدد تأکید می‌نماید، کدرشدن چسب لام پس از ۶ تا ۱۲ ماه عیب فنی عمده‌ای محسوب می‌گردد.

از آنجاکه تمامی سیتولوژیست‌ها دوره‌های آموزشی لازم را طی کرده‌اند، این اشکالات فنی می‌توانند ناشی از صرفه‌جویی پیش از حد، حتی به قیمت لطمہ به کیفیت

۳- اشکالات مربوط به تفسیر نمونه‌ها: در مجموع از کل نمونه‌های بازبینی شده پس از حذف موارد غیرقابل بررسی بین تفسیر سیتولوژیست و پاتولوژیست ۹۶/۶ درصد مطابقت وجود داشته است.

بحث

در این مطالعه شایع‌ترین مشکل مربوط به کار سیتولوژیست‌ها در آماده‌سازی لام‌ها بوده است (۷۴/۴٪ نمونه‌ها). نتیجه غیر مترقبه حين تحقیق وجود اشکالات تکنیکی در آماده‌سازی نمونه‌های پاپ اسمری برای مطالعه بوده است. کدرشدن چسب لام به حدی که مانع از رؤیت سلول‌ها شده و یا کم رنگبودن اسمریها در حدی که خصوصیات هسته و سیتولوپلاسم قابل بررسی نباشد، موجبات حذف ۲۶۰ نمونه از مطالعه و بررسی ۳۴۶ لام دیگر با عنوان نامطلوب گردید.

در مطالعه ما نیز عمدۀ اشکال در نمونه‌گیری، مربوط به نبود سلول‌های قسمت داخلی دهانه رحم (آندوسرویکال) و سلولاریته کم بوده است. بعضی از محققان استفاده از سیتوبراش را در این موارد ارجح می‌دانند و هزینه آن را نیز در مجموع کمتر از روش‌های سنتی می‌دانند.)

مطالعات جدید خطاها نمونه‌گیری و آماده‌سازی را با کاربرد یک واسطه مایع برای جمع‌آوری نمونه تقریباً حذف و باعث بهبود حساسیت تا ۸۰ درصد شده‌اند. در این روش ۸۰-۹۰ درصد سلول‌های جمع‌آوری شده توسط بررس سیتولوژی به یک لوله محتوی مایع نگهدارنده منتقل می‌شوند که در مقایسه با روش‌های سنتی اسلامی شیشه (به میزان ۲۰-۱۰٪)، سلول‌های بسیار بیشتری منتقل خواهند شد. علاوه بر آن، این روش مانع خشک شدن نمونه در معرض هوا خواهد شد. سلول‌های محتوی مایع از فیلتر عبور داده می‌شود که خود موجب به تله‌افتادن سلول‌های اپتیال و التهابی می‌شود و همچنین با تهیه یک نمونه نازک امکان تفسیر بهتر را به سیتولوژیست می‌دهد و نمونه‌های غیرمطلوب را به میزان ۷۰ تا ۹۰ درصد نسبت به روش‌های سنتی کاهش می‌دهد. شاید زمان آن رسیده است که ما نیز در روش‌های غربال گری تجدید نظر کنیم. بر طرف نمودن این مشکل نیز با کاربرد روش‌های جدید و وسائل مطلوب، نظارت بر اشکالات آن‌ها و آموزش در همان زمینه امکان‌پذیر است.

اما مهم‌ترین نکته مربوط به کیفیت تفسیر نمونه‌هاست. هرچندکه در این بررسی کیفیت کار ظاهرًاً بسیار بالاست (۹۶/۶٪ تطابق تفسیر سیتولوژیست با پاتولوژیست) و موارد عدم تطابق بیشتر مربوط به عدم گزارش آتبیی بوده

کار یا استفاده از مواد نامرغوب و همچنین عدم نظارت کافی بر کار آنان باشد. در مواردی سیتولوژیست به اشتباہ لام را به پشت لام چسبانده بود (۷۲ درصد اشکالات مربوط به لام) و به رغم اینکه در بررسی اولیه توسط خودش هم این‌گونه لام‌ها قابل بررسی نبودند، برگه جواب به بیمار ارایه نموده بودند.

در مجموع چنین سهل‌انگاری‌های فنی را می‌توان نشانه‌ای از سهل‌انگاری‌های مشابه در هنگام تفسیر لام نیز در نظر گرفت. به نظر می‌رسد مشکل فوق با آموزش مناسب، بازیبینی منظم و تصادفی روی کار آن‌ها توسط پاتولوژیست و دادن بازخورد مناسب به سیتولوژیست قابل حل باشد.

مشکل بعدی مربوط به کار نمونه‌گیران بوده است (۷۱/۱٪ نمونه‌ها). همان‌طور که می‌دانیم چنانچه نحوه تهیه نمونه از کیفیت کافی برخوردار نباید، از حساسیت آزمایش کاسته خواهد شد. اغلب مطالعات، نمونه‌گیری ناکافی را دلیل عمدۀ افزایش موارد منفی کاذب ذکر می‌نمایند. اولین نکته در عدم نمونه‌گیری صحیح، نبودن سلول‌های آندوسرویکال است که گویای این واقعیت است که نمونه از منطقه ترانزیشنال گرفته نشده است. این منطقه از نظر بروز CIN و سرطان‌ها ناحیه مهمی است و اساس این آزمایش، نمونه‌گیری از همین منطقه است.

یکی از مشکلات دیگر در این خصوص استفاده از اسپاچول به تنها‌یی در نمونه‌گیری سیستم بهداشتی است، در حالی که در روش سنتی استاندارد باید برای گرفتن سلول‌های آندوسرویکال از سوآپ استفاده کرد. اهمیت این نکته بیشتر در مواردی است که به دلایل آناتومیک قادر به برداشتن نمونه خوب از آندوسرویکس نیستیم.

کم موارد دیسپلازی مربوط به طیف سنی مراجعین بوده است.

در مجموع، انجام پاپ اسمیر با شرایط ذکر شده با وجود صرف هزینه گزارف برای تهیه و تفسیر آن از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست.

در صورت امکان با توجه به اینکه این بیماری تقریباً نهین عامل مرگ، در حداقل ۴ استان کشور بوده است، غربالگری و بیماریابی آن نیاز به بازنگری و تحول اساسی در نوع نمونه گیری و تفسیر آن، تعیین جمعیت پرخطر در ایران و نمونه گیری منظم در این گروهها و همچنین آموزش و نظارت مستمر بر کار نمونه گیران و سیتوالوژیستها دارد.

سپاس‌گزاری

برخود لازم می‌دانیم از زحمات بی‌دریغ جناب آقای دکتر کاظم‌زاده مسئول بهداشت خانواده مرکز بهداشت استان همدان و به خصوص همکار محترم‌شان سرکار خانم قهرمانی به خاطر جمع‌آوری نمونه‌ها از شهرستان‌های استان و همچنین جناب آقای مهندس مانی کاشانی که در تجزیه و تحلیل آماری ما را یاری نمودند، کمال تشکر و قدردانی را بنماییم.

است. از ۲۵ مورد عدم تطابق، ۱۱ مورد مربوط به عدم گزارش آتبیی بوده است که از این میان، ۵ مورد آتبیی خفیف، ۵ مورد آتبیی متوسط و ۱ مورد مربوط به آتبیی شدید گلاندولار بوده است و به هر حال در هیچ‌کدام از این موارد عدم تطابق و همچنین در هیچ‌موردی از گزارش سیتوالوژیست‌ها تشخیص سرطان و یا دیسپلازی مطرح نگردیده است، اما چند نکته وجود دارد: در این سال نمونه‌های مشکوک توسط پاتولوژیست بازبینی شده است، مهم‌تر آنکه نمونه‌های نامطلوب عملاً حذف شدند و احتمالاً سیتوالوژیست‌هایی که نمونه‌های دقیق‌تری تهیه کرده‌اند، آن‌ها را دقیق‌تر هم تفسیر کرده‌اند. به عبارتی با حذف غیرعمد نمونه‌های نامطلوب، عملاً ما فقط کار سیتوالوژیست‌هایی که با توجه به شرایط موجود نمونه‌های مطلوبی را تهیه کرده بودند، بررسی کردیم. چه‌بسا اگر در شرایطی قرار می‌گرفتیم که می‌توانستیم کار سیتوالوژیست‌هایی را که در تهیه، رنگ‌آمیزی و چسب سهل‌انگارانه برخورد کردنده، بررسی کنیم، تا این اندازه تطابق را هم به دست نمی‌آوردیم. مسأله دیگر مربوط به سن افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی است. این افراد اغلب در سنین ابتدای جوانی بودند و شاید دلیل تعداد

Abstract:

Evaluating the Causes of Low Quality of Papsmear in Hamadan Province.

Farimani, M.¹; Anvari, N.²

1. Assistant Professor in Gynecology, Hamadan University of Medical Sciences.

2. Assistant Professor in Pathology, Hamadan University of Medical Sciences.

Introduction: Papsmear had done by health services since 1991 in Iran ,unfortunately detection of abnormal smear is very low although this cancer is 9th cause of death in 4four county in 1999.The goal of this research is to determine the cause of low quality of Papsmear in Hamadan Province.

Method: We choose 1224 smears from total smear that had been evaluated by cytologist in 2000. All of smears were reevaluated with pathologist to have a valid answers to these questions; Were smears prepared correctly? Were smears evaluated carefully? Then descriptive statistics was used to analyze the data.

Results: Problems classified in 3 groups. First group related to smear's collector (11/7%) including 43/7% related to loss of endocervical cell- 34/7% related to low cellularity - 28/8% related to coverage with inflammatory cell &4/2% related to poor fixation.

Second group related to preparing smear by cytologist (74/5%), including coloring, sticking lamella to lame. 47/5% smear prepared was so bad that they were not valuable, 30/1% related to unfavorable stick, 14/2% to wrong coloring, 2/7% related to putting the lamella over lame.

Third group related to quality of evaluation. There was 96/6% agreement between cytologist and pathologist in this case.

Conclusion: This research demonstrated that the most significant point in low quality of papsmear was related to evaluation and the sensitivity of papsmear in Iran is much lower than that of standard (11/7% versus 70%).

منابع

1. Berek JS, Rinehart RD, Adams PJ, Adashi EY. Novak's gynecology. 13th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002, 1199-1232.
2. Ryan KJ, Brkowitz RS, Barbieri RL, Dunaif A. Kistner gynecology and woman's health. 7th ed. Baltimore: Mosby, 1999, 100-114.
3. Garcia F, Mendez E, Baldwin S. Factors that affect the quality of cytologic cervical cancer screening along the Mexico - United States border. Am J Obstet Gynecol 2003; 189:467-72
4. Bibbo M. Comprehensive cytopathology. 1st ed. New York: Mosby; 1996, PP.46-70
5. Risberg B, Andersson. Cervix-brush vs spatula and cytobrushic evaluation. J Reprod Med 1997. 111-15
6. Cronje HS, Parham GP, Cooreman BF. A comparison of four screening method for cervical neoplasia in developing country. Am J Obstet Gynecol 2003; 188:395-400
7. نقدی محسن. سیمای مرگ در چهار استان کشور ۱۳۷۸. تهران: معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛ سال ۱۳۷۸
8. World Health Organization. Cervical cancer screening programs: cervical cytology basic consideration. Geneva: WHO; 1999
9. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. وضعیت غربال گری سرطان گردن رحم. تهران: معاونت بهداشتی اداره کل بهداشت خانواده، اداره زنان و سالمندان؛ سال ۱۳۷۹
10. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. چکیده تحلیل غربالگری سرطان گردنبند رحم در کشور و ارائه راهکارهای اجرائی. تهران: دفتر سلامت خانواده و جمعیت ، اداره زنان و سالمندان؛ سال ۱۳۸۰