

عوامل خطر انسداد ورید مرکزی و شاخه ورید شبکیه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی کرمانشاه (۱۳۷۸-۸۱)

دکتر فریبا شیخی^{*}، دکتر محمدرضا انصاری^{*}، دکتر فرید دانشگر^{*}، دکتر جلیل امیدیان^{**}، دکتر ابراهیم قادری^{***}،

دکتر مژگان فتاحی جم^{***}

چکیده

سابقه و هدف: بیماری‌های عروقی چشم بیشتر در افراد مسن روی می‌دهد و علت‌های زمینه‌ای برای ایجاد این بیماری‌ها در افراد جوان مورد بحث است. در این مطالعه به علت‌های زمینه‌ای انسداد ورید مرکزی و انسداد شاخه وریدی شبکیه بررسی شده است.

مواد و روشها: این مطالعه به صورت مجموعه موارد انجام شد که در آن ۲۰ بیمار زیر ۵۰ سال با تشخیص انسداد شاخه‌ای و انسداد ورید مرکزی شبکیه مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان امام خمینی کرمانشاه طی سال‌های ۱۳۷۸-۸۱ مطالعه شده‌اند. بیماران بعد از تشخیص توسط چشم پزشک برای بررسی‌های سیستمیک به متخصص داخلی ارجاع شدند.

یافته‌ها: شایع‌ترین بیماری زمینه‌ای یافته شده در این بیماران به ترتیب افزایش فشار خون، چربی و دیابت بود. در یک نفر هیچ علتی یافت نشد. در این مطالعه در افراد دارای انسداد شاخه‌ای، در ۱ چشم (۷٪) در گیری سوپر اتمپورال، در یک چشم (۹٪) اینفرونازال و در ۴ چشم (۳۶٪) اینفروتمپورال وجود داشت و در گیری سوپر انزال مشاهده نشد.

بحث: با توجه به نتایج این مطالعه افزایش فشار خون و چربی خون در افراد جوان یک علت زمینه‌ای شایع در انسداد شاخه‌ای و انسداد ورید مرکزی شبکیه می‌باشد، ولی در افراد مسن افزایش چربی کمتر مطرح است.

کلید واژه‌ها: انسداد شاخه وریدی شبکیه، انسداد ورید مرکزی شبکیه، عوامل خطر

«دریافت: ۱۶/۸/۸۳ پذیرش: ۶/۴/۸۵»

*متخصص چشم پزشکی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

** فوق تخصص استرایسم و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

***پزشک عمومی

**** عهده‌دار مکاتبات: کرمانشاه، بیمارستان امام خمینی، بخش چشم پزشکی، تلفن: ۰۸۳۱-۷۷۷۶۰۴۴

به CRVO و BRVO در بیماران زیر ۵۰ سال بررسی شده

است.

مقدمه

انسداد ورید شبکیه یکی از علل مهم کاهش بینایی است (۱-۵). انسداد وریدهای شبکیه به دو دسته مرکزی و شاخه‌ای تقسیم می‌شود (۶). انسداد ورید مرکزی central retinal vein occlusion=CRVO شبکیه Branch retinal vein occlusion=BRVO از شایع‌ترین اختلالات عروقی شبکیه هستند که اغلب در افراد مسن روی می‌دهند به طوری که در ۹۰ درصد موارد در مرحله بروز بیماری، سن بیشتر از ۵۰ سال است (۷). بیشتر اطلاعات به دست آمده در مورد انسداد ورید شبکیه از مطالعات مجموعه موارد و مطالعات مورد- شاهدی به دست آمده است (۸-۱۸)، ولی هنوز مشخص نیست که در چه شرایطی انسداد مرکزی و یا شاخه‌ای روی می‌دهد (۱۷ و ۱۹-۲۱). فقط تعدادی مطالعه محدود، مشخصات بالینی این دو نوع انسداد را مورد بررسی قرار داده‌اند (۲۳-۲۶ و ۱۷).

انسداد وریدی شبکیه در اغلب موارد با بیماری‌های سیستمیک از قبیل افزایش فشارخون، بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت و گلوکوم همراه است (۳، ۷، ۲۴، ۲۶ و ۲۷). در افراد جوان نیز بیماری سیستمیک شایع است، هر چند در تعدادی از افراد هیچ علت زمینه‌ای یافت نمی‌شود (۲۸).

مواد و روش‌ها

این بررسی یک مطالعه مجموعه موارد است که در آن کلیه بیماران (۲۰ نفر) دارای سن زیر ۵۰ سال مبتلا به CRVO و BRVO مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در طول سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ بررسی شده است. این بیماران توسط متخصص چشم و با استفاده از آنتیوگرافی تشخیص داده شدند. بیماران همچنین از نظر ابتلا به میوپی مورد معاینه قرار گرفتند که بررسی با استفاده از اسپریکال اکی والان انجام شد. سپس برای شناسایی علت زمینه‌ای به متخصص داخلی ارجاع شدند و از نظر افزایش فشار خون، بیماری قلبی عروقی، مشکلات کلیوی، افزایش چربی خون، مشکلات خونی، HIV، کولیت اولسرو، بدخیمی‌ها و سابقه مصرف داروهای هورمونی بررسی شدند.

اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آمار توصیفی ارایه گردیدند.

یافته‌ها

در این مطالعه ۱۴ نفر (۷۰٪) زن و ۶ نفر (۳۰٪) مرد شرکت داشتند. در ۹ نفر (۴۵٪) چشم چپ و در ۱۱ نفر (۵۵٪) چشم راست درگیر بود. ۱۱ مورد (۵۵٪) مبتلا به BRVO (۸ نفر زن و ۳ نفر مرد) و ۹ نفر (۴۵٪) مبتلا به CRVO (۶ نفر زن و ۳ نفر مرد) بودند. در گروه CRVO تعداد ۴ نفر (۴۴٪) از نوع ایسکمیک و ۵ نفر (۵۵٪) از نوع غیرایسکمیک بودند. سن

در مطالعات مختلف (۱۸-۲۹ و ۱۱) عوامل خطر پیشنهاد شده‌اند، ولی این مطالعات اکثراً در افراد مسن انجام شده و عوامل خطر در افراد جوان هنوز مورد بحث است. با شناخت بهتر عوامل مؤثر بر این بیماری‌ها و شناسایی افراد در معرض خطر می‌توان از بروز این بیماری‌ها جلوگیری نمود. در این مطالعه عوامل خطر بیماران مبتلا

افراد بررسی شده $36 \pm 8/35$ سال (۲۳-۵۰ سال) هیچ بیماری زمینه‌ای یافت نشد. میوپی در این مطالعه در ۹ چشم (٪۴۵) مشاهده گردید. بود.

در مطالعه حاضر در افراد BRVO، ۸ چشم (٪۷۲/۷)

درگیری سوپراتمپورال، ۱ چشم (٪۹/۱) اینفرونازال و ۴ چشم (٪۳۶/۴) اینفروتمپورال داشتند و درگیری سوپرانازال مشاهده نشد (جدول ۱).

شایع ترین بیماری‌های زمینه‌ای در بیماران بررسی شده به ترتیب افزایش فشار خون، افزایش چربی خون، هیپرلیپیدمی و دیابت بود (جدول ۲ و ۳). بیماری مولتیپل میلوما، ایدز، تالاسمی، ریتینیت، گلوكوم، تحمدان پلی کیستیک و کولیت در هیچ بیماری یافت نشد. در ۱ نفر

جدول ۱- فراوانی قسمت‌های درگیر شبکیه در بیماران BRVO

BRVO	قسمت درگیر
درصد	تعداد
۰	۰
۷۲/۷	۸
۹/۱	۱
۳۶/۴	۴

جدول ۲- فراوانی بیماری‌های زمینه‌ای یافت شده در بیماران مورد مطالعه

مشکل زمینه‌ای	BRVO	CRVO	مجموع
	نفر	نفر	نفر
	درصد	درصد	درصد
HTN	۹	۸۱/۸	۴۴/۴
دیابت	۲	۱۸/۲	۲۲/۲
بیماری قلبی عروقی	۲	۱۸/۲	۱۱/۱
افزایش چربی خون	۳	۲۷/۳	۵۵/۵
بدخیمی	۱	۹	۰
بیماری انقادی	۲	۱۸/۲	۰
بیماری کلیوی	۱	۹	۱۱/۱
صرف آنتی‌آندروزنیک	۰	۰	۱۱/۱
صرف استروژن	۴	۳۶/۴	۱۱/۱
ارث	۰	۰	۲۲/۲
میوپی	۳	۲۷	۶۶/۶
گلوكوم	۰	۰	۰

جدول ۳- جدول مشخصات کلی بیماران بررسی شده

بیماری زمینه‌ای	طرف	قسمت درگیر	نوع بیماری چشمی	جنس	سن	شماره
HTN و DM	L	ST, IT	BRVO	M	۵۰	۱
DM و HLP	R	-	CRVO (NI)	M	۴۰	۲
DM	R	-	CRVO (I)	F	۲۳	۳
HTN	L	IT	BRVO	F	۴۷	۴
CV و HTN	R	ST	BRVO	F	۴۳	۵
HTN	R	-	CRVO (NI)	F	۴۹	۶
و مصرف استروژن HTN	L	ST	BRVO	F	۵۰	۷
HTN, HLP	L	-	CRVO (I)	M	۲۸	۸
و مصرف استروژن HTN	L	IT	BRVO	F	۴۷	۹
و مصرف استروژن ESRD	L	IT	BRVO	F	۴۵	۱۰
و پلی سیتی	L	ST	BRVO	M	۴۲	۱۱
و مصرف استروژن HTN	R	ST	BRVO	F	۴۰	۱۲
-	L	-	CRVO (NI)	F	۵۰	۱۳
صرف استروژن و آنتی آندروژن	R	-	CRVO (NI)	F	۲۷	۱۴
HTN, HLP, DM	R	ST, IN	BRVO	F	۴۱	۱۵
HLP و HTN	R	-	CRVO (I)	F	۵۰	۱۶
ESRD و سابقه فامیلی و HTN, HLP, CV	R	-	CRVO (I)	F	۳۰	۱۷
HTN	L	ST	BRVO	M	۴۰	۱۸
سابقه فامیلی	R	-	CRVO (NI)	M	۴۳	۱۹
HTN, HLP, CV	R	ST	BRVO	F	۲۵	۲۰

M: مرد F: زن L: چپ R: راست

CV: بیماری قلبی عروقی DM: دیابت ملیتوس HTN: افزایش فشار خون

HLP: افزایش چربی خون ESRD: بیماری کلیوی در مراحل انتهایی ST: سوبرتمپورال

IT: اینفرونمازال IN: اینفرونمازال I: ایسکمیک

NI: غیرایسکمیک

ویسکوزیته خون، Cr, BUN، اووه و فیبرینوژن بررسی شوند و در افراد جوان سطوح پروتئین S، C و آنتی ترومیجن III نیز باید سنجش گردند (۹).

این یافته نشان دهنده تفاوت بین گروههای سنی مبتلا به CRVO است که علت آن جوان بودن افراد مطالعه حاضر است البته امکان دارد یک علت دیگر افزایش چربی خون در این مطالعه وضعیت تغذیه ای و عادات غذایی در این جامعه باشد. در کل طبق نتایج این مطالعه بیماری های زمینه ای همراه CRVO در افراد جوان بیشتر شامل افزایش چربی خون و افزایش فشار خون و دیابت است.

در مطالعه حاضر هیچ موردی از گلوکوم یافت نگردید. یکی از علتهای عدم وجود گلوکوم در این مطالعه احتمالاً تعداد کم نمونه ها است. در برخی از مطالعات روابطی بین گلوکوم و CRVO وجود داشته است (۱۶)، (۳۰ و ۳۱) در این مطالعه شایع ترین قسمت درگیر در BRVO شامل سوپراتمپورال و اینفرا تمپورال بود. در افراد مسن نیز این قسمت ها از نظر درگیری شایع ترند (۱ و ۹)، در مطالعه ای دیگر درگیری سوپراتمپورال در ۵۱/۷، اینفرا تمپورال در ۲۸، اینفرا انزال در ۲/۸ و سوپرانازال در ۰/۵ درصد مشاهده شده (۱۸) و به این ترتیب ظاهرآ اتفاقی در آنatomی قسمت های درگیر بین افراد جوان و مسن دیده نمی شود.

BRVO همیشه در محل تقاطع شریانی - وریدی روی می دهد. بررسی هایی که در این بیماری باید انجام شود، شبیه CRVO است (۴). در این بیماری افزایش فشار خون شایع تر از CRVO است (۶۵-۷۵٪) و دیابت در ۱۳-۲٪ افراد دیده می شود (۱ و ۹). موارد دیگری که در مطالعات گذشته به عنوان بیماری زمینه ای همراه گزارش

بحث

در مطالعه حاضر ۴ نفر از افراد CRVO (۴۴/۴٪) دچار افزایش فشار خون، ۲ نفر (۲۲/۲٪) دچار دیابت و ۵ نفر (۵۵/۵٪) دچار افزایش چربی خون بودند و ۱ نفر (۱۱/۱٪) مشکل قلبی داشت که در مقایسه با مطالعات قبلی افزایش چربی خون و بیماری قلبی کمتر و افزایش چربی خون و دیابت بیشتری دیده شد. CRVO یک علت مهم کوری در افراد پیر بخصوص در مبتلایان به افزایش فشار خون و گلوکوم است که در بیش از نیمی از این افراد، بیماری قلبی عروقی مشاهده می شود (۹،۱۴).

میزان بروز CRVO در مبتلایان به دیابت، افزایش فشار خون، بیماری کلازن و عروقی و سندروم های هیپر ویسکوزیته بالاتر است. بیماری های زمینه ای یافت شده در CRVO شامل افزایش فشار خون (۶۱٪) و دیابت (۷٪) در افراد مسن گزارش گردیده است (۱۰). در مطالعه ای نیز عضلانی شدن بطن چپ در ۳۰/۸ درصد در مقایسه با گروه کنترل ۵/۱ درصد مشاهده شد (۱۱). موارد دیگری که به عنوان عوامل خطر CRVO پیشنهاد شده اند شامل اختلالات ECG، سابقه درمان دیابت، گلوکوم، سطوح بالای آلفا گلوبولین (۱۲ و ۱۳) بوده است. در افراد جوان عوامل دیگری نیز با CRVO همراه هستند که شامل مصرف داروهای آنتی آندروژنیک، سندروم استرج ویر، میاستنی گراو و مقاومت نسبت به پروتئین C است (۱۴، ۱۵)، ولی افزایش فعالیت و افزایش سطح الكل با کاهش CRVO همراه بوده اند (۱۲ و ۱۶). در افراد مبتلا به CRVO لازم است سطح چربی های سرم، پروتئین های سرم، آزمایش تحمل گلوکز،

تفاوت احتمال‌باعلهت سن کمتر نمونه‌های این مطالعه می‌باشد؛ زیرا با افزایش سن شیوع میوپی کمتر می‌شود. (۲۰، ۲۱ و ۲۲).

نتیجه‌گیری

در کل با توجه به نتایج این مطالعه افزایش چربی خون و بعد از آن افزایش فشار خون در افراد جوان یک علت زمینه‌ای شایع در CRVO و BRVO می‌باشد، ولی در افراد مسن بیماری‌های قلبی عروقی و دیابت عوامل خطر فاکتورهای عمدۀ همراه با این دو بیماری است برای بررسی بیشتر عوامل خطر این دو بیماری در افراد جوان، مطالعات وسیع تری در سطح کشور لازم است تا حجم نمونه بیشتری به‌دست آید.

شده‌اند، شامل هیپرنسولینمی، اختلال در آزمایش تحمل گلوکز (۱۷) و افزایش BMI (۱۲) بوده است. در این بیماری نیز افزایش سطح الكل خون و HDL باعث کاهش خطر ابتلا به BRVO شده است (۱۶). در مطالعه مانیز افزایش فشار خون بیشترین بیماری زمینه‌ای یافته شده است و افزایش چربی خون، دیابت و بیماری قلبی در رتبه‌های بعدی قرار دارد. در این مطالعه مانند مطالعات قبلی که در افراد با سن بالاتر انجام شده، افزایش فشار خون در BRVO بیشتر از CRVO بود که به‌نظر می‌رسد عوامل خطر فاکتورهای ابتلا به BRVO در افراد جوان و مسن چندان متفاوت نباشند.

تعداد افراد مبتلا به میوپی در مطالعه ما بیش از مطالعات دیگر بوده است. در مطالعات دیگر میوپی حدود ۸/۹ درصد گزارش گردیده بود (۱۹) که این

Abstract:

Risk Factors in Patients with CRVO and BRVO Referred to Imam Khomeini Hospital of Kermanshah.

Shiekhi, F.¹; Ansari, M. R.¹; Daneshgar, F.¹; Omidian, J.²; Ghaderi, E.³; Fatahijam, M.³

1. Assistant Professor in Ophthalmology, Kermanshah University of Medical Sciences

2. Assistant Professor in Strabismus, Kermanshah University of Medical Sciences

3. General Physician

Introduction: Eye's vascular diseases often occur in elderly people but the main causes of these diseases in the youth is under discussion. This study investigates fundamental causes of central and branch retinal vein occlusion.

Materials & Methods: This study was conducted as case series, in which 20 patients (under 50 years old) with BRVO and CRVO in Imam Khomeini Hospital of Kermanshah during 1999-2003. were evaluated. These patients diagnosed by ophthalmologist and evaluated for systemic diseases by internal specialist.

Result: The most common associated diseases found in these patients are Hypertension, Hyperlipidemia and diabetes. There wasn't found any mentioned causes in one of these patients. In this study, 8 eyes (72.7%) with supratemporal involvement in BRVO patients, one eye (9.1%) with inferonasal involvement, and four eyes (36.4%) with inferotemporal involvement were found, but no eyes were found with superatemporal involvement.

Conclusion: It was concluded from this study that Hypertension and Hyperlipidemia two most a common causes in BRVO and CRVO diseases among young population but Hyperlipidemia is less common among old population.

Key Words: BRVO, CRVO, Risk Factor

منابع

1. Klein R, Wang Q, Klein BE, Moss SE, Meuer SM. The relationship of age-related maculopathy, cataract, and glaucoma to visual acuity. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 1995; 36(1):182-191
2. David R, Zangwill L, Bardana M, et al. Epidemiology of retinal vein occlusion and its association with glaucoma and increased intraocular pressure. *Ophthalmologica* 1988; 197:69-74
3. Guven D, Sayinapl N, Kalayci D, Dundar S, Hasiripi H. Risk factors in central retinal vein occlusion and activated protein C resistance. *Eur J Ophthalmol* 1999; 9(1):43-8
4. Opremcak EM, Bruce RA. Surgical decompression of branch retinal vein occlusion via arteriovenous crossing sheathotomy. *Retina* 1999; 19(1):1-5
5. Hardy RA, Crawford JB. Retina: In: Vaughan D. General ophthalmology. 15th ed. Stamford: Appleton and Lange; 1999, P.195.
6. Clemett RS, Kohner EM, Hamilton AM. The visual prognosis in retinal branch vein occlusion. *Trans Ophthalmol Soc UK* 1973; 93:523-35
7. American Academy of Ophthalmology. Retina and vitreous. Section 12. American Academy of Ophthalmology 1996-1997; P. 107
8. Dodson PM, Kritzinger EE, Clough CG. Diabetes mellitus and retinal vein occlusion in patients of Asian, West Indian, and white European origin. *Eye* 1992; 6:66-68
9. Hayreh SS, Zimmerman MB, Podhajsky P. Incidence of various types of retinal vein occlusion and their recurrence and demographic characteristics. *Am J Ophthalmol* 1994; 117(4):429-41
10. Staurenghi G, Lonati C, Aschero M, Orzalesi N. Arteriovenous crossing as a risk factor in branch retinal vein occlusion. *Am J Ophthalmol* 1994; 117(2):211-13
11. Glacet-Bernard A, Coscas G, Chabanel A, Zourdani A, Lelong F, Samama MM. Prognostic factors for retinal vein occlusion: prospective study of 175 cases. *Ophthalmology* 1996; 103(4):551-560
12. Peduzzi M, Debbia A, Guerrieri F, Bolzani R. Abnormal blood rheology in retinal vein occlusion. A preliminary report. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 1986; 224(1):83-85
13. Feist RM, Ticho BH, Shapiro MJ, Farber M. Branch retinal vein occlusion and quadratic variation in arteriovenous crossings. *Am J Ophthalmol* 1992; 113(6):664-68

14. Anonymous. Risk factors for branch retinal vein occlusion: the eye disease case-control study. *Am J Ophthalmol* 1993; 116:286-96
15. Johnston RL, Brucker AJ, Steinmann W, Hoffman ME, Holmes JH. Risk factors of branch retinal vein occlusion. *Arch Ophthalmol* 1985; 103(12):1831-32
16. Rath EZ, Frank RN, Shin DH, Kim C. Risk factors for retinal vein occlusions: a case-control study. *Ophthalmology* 1992; 99(4):509-14
17. Sperduto RD, Hiller R, Chew E, Seigel D, Blair N, Burton TC, et al. Risk factors for hemiretinal vein occlusion: comparison with risk factors for central and branch retinal vein occlusion: the eye disease case-control study. *Ophthalmology* 1998; 105(5):765-71
18. McGrath MA, Wechsler F, Hunyor AB, Penny R. Systemic factors contributory to retinal vein occlusion. *Arch Intern Med* 1978; 138(2):216-20
19. Hayreh SS, Hayreh MS. Hemi-central retinal vein occlusion: pathogenesis, clinical features, and natural history. *Arch Ophthalmol* 1980; 98:1600-9
20. Gomez-Ulla DE, Irazazabal FJ, Cadarso Suarez L, Orduna Domingo E. Hemispheric retinal branch vein occlusions. *Ophthalmologica* 1986; 193:14-22
21. Sanborn GE, Magargal LE. Characteristics of the hemispheric retinal vein occlusion. *Ophthalmology* 1984; 91:1616-26
22. The Eye Disease Case-Control Study Group. Risk factors for branch retinal vein occlusion. *Am J Ophthalmol* 1993; 116:286-96
23. The Eye Disease Case-Control Study Group. Risk factors for central retinal vein occlusion. *Arch Ophthalmol* 1996; 114:545-54
24. Appiah AP, Trempe CL. Risk factors associated with branch vs. central retinal vein occlusion. *Ann Ophthalmol* 1989; 21:153-7
25. Appiah AP, Trempe CL. Differences in contributory factors among hemicentral, central, and branch retinal vein occlusions. *Ophthalmology* 1989; 96:364-6
26. Rath EZ, Frank RN, Shin DH, Kim C. Risk factors for retinal vein occlusions: a case-control study. *Ophthalmology* 1992; 99(4):509-14

27. Sanborn GE, Magargal LE, Jaeger EA. Venous occlusive disease of the retina: In: Tasman W, Jaeger EA, editors. Doan's clinical ophthalmology. Vol 3, Philadelphia: Lippincott; 1994, PP.1-23
28. Fong AC, Schatz H. Central retinal vein occlusion in young adults. Surv Ophthalmol 1993; 37(6):393-417
29. Mitchell P, Smith W, Chang A. Prevalence and associations of retinal vein occlusion in Australia: the Blue Mountains eye study. Arch Ophthalmol 1996 Oct; 114(10):1243-47
30. Beaumont PE, Kang HK. Clinical characteristics of retinal venous occlusions occurring at different sites. Br J Ophthalmol 2002; 86:572-80
31. Soni KG, Woodhouse DF. Retinal vascular occlusion as a presenting feature of glaucoma simplex. Br J Ophthalmol 1971; 55:192-5