

بررسی انواع تومورهای مدبیاستن جراحی شده در مرکز آموزشی درمانی طالقانی کرمانشاه^۱

دکتر سید محمدعلی حسامی^{*}؛ دکتر بابک ایزدی^{**}

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت مدبیاستن به عنوان حضره مرکزی قفسه سینه و ترافیک فیزیولوژیک آن، شناخت انواع توده‌های مدبیاستن ضروری است. این بررسی به منظور تعیین فراوانی انواع تومورهای مدبیاستن در بیماران جراحی شده در مرکز آموزشی درمانی طالقانی طی سالهای ۱۳۸۱-۱۴۰۶ انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی مقطعی در روی پرووندهای بیماران بستری شده انجام شد. برای استخراج اطلاعات از یک برگه اطلاعاتی که شامل متغیرهای نوع توده، محل، سن، جنس، متاستاز و علایم بالینی بود، استفاده شد. اطلاعات پس از جمع آوری، با استفاده از آمار توصیفی ارایه گردید.

یافته‌ها: از ۳۱۸ مورد توراکوتومی غیرترورماتیک انجام شده، ۱۹ مورد (۶٪ درصد) توده مدبیاستن بوده است، فراوان ترین توده‌ها، توده تیموس (۲۵٪) و لنفوما (۱۵٪) بودند و شایع ترین محل در گیر مدبیاستن قدامی (۶۶٪ درصد) بود. سن متوسط بیماران ۲۸/۲ سال و ۴۲ درصد مؤنث و ۵۸ درصد مرد بودند. علایم بالینی شایع، کاهش وزن (۶۰٪ درصد)، سرفه (۴۲٪ درصد)، تنگی نفس (۴۲٪ درصد) و درد قفسه سینه (۳۹٪ درصد) بود. متاستاز در ۳۳ درصد بیماران دیده شد و شایع ترین محل متاستاز ریه و پلور بود. فراوانی میاستنی گراو در بیماران با توده تیموس ۷۳٪ درصد بود، علاوه بر این در این مدت ۹۷ مورد توده مری نیز عمل شده بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به اطلاعات به دست آمده، بررسی بیمارانی که با علایم بالینی کاهش وزن، سرفه، تنگی نفس و درد قفسه سینه مراجعه می‌کنند، از نظر وجود توده مدبیاستن ضروری به نظر می‌رسد تا از رشد این توده‌ها و متاستاز آن‌ها جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها: مدبیاستن، تومور، کرمانشاه

«دریافت: ۸۵/۵/۷ پذیرش: ۸۶/۴/۵»

* فوق تخصص جراحی قفسه سینه، استادیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

** استادیار گروه پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

* عهده‌دار مکاتبات: کرمانشاه، بیمارستان امام رضا(ع)، بخش جراحی عمومی، تلفن: ۰۸۳۱-۴۲۷۶۳۰۰-۷

مقدمه

تهاجم به جدار قفسه سینه، پلور، اعصاب پیرامون مدیاستن، درد قفسه سینه، پلورال افیوژن، خشونت صدا، سندروم هورنر، پاراپلزی و فلچ دیافراگم ممکن است دیده شود (۱). برخی توده‌ها باعث ایجاد سندرم‌های آندوکرینی مانند: افزایش فشارخون، هیپرکلسیمی، تیروتوکسیکوز و ژنیکوماستی می‌شوند (۲). طبق گزارش Davis و همکارانش از ۴۰۰ مورد توده مدیاستن، نوپلاسم تیموس (۱۷درصد) شایع‌ترین تومور اولیه و با اختلاف کمی لنفوما (۱۶درصد)، تومور عصبی (۱۴درصد) و ژرم سل تومور (۱۱درصد) قرارداشتند (۴). در مطالعه‌ای در بیمارستان Saopaulo آمریکا روی ۷۳ بیمار، سن متوسط ۴۳/۸ درصد سال بود (۵) و در مطالعه دیگری روی ۱۲۴ بیمار ۳۵ سال ذکر شد (۵). در مطالعه‌ای در آمریکا روی ۷۳ بیمار، ۵۶/۲ درصد مؤنث و ۴۳/۸ درصد مذکر بودند (۲). در مطالعه‌ای روی ۱۲۴ بیمار ۱۱ درصد متاستاز دوردست داشتند (۵). در مطالعه‌ای در مرکز پزشکی Naval آمریکا روی ۱۱۷ بیمار، ۳۷ درصد توده‌ها بدخیم گزارش شد (۶).

در مطالعه Adegbeye و همکارانش روی ۱۰۵ بیمار ۶۳/۸ درصد توده‌ها مدیاستن قدامی، ۲۲/۹ درصد در مدیاستن خلفی و ۱۳/۳ درصد در مدیاستن میانی بود. در مطالعه Whooley و همکارانش (۱۹۹۹) شایع‌ترین تومور تیوما و سپس ژرم سل تومور، لنفوما و تومور عصبی قرارداشتند (۷).

در مطالعه Adegbeye و همکارانش شایع‌ترین تومور اولیه مدیاستن لنفوما (۲۱/۹ درصد)، تومور تیموس (۱۸/۱ درصد) و تومور آندوکرین (۱۷/۱ درصد) بودند. در مطالعه Strollo و همکارانش تراتوم بالغ شایع‌ترین نوپلاسم ژرم سل اولیه مدیاستن بود (۸). کمتر از ۴۰ درصد این

مدیاستن حفره مرکزی قفسه سینه است که دو طرف آن حفرات پلور، دیافراگم در پایین، دهانه خروجی قفسه سینه در بالا، استرنوم در قدام و تنہ مهره‌ها و نواحی پاراورتبرال در خلف آن قرار گرفته است (۱). مدیاستن به ۳ کمپارتمان تقسیم می‌شود:

۱- مدیاستن قدامی: ناحیه جلوی پریکارد و پشت استرنوم؛

۲- مدیاستن میانی (احشایی): بین مدیاستن قدامی و مدیاستن خلفی؛

۳- مدیاستن خلفی (شیارهای پاراورتبرال) که در پشت قلب واقع شده و در آنجا کناره‌های قدامی ستون فقرات آن را از مدیاستن میانی جدا می‌کند (۲). مدیاستن قدامی حاوی تیموس، مقادیری چربی، نسج همبند و بافت‌های لنفاوی است. در مدیاستن میانی قلب، پریکارد، مری، آئورت، تراشه، شاخه‌های بروننش اصلی و غدد لنفی مربوط قرار می‌گیرند. در مدیاستن خلفی آئورت نزولی و تنہ عصبی اتونوم قراردارد (۲). اکثر توده‌های مدیاستن قدامی شامل: تیوما، لنفوما و ژرم سل تومور است و در کمپارتمان احشایی کیست‌های برونوکوژنیک، ازوفاژیال و گاستریک و توده‌های لنفاوی شایع است و اکثر توده‌های مدیاستن خلفی منشأ نوروژنیک دارند. فیبروما، لیپوما و انواع بدخیم آن‌ها ممکن است در هر ۳ کمپارتمان دیده شوند (۱).

تومورهای مدیاستن در بالغین معمولاً بدون علامتند. در مطالعه‌ای در آمریکا روی ۷۳ بیمار ۴/۶ درصد علامت دار بودند که شایع‌ترین علایم: درد سینه، میاستنی گراو، انسداد سوپریور و ناکاوا، خشونت صدا، درد اندام فوقانی، دیسفارژی و تنگی نفس بود (۳). در انواع بدخیم

یافته‌ها

از حدود ۳۱۸ بیمار که در بخش، تحت جراحی توراکوتومی غیرتروماتیک قرار گرفته بودند، ۸۹ مورد (۲۷/۹۸ درصد) به توده مدبیاستن مبتلا بودند. در این مطالعه ۸۹ بیمار مبتلا به توده مدبیاستن طی سال‌های ۱۳۸۱-۲۷/۹۸ بررسی شدند که فراوانی توده‌های مدبیاستن درصد بود و به طور میانگین شیوع توده‌های مدبیاستن ۲۲/۲۵ مورد در سال بود. شایع‌ترین توده مدبیاستن توده تیموس (۲۵/۸ درصد) (شامل تیوما و کارسینوم تیموس)، لنفوم (۱۵/۷ درصد)، توبرکولوزیس (۱۵/۷ درصد)، کیست مزانشیمال (۹ درصد) (شامل کیست پریکارد، اپیدرموئید و برونوکوژنیک)، کارسینوم سلول‌های سنگفرشی (SCC)^۱ (۹ درصد)، تومور نوروژنیک (۶/۷ درصد) (شامل گانگلیونوروما، گانگلیو نوروبلاستوما، نوروبلاستوما و شوانوما)، تومور متفرقه (۶/۷ درصد) (شامل تومور تراشه و تیروئید رترواسترنال)، ژرم سل تومور (۵/۶ درصد) (تراتوما)، تومور مزانشیمال (۴/۳ درصد) (شامل لیپوما، مزوتیلوما و سارکوما)، و ۶۲/۹ متابستاز آدنوکارسینوم (۲/۴ درصد) قرارداشتند. در درصد مواد توده در مدبیاستن قدامی، ۲۱/۴ درصد در مدبیاستن میانی و ۱۵/۷ درصد در مدبیاستن خلفی بود. سن متوسط بیماران ۲۸/۲ سال بود و بیشترین گروه سنی در گیر ۱۶-۳۰ ساله‌ها بودند. ۴۲ درصد مؤنث و ۵۸ درصد مذکر بودند. فراوانی عالیم بالینی بررسی شده به این صورت بود: کاهش وزن (۵/۶۰ درصد)، سرفه (۴۲ درصد)، تنگی نفس (۴۲ درصد)، درد قفسه سینه (۵/۳۹ درصد)، خشونت صدا (۷/۳ درصد) و انسداد ورید اجوف فوکانی (SVC)^۲ (۵/۲ درصد). متابستاز در ۳/۳

تومورها بدخیم هستند. در کمپارتمنان احشایی اکثر توده‌ها خوش‌خیم و در شیارهای پاراورتبرال ۱-۳ درصد تومورهای نوروژنیک بدخیم هستند و شیوع بدخیمی در اطفال بیش از بالغین است (۱). در مطالعه Strollo و همکارانش روی ۶۴ بیمار، ۴۵ نفر خوش‌خیم و ۱۹ نفر بدخیم گزارش شد (۸). هدف از این مطالعه مقایسه بین یافته‌های این پژوهش و مطالعات خارجی برای ایجاد بستری برای یافتن علت‌های مداخله‌گر در تعیین فراوانی انواع تومورهای مدبیاستن می‌باشد.

مواد و روش‌ها

این مطالعه توصیفی مقطعی روی پرونده‌های بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی طالقانی کرمانشاه در بخش جراحی (۱۳۸۱-۸۴) که تحت توراکوتومی قرار گرفتند، برای تعیین انواع تومورهای مدبیاستن انجام شد. از ۳۱۸ پرونده توراکوتومی غیرتروماتیک ۸۹ پرونده مربوط به توده‌های مدبیاستن بود. در این مدت ۹۷ مورد سرطان مری عمل شده بود که از مطالعه خارج شدند. بیماران در ۶ گروه سنی کمتر از ۵ سال، ۵-۱۵، ۱۶-۳۰، ۳۱-۴۵، ۴۶-۶۰ و بیشتر از ۶۰ سال قرار گرفتند و عالیم بالینی مندرج در پرونده آن‌ها بررسی شد. سپس مشخصات بیماران مبتلا به توده مدبیاستن در جدول متغیرها جمع‌آوری شدند. برای استخراج اطلاعات از یک برگه اطلاعاتی استفاده شد که براساس مندرجات پرونده و شامل متغیرهای نوع توده، محل، سن، جنس، متابستاز و عالیم بالینی بود. اطلاعات به دست آمده مورد باستفاده از آمار توصیفی ارایه گردید.


و نادرترین محل مدياستن خلفی (۱۴ درصد) بود (جدول ۱). توزیع جنسی توده‌های مدياستن بر حسب انواع توده مدياستن در بیماران جراحی شده در مرکز آموزشی درمانی طالقانی کرمانشاه نیز در جدول ۱ مشاهده می‌شود. علایم قابل ذکر در بیماران با توده مدياستن شامل کاهش وزن، سرفه، تنگی نفس، درد فقرسی سینه، دیسفرازی، خشونت صدا، انسداد SVC و متاستاز بود (نمودار ۱). ذکر این نکته لازم است که شایع‌ترین محل متاستاز

در صد بیماران دیده شد و شایع‌ترین محل متاستاز ریه و پلور بود. می‌استنی‌گراو از علایم شایع در بیماران با توده تیموس بود (۷۳/۷ درصد).

فراوان‌ترین توده مدياستن مربوط به توده تیموس (۲۵/۸ درصد) و لنفوم (۱۵/۷ درصد) و کمترین درصد مربوط به ژرم سل تومور (۵/۶ درصد)، تومور مزانشیمال (۳/۴ درصد) و متاستاز آدنوکارسینوم (۴/۲ درصد) بود. شایع‌ترین محل برای توده مدياستن قدامی (۶۲/۹ درصد)

جدول ۱- توزیع فراوانی توده‌های مدياستن بر حسب انواع مدياستن و جنس در بیماران جراحی شده در مرکز آموزشی درمانی طالقانی کرمانشاه (۱۳۸۱-۸۴)

نوع توده	متاستاز	مدیاستن		خلفی	جنس		جمع
		مرد	زن		مرد	زن	
توده تیموس		۲۳ (۲۵/۸)	۱۱ (۱۲/۴)	۱۲ (۱۳/۴)	۰ (۰)	۰ (۰)	۲۳ (۲۵/۸)
لنفوم		۱۴ (۱۵/۷)	۱۰ (۱۱/۲)	۴ (۴/۵)	۲ (۴/۲)	۲ (۲/۲)	۱۰ (۱۱/۲)
توبرکولوزیس		۱۴ (۱۵/۷)	۶ (۶/۷)	۸ (۹)	۰ (۰)	۶ (۶/۷)	۸ (۹/۰۰)
تومور نوروجنیک		۶ (۶/۷)	۴ (۴/۵)	۲ (۲/۲)	۶ (۶/۷)	۰ (۰)	۰ (۰)
SCC ریه		۸ (۹)	۵ (۵/۶)	۳ (۳/۴)	۳ (۳/۴)	۰ (۰)	۵ (۵/۶)
کیست مزانشیمال		۸ (۹)	۵ (۵/۶)	۳ (۳/۳)	۰ (۰)	۸ (۹/۰)	۰ (۰)
تومور مزانشیمال		۳ (۳/۴)	۲ (۲/۲)	۱ (۱/۱)	۰ (۰)	۳ (۳/۳۷)	۰ (۰)
ژرم سل تومور		۵ (۵/۶)	۴ (۱/۱)	۱ (۱/۱)	۰ (۰)	۰ (۰)	۵ (۵/۶)
متاستاز آدنوکارسینوم		۲ (۲/۴)	۱ (۱/۱)	۱ (۱/۱)	۰ (۰)	۰ (۰)	۲ (۲/۲)
تومور متفرقه		۶ (۶/۷)	۴ (۴/۵)	۲ (۲/۲)	۳ (۳/۴)	۰ (۰)	۳ (۳/۴)
جمع		۸۹ (۱۰۰)	۵۲ (۵۸/۴)	۳۷ (۴۱/۶)	۱۴ (۱۵/۷)	۱۹ (۲۱/۳)	۵۶ (۶۲/۹)



نمودار ۱- توزیع فراوانی علایم بالینی در بیماران مبتلا به توده مذیاستن جراحی شده در مرکز آموزشی درمانی طالقانی کرمانشاه (۱۳۸۱-۸۴)

مذیاستن لنفوما (۲۱/۹ درصد)، تومور تیموس (۱۸/۱ درصد)

درود و تومور آندوکرین (۱۷/۱ درصد) بودند و ۶۳/۸

درصد توده‌ها مذیاستن قدامی، ۲۲/۹ درصد در مذیاستن

خلفی و ۱۳/۳ درصد در مذیاستن میانی بود (۵). در

مطالعه‌ای در بیمارستان Saopaulo آمریکا (سال ۲۰۰۰)

روی ۷۳ بیمار با توده مذیاستن، ۲۴/۶ درصد تومورها در

مذیاستن قدامی، ۳۸/۳ درصد در مذیاستن میانی و ۳۷/۱

درصد در مذیاستن خلفی گزارش شد و سن متوسط

بیماران ۴۳/۸ سال بود که ۵۶/۲ درصد زن و ۴۳/۸ درصد

مرد بودند. علایم شایع درد قفسه سینه، میاستنی گراو،

انسداد SVC، خشونت صدا، درد اندام فوکانی، دیسفارژی

و دیسپنه بود (۵). در مطالعه Strollo و همکارانش تراکوم

بالغ شایع ترین نئوپلاسم ژرم سل اولیه مذیاستن بود (۸).

در مطالعات انجام شده در مقالات آمریکایی، ژاپنی و

اروپایی در کل ۳۶۰۸ مورد توده‌های مذیاستن در طول

سال‌های ۱۹۵۶-۹۵ گزارش شده است. براساس مطالعه

Zeng و همکارانش (۸۵-۸۰) روی ۲۵۷ مورد توده

ریه و پلور بود که درصد ۵۵ بیماران دیده

شد. میاستنی گراو از علایم قابل ذکر در بیماران با توده

تیموس و در ۷۳/۷ درصد آنان دیده شد.

بحث

به طور کلی نتایج مطالعات ما با سایر مطالعات انجام شده

تفاوت چندانی ندارد و ترتیب شیوع و محل توده‌ها

مشابهت زیادی دارد. تفاوت‌های موجود شامل شیوع

سالانه بالای این توده‌ها در مطالعه ما و میزان بالای

لنفادنوپاتی‌های تویرکولوزیس می‌باشند. در مطالعه

Whooley و همکارانش (سال ۱۹۹۹) روی ۱۲۴ بیمار با

توده مذیاستن شایع ترین تومور تیموس (۳۱ درصد) و

سپس ژرم سل تومور (۲۳ درصد)، لنفوما (۱۹ درصد) و

تومور عصبی (۱۲ درصد) قرارداشتند. سن متوسط بیماران

۶۹ سال بود و ۱۱ درصد متاستاز دوردست داشتند

درصد علامت‌دار بودند (۷). در مطالعه Adegboye و

همکارانش روی ۱۰۵ بیمار شایع ترین تومور اولیه

برخوردار است؛ که به طور مثال دانستن مکان‌های شایع بروز توده‌های سلی و لنفومنی ما، را از اقدامات جراحی تهاجمی برای خارج کردن کامل توده منصرف می‌کند؛ چون با یک نمونه‌برداری کوچک و با درمان‌های طبی از قبیل انتی بیوتیک‌ترابی یا شیمی‌درمانی و رادیوتراپی درمان اصلی انجام می‌شود.

مدیاستن شیوع این توده‌ها ۱۲ مورد در سال بود (۳). در مطالعه Davis و همکارانش (۱۹۸۷) ۴۰۰ مورد توده مدیاستن گزارش شد که شیوع آن‌ها ۸ مورد در سال بود (۴). براساس مطالعاتی در ژاپن شیوع این توده‌ها ۸ مورد در سال بود (۱) که شیوع بالای این توده در مطالعه ما بررسی بیشتر آن توده‌ها و ارایه راهکارهای تشخیصی درمانی مناسب را مطرح می‌سازد.

تشکر و قدردانی

در پایان از زحمات بی‌شائبه سرکار خانم‌ها: سارا قدیمی، مهبا عزیزی (دانشجویان پزشکی) و خانم فرانک وکیلی فر که در تهیه این مقاله بنده را یاری کردند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.

نتیجه گیری

از لحاظ ترتیب شیوع و مکان‌های بروز توده‌های مدیاستن غیر از شیوع بالای لنفادنوپاتی‌های سلی تفاوتی بین مطالعه ما و سایر مطالعات وجود ندارد. دانستن مکان‌های شایع بروز هر توده از اهمیت بهسازی

Abstract:

Assessment of Different Types of Mediastinal Tumors Removed by Surgery at Taleghani Hospital, Kermanshah, (2002-2005)

Hesami, S.M.A.¹; Izadi, B.²

1. MD, Fellowship, Thorax Surgeon, Kermanshah University of Medical Sciences.

2. MD, Pathologist, Associate professor, Kermanshah University of Medical Sciences.

Background & Objectives: With regard to the mediastinum importance as a central region of thorax and its physiologic traffic of vital structures, the knowledge of mediastinal masses is necessary. This survey was conducted to determine the prevalence of different kinds of mediastinal tumors in patients who underwent surgical procedures at Taleghani hospital between 2002 and 2006.

Methods & Materials: This is a descriptive sectional study that was done on the patients files and we used an information form containing variable factors such as kind of mass, place of mass, age, sex, metastasis, clinical signs. After gathering of information, data was analyzed by statistical soft ware.

Results: Among 318 nontraumatic thoracotomies performed in this period, 89 cases were mediastinal masses and most frequent masses were thymic (25.8%) and lymphoma (15.7%). Anterior mediastinum was the most common site affected 66.9% of patients. The average age was 28.2 years and 42% of patients were female. The most significant clinical signs were: Weight loss (60.5%), cough (42%), dyspnea (42 %), and chest pain (39.5 %). Metastasis occurred in 33.3% of patients and the most frequent sites were lung and pleural. The frequency of myasthenia gravis in thymoma was 73.7%. Patients with myasthenia gravies with normal thymus and thymectomy were excluded from the study.

Conclusion: There was little difference between our statistical results and other studies (mass types frequencies and mediastinal compartments most involved by each type of this masses). The only exception was the high prevalence of tuberculosis lymphadenopathy in our study. Knowing of common location of mediastinal masses prevents unnecessary aggressive surgical procedures because masses like tuberculosis lymphadenopathy and lymphoma only needs tissue diagnosis and the definite treatments for such diseases are antibiotic and chemoradiation respectively.

Key words: Mediastinum, Tumor, Incidence

منابع

1. Sheilds TW. Over view of primary mediastinal tumors and cysts: In: Shields TW, editor. General thoracic surgery. 5th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins; 2000, PP. 2105-9
2. Rush VW, Ginsberg RJ. Chest wall, pleura, lung and mediastinum: In: Shwartz SI, Shires GT, Spencer FC, Daly JM, Fischer JE, Galloway AC, editors. Principles of surgery. 7th ed. New York: McGraw-Hill; 1999, PP.770-80
3. Zeng LQ. The changing patterns of occurrence and management in primary mediastinal tumors and cysts in the People's Republic of China. Surg Gynecol Obstet 1988; 166: 55-59
4. .Davis RD, Oldham HN, Sabiston DC. Primary cysts and neoplasms of the mediastinum: recent changes in clinical presentation, methods of diagnosis, management and results. Ann Thorac Surg 1987; 44:229-37
5. Marcelo Inaco Cirino L, Ribas Milanez de Campos J, Fernandez A, Samano MN, Pego Fernandez P, Filomeno LTB, et al. Diagnosis and treatment of mediastinal tumors by thoracoscopy. J Chest Chicago 2000; 117: 1787-92
6. Foley RW, Rodrigues MI. Preoperative irradiation of selected mediastinal mass. J Cardiovascular Surgery 2001; 42:695-7
7. Whooley BP, Urshel JD, Ant Kowiac JG, Takita H. Primary tumors of mediastinum. J Surg Oncol 1999; 70:95-9
8. Strollo DC, Rosada de Christienson ML, Jett JR. Primary mediastinal tumors: Part 2- Tumors of the middle and posterior mediastinum.Chest 1997; 112:1344