

بررسی موارد مقاومت مایکوباتریوم توبرکلوزیس به ریفامپین و ایزوپیازید جدادشده از نمونه های کلینیکی مرکز بهداشت استان کرمانشاه طی سال های ۸۷-۱۳۸۵*

بابک ایزدی^۱; مالک کنانی^{۱*}; صدیقه خزاعی^۱; سید حمید مدنی^۱

چکیده

وجود مقاومت دارویی، مشکلاتی را در امر درمان سل پدید آورده است. آگاهی از وجود مقاومت دارویی مبتلایان به سل در کرمانشاه می تواند در درمان و اجرای طرح درمان تحت نظارت مستقیم (DOTS) به طور مداوم مؤثر باشد. در این مطالعه، آزمایش TB-PCR و مقاومت آنتی بیوتیکی بر روی تعدادی از سوش های موجود در آزمایشگاه سل مرکز بیماری های ریوی کرمانشاه انجام شد. TB-PCR ۸۹/۷ درصد از سوش ها مثبت بود. ۵۷/۱ درصد به ایزوپیازید $1\mu\text{g}/\text{ml}$ و ۴۶/۲ درصد به ریفامپین $1\mu\text{g}/\text{ml}$ مقاوم بودند. این مطالعه میزان بالایی از مقاومت دارویی را نشان می دهد. به همین دلیل پیشنهاد می گردد برای همه موارد، توبرکلوزیس آنتی بیوگرام انجام شود.

کلیدواژه ها: توبرکلوزیس، مقاومت دارویی

پذیرش: ۱۳۸۹/۵/۱۲

دریافت: ۱۳۸۹/۳/۱۰

۱. گروه پاتولوژی، مرکز تحقیقات پاتولوژی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

* عهده دار مکاتبات: کرمانشاه-بلوار زکریای رازی-آ.د.امام رضا(ع)-مرکز تحقیقات پاتولوژی مولکولی پاتولوژی، تلفن: ۰۸۳۱-۴۲۸۳۳۹۲

E-mail: malek_kan@yahoo.com

* این مقاله برگرفته از پایان نامه مقطع دستیاری آقای مالک کنانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد.

ایزوپیازید و ریفامپین تعریف می گردد مشکل بزرگی در کترول سل محسوب می گردد (۴).

در حال حاضر تعیین میزان MDR و ارزیابی روند گسترش و کترول آن به عنوان یکی از معیارهای اساسی کیفیت و موفقیت برنامه های کترول سل در کشورها به شمار می رود (۴). لذا با توجه به شیوع متفاوت مقاومت در مناطق مختلف جغرافیایی (۵) و اهمیت بررسی وضعیت مقاومت دارویی مایکوباتریوم توبرکلوزیس، این مطالعه به بررسی مواردی از مقاومت دارویی ایزوله های کلینیکی این باکتری در کرمانشاه می پردازد.

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی، بر روی تعدادی از نمونه های موجود در مرکز مبارزه با بیماری های ریوی استان کرمانشاه طی سال های ۸۷-۱۳۸۵ انجام شد. باکتری های

سل یکی از قدیمی ترین بیماری های شناخته شده انسانی و یکی از شایع ترین علل عمدۀ مرگ و میر، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است (۱). امروزه علی رغم کشف عامل بیماری، واکسن و داروهای بسیار مؤثر برای درمان آن، کما کان یکی از معضلهای جدی بهداشتی در جهان به شمار می آید (۲). در سال های اخیر تغییرات جمعیتی، پوشش نامناسب، کترول ناموفق بیماری، وجود اپیدمی ایدز، عدم توازن در آمدها و گسترش فقر در کنار بروز فشارهای روانی و فیزیکی در برخی کشورها به خصوص کشورهای آسیایی و آفریقایی، موجب شده که توجه جامعه جهانی مجدداً به سل معطوف گردد (۳). امروزه مقاومت دارویی به عنوان یک مشکل جدی در مقابل کترول سل در اغلب کشورها مطرح است (۲). خطر سل مقاوم چند دارویی (MDR-TB) که به عنوان مقاومت باکتری به حداقل

جدول ۱- بررسی فراوانی مقاومت موارد کشت مایکوباکتریوم

تویرکلوزیس به ایزوپنیازید و ریفامپین ۱µg/ml			جمع
مقاآم	حرس	ایزوپنیازید ۱µg/ml	ریفامپین
6 (42/8%)	1 (7/1%)	5 (35/7%)	مقاآم
8 (57/1%)	5 (35/7%)	3 (21/4%)	حرس
14 (100)	6 (42/8%)	8 (57/1%)	جمع

بحث

امروزه مقاومت دارویی به عنوان یک مشکل جدی در مقابل برنامه کنترل سل در اغلب کشورها مطرح است (۲). این مقاومت، پیوسته در حال افزایش است و با توجه به محدود بودن داروهای مؤثر، وجود این مقاومت‌ها به عنوان تهدیدی در برنامه کنترل سل محسوب می‌شود. به رغم این که ایزوپنیازید به عنوان مؤثرترین دارو برای از میان بردن باسیل سل مطرح است مقاومت به این دارو به سهولت ایجاد می‌گردد (۷). یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد میزان مقاومت کلی تک دارویی ۶۴ درصد بوده است که با مطالعات صورت گرفته در کاشان ۹/۴۷ درصد (۱)، استانبول ترکیه ۴۴ درصد (۵)، لبنان ۲۶ درصد (۸) و همچنین با میزان مقاومت کلی در فیلیپین ۵/۴۸ درصد، موریتانی ۶/۴۶ درصد و کره ۸/۴۷-۲۷ درصد قابل مقایسه و کمی بیشتر است (۲). همچنین مطالعه ما نشان داد که میزان مقاومت به ایزوپنیازید ۱/۵۷ درصد است. در حالی که این میزان در مطالعات کاشان ۱/۱۸ درصد (۱) و در مطالعات دیگر در هند ۹/۱۶ درصد، هائیتی ۲/۱۲ درصد، کنیا ۲/۱۰ درصد، آرژانتین ۶/۱ درصد و در انگلستان ۱/۲ درصد بوده است (۲) که اختلاف چشمگیری با مطالعه ما دارد. همچنین مطالعه حاضر مقاومت به ریفامپین را ۹/۴۲ درصد نشان داد که مشابه

Middlebrook 7H10 Agar Base موجود در این مرکز بر روی محیط کشت ۵ درصد مکمل غذایی OADC (ALFA CHEM) و ۵/۰۶ درصد گلیسروول پاساژ مجدد و در دمای ۳۷°C به مدت ۴-۱ هفته انکوبه شدند. پس از رشد باکتری‌ها با استفاده از کیت (CinnaGen-Inc High yield DNA purificationKit) DNPTM آن‌ها استخراج شد. برای اطمینان از استخراج DNA، جذب نوری DNA در ۲۶۰ نانومتر با دستگاه اسپکتروفوتومتری خوانده شد و سپس با استفاده از کیت (CinnaGen-Inc Mycobacterium tuberculosis PCRD detection kit) وجود باکتری مایکوباکتریوم تویرکلوزیس مورد تأیید PCR گرفت. بر روی باکتری‌هایی که جواب آزمایش PCR آن‌ها مثبت بود، تست حساسیت آنتی‌بیوتیکی به روش proportion method برای آنتی‌بیوتیک‌های ایزوپنیازید ۱µg/ml و ایزوپنیازید ۰/۲µg/ml و ریفامپین ۱µg/ml (Sigma) انجام شد (۶).

یافته‌ها

در ۲۹ مورد از سوش‌های نگهداری شده در آزمایشگاه سل مرکز بیماری‌های ریوی پس از کشت مجدد، رشد باسیل دیده شد. از این تعداد ۱۶ مورد (۴۴/۸٪) زن و ۱۳ مورد (۵۵/۲٪) بیماران ۳-۸۰ سال بود. با انجام تست PCR مشخص شد که ۲۹/۲۶ مورد (۸۹/۷٪) از نمونه‌ها مربوط به سوش تویرکلوزیس است. برای آن‌ها به روش Proportional مورد نتایج به دست آمده آنتی‌بیوگرام قابل بررسی بود. از این تعداد ۸ مورد (۵۷/۱٪) به ایزوپنیازید با غلظت ۰/۲µg/ml و ۱۲ مورد (۸۵/۷٪) به غلظت ۱µg/ml بود. همچنین مشخص گردید که میزان مقاومت به ریفامپین ۹/۴۲ درصد (۶ مورد) بوده است و پنج مورد از موارد مقاوم به ریفامپین به INH نیز مقاوم بودند (جدول ۱).

اطلاعاتی در مورد Attack rate سل در استان، بهویژه در افراد HIV⁺ و IVDU وجود ندارد. ضمناً این که این افراد ممکن است مرتب به زندان رفت و آمد بکنند و این امر می‌تواند بالقوه خطر افزایش مقاومت دارویی را افزایش دهد.

نتیجه‌گیری

هرچند حجم نمونه و روش نمونه‌گیری در مطالعه حاضر ممکن است برای اظهارنظر و تعیین دادن نتایج کافی نباشد اما این نتایج ممکن است برای مسئولین زندان‌ها، مسئولین بهداشتی و پزشکانی که در این حیطه کار می‌کنند هشداردهنده باشد. پیشنهاد می‌گردد از یکسو همه موارد موجود و کشف شده در آینده در استان با توجه به نکات ذکر شده در بحث مقاله جهت کشت و آنتی‌بیوگرام برسی گردد و از سوی دیگر بر حسن اجرای طرح DOTS نظارت دقیق‌تری اعمال گردد.

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان این مقاله از کلیه پرسنل مرکز مبارزه با بیماری‌های ریوی استان کرمانشاه، به خصوص سرکارخانم زیلا هدایتی قدردانی و تشکر می‌نمایند.

References

- Moniri R, Rasa SH, Mousavi SGH. [A survey on type of mycobacterium and drug resistance rates of mycobacterium tuberculosis strains in Kashan (Persian)]. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services 2001; 9(1): 67-70.
- Cohn DL, Bustreo F, Ravaglione MC. Drug resistant tuberculosis: review of the worldwide situation and the WHO/IVATLD global surveillance project. International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Clin Infect Dis 1997; 24 (suppl 1): S121-30.
- Bennet S, Lienhardt C, Bah-Sow O, Gustafson P, Manneh K, Del Prete G, et al. Investigation of environmental and host-related risk factors for tuberculosis in Africa. Am J Epidemiol 2002; 155(11): 1074.
- Liu CE, Chen CH, Hsiao JH, Young TG, Tsay RW, Fung CP. Drug resistance of Mycobacterium tuberculosis complex in central Taiwan. J Microbiol Immunol Infect 2004; 37(5): 295-300.
- Bengisum JS, Karnak D, Palabiyikoglu I, Saygun N. Mycobacterium tuberculosis isolated drug resistance in Turkey 1976-79. Scand J Infec Dis 2000; 32(5): 507-10.
- Clinical and Laboratory Standards Institute (NCCLS). Susceptibility Testing of mycobacteria, Nocardiae, and other Aerobic Actinomycetes; Approved Standard 2003; 23(18): 5-15.
- Tavakoli A, Mohajeri P, Shojai H, Yazdani R, Moghim Sh, Nasr Isfahani B. [Study of mutations associated with Isoniazid-resistance in clinical mycobacterium tuberculosis strains, Tehran and Isfahan province tuberculosis centers by PCR and RFLP-based technique(2004-5) (Persian)]. Behbood Journal 2007; 11(3): 266-76.
- Hamez MM, Araj GF. Drug resistance among mycobacterium tuberculosis isolated in Lebanon. Int J Tuber Lung Dis 1997; 1(4): 1314-8.
- Karamat KA, Rafi S, Abasi SA. Drug resistance in mycobacterium tuberculosis: a four years experience. J Pak Med Assoc 1999; 49(11): 262-5.
- Mardani M. Drug-resistant tuberclusis: a world-wide problem. Research in Medicine 2007; 31(4): 299-301.

مطالعه کاشان (1) (%43/6) است. این مقاومت در پاکستان 24 درصد (9)، لبنان 12/5 درصد (8) و در ترکیه 6/9 درصد (5) گزارش شده است. مطالعه حاضر مقدار مقاومت دودارویی (MDR) را 5 مورد نشان داد. لازم به ذکر است که مردانی در سال 1386 نشان داد 113 مورد سل MDR-TB در ایران وجود دارد (10) که به نظر می‌رسد با آمار پنج مورد برای استان کرمانشاه همخوانی داشته باشد.

آمار مقاومت دارویی در مطالعه حاضر بالا بود که ممکن است بدلاًیل متعددی مانند وجود موارد HIV⁺ در استان کرمانشاه (طبق اطلاعات منتشرنشده تعداد 360 نفر بیمار HIV⁺ به TB مبتلا هستند) و احتمال مقاومت دارویی در آن‌ها باشد. لازم به ذکر است مشخص نشد که چه تعداد از موارد موردمطالعه HIV⁺ بودند. همچنین وجود موارد IVDU (Intravenous drug user) و مسایل بیکاری، بی‌خانمانی، طرد شدن، بالا بودن موارد TB در آن‌ها و احتمال عدم مصرف داروها به‌طور کامل می‌تواند منجر به مقاومت شود. اطلاعی در دسترس نیست که چه تعداد از افراد موردمطالعه ما، IVDU بودند. علاوه بر آن