

## اثر ABA روی رنگدانه ها و دلتا-۹-تراهیدروکانابینول گیاه شاهدانه (*Cannabis sativa*)

### در مرحله گلدهی

حکیمه منصوری\* و زهرا اسرار

کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی

تاریخ پذیرش: ۸۹/۶/۲ تاریخ دریافت: ۸۶/۷/۲۷

چکیده

در این مطالعه اثر ABA روی مقدار کلروفیل، کاروتونوئید، آنتوسیانین و فلاونوئیدهای گیاهان نر و ماده شاهدانه بررسی گردید. گیاهان با محلولهای ABA (۱ و ۱۰ mg/l) و آب مقطر به عنوان شاهد محلول پاشی شدند. نتایج نشان داد که مقدار کلروفیل b a، و کل در گیاهان ماده تیمار شده با ۱۰ mg/l ABA کاهش یافت. گیاهان نر فقط در ۱۰ mg/l ABA کاهش مقدار کلروفیل a، و کل در گیاهان ماده تیمار شده با ۱۰ mg/l ABA کاهش یافت. گیاهان نر نداشت ولی در گیاه ماده باعث کاهش غلظت کاروتونوئیدها را نشان دادند. تیمار ABA تأثیری در مقدار کاروتونوئیدها در گیاه نر نداشت ولی در گیاه ماده باعث کاهش غلظت کاروتونوئیدها شد. غلظت آنتوسیانین در گیاهان نر در ۱۰ mg/l ABA کاهش یافت در حالی که مقدار آنتوسیانین گیاهان ماده در هر دو سطح ABA افزایش یافت. در هر دو جنس نر و ماده، فلاونوئیدها با ماکریم جذب ۲۷۰ nm در تیمار ۱ mg/l ABA افزایش نشان دادند و فلاونوئیدها با ماکریم جذب ۳۳۰ nm بدون تغییر بودند. فلاونوئیدهای با ماکریم جذب ۳۰۰ nm در گیاهان نر در ABA ۱ mg/L و در گیاهان ماده در تیمار ۱ mg/l ABA افزایش نشان داد. مقدار دلتا-۹-تراهیدروکانابینول در گیاهان تیمار شده با ABA افزایش یافت. این مطالعه نشان داد گیاه نر و ماده شاهدانه به صورت متفاوتی به ABA پاسخ می‌دهند. ABA می‌تواند متابولیتهای ثانویه ای مانند آنتوسیانین، فلاونوئیدها و تراهیدروکانابینول (THC) را افزایش دهد و باعث کاهش متابولیتهای اولیه مانند کلروفیل و کاروتونوئیدها در گیاه شاهدانه شود.

**واژه های کلیدی:** آنتوسیانین، فلاونوئیدها، کانابینوئیدها

\* نویسنده مسئول، تلفن: ۰۹۱۳۲۴۳۱۵۶۸، پست الکترونیکی: h\_mansuori@yahoo.com

### مقدمه

از گیاه شاهدانه استفاده های زیادی در زمینه دارویی می‌شود. کانابینوئیدها ترکیبات ترپنوفولیک هستند که تنها در جنس شاهدانه شناسایی شده‌اند. بیش از شصت کانابینوئید در گیاه شاهدانه شناسایی شده است. از کانابینوئیدهای اصلی می‌توان کانابیجرول (CBG)، دلتا-۹-تراهیدروکانابینول (THC)، کانابینول (CBN)، کانابیدیول (CBD) و کانابیکروم (CBC) را نام برد (۳۰). از بین این ترکیبات بیشترین اثرات دارویی شناخته شده مربوط به THC می‌باشد (۴، ۸ و ۹). علاوه بر استفاده های دارویی، از گیاه شاهدانه در صنعت نساجی برای تهیه الیاف

گیاه شاهدانه (*Cannabis sativa* L.) گیاهی است دو پایه و یک ساله از راسته اورتیکال، خانواده کانابیاسه. این گیاه برگهای پنجه ای با پنج تا هفت برگچه دندانه دارد (۳۰). شاهدانه یک کارخانه واقعی تولید کننده متابولیتهای ثانویه است. آلکانها، ترکیبات نیتروژن دار (آمینها، نمکهای آمونیوم، آلکالوئیدهای مشتق شده از اسپرمیدین) فلاونوئیدها، اسپیروایندان فنولیکها و دی هیدرواستیلن ها در گیاه شناسایی شده است. ترکیباتی شبیه فریدلین، اپی فریدلینول، بتاسیتواسترول، کارون و دی هیدروکارون از ریشه ها جدا سازی شده است (۲۲).

تاریکی) رشد کردند و هر هفته یک بار با محلول غذایی لانگ اشتاین آبیاری شدند. پس از گلدهی گیاهان نر و ماده با محلولهای ABA ۰، ۱، ۱۰ mg/l به طور کامل محلول پاشی شدند. به طوری که قطرات محلول از برگها شروع به چکیدن کرد. این تیمار سه بار و به فاصله ۲۴ ساعت تکرار شد. یک روز پس از تیماردهی برگهای گیاهان جهت بررسیهای بیوشیمیایی با استفاده از نیتروژن مایع منجمد شد. جهت اندازه گیری مقدار THC، برگها و گلها در دمای اتاق به مدت دو روز خشک شدند.

Lichtenthaler کلروفیل a و b و کاروتونوئیدها با روش اندازه گیری شد (۱۶). برای اندازه گیری آنتوسیانین با روش Krizek ۰/۱ گرم بافت گیاهی با ۱۰ ml متانول اسیدی (۹۹ ml) مatanول با ۱ ml HCl عصاره گیری شد (۱۴). عصاره به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۲۵ درجه در تاریکی نگهداری شد. پس از سانتریفیوژ جذب نمونه ها در ۵۵۰ nm خوانده شد و با استفاده از ضربی خاموشی Wagner مقدار آنتوسیانین محاسبه گردید (۳۲). برای اندازه گیری فلاونوئید ۰/۱ گرم بافت گیاهی با ۱۰ ml اتانول اسیدی (۹۹ ml) اتانول و ۱ ml اسید استیک) عصاره گیری شد. عصاره ها به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۸۰ درجه نگهداری شدند. پس از سانتریفیوژ جذب نمونه ها در طول موجهای ۲۷۰، ۳۰۰ و ۳۳۰ nm خوانده شد.

برای عصاره گیری THC، ۵۰ میلی گرم بافت خشک برگ یا گل با ۱ ml اکلروفرم به مدت ۱۵ دقیقه سانتریفیوژ شد. بعد از صاف کردن عصاره، حلال تبخیر شد و با قیمانده در ۰/۵ مтанول حل شد. اندازه گیری کمی THC با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع و دستگاه Ultra-Liquid Chromatography (UPLC) ساخت شرکت Waters با آشکارساز PDA و ستون UPLC C<sub>18</sub> (2.1 mm × 150 mm) BEH با ذراتی به قطر ۱/۷ میکرومتر انجام شد. شب استونیتیل- آب با بافر ۰/۰۵% TFA درصد ۳۰٪:۷۰٪ تا ۱۰۰٪ در ۵ دقیقه،

طبیعی استفاده می شود. دانه شاهدانه و همچنین روغن آن به دلیل داشتن مقادیر قابل توجه لیپیدهای امگا ۳ مورد توجه متخصصین علم تغذیه قرار گرفته است (۱۵).


جنس نر و ماده شاهدانه مخصوصاً در زمان گلدهی خصوصیات رشدی متفاوتی نشان می دهند. گیاه ماده ضخیم تر، کوتاه تر و سیکل زندگی طولانی تری نسبت به گیاه نر دارد (۱۸). استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی باعث تغییر بیان جنسیت در گیاه بالغ شاهدانه می شود. به طوری که جیبرلین باعث تشکیل گیاه نر و آبسیسک اسید تشکیل گیاه ماده یا گلهای دو جنسی را تحریک می کند (۳). وجود بعضی اختلافات در خصوصیات بیوشیمیایی و مقدار متابولیتهای ثانویه بین جنس نر و ماده گیاه شاهدانه به اثبات رسیده است (۲۰ و ۲۸).

از طرفی هورمون ABA به عنوان یکی از تنظیم کننده های رشد گیاهی معروفی شده است که در فرآیندهای مختلف رشد و نمو گیاه از جمله بلوغ جنبین، نمو و جوانه زنی دانه، تقسیم و طویل شدن سلولی، باز و بسته شدن روزنه ها، نمو ریشه و پاسخ به تنشهای محیطی مانند خشکی، شوری، سرما، حمله پاتوژن و اشعه ماورائی بنفش نقش دارد (۲۳). در تحقیق حاضر به دلیل اهمیت دارویی و صنعتی گیاه شاهدانه اثر ABA روی تغییرات مقدار کلروفیل، کاروتونوئید، آنتوسیانین، فلاونوئیدها و ترکیب دارویی THC در این گیاه مورد بررسی قرار گرفت. در ضمن جنس نر و ماده شاهدانه از نظر تفاوت در مقدار این ترکیبات مقایسه شد.

## مواد و روشها

**کشت گیاه:** ۵ دانه شاهدانه در گلدانهای به قطر ۱۰ cm کشت داده شد. پس از رویش تعداد گیاهان به یک گیاه در هر گلدان کاهش داده شد. یک ماه پس از رویش، گیاهان به گلدانهای حاوی خاک (لوم، ماسه و گیاخاک ۱:۲:۱) منتقل شدند. گیاهان در فیتوترون (۱۶ ساعت نور، ۸ ساعت

۱۰۰: در ۱ دقیقه، برگشت به ۷۰:۳۰ در ۱ دقیقه با سرعت جریان  $4 \text{ ml min}^{-1}$ ، طول موج ۲۳۰ nm و حجم تزریق



شکل ۱- مقدار کلروفیل **a,b**,**total** در (الف) گیاه نر و (ب) گیاه ماده شاهدانه تحت تیمار با ABA (هر عدد میانگین سه تکرار و علائم روی ستونها خطای معیار SE را نشان می‌دهد. حروف متفاوت نشان دهنده تفاوت معنی دار با حدود اطمینان ۹۵٪ بین تیمارها است.

ماده مقدار بیشتری آنتوسبیانین داشتند. مقدار آنتوسبیانین در گیاهان نر تیمار شده با ۱۰ mg/l ABA کاهش یافت اما در گیاهان ماده در تیمارهای ۱ و ۱۰ mg/l ABA افزایش یافت (شکل ۳). نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در مقدار فلاونوئیدها بین جنس نر و ماده این گیاه وجود ندارد. در هر دو جنس (نر و ماده) فلاونوئیدهایی که در طول موج ۲۷۰ ماکزیمم جذب دارند در تیمار ۱۰ mg/l ABA افزایش نشان داد (شکل ۴). فلاونوئیدهایی که در طول موج ۳۰۰ ماکزیمم جذب دارند در گیاه نر در ۱۰ mg/l ABA و در گیاه ماده در تیمار ۱۰ mg/l ABA افزایش نشان داد. جذب فلاونوئیدها در طول موج ۳۳۰ در گیاه نر و ماده تفاوت معنی داری با گیاهان کنترل نشان نداد.

**تجزیه آماری:** آزمایش به صورت طرح کامل تصادفی با سه سطح هورمون آبسیسیک اسید (۰، ۱۰ و ۱۰ mg/l ABA)، سه تکرار و به صورت جداگانه روی گیاهان نر و ماده انجام شد. تجزیه واریانس داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شد و میانگینها از طریق آزمون دانکن در سطح  $P < 0.05$  مقایسه شد.

## نتایج


گیاهان نر و ماده از نظر میزان کلروفیل تفاوتی نداشتند. مقدار کلروفیل **a,b** و کل در گیاه نر در تیمار ۱۰ mg/l ABA کاهش معنی داری در مقایسه با گیاهان کنترل نشان داد (شکل ۱ الف). هر دو سطح تیمار ABA باعث کاهش مقدار کلروفیل در گیاهان شد ولی بین دو سطح تیمار اختلاف معنی دار مشاهده نشد (شکل ۱ ب). میزان کاروتوئید در گیاهان ماده بیشتر از نر بود. تیمار ABA تأثیری در مقدار کاروتوئیدهای گیاهان نر نداشت، ولی در هر دو سطح باعث کاهش مقدار کاروتوئیدها در گیاهان ماده شد (شکل ۲). گیاهان نر در مقایسه با گیاهان

دارند (شکل ۵). مقدار THC در گلهای ماده تقریباً دو برابر گلهای نر بود. در هر جنس مقدار THC در گلهای تقریباً دو برابر برگها بود. تیمار ABA باعث افزایش معنی دار مقدار THC در برگها و گلهای هر دو جنس شد. تیمار ABA در افزایش مقدار THC برگهای گیاهان ماده مؤثرتر از گلهای بود.

### بحث


در مطالعه حاضر تیمار ABA باعث کاهش کلروفیل شد. استفاده از ABA آگزوژن در جو، گندم و سویا نیز باعث کاهش کلروفیل شده است (۵، ۲۴، ۲۹). کاهش کلروفیل که در تیمار ABA مشاهده می‌شود می‌تواند ناشی از تأثیر سوء هورمون بر ماده سازی گیاه باشد (۳۱). اثرات بازدارندگی ABA روی انتقال الکترون، کاهش فعالیت روپیسکو و افزایش سرعت تنفس به اثبات رسیده است. تمام اثرات فوق (از طریق اختلال در انتقال انرژی یا افزایش تولید اکسیژن) می‌تواند باعث افزایش تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن شود (۱۷). Synkova نیز بیان کرده است که ABA باعث افزایش مقدار ROS در گیاه می‌شود (۲۷). افزایش ROS باعث آسیب دیدن بعضی ترکیبات از جمله کلروفیلها می‌گردد.

در مطالعه حاضر الگوی تغییر کاروتونئیدها در گیاه ماده مشابه تغییر کلروفیل بود. یعنی کاهش کلروفیل با کاهش کاروتونئید همراه بود. در گیاه نر تفاوت معنی داری بین مقدار کاروتونئید گیاهان تیمار شده و گیاهان کنترل وجود نداشت. در توافق با نتایج به دست آمده در این تحقیق تیمار با ABA باعث کاهش بتاکاروتون در *Helianthus annus* شده است (۱۳).




شکل ۲- مقدار کاروتونئید در برگهای گیاه نر و ماده شاهدانه تحت تیمار با ABA

تاکنون با وجود اهمیت گیاه شاهدانه به عنوان یک گیاه دارویی تحقیق علمی در مورد مقدار ماده مؤثره گیاه شاهدانه بومی ایران انجام نشده است. در این بررسی مقدار CBD و THC مورد بررسی قرار گرفت. برگها و گلهای گیاهان نر و ماده در دوره گلدهی مقدار ناچیزی CBD داشتند به همین دلیل نتایج مربوط به CBD در این تحقیق آورده نشده است.




شکل ۳- مقدار آنتوسیانین در برگهای گیاه نر و ماده شاهدانه تحت تیمار با ABA

جدای از تیمار ABA، مقایسه بین گیاهان نر و ماده نشان داد که گیاهان ماده مخصوصاً گلهای ماده مقدار بیشتری



شکل ۴- میزان جذب فلاؤنیدها در طول موجهای ۲۷۰، ۳۰۰، ۳۳۰ در (الف) گیاه نر و (ب) گیاه ماده شاهدانه تحت تیمار با ABA



شکل ۵- مقدار THC در (الف) برگها و (ب) گلهای گیاهان نر و ماده شاهدانه تحت تیمار با ABA

دو جنس نر و ماده گیاه شاهدانه از نظر محتوای آنتوسیانین پاسخ متفاوتی به تیمار ABA نشان دادند. گیاه ماده افزایش گیاه نر کاهش نشان داد. تجمع آنتوسیانینها در برگها، ساقه ها و ریشه ها به وسیله عوامل محیطی مختلف مثل درجه حرارت، نور، عناصر غذایی و تشاهیابی مانند زخم، حمله پاتوژن و خشکی تحريك می شود. بیان ژنهای مسیر بیوستز آنتوسیانین و تجمع آن در بین بافتها، اندامها و گونه های گیاهی مختلف الگوهای متفاوتی را نشان می دهد (۱۹). لذا این امکان وجود دارد که گیاه نر شاهدانه به عنوان مثال آنتوسیانین را در گلها ذخیره کند. بیوستز آنتوسیانین در میوه توت فرنگی تحت تیمار ABA افزایش یافت و این تغییر هماهنگ بود با افزایش اتیلن، ترکیبات فنلی و فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) که آنزیم

یکی از دلایل کاهش مقدار کاروتونئیدها می تواند افزایش تجزیه این ترکیبات در اثر تیمار ABA باشد. همان طور که ثابت شده است، ABA باعث افزایش سطح رونویسی از ژن *CCD* می شود. این ژن بیان کننده آنزیم دخیل در کاتابولیسم کاروتونئیدهاست (۲). از طرفی بعضی از محققان بیان کردند که تیمار ABA باعث افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و مقدار آنتی اکسیدانهای غیر آنزیمی از جمله کاروتونئیدها می شود (۱۰ و ۳۳). با توجه به نتایج به دست آمده از آزمایشات مختلف می توان فرض کرد که احتمالاً ABA در گیاهان مختلف یا حتی در ارگانهای متفاوت باعث تحريك سیستم آنتی اکسیدانی خاصی شود.

CBD که توسط کارل و همکارانش (۱۲) به عنوان معیاری جهت تعیین نوع دارویی و فیبری این گیاه تعریف شده است، شاهدانه بومی ایران با نسبت THC/CBD بالاتر از یک جزء گروه دارویی به شمار می‌آید. معمولاً THC به مقدار کم در برگهای تازه گیاه یافت می‌شود و این ترکیب بیشتر به صورت ترکیب اسیدی تراهیدروکانابینولیک اسید (THCA) وجود دارد که به وسیله دکربوکسیلاسیون غیر آنزیمی در هنگام خشک کردن یا ذخیره کردن بافت‌های گیاهی به THC تبدیل می‌شود (۶ و ۲۵).

مقدار THC در گلها و برگهای گیاهان ماده بیش از گیاهان نر بود. البته این تفاوت در مورد برگها ناچیز و در مورد گلها زیاد بود. تیمار ABA باعث افزایش مقدار THC در برگها و گلها شد. چون کلروفیلها و THC هر دو مسیری سنتزی مشترکی دارند ممکن است قسمتی از افزایش مقدار THC به دلیل کاهش مقدار کلروفیل تحت تأثیر تیمار ABA باشد.

### نتیجه گیری

مطالعه حاضر اطلاعاتی را درباره تأثیر ABA روی مقدار پیگمانها و THC در گیاه دو پایه *Cannabis sativa* و تفاوت‌هایی که بین گیاه نر و ماده در این مورد وجود دارد ارائه می‌دهد. تحقیق بیشتر در این زمینه می‌تواند به افزایش شناخت از فیزیولوژی این گیاه دو پایه، نقش هورمونهای گیاهی در تفاوت بین جنسها و استفاده از خواص دارویی این گیاه کمک کند.

**تشکر و قدردانی:** بدین وسیله از پروفسور Jan Szopa دانشگاه وراسلاو لهستان (Wroclaw university) که امکانات لازم جهت اندازه گیری THC را فراهم نمودند تشکر و قدردانی می‌گردد.

اصلی در سنتز ترکیبات فلئی می‌باشد. اتیلن اگزوژن باعث تحریک فعالیت PAL می‌شود. بنابراین اثرات تیمار ABA می‌تواند به دلیل تحریک سنتز اتیلن باشد (۱۱). همچنین اثرات بازدارندگی ABA روی سنتز آنتوسیانین در سلولهای *Raphanus sativus* کشت شده هویج (۲۱) و گیاه‌های چالکون سنتاز القاء شده به وسیله جیرلین و ایجاد رنگدانه را کاهش داده است. تفاوت‌هایی که بین اثرات تنظیم کننده های رشد روی سنتز آنتوسیانین وجود دارد ممکن است به خاطر اختلاف در حالت نموی و فیزیولوژیکی سلولها به علاوه نوع گیاه مورد استفاده باشد (۱۹).

فلاؤنونئیدهای طول موجهای ۲۷۰ و ۳۰۰ در غلاظت ۱ mg/l ABA در جنس نر افزایش نشان داد. در جنس ماده نیز افزایش جذب فلاؤنونئیدها در هر دو غلاظت ABA مشاهده شد. افزایش مقدار فلاؤنونئیدها می‌تواند بدلیل افزایش فعالیت PAL باشد. از طرفی همان طور که قبل از ذکر شد اتیلن اگزوژن باعث افزایش فعالیت PAL می‌شود و اثر ABA روی فلاؤنونئید می‌تواند به صورت غیر مستقیم از طریق تحریک سنتز اتیلن اعمال شود. از آنجاکه غلط‌های متفاوت ABA می‌تواند باعث تحریک یا بازدارندگی سنتز اتیلن شود (۲۶)، ممکن است ABA در غلاظت کم (۱ mg/l) باعث افزایش سنتز اتیلن در نتیجه افزایش فعالیت PAL و افزایش فلاؤنونئیدها شده باشد و در غلاظت بالا (۱۰ mg/l) باعث بازدارندگی سنتز اتیلن، PAL و فلاؤنونئیدها شده باشد. در میوه گریپ فروت استفاده از ABA اثرات کمی در سطح فلاؤنونئیدهای داشته است (۱).

این مطالعه اولین گزارش در مورد بررسی گیاه شاهدانه بومی ایران از نظر مقدار THC و اثر هورمونهای گیاهی روی تغییر مقدار این ترکیب در گیاه است. نتایج به دست آمده نشان داد با توجه به نسبت بین مقادیر THC و

### منابع

- Berhow MA. 2000. Effects of early plant growth regulator treatments on flavonoid levels in grapefruit. Plant Growth Regulation. 30: 225–232.

2. Cao Y, Guo XL, Zhang Q, Cao ZY, Zhao YX and Zhang H. 2005. Isolation and characterization of carotenoid cleavage dioxygenase gene in halophyte *Suaeda salsa*. Plant Growth Regulation. 46:61-67.
3. Chailakhyan M KH and Khryanni V N. 1978. Influence of growth regulators absorbed by the root on sex expression in hemp plants. Planta. 2:181-184.
4. Croxford JL and Yamamura T. 2005. Cannabinoids and the immune system: Potential for the treatment of inflammatory diseases? Journal of Neuroimmunology. 166:3-18.
5. Cuello J, Quiles MJ, Rosauro J and Sabate B. 1995. Effects of growth regulators and light on chloroplasts NAD(P)H dehydrogenase activities of senescent barley leaves. Plant Growth Regulation. 17: 225-232.
6. Fellermeier M., Eisenreich W., Bacher A. and Zenk M.H. 2001 Biosynthesis of Cannabinoids: Incorporation experiments with <sup>13</sup> C-labeled glucoses. European Journal Biochemistry. 268: 1596-1604.
7. Guruprasad K, Laloraya L (1980) Effect of pigment precursors on the inhibition of anthocyanin biosynthesis. Plant Science Letters 19:73-79
8. Guzman M. 2003. Cannabinoids: Potential anticancer agents. Nature Reviews. 3:745-755.
9. Howlett AC, Breivogel CS, Childers SR, Deadwyler SA, Hampson RE and Porrino LY. 2004. Cannabinoid physiology and pharmacology: 30 years of progress. Neuropharmacology. 47:345-358.
10. Jiang M and Zhang J. 2001. Involvement of plasma membrane NADPH oxidase in abscisic acid- and water stress-induced antioxidant defense in leaves of maize seedlings. Planta. 215: 1022-1030.
11. Jiang Y and Joyce DC. 2003. ABA effects on ethylene production, PAL activity, anthocyanin and phenolic contents of strawberry fruit. Plant Growth Regulation. 39: 171-174.
12. Karl W, Mahlberg H and Mahlberg PG. 2004 A chemotaxonomic analysis of cannabinoid variation in cannabis (Cannabaceae). American Journal of Botany 91(6): 966-975.
13. Keleo Y and Ünyayar S. 2004. Responses of antioxidant defense system of *Helianthus annuus* to abscisic acid treatment under drought and water logging. Acta Physiologae Plantarum. 26(2): 149-156.
14. Krizek DT, Britz SJ and Mirecki RM .1998. Inhibitory effect of ambient level of solar UV-A and UV-B radiation on growth of CV. New Red lettuce. Physiologia plantarum.103:1-7.
15. Leizer C, Ribicky D, Poulev A, Dushenkov S and Raskin. 2000. The composition of hemp seed oil. Journal of Nutraceuticals Functional and Medical Foods. 2(4):35-55.
16. Lichtenthaler HK.1987.Chlorophylls and Carenoids:pigments of photosynthetic biomembranes. Methods in Enzymology. 148: 350-382.
17. Maslenkova I, Toncheva S and Zeinalov Y.1995. Effect of abscisic acid and jasmonic acid (or JA-ME) on the photosynthetic electron transport and oxygen evolving reactions in pea plant. Bulgarian Journal Plant Physiology. 21(4): 48-55.
18. Mcphee HC. 1924. The influence of environment on sex in Hemp, cannabis sativa. Journal of Agricultural Research. 11:1067-1080.
19. Nagira Y, Ikegami K, Koshiba T and Ozeki Y.2006.Effect of ABA upon anthocyanin synthesis in regenerated torenia shoots. Journal of Plant Research .119:137-144.
20. Ohlsson A, Abou-Chaar CI, Agurell S, Nilsson IM, Olofsson K and Sandberg F. 1971.Cannabinoid constituents of male and female Cannabis sativa. UN Bulletin on Narcotics. 23: 29-32.
21. Ozeki Y, Komamine A (1986) Effects of growth regulators on induction of anthocyanin synthesis in carrot suspension cultures. Plant Cell
22. Pate D W. 1994. Chemical ecology of cannabis. Journal of the International Hemp Association. 2:29 32-37.
23. Razem F A, Baron K and Hill RD .2006. Turning on gibberellin and abscisic acid signaling. Current Opinion in Plant Biology.9:454-459.
24. Samet J.S., Thomas R. and Sinclair T.R. 1980. Leaf senescence and abscisic acid in leaves of field-grown soybean. Plant Physiol. 66:1164-1168.
25. Sirikantaramas S., Morimoto S., Shoyama Y., Ishikawa Y., Yoshiko Y., Shoyama Y. et al. 2004. The gene controlling marijuana psychoactivity molecular cloning and heterologous expression of tetrahydrocannabinolic acid synthase from cannabis sativa L. Journal of Biological Chemistry. 37976-39774.

26. Sharp RE and Noble ME .2002.ABA, ethylene, and the control of shoot and root growth under water stress. *Journal of Experimental Botany.* 53(366):33-37.
27. Synkova H., Pospisilova J .2002. Invitro precultivation of tobacco affects the response of antioxidative enzymes to exvitro acclimation. *Journal of Plant Physiology.*159:781-789.
28. Truta E,Gille E,Toth E and Maniu M. 2002. Biochemical differences in cannabis sativa depending on sexual phenotype. *Journal of Apply Genetic.* 43 (4):451-462.
29. Xie Z, Jiang D, Dai T, Jing Q and Cao W. 2004. Effects of exogenous ABA and cytokinin on leaf photosynthesis and grain protein accumulation in wheat ears cultured in vitro. *Plant Growth Regulation.* 44: 25–32.
30. Yoshimatsu K,Iicla O and Kitazawa T. 2004. Growth characteristics of Cannabis sativa cultivated in a phytotron and in the field. *Bulletin on Natural Instruction of Health Science.* 122:16-20.
31. Yun C. Chang YC and Walling LL .1991.Abscisic acid negatively regulates expression of chlorophyll a/b binding protein genes during soybean embryogeny. *Plant Physiology.* 97: 1260-1264.
32. Wagner GJ.1979.Content and vacuole /extravacuole distribution of neutral sugars,free amino acids and anthocyanin in protoplasts. *Plant Physiology.*69:88-93.
33. Zhou B, Guo Z and Liu Z. 2005. Effects of abscisic acid on antioxidant systems of *Stylosanthes guianensis* (Aublet) Sw. under chilling stress.*Crop Science.* 45:599-605.

## The effect of ABA on pigments and tetrahydrocannabinol in *Cannabis sativa* at flowering stage

Mansouri H. and Asrar Z.

Biology Dept., Faculty of Sciences, Shahid Bahonar University, Kerman, I.R. of IRAN

### Abstract

The effect of ABA was investigated on chlorophyll, carotenoid, anthocyanin and flavonoid content in leaves of male and female cannabis plants at flowering stage. Plants were sprayed with ABA solutions (1 and 10 mg/l) and distilled water as control. Content of chlorophyll a, b and total decreased in female plants sprayed with 1 and 10 mg/l ABA. Male plants showed a decrease in chlorophyll content only in high ABA levels (10 mg/l). ABA treatment did not affect carotenoid content in male plants but it caused the decrease of carotenoids content in female ones. Anthocyanin content decreased by treatment with 10 mg/l ABA in male plants but in females, anthocyanin content increased with ABA treatment (1 and 10 mg/l). In both of female and male plants, flavonoids A 270 on leaf increased in 1mg/l ABA but flavonoids A 330 on leaf did not change. Flavonoids A 300 increased in 1mg/l ABA in male plants and in 10 mg/l ABA in female ones. The content of  $\Delta^9$ -tetrahydrocannabinol (THC) increased the treated plants with ABA. This study showed that male and female plants of cannabis respond to ABA differently. ABA can increase secondary metabolites such as anthocyanin and flavonoids and decrease primary metabolites such as chlorophyll and carotenoids.

**Keywords:** Anthocyanin, Flavenoids, Cannabinoids