

جداسازی، تشخیص و مطالعه اثر آنتاگونوستی برقی از جدا یه های fluorescent pseudomonads بر روی بعضی از عوامل قارچی مرگ گیاهچه در خوزستان

محمد رضا اصلاحی^۱، رضا فرخی نژاد^۲ و مسعود شمس بخش^۳

در این تحقیق با استفاده از محیط اختصاصی King-B از خاکهای زراعی مناطق مختلف خوزستان شامل شهرهای دزفول، شوشتر، شوش، میلانی، حمیدیه و سوستگرد تعداد یکصد و پیست جدایه از پسودوموناسهای فلورسنت جدا گردید که سه عدد از آنها در بررسی های آزمایشگاهی خواص آنتاگونوستی خوبی علیه قارچهای نشان *Fusarium solani*, *Rhizoctonia ultimum*, *Pythium*, *Sclerotinia sclerotiorum*, *oxysporum* استفاده از *Pseudomonas fluorescens* داشتند. هر سه استرین تأثیر معنی داری روشهای متداول در باکتریولوژی شناسایی شده و بالانسکی اختلاف به گونه تعلق روی کاشهای درصد مرگ و میر گیاهچه ها در مقایسه با شاهد از خود نشان دادند اما اثر استرین ۲۴ نسبت به استرین های ۳۰ و ۴۲ چشمگیر تر بود. هر سه استرین روی محیط PDA (حاوی ۵٪ گلوكز) تولید نوعی متابولیت نمودند که توانست کشت در غیاب باکتری ها از رشد قارچ عامل بیماری ممانعت کند. اگرچه ماهیت این متابولیت روش نش داما به نظر می رسد که نوعی آنتی بیوتیک باشد. هیچگدام استرین ها روی محیط PDA (حاوی ۵٪ گلوكز) که حاوی ملقطهای مختلف کشت کلرید آهن بود تولید سیدروفور تکرددند. در یک آزمایش مقدماتی که در شرایط مزرعه انجام گرفت هر سه استرین تأثیر معنی داری روی رشد بوته ها و میزان محصول خده های سبب زمینی در مقایسه با گیاهان شاهد از خود نشان دادند.

واژه های کلیدی : *Pseudomonas fluorescens*, مرگ گیاهچه، کترول بیولوژیک،

آنتی بیوتیک، سیدروفور، آنتاگونوست، PGPR

۱ - دانشجوی ساقی کارشناسی ارشد، گروه گیاهپژوهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

۲ - اعضای هیات علمی گروه گیاهپژوهی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

پذیرش: ۱۵/۱۲/۷۹

دریافت: ۲۲/۱۲/۷۸

مبارزه بیولوژیک با عوامل بیماریزای گیاهان و بویژه پاتوژنهای خاکزاد از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. تاکنون باکتریهای متعددی از جنسهای مختلف بعنوان عوامل کنترل بیولوژیک معرفی گشته‌اند که بعضی از آنها نیز بعنوان عوامل تحریک کننده رشد گیاه بکار گرفته شده‌اند. در بین چنین عواملی پسودوموناسهای فلورست نسبت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند (۴۰). استفاده از برخی گونه‌های فلورست پسودوموناس به طریق آغشته کردن بذور به این باکتریها و اضافه نمودن باکتریها به خاک برای کنترل بیماریهای پناخوره گندم (۲۱)، پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه نخود فرنگی (۱۵)، مرگ گیاهچه پنبه (۲۲)، بوته میری خیار (۱۰)، پوسیدگی سیاه ریشه توتون (۲۰)، مرگ گیاهچه و پوسیدگی بذر گندم (۱۳) و عامل پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه نخود ایرانی (۱)، تایع مطلوب و موفقیت آمیزی در برداشت است. در این ارتباط تحقیقات بعمل آمده توسط مرکز تحقیقات و بیوتکنولوژی برلین نشان داد که جدایه *Pseudomonas fluorescens* H237 می‌تواند جمعیت قارچ *Fusarium oxysporum* f.sp *dianthi* را کاهش دهد (۱۶). همچنین لیمن و همکاران (۱۱) با سواستازی جدایه *P. fluorescent WCS 374* از خاک مزارع تربچه نشان دادند که این جدایه کاهش بیماری پوسیدگی ریشه و پژمردگی گیاه تربچه ناشی از *F. oxysporum* f.sp *conglutinans* را دارد. در همین رابطه لیمن و همکاران (۱۱) نشان دادند که جدایه *F. semitectum* از *Fusarium solani* RRLJ 181 *F. oxysporum* f.sp *lycopersici* و *F. oxysporum* f.sp *ciceris moniliforme* جلوگیری می‌کند. احمدزاده و همکاران (۱) یا کاربرد یک جدایه از باکتریهای پسودوموناس فلورست توانستند بیماری مرگ گیاهچه نخود ایرانی ناشی از قارچ *Pythium ultimum* را کاهش دهند. همچنین ذاکی و همکاران (۲۲) یک جدایه از *Burkholderia* از *Pseudomonas cepacia* را از خاکهای مزارع پنبه در آریزونا جدا کردند و نقش آن را بعنوان عامل کنترل بیولوژیکی *Rhizoctonia solani* عامل مرگ گیاهچه پنبه به اثبات رساندند. به همین ترتیب فرخی نژاد و همکاران (۳) توانستند بیماری پژمردگی فوزاریومی

Archive of SID

نحوه فرنگی را با استفاده از یک استرین از گونه *P. putida* بنام N1R بطور مطلوبی کنترل نمایند.

تحقیقاتی که در جهت تعیین مکانیسم عمل پسودوموناسهای فلورسنت در کنترل بیماریهای خاکزاد مانند مرگ گیاهچه انجام گرفته نشان می‌دهد که رقابت برای جذب مواد غذایی و محصور نمودن جایگاه میکروبی، تولید آنتی‌بیوتیک و مواد ضد قارچی، تولید سیدروفور و القاء مقاومت در گیاه، نقش عمده‌ای در کنترل بیماریهای خاکزاد ایفا می‌کند (۲۰). بیشتر، تلاش‌هایی که تاکنون در جهت اطلاع از مکانیسم کنترل بیماریهای ریشه، توسط باکتریهای فوق صورت گرفته است اساساً بر روی سیدروفورها و آنتی‌بیوتیکها متمرکز بوده است (۱۴). کلپر و همکاران در سال ۱۹۸۰ گزارش نمودند که جدایه B1۰ از باکتری *P. fluorescens* و یا سیدروفور آن از پیش روی بیماری پژمردگی جو ممانعت بعمل می‌آورد (۹). هاول و استیپانوویک (۷) برای اولین بار موفق شدند نقش آنتی‌بیوتیک پیولوتوثورین را در بازدارندگی از رشد قارچهای *R. solani* و *Pythium ultimum* به اثبات برسانند.

یکی دیگر از موارد استفاده این باکتریها، کاربرد آنها بعنوان عوامل سرعت بخشیدن به رشد و بهبود باروری محصولات کشاورزی (PGPR) Plant Growth Promoting Rhizobacteria می‌باشد. استفاده از این پدیده به روش باکتریزاسیون بذر در جهت افزایش باردهی محصولات کشاورزی در سطح تجاری ابتدا توسط دانشمندان شوروی در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی صورت پذیرفت (۱). در دهه ۱۹۷۰ میلادی این پدیده با کشف یک گروه از باکتریهای پسودومonas فلورسنت در علم کنترل بیولوژیک اعتبار و مقام خود را بازیافت و در پی انجام یک سری آزمایش مزرعه‌ای در برخی از کشورها، این فرضیه بصورت یک سیستم نسبتاً جدید و بعنوان یک گام نوظهور در راه کنترل بیماریهای ریشه و افوایش رشد و باردهی گیاهان مطرح گردید (۱۲).

در این تحقیق خاک مزارع مختلف شهرهای استان خوزستان از نظر وجود باکتریهای پسودومonas فلورسنت آتاگونیست مورد بررسی قرار گرفت، پس از جداسازی باکتریها، اثر جدایه‌ها بر روی قارچهای *Sclerotinia sclerotiorum* عامل مرگ گیاهچه بادمجان، *R.*

Archive of SID

عامل مرگ گیاهچه لوپیا، *F. oxysporum* و *Pythium ultimum* نیز خاصیت تحریک کنندگی آنها روی رشد و میزان محصول بوتهای سبیب زمینی آزمایش شد. همچنین مکانیسم عمل استرین های مورد استفاده مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

مواد و روشها

۱- جداسازی باکتریهای *P. fluorescent* از خاک

برای جداسازی باکتریها از محیط اختصاصی King-B استفاده شد، اختصاصی بودن این محیط به دلیل وجود آمپی سیلین، کلرامفینیکل و سیکلوهگزامید در محیط مزبور می باشد. اجزای این محیط در یک لیتر عبارتند از:

پیتون ۲۰ گرم، $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ ۱/۵ گرم، آگار ۱۵ گرم، گلیسرول ۱۵ گرم، آمپی سیلین ۵۰ میکروگرم در میلی لیتر، کلرامفینیکل ۱۳ میکروگرم در میلی لیتر، سیکلوهگزامید ۱۰۰ میکروگرم در میلی لیتر و آب مقطر ۱ لیتر (۱۱).

نمونه های خاک از مناطق مختلف خوزستان شامل شهر های ذوق، شوشتر، شوش، ملاثانی، حمیدیه و سو سنگرد جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شد. از هر نمونه ۲ گرم خاک در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر استریل ریخته شد و با استفاده از روش ترقیق مکرر سوسپانسیون خاک تا 10^{-5} برابر رقيق گردید. از هر رقت یک دهم میلی لیتر به تشکه های حاوی محیط کشت فوق منتقل و پخش گردید. پس از ۴۸ ساعت نگهداری در دمای ۲۳ تا ۲۵ درجه سانتی گراد، ظروف کشت جهت ظهور کلنی های باکتری مورد بررسی قرار گرفتند. باکتریهای جدا شده برای مطالعات بعدی به لونه های آزمایش حاوی آگار غذایی (NA) منتقل گردیدند. بررسی های مقدماتی در آزمایشگاه که با باکتریهای بدست آمده انجام شد نشان داد که تنها سه جدایه از باکتریهای فوق دارای اثرات آنتاگونیستی روی عوامل مرگ گیاهچه بودند، بنابراین بقیه آزمایشات با این سه جدایه انجام شد.

۲- شناسایی باکتریها

با توجه به خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و تغذیه‌ای و با استفاده از روش شاد (۱۸)، باکتریها مسوزد شناسایی قرار گرفتند (جدول شماره ۱).

جدول ۱ خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی جدایه‌ها.

| | استرین | آزمایش | |
|-----|----------|----------|---------------------------|
| | ۴۲ | ۳۰ | ۲۴ |
| - | - | - | واکنش گرم |
| + | + | + | تولید رنگدانه فلورسنت |
| ۱-۳ | ۱-۳ قطبی | ۱-۳ قطبی | تاژی |
| + | + | + | کاتالاز |
| + | + | + | تجزیه هوازی اکسیژن |
| - | - | - | تجزیه بی هوازی اکسیژن |
| + | + | + | اکسیداز |
| - | - | - | فوق حساسیت |
| - | - | - | لهانیدن سیب زمینی |
| - | - | - | هیدرولیز نشاسته |
| + | + | + | هیدرولیز ژلاتین |
| + | + | + | لوان |
| + | + | + | أرجی نین |
| + | + | + | احیاء نیترات |
| - | - | - | رشد در ۴۱ ° |
| + | + | + | رشد در ۴ ° |
| + | + | + | استفاده از فندهای مانیتول |
| + | - | + | سوربیتول |
| - | + | + | ترهالوز |
| + | + | + | ساکارز |
| - | - | - | آرابیتوز |
| - | - | - | زایلوز |
| + | + | + | گلوكز |
| + | + | + | گالاكتوز |
| - | - | - | لاکتوز |
| - | - | - | سیترات |
| + | + | + | مانوز |
| - | - | - | آدنیتول |
| + | + | + | رافینوز |
| + | + | + | مالی سین |
| + | + | + | دکستروز |

۳- بررسی خاصیت آنتاگونیستی باکتریها بر پاتوژنهای عامل مرگ گیاهچه در شرایط آزمایشگاه

اثر باکتریها روی رشد پاتوژنهای عامل مرگ گیاهچه در شرایط آزمایشگاه با استفاده از روش کشت متقابل انجام شد. برای این منظور، دیسکهایی به قطر ۹ میلیمتر از محیط کشت‌های ۴۸ ساعته قارچهای (*P. ultimum*, *R. solani*, *F. oxysporum*, *S. sclerotiorum*) قرار داده شد. ظروف کشت پس از آماده شدن در دمای ۲۵ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. بعد از گذشت دو روز سوسپانسیون غلیظی از کشت تازه باکتری با استفاده از محلول بافر ۱/۰ مولار $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ تهیه گردید. غلظت باکتری در سوسپانسیون توسط اسپکتروفوتومتر در طول موج ۶۰۰ نانومتر تعیین شد. برای آزمایش، غلظت مناسبی از باکتری ($10^{9} - 10^{10}$ سلول در میلی‌لیتر) با رقیق نمودن سوسپانسیون غلیظ در محلول بافر فوق، تهیه گردید. یک دهم میلی‌لیتر از این سوسپانسیون به طریق نقطه‌گذاری در طرف مخالف دیسکهای قارچ در شرکهای پتری حاوی PDA قرار داده شد. ظروف کشت در دمای ۲۸°C نگهداری و پس از گذشت ۳ الی ۴ روز خاصیت آنتاگونیستی جدایه‌ها مورد بررسی قرار گرفت (۱۶).

۴- تأثیر باکتریهای آنتاگونیست بر بیمارگرهای در شرایط گلخانه

به منظور آماده‌سازی مایه بیمارگرهای آلوده ساختن خاک، بذور جو در ۵۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر بمدت ۳ ساعت خیسانده شد. سپس بذور فوق درون فلاسکهای ۲۵۰ میلی‌لیتری قرار گرفته و در دمای ۱۲۱ درجه سانتی‌گراد و فشار ۱/۵ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع بمدت یک ساعت اتوکلاو گردیدند. پس از آن هر فلاسک به طور جداگانه با یکی از قارچهای عامل مرگ گیاهچه مایه زنی شد. آنگاه فلاسکها برای مدت ۳ هفته در دمای اتاق نگهداری شدند. مایه آماده شده برای مدت ۲۴ ساعت در هوای آزاد در آزمایشگاه خشک شده و در پاکتهاي کاغذی در دمای ۲۵ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد نگهداری گردید. برای آلوده کردن خاک مایه بیمارگرهای به نسبت ۱٪ وزنی به خاک سترون اضافه و خوب مخلوط شد. جدایه‌های باکتری‌ها روی محیط

Archive of SID

کشت King-B مایع کشت داده شدند. فلاسکهای حاوی محیط کشت به مدت ۲۴ ساعت روی دستگاه شیکر گردان با دور ۱۵۰ rpm قرار گرفتند. سلولهای باکتری تو سط دستگاه ساتریفیوژ با شتاب گردش ۱۵۰۰ rpm و به مدت ۱۵ دقیقه از محیط کشت مایع جدا گردید. سلولهای باکتری، رسوب کرده و محیط کشت در بالا قرار گرفت، محیط کشت را تخلیه نموده و سپس غلظت مناسبی از باکتری ($10^9 - 10^{10}$ یاخته در میلی لیتر) با رقیق نمودن سلولهای باکتری تو سط محلول بافر ۰/۱ مولار $MgSO_4$ ، H_2O تهیه گردید. بذر هندوانه، بادمجان و لوبيا پس از ضد عفونی در هیپوکلریت سدیم ۵٪ / دز صد بلا فاصله ۳ تا ۵ مرتبه در ظروف حاوی آب سترون شسته شدند. پس از آن بذر مزبور در پارچه ململ نگهداری شده تا تحریک به جوانه زنی شوند. بذرهای جوانه زده به مدت ۳۰ دقیقه در سوسپانسیون باکتری قرار داشته شدند. برای هر نوع گیاه دو تیمار شامل شاهد : ۱- بذرهای خیسانده شده بدون قارچ و باکتری ۲- بذرهای خیسانده شده بهمراه قارچ عامل بیماری و سه تیمار باکتریایی (بذرهای تیمار شده با جدایه‌های باکتری بهمراه قارچ عامل بیماری) و برای هر تیمار ۴ تکرار در نظر گرفته شد. سپس ۵ بذر هندوانه، ۵ بذر لوبيا و ۱۰ بذر بادمجان بطور جداگانه در هر گلدان کاشته شد. آزمایشات براسان طرح کاملاً تصادفی در گلخانه و در شرایط طبیعی انجام گرفت.

۵- بررسی تولید آنتی بیوتیک و سیدروفور بعنوان مکانیسم عمل باکتریها

برای اثبات تولید آنتی بیوتیک روی محیط کشت PDA از روش کرائوس و لویر (۱۰) استفاده شد. در این روش از کشت ۴ روزه باکتری روی محیط کشت مزبور استفاده بعمل آمد. برای آزمایش، پرگنه‌های باکتری از سطح تشک پتری جمع آوری و برای اطمینان از عدم رشد بقا یای پرگنه باکتریها، از پنبه آغشته به فرمالین ۴۰٪ استفاده گردید. برای این کار پنبه آغشته به فرمالین را درون تشک پتری قرار داده و به مدت نیم ساعت به حالت وارونه در محیط آزمایشگاه تحت شرایط سترون نگهدارشده شد. سپس پنبه را خارج کرده و بعد از گذشت چند دقیقه دیسکهایی از قارچ روی محیط کشت قرار گرفت. عدم رشد قارچ روی این محیط و مقایسه آن با شاهد که باکتری در آن کشت نشده بود نشانه وجود آنتی بیوتیک درون محیط غذایی تلقی شد. در

Archive of SID

تشکهای پترو شاهد نیز از پنه آخشه به فرمالین بهمان صورت فوق استفاده گردید. به منظور بررسی تولید سیدروفور از روش ولر و کوک (۲۱) با اندکی تغییر استفاده شد. به این ترتیب که از محیط سیب زمینی دکستروز آگار (PDA) حاوی ۵٪ گلوكز بجای محیط King-B استفاده گردید. به این محیط مقادیر ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میکرومول کلرید آهن (FeCl₃) اضافه شد. دیسکهایی از قارچ در یک طرف تشکهای پترو حاوی محیط کشت FeCl₃ و PDA قرار داده شد. باکتریهای مورد نظر بصورت خطی روی محیط کشت طوری مایه زنی گردیدند که در امتداد قطر ظروف کشت، نواری به پهنهای ۱/۱۵ سانتی متر تشکیل شد. ظروف کشت در دمای ۲۸°C نگهداری شدند. پس از گذشت ۲ الی ۳ روز عدم رشد قارچ روی محیط مذکور و مقایسه آن با شاهد که فاقد کلرید آهن بود نشانه عدم فعالیت سیدروفور تلقی شد.

۶- تأثیر باکتریها روی تحریک رشد و محصول دهی سیب زمینی

برای نشان دادن اثر باکتریها روی رشد و عملکرد گیاه یک آزمایش مقدماتی با استفاده از روش وئی و همکاران (۱۹) در مزرعه انجام شد. بدین منظور، باکتریها برای مدت ۲۴ ساعت در دمای ۲۵ تا ۲۷ درجه سانتیگراد در مخلوط عصاره گوشت و پپتون (Nutrient broth) (بر روی شیکرگردان با دور ۱۵۰ rpm کشت داده شدند. به کمک ساتریفیوژ با شتاب گردش ۱۵۰۰ rpm به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه، یاخته‌های باکتری از محیط کشت مایع جدا گردید. پس غلظت مناسبی از باکتری (۱۰^۷-۱۰^۹ یاخته در میلی لیتر) با ریق نمودن سوسپانسیون باکتری توسط محلول بافر ۱/۰ مولار MgSO_۴, ۷H_۲O تهیه شد. غده‌های سیب زمینی رقم آثولا به مدت ۲ ساعت با هیپوکلریت سدیم ۵/۰ درصد سترون شده و بعد از آن با آب مقطر سترون شستشو گردیدند. سپس غده‌ها در سوسپانسیون باکتری که از قبل آماده شده بود به مدت یک ساعت قرار گرفتند. غده‌های تیمار شده، بدون اینکه قطعه قطعه شوند در قطعه زمینی در مزرعه گروه با غبانی داشکده کشاورزی اهواز روی خطوطی بطول ۳۰۰ سانتی متر کشت گردیدند. فاصله خطوط ۴۰ سانتی متر و فاصله بین غده‌ها در روی خطوط ۴۰ سانتی متر بود. تمام

Archive of SID

بوتهای موجود جهت تعیین اثر باکتریها در رشد و عملکرد گیاه سیبازمینی در طول فصل کشت مورده ارزیابی قرار گرفتند. در انتهای نصل رشد، خدهای سیبازمینی مربوط به هر ردیف جمع آوری شده و میانگین وزنی خدها در هر ردیف با یکدیگر و با شاهد مقایسه شد.

نتایج

۱- جداسازی و بررسی خاصیت آنتاگونوئیستی باکتریها در شرایط آزمایشگاه از میان ۱۲۰ جدایه باکتریایی جمع آوری شده از خاک مناطق مختلف خوزستان که در محیط کشت King-B تولید رنگ فلورسنت کردند، فقط سه استرین اثر آنتاگونوئیستی بر علیه عوامل بیماریزای مولد مرگ گیاهچه در روی محیط کشت نشان دادند.

۲- شناسایی جدایه‌های باکتری

خصوصیات بیوشیمیایی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی این ۳ استرین در جدول شماره ۱ ارائه شده است. براساس نتایج حاصل از آزمایشات بیوشیمیایی و خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک، این سه استرین با اندکی اختلاف به گونه *P.fluorescens* تعلق دارند(۱۶ و ۱۷).

۳- بررسی مکانیسم عمل باکتریها

هر سه استرین در محیط کشت PDA تولید نوعی متابولیت نمودند که توانست در غیاب باکتری از رشد قارچ عامل بیماری ممانعت کند. اگرچه ماهیت این متابولیت روشن نشد. ولی به نظر می‌رسد که این متابولیت نوعی آنتی‌بیوتیک باشد. خاصیت بازدارندگی استرین‌ها در برابر بیمارگرهای روی محیط کشت PDA با اضافه نمودن کلرید آهن کاهش پیدا نکرد. بنابراین به نظر می‌رسد که سیدروفور تولید شده در بازدارندگی از بیماری نقشی نداشته باشد.

Archive of SID

۴- اثر آنتاگونیستی باکتریاهابر کاهش درصد مرگ و میر گیاهچه ها در گلخانه

نتایج بدست آمده از آزمایش تأثیر مایه زنی بذور بامجان توسط باکتریاهای آنتاگونیست روی قوی مرگ گیاهچه بامجان تحت شرایط گلخانه نشان داد که هر سه استرین از توسعه بیماری جلوگیری کرده و استرین شماره ۲۴ بهترین اثر آنتاگونیستی را در براوس بیماری نشان داد (جدول شماره ۲ و نمودار شماره ۱)، مقایسه میانگین ها که با استفاده از روش دانکن صورت گرفت نشان داد که میانگین ها در سطح ۵ درصد با هم اختلاف معنی دار دارند (جدول شماره ۳).

جدول ۲ تأثیر باکتریاهای آنتاگونیست در کنترل بیماری مرگ گیاهچه بامجان در گلدان

| | | تیمار یا استرین های باکتری* | | تیمار شاهد** | | تعداد گیاهچه های سالم (میانگین) | درصد گیاهچه های سالم |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|------|--------------|--|------------------------------------|----------------------|
| CK ₂ | CK ₁ | ۴۲ | ۳۰ | ۲۴ | | | |
| ۳ | ۱۰ | ۷/۵ | ۷/۲۵ | ۸/۵ | | | |
| ۳۰ | ۱۰۰ | ۷۵ | ۷۲/۵ | ۸۵ | | | |

* هر تیمار شامل ۴ تکرار بود و هر تکرار با ۱۰ بذر انجام گرفت.


** خاک سترون شده عاری از بیمارگر CK₂، دارای بیمارگر CK₁.

جدول ۳ مقایسه میانگین های تیمارهای مختلف با استفاده از آزمون دانکن

| مقایسه میانگین در سطح احتمالی ۵٪ میانگین تعداد گیاهچه های سالم تیمار | | A | * |
|--|------|----|---|
| ۱ = بذر | ۱۰ | | |
| ۳ = بذر، عامل بیماری، استرین ۲۴ | ۸/۵ | B | |
| ۵ = بذر، عامل بیماری، استرین ۴۲ | ۷/۵ | BC | |
| ۴ = بذر، عامل بیماری، استرین ۳۰ | ۷/۲۵ | C | |
| ۲ = بذر، عامل بیماری | ۳ | D | |

* میانگینهای دارای حروف غیر مشترک در سطح ۵٪ احتمالی خطابه روش دانکن با هم اختلاف معنی دار دارند.

Archive of SID



استرین ۱ = ۳۰ استرین ۲ = ۴۲ استرین ۳ = ۲۴ شاهد ۱ (بذر) = ۱۰ شاهد ۲ (قارچ + بذر) = ۱۵

نمودار ۱ - تأثیر مایه زنی بذور بامجان توسط باکتری های آنتاگونوست بر روی بیماری مرگ گیاهچه ناشی از قارچ *S. sclerotiorum* (نمودار درصد گیاهان بیمار را در هر تیمار نشان می دهد).

با توجه به تتابع حاصله از آزمایش تأثیر مایه زنی بذور لوپیا توسط باکتری های آنتاگونوست بر روی وقوع مرگ گیاهچه تحت شرایط گلخانه، استرین های شماره ۲۴، ۳۰، ۴۲ به ترتیب به میزان ۸۶ درصد، ۷۸/۶ درصد، ۸۵/۸ درصد نسبت به شاهد قارچ، مرگ و میر گیاهچه های لوپیا را کاهش دادند (نمودار ۲). مقایسه میانگین ها که با استفاده از روش دانکن صورت گرفت نشان داد که میانگین ها در سطح ۵ درصد با هم اختلاف معنی دار دارند (جدول شماره ۴). تتابع تأثیر باکتری های آنتاگونوست در کاهش مرگ و میر گیاهچه های هندوانه کشت شده در گلدان در جدول شماره ۵ و نمودار ۳ ارائه شده است. با توجه به جدول شماره ۶ میانگین های دارای حروف غیر مشترک در سطح ۵ درصد با هم اختلاف معنی دار دارند. مقایسه میانگین ها با استفاده از روش آماری دانکن صورت گرفت.

جدول ۴ مقایسه میانگینهای تیمارهای مختلف با استفاده از آزمون دانکن

| مقایسه میانگین در سطح احتمالی ۵٪/میانگین تعداد گیاهچه‌های سالم | | تیمار | |
|--|---------|-------|-----|
| | ۱ (بذر) | ۰ | A * |
| (بذر، عامل بیماری، استرین ۲۴) | ۴/۵ | | B |
| (بذر، عامل بیماری، استرین ۴۲) | ۴/۱ | | C |
| (بذر، عامل بیماری، استرین ۳۰) | ۴ | | C |
| (بذر، عامل بیماری) | ۱/۰ | | D |

* میانگینهای دارای حروف هیرشتراک در سطح ۵٪ احتمالی خطاب روش دانکن باهم

اختلاف معنی دار دارند.

جدول ۵ تأثیر باکتریهای آنتاگونیست در کنترل بیماری مرگ گیاهچه نشای هندوانه

کشت شده در گلستان

| تیمار با استرین های باکتری* | | تیمار شاهد* | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------|----|------|
| CK ₂ | CK ₁ | ۴۲ | ۳۰ | ۲۴ |
| تعداد گیاهچه‌های سالم | ۱ | ۵ | ۴ | ۲/۲۵ |
| (میانگین) | | | | ۴/۵ |
| درصد گیاهچه‌های سالم | ۲۰ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۶۵ |
| | | | ۹۰ | |

* هر تیمار شامل ۴ تکرار بود و هر تکرار با ۵ بذر انجام گرفت.

** خاک سترون شده عاری از پاتوزن CK₁، دارای پاتوزن CK₂


Archive of SID

جدول ۶ مقایسه میانگین تیمارهای مختلف با استفاده از آزمون دانکن


| تیمار | میانگین تعداد گیاهچه‌های سالم | میانگین در سطح احتمالی ۵٪ | A * |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----|
| ۱ (بذر) | ۵ | ۵ | A * |
| ۳ (بذر، عامل بیماری، استرین ۲۴) | ۴/۵ | ۴/۵ | B |
| ۵ (بذر، عامل بیماری، استرین ۴۲) | ۴ | ۴ | B |
| ۴ (بذر، عامل بیماری، استرین ۳۰) | ۴/۲۵ | ۴ | C |
| ۲ (بذر، عامل بیماری) | ۱ | ۱ | D |

* = میانگینهای دارای حروف غیر مشترک در سطح ۵٪ احتمالی خطأ به روش دانکن با

هم اختلاف معنی دار دارند.



نمودار ۲ - تأثیر مایوزنی بذور لوبيا توسط باکتری های آناتاگونیست بر روی بیماری مرگ گیاهچه ناشی از قارچ *R. solani* (نمودار درصد گیاهان بیمار را در هر تیمار نشان می دهد).



نمودار ۳- تأثیر مایه زنی بذور هندوانه توسط باکتری های آنتاگونیست بر روی بیماری مرگ گیاهچه ناشی از قارچ *F. oxyysporum* (نمودار درصد گیاهان بیمار را در هر تیمار نشان می دهد).

۵- تأثیر باکتریها روی تحریک رشد و محصول دهی سیب زمینی: تمامی استرین هایی که اثر آنتاگونیستی آنها روی عوامل بیماری زای مولد مرگ گیاهچه مشخص شده بود بعنوان عوامل افزایش دهنده رشد و بهبود محصول دهی استفاده شدند. هر سه استرین مذکور در این آزمایش مقدماتی موجب افزایش رشد بوته های سیب زمینی شده و باعث افزایش محصول در ردیفهای تیمار شده در مقایسه با شاهد تیمار نشده گردیدند. استرین ۲۴ با افزایش محصول به میزان ۳۶/۲۰ درصد نسبت به شاهد بهترین تحریک کننده رشد و افزایش دهنده محصول شناخته شد (جدول ۷).

Archive of SID

جدول ۷ افزایش رشد و محصول دهی بوته‌های سیب زمینی در اثر آغشتن غده‌ها با باکتری

| تیمارها | میانگین ارتفاع بوته‌ها (cm) | میانگین محصول (kg/k) | درصد افزایش محصول نسبت به شاهد |
|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| استرین ۲۶/۲۰ | ۳/۹۵۰ | ۷۰/۵۰ | ۲۴ |
| استرین ۱۵/۵ | ۳/۲۵۰ | ۶۷/۶۰ | ۳۰ |
| استرین ۱۶/۹ | ۳/۲۸۰ | ۶۹/۸۰ | ۴۲ |
| شاهد | ۲/۹۰۰ | ۶۰/۴۵ | |

بحث

این مطالعه اهمیت استرین‌های منتخب *P. fluorescent* را در کنترل بیماری‌های ناشی از عوامل بیماری مرگ گیاهچه نشان داد.

در این پژوهش، سه استرین مختلف باکتریایی از گونه *P. fluorescent* مورد استفاده قرار گرفت که هر سه آنهاز شدت ظهر بیماری مرگ گیاهچه بامجان، لوبيا، هندوانه در شرایط گلخانه‌ای کاستند (نمودار ۱ و ۲ و ۳)، هر سه استرین در شرایط آزمایشگاه در برابر عوامل ایجاد کننده مرگ گیاهچه واکنش آنتی‌بیوزی خوبی نشان دادند. یکی از روش‌های تشخیص اثر آناتاگونیستی میکرووارگانیسم‌های جمع آوری شده از طبیعت روی عوامل بیماری‌زاکاربرد آنها در محیط کشت در آزمایشگاه، می‌باشد ولی ظهر چنین تأثیری در آزمایشگاه، نشان دهنده موفق بودن استرین‌ها در کنترل بیماری در شرایط گلخانه و مزرعه نبوده (۱۳) که دلیل این امر شرایط غذایی و بعضی دیگر از فاکتورهایی است که روی رشد و بقاء عوامل بیوکنترل در طبیعت اثر دارند و بطور قابل توجهی با شرایط محیط کشت متفاوت می‌باشند (۹). بنابراین برای تعیین خاصیت آناتاگونیستی یک میکرووارگانیسم نه تنها آزمایشات تحت شرایط آزمایشگاه باید انجام شود بلکه آزمایشات مربوطه در سطح مزرعه و یا در نظر گرفتن شرایط محیطی نیز بایستی انجام پذیرد تا بتوان مؤثرترین عامل بیوکنترل را شناسایی کرد.

در شرایط گلخانه، اثر آناتاگونیستی استرین‌های مذکور بر روی *F. oxysporum* عامل *R. solani* و *S. sclerotiorum* عامل مرگ گیاهچه هندوانه، عامل مرگ گیاهچه لوبيا و *S. sclerotiorum* عامل مرگ

Archive of SID

گیاهچه بادمجان، با روش آغشته کردن بذور به سوبیپانسیون باکتری با غلظت (۱۰-۱۰^۷) سلول در میلی لیتر) بطور جداگانه و با استفاده از طرح آماری کامل تصادفی مورد آزمایش قرار گرفت. در این بررسی استرین های شماره ۲۴، ۳۰، ۴۲ توائیتند بیماری مرگ گیاهچه بادمجان ناشی از قارچ *S. sclerotiorum* را به ترتیب به میزان ۸۶ درصد، ۶۸/۶ درصد و ۷۱/۵ درصد نسبت به شاهد قارچ تحت شرایط گلخانه کاهش دهنده (نمودار ۱). نتایج بدست آمده از این بررسی با نتایج تحقیقات رودریگز و فندر (۱۷) مطابقت دارد. همچنین استرین های فوق بیماری مرگ گیاهچه لوپیا ناشی از قارچ *R. solani* را به ترتیب به میزان ۸۶ درصد، ۷۸/۶ درصد و ۸۵/۸ درصد نسبت به شاهد کاهش دادند (نمودار ۲). نتایج بدست آمده از این آزمایش با نتایج بدست آمده توسط دفاگو و همکاران (۵)، کلویر (۸)، کارترایت و بنسون (۴) مطابقت دارد. در همین راستا استرین های مذکور توائیتند بیماری مرگ گیاهچه ناشی از قارچ *F. oxysporum* را به ترتیب به میزان ۸۷/۵ درصد، ۸۶/۸ درصد و ۷۵ درصد نسبت به شاهد کاهش دهنده (نمودار ۳). نتایج حاصله از انجام این آزمایش با نتایج بدست آمده توسط لیمن و همکاران (۱۱) مطابقت دارد. با توجه به نتایج حاصل از آزمایشات فوق استرین شماره ۲۴ نسبت به دو استرین دیگر اثر بیشتر و مطلوبتری داشت.

نظرات مختلفی در مورد مکانیسم اثر باکتریهای پسودوموناس فلورسنت وجود دارد در این زمینه ولر (۲۰) مکانیسم عمل پسودوموناسهای فلورسنت در کنترل بیماریهای خاکزad را رقابت برای جذب مواد غذایی و جا، تولید آنتی بیوتیک و سیدروفور و تحرینک سیستم دفاعی گیاه یا مقاومت القائی معرفی نموده است. اما بیشتر تلاشها بین که تاکنون جهت اضلاع از مکانیسم کنترل بیماریهای خاکزad توسط باکتریها صورت گرفته اساساً بر روی سیدروفورها و آنتی بیوتیکها متعرکز بوده است (۱۴). با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد که مکانیسم اثر استرین های مورد استفاده در این پژوهش تولید نوعی آنتی بیوتیک باشد و این بعلت عدم رشد عوامل مرگ گیاهچه در محیط کشت حاوی گلوكز میباشد که تولید آنتی بیوتیک پیروز نیترین و پایولوتوئرین می توانند به اندازه خود باکتری *P. ultimum* و *R. solani* را ممکن می سازد. در این زمینه هاول و استیپانوویک (۷) قبل اثبات کرده بودند که آنتی بیوتیک پیروز روی محیط کشت ایجاد بازدارندگی نمایند.

Archive of SID

در سالهای اخیر باکتریهای *P. fluorescent* به گونه‌ای موقیت آمیز بعنوان محركین رشد و افزایش تولید محصولات کشاورزی بکار گرفته شده‌اند. در این مطالعه سعی شد که این خصوصیت باکتریهای فلورسنت جدا شده از خاکهای خوزستان در مزرعه و در روی گیاه سبیل‌زمینی بررسی شود. نتایج بدست آمده مشخص نمود که هر سه استرین میزان تولید غده‌زا افزایش داده ولی استرین شماره ۲۴ نسبت به ۲ استرین دیگر اثر بیشتری از خود نشان داد. در جواب اینکه چرا باکتریهای پسودوموناس فلورسنت چنین تأثیری را روی رشد گیاهان دارند. دلایل متعددی ارائه شده است که از جمله می‌توان از بازدارندگی فعالیت پاتوژنهای کم اهمیت خاک (۲۰)، جذب بهتر مواد غذایی بوسیله گیاه و رشد بهتر سایر میکروارگانیسم‌های مفید خاک مانند میکوریزا (۹ و ۲۰)، تولید سیدروفور (۱۱ و ۲۰) و نیز تولید مواد تنظیم کننده رشد (۱۹) نام برد.

Archive of SID

REFEERNCES

منابع:

- ۱- احمد زاده، مسعود؛ شریفی تهرانی، عباس؛ رحیمیان، حشمت‌ا... (۱۳۷۶). جدا سازی باکتریهای آتاگونیست از ناحیه ریزوسفر نخود ایرانی و بررسی مکانیسم بازدارنده‌گی علیه قارچ عامل پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد ۲۸، شماره ۳: صفحه ۸۱-۸۵.
- ۲- حسن زاده، نادر. (۱۳۷۱). بیوکترول عوامل بیماری‌زای خاکزاد گیاهان. مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی. ۱۸۰ صفحه.
- ۳- فرخی نژاد، رضا؛ بیکر، رالف؛ و رانو، راجیندر. (۱۳۷۷). کترول بیولوژیکی پژمردگی فوزاریومی نخود فرنگی بوسیله استرین N1R از *Pseudomonas putida* در دو pH مختلف خاک. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. صفحه ۱۵۰.

- 4- CARTWRIGHT,D.K.;BENSON,D.M.(1995).Comparision of *Pseudomonas* species and application techniques for biocontrol of Rhizoctonia stem rot of poinsettia. Plant Disease 79:309-313.
- 5- DIFAGO, G.; and HAAS, D. (1995). Pseudomonas as antagonists of soilborne plant pathogens : mode of action and genetic analysis. Soil Biochemistry 6 : 249-291.
- 6- FAHY, P.C.; and PERSLEY,G.J.(1983). Plant bacterial diseases, A diagnostic guide. Academic Press. 393pp.
- 7- HOWELL, C.R.; STIPANOVIC, R.D. 1979. Control of *Rhizoctonia solani* on cotton seedling with *Pseudomonas fluorescens* and with an antibiotic produced by the bacterium. Phytopathology 28 : 84-96.

Archive of SID

- 8- KLOEPER, J.W. (1991). Development of *in vivo* assays for prescreening antagonists of *Rhizoctonia solani* on cotton. *Phytopathology* 81: 1006-1013.
- 9- KLOEPER, J.W. ; LEONG, J.; TEINTZE, M.; and SCHROTH, M.N.1980. Enhanced plant growth by siderophores produced by plant growth promoting rhizobacteria. *Nature* 286 : 885-886.
- 10- KRAUS, J.; & LOPER, J.E. (1990). Biocontrol damping-off of cucumber by *Pseudomonas fluorescens* Pf-5 : mechanistic studies. 172-175. In Plant growth promoting rhizobacteria. Keel, C.; Koller,B.; and Defago, G. (eds). The second international workshop on plant growth-promoting rhizobacteria Interlacen, Switzerland.
- 11- LEEMAN, M.; VANPELT, J.A.; HENDRICKX, M.J.; SCHEFFER, P.A.;BAKER, P.A.H.M.; and SCHIPPERS, B.1995. Biocontrol of fusarium wilt of radish in commercial greenhouse trials by seed treatment with *Pseudomonas fluorescens* WCS 374. *Phytopathology* 85 : 1301-1305.
- 12-LEONG, J.1986. Siderophore : Their biochemistry and possible role in the biocontrol of plant pathogen. *Annu.Rev. Phytopathol* 24 : 187-209.
- 13- MILUS, E.A.; ROTHROCK, C.S. 1997. Efficacy of bacterial seed treatments for controlling Pythium root rot of winter wheat. *Plant Disease* 81 : 180-184.
- 14- MONTEIENS, E.; BONTERRA, A.; OPHIR, Y.; and BEER, S.V.

Archive of SID

1996. Antagonism of selected bacterial strains to *Stemphylium vesicarium* and biological control of brown spot of Pear under controlled environment conditions . *Phytopathology* 86:856-863.
- 15- PARKE, J.L.; JOY, A.E.; and KING, E.B. 1991. Biological control of Pythium damping-off and Aphanomyces root rot of peas by application of *Pseudomonas cepacia* or *P.fluorescens* to seed. *Plant Disease* 75 : 987-992.
- 16- RAAIJMAKERS, J.M.; LEEMAN, M.; SCHIPPERS, B.; and BAKER, P.A. 1995. Dose-response relationships in biological control of fusarium wilt of radish by *Pseudomonas* spp .*Phytopathology* 85 : 1075-1081.
- 17- RODRIGUES, F.; PFENDER, W.F. (1997). Antibiosis and antagonist of *Sclerotinia homeocarpa* and *Drechslera poae* by *Pseudomonas fluorescens* Pf-5 in vitro and in planta. *Phytopathology* 87: 616-621.
- 18- SCHAAD, N.W. 1989. Laboratory guide for identification of Plant pathogenic bacteria, Amer. Phytopathol. Soc, St. Paul, Minnesota U.S.A. 72p.
- 19- WEI, G.; KLOEPFER, J.W.; and TUZUN, S. 1995. Induced systemic resistance to cucumber disease and increased plant growth by plant growth-promoting rhizobacteria under field conditions. *Phytopathology* 86 : 221-224.
- 20- WELLER, D.M. 1988. Biological control of soilborne plant

Archive of SID

pathogens in the rhizosphere with bacteria. Ann. Rev.

Phytopathol 26 : 379-407.

- 21- WELLER, D.M.; and COOK, R.J. 1983. Suppression of take-all of wheat by seed treatments with fluorescent pseudomonads.

Phytopathology 73 : 463-469.

- 22- ZAKI, K.; MISAGHI, I.J.; and HEYDARI, A. 1995. Control of cotton seedling damping-off in the field by *Burkholderia (Pseudomonas) cepacia*. Plant Disease.82: 291-293.