

ارزیابی اثر دما بر پارامترهای زیستی کنه تارتن دو لکه ای *Tetranychus turkestanii* Ugarov & Nicolski (Tetranychidae)

علیرضا نعمتی، ابراهیم سلیمان نژادیان، پرویز شیشه بر^۱ و کریم کمالی^۲

چکیده

اثر ۶ دمای ثابت (۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵ و ۴۰ درجه سانتی گراد) روی پارامترهای زیستی (طول دوره رشد و نمو مراحل مختلف زیستی، طول عمر ماده ها، میزان تخمگذاری، دوره های پیش-تخمگذاری، تخمگذاری، پس-تخمگذاری و سرانه تخم) و کمی جمعیت (نرخ خالص تولید مثل، متوسط طول دوره یک نسل، نرخ ذاتی رشد و نرخ متناهی افزایش) گونه *Tetranychus turkestanii* در آزمایشگاه تحت شرایط کنترل شده شامل رطوبت نسبی 10 ± 55 درصد، نور - تاریکی ۱۶ به ۸ انجام شد. آستانه حرارتی پایین و بالا بترتیب $13/4$ و $41/6$ درجه سانتی گراد برآورد شد. کمترین و بیشترین زمان رشد و نمو مراحل نابالغ بترتیب $4/33$ و $30/32$ در دماهای ۳۵ و ۱۵ درجه سانتی گراد ثبت شد. با توجه به حداقل بودن میزان مرگ و میر، حداکثر نرخ ذاتی رشد ($0/379$) و همینطور میزان تخمگذاری بیشتر به ازاء هر کنه ماده ($73/8$) دمای ۳۵ درجه سانتی گراد بعنوان دمای بهینه برای رشد و نمو و تولید مثل در نظر گرفته شد. میزان باروری روزانه با افزایش دما روند مشخصی ندارد اما در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد حداکثر مقدار باروری ($73/8$) تخم به ازاء هر ماده) بدست آمد. تعداد کل تخم تولید شده به ازاء هر کنه ماده در دماهای مختلف تفاوت معنی داری با هم نشان می دهد. اثر دما روی نرخ ذاتی رشد توسط مدل تغییر یافته لوگان و همکاران بررسی شد و پارامترهای این مدل بترتیب $0/102$ ، $0/106$ و $5/47$ برآورد شد.

واژه های کلیدی: آستانه حرارتی، نرخ ذاتی رشد، پارامترهای زیستی، *T. turkestanii*

مقدمه

در مطالعه تولید مثل، پارامترهای مختلفی که به نام پارامترهای تولیدمثلی نامیده می شوند، مورد توجه اند. پارامترهای تولید مثلی افراد شامل باروری، میزان تفریح تخم، طول دوره تخمگذاری، طول عمر، نرخ رشد، بقاء و نسبت جنسی می باشد. این پارامترها تحت تاثیر عوامل داخلی (ذاتی) و خارجی قرار می گیرند (۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۲۱). عوامل خارجی موثر بر پارامترهای ذکر شده شامل دما، رطوبت، نور، میزان اثر دشمنان طبیعی، رقابت درون و برون گونه ای، ویژگی های گیاه میزبان از جمله رقم، مواد غذایی خاک و گیاه و سن گیاه می باشند (۲، ۳ و ۹).

عوامل داخلی موثر بر این پارامترها شامل نژاد

کنه های تارتن از مهمترین آفات گیاهان زراعی، باغی و زینتی محسوب می شوند. کنه تارتن دولکه ای (ترکستانی) *Tetranychus turkestanii* Ugarov, Nicolski از خانواده Tetranychidae از روی بیش از ۳۰۰ گونه گیاهی گزارش شده است (۹۴). این گونه در مناطق جنوبی کشورمان گسترش وسیعی داشته و در بعضی از مزارع جمعیت هایی با تراکم های زیاد ایجاد می کند. مطالعات متنوعی در نقاط مختلف جهان در مورد پارامترهای زیستی کنه های این خانواده انجام شده است. از جمله این مطالعات می توان به بررسی پارامترهای تولیدمثلی این کنه ها اشاره نمود (۲، ۶، ۲۸).

۱- برتیب دانشجوی دکتری، استادیار و دانشیار گروه گیاه پزشکی،

دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز.

۲- استاد گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت

مدرس، تهران.

تاریخ دریافت: ۸۳/۴/۱۴

تاریخ پذیرش: ۸۴/۱/۲۹

کاری و برادلی (۴) تاثیر پنج دمای ثابت را روی صفات زیستی گونه‌های *T. turkestanii*، *T. pacificus* McGregor و *urticae* Koch مطالعه نمودند. تانیگوشی و همکاران (۲۶) گونه *T. mcdanieli* McGregor را مورد مطالعه قرار داده و روابط دما و طول دوره رشد را تشریح کردند. این روابط توسط لوگان و همکاران (۱۴) نیز مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی محققین متعددی از جمله گوتو و ناگاتا (۸)، جونز و مورس (۱۲)، نوردنفرس و همکاران (۱۹)، روی و همکاران (۲۱) در مورد اثر دما روی پارامترهای زیستی کنه‌های تارتن و بعضی از شکارگران آنها مطالعه کرده اند. مطالعه و بررسی پارامترهای زیستی کنه *T. turkestanii* به طور اختصاصی در ایران انجام نشده است و همانطور که اشاره شد با توجه به این که این گونه از مهمترین آفات گیاهان زراعی و زینتی در مناطق جنوبی کشور محسوب می‌شود لذا اثر دما روی پارامترهای مهم مانند طول دوره رشدی مراحل مختلف زیستی (تخم، لارو، استراحت اول، پروتومف، استراحت دوم، دتوتو نمف، استراحت سوم، ماده‌ها و نرها)، باروری، بارآوری، مراحل پیش - تولیدمثلی، تولیدمثلی و پس - تولید مثلی ماده‌ها، نرخ ذاتی رشد، نرخ خالص تولید مثلی، زمان دو برابر شدن جمعیت، نرخ منتهای افزایش جمعیت، میزان بقاء و ویژگیهای دیگر مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها

۱- پرورش کنه و گیاه میزبان

کنه‌های ماده از مزرعه بادنجان واقع در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز جمع‌آوری شده و در آزمایشگاه روی گیاه لوبیا پرورش یافتند. انتخاب گیاه لوبیا جهت تشکیل کلنی به دو دلیل بود. با توجه به تحقیقات مختلفی که در زمینه پرورش این کنه‌ها انجام یافته ثابت شده است

کنه، تراکم کلونی، سن ماده‌ها، سن جمعیت، وضعیت باروری ماده‌ها، کیفیت جفتگیری، طول مدت تلقیح ماده‌ها توسط نرها و جنبه‌های مختلف رفتاری می‌باشند (۹). هدف بسیاری از مطالعات انجام شده روی زیست‌شناسی کنه‌های تارتن ارزیابی نرخ ذاتی رشد آنهاست که این امر برای اندازه‌گیری کمی میزان توانایی کنه‌های تارتن جهت ارزیابی طغیان آنها می‌باشد (۹، ۱۰).

آگاهی از سازگاریهای حشرات و کنه‌ها با شرایط آب و هوایی مختلف نقش مهمی در مدیریت آفات به ویژه کمک به پیش بینی زمان رشد و نمو، تولید مثل، دیابوز و مهاجرت آنها دارد (۱۸).

دما یکی از مهمترین عوامل غیرزنده است که دینامیسم جمعیت کنه‌ها، حشرات آفت و دشمنان طبیعی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد (۱۰).

دما همچنین به عنوان یک عامل تعیین کننده در فرایندهای زندگی بندپایان است. بطوریکه در یک دامنه بخصوص، یک تغییر کوچک در دما سبب تغییرات عمده در نرخ هر فرایند بیولوژیکی ویژه می‌شود. این اثر دما را می‌توان توسط توابع بخصوصی که دما را با ویژگیهایی مانند بقاء، تولید مثل و رشد جمعیت مرتبط می‌سازد، توصیف نمود (۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۷). نرخ رشد در آستانه دمای پایین حدود صفر است. با افزایش دما، زیاد شده و سپس در دما بهینه حالت یکنواخت یافته و سرانجام با فرا رسیدن آستانه بالا، به سرعت کاهش می‌یابد. این رابطه در نزدیکی محدوده‌های انتهایی به صورت منحنی - خطی می‌باشد اما در حرارت‌های بهینه تقریباً حالت خطی می‌یابد (۲۲، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۹).

در بررسی تولید مثل، پارامترهای تولیدمثلی و عوامل موثر بر آن اثر دما به عنوان یک عامل خارجی همواره مد نظر است (۲، ۳، ۴، ۸، ۹). از مهمترین مطالعات انجام شده در این زمینه به طور خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

رطوبت معین قرار گرفتند. جهت اطمینان از تولید تمام تخمها در یک دمای یکسان، پس از ۲۴ ساعت تمام تخمهای تولید شده حذف شدند. سپس ۶ ساعت بعد، با بررسی هر یک از اتاقکها، درون هر کدام فقط یک تخم نگهداری شده و بقیه تخمها حذف شدند. بررسی تخمها جهت تعیین نرخ رشد و نمو و بقاء برای تمام مراحل نابالغ و استراحتها (تخم، لارو، استراحت اول، پروتونمف، استراحت دوم، دثوتو نمف، استراحت سوم) و سپس بالغها انجام شد. هر یک از اتاقکها در شبانه روز ۳ بار (۸ صبح، ۲ بعد از ظهر و ۸ شب) مورد بررسی قرار گرفت و انتقال از یک مرحله زیستی به مرحله دیگر ثبت شد. آستانه حرارتی پایین برای رشد و نمو با استفاده از نسبت a/b بدست آمد. a و b با استفاده از رگرسیون خطی $DR = a + bT$ برآورد شدند. در این معادله DR بیانگر نرخ رشد روزانه T دما برحسب درجه سانتیگراد، a و b نیز ضرائب رگرسیون هستند (۱۴، ۲۶، ۲۷). برای دماهای ذکر شده در این بررسی به ترتیب ۷۵، ۶۵، ۵۵، ۶۱، ۵۶ و ۵۸ عدد تخم در نظر گرفته شد. رابطه بین نرخ رشد و نمو مراحل مختلف زیستی و دما در دامنه دمایی ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد با استفاده از رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفت.

۴- تخمگذاری

درون هر اتاقک که حاوی یک کنه در مرحله استراحت سوم^۲ بود، به کمک قلم موی نرم، دو کنه نر قرار داده شد. ۴۸ ساعت پس از ظهور مادهها، نرها حذف شدند. تعداد تخمهای گذاشته شده به ازای هر ماده، روزانه مورد بررسی قرار گرفت و این بررسی تا پایان عمر تمام مادههای موجود در آن گروه انجام شد. دیسکهای برگی هر ۳-۴ روز یکبار تعویض شدند.

که این گیاه، میزبان مناسبی برای رشد و نمو جمعیت کنههای تارتن می باشد (۹). از طرفی چون همزمان با این تحقیق، آزمایشهای دیگری نیز برای مقایسه ارقام مختلف گیاه بادنجان از نظر تاثیر گیاه میزبان در صفات بیولوژیکی کنه تارتن انجام می شد و برای انجام این آزمایش کنهها باید از نظر تغذیه و گیاه میزبان کاملا یکسان باشند لذا برای خالص ساختن کنههای جمع آوری شده از مزرعه، گیاه لویبا در نظر گرفته شد. پس از تشکیل کلنی روی لویبا در آزمایشگاه، کنههای ماده جهت آزمایش استفاده شدند. این کنهها تحت شرایط کنترل شده ذیل روی دیسکهای برگهای بادنجان (وارینه Black beauty) مورد مطالعه قرار گرفتند.

۲- شرایط آزمایش

آزمایشها در ۶ دمای ثابت شامل ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵ و ۴۰ درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی ۶۵-۴۵ درصد و دوره نوری ۱۶ به ۸ ساعت (روشنایی به تاریکی) در قالب طرح کاملا تصادفی و به ترتیب با تکرارهای ۷۵، ۶۵، ۵۵، ۶۱، ۵۶ و ۵۸ در دو دوره زمانی و در ۳ انکوباتور انجام شد. از آنجا که در مقایسه پارامترهای تولیدمثلی (R_0 ، r_m و λ) از روش جک نایف^۱ استفاده شده است لذا استفاده از طرح کاملا تصادفی برای انجام جدول زندگی ضرورت می یابد. دیسکهای برگی با قراردادن برگهای گیاه بادنجان، وارینه بلاک بیوتی، درون ظرف پتری محتوی پنبه غوطه ور در آب، ساخته شد. با استفاده از سلوکاتون (نوعی کاغذ شبیه دستمال کاغذی)، روی هر دیسک برگ، اتاقکهای متعددی برای رشد کنهها ایجاد شد.

۳- نرخ بقاء و رشد ونمو

تعداد ۱ تا ۳ کنه ماده جفتگیری کرده در هر اتاقک روی دیسکهای برگی گذاشته شد. این دیسکهای برگی درون انکوباتور با شرایط دما و

۵- نسبت جنسی

جهت تعیین نسبت جنسی، در طول دوره تخمگذاری بطور تصادفی نمونه هایی از تخمهای تمام کنه‌های ماده گروه انتخاب شد. در این حالت ماده‌ها هر روز روی یک دیسک برگی جدید قرار گرفتند سپس دیسکها و تخمهای روی آن در همان شرایط آزمایشگاهی نگهداری شدند. سر انجام نتاج نر و ماده به دست آمده از این تخمها مورد شمارش قرار گرفت. نسبت نتاج ماده به کل نتاج حاصله به عنوان نسبت جنسی معرفی شد. کنه‌های ماده‌ای که جفتگیری نکرده‌اند فقط نتاج نر تولید می‌کنند، که داده‌های این ماده‌ها برای تعیین نسبت جنسی مورد محاسبه قرار نگرفت. مقادیر محاسبه شده برای تعیین پارامترهای جدول تولید مثلی استفاده شد.

۶- تحلیل کمی جمعیت و پارامترهای

مربوطه

نرخ خالص تولیدمثلی (R_0)، متوسط طول یک نسل (T)، نرخ ذاتی رشد (r_m) و نرخ متناهی افزایش (λ) با استفاده از نرم افزارهای Excel، Pop tools و SAS محاسبه شد. با محاسبه واریانس و خطای معیار این پارامترها بر اساس روش جک‌نایف (۱۱، ۱۵، ۱۶) و بوسیله این نرم افزارها امکان مقایسه این مقادیر فراهم شد. اثر دما روی نرخ ذاتی رشد توسط مدل لوگان و همکاران (۱۴) که تغییر شکلی در آن بوجود آمده است، توصیف شد. فرمول این مدل بصورت زیر می‌باشد.

$$r_m = p \left[\exp \left[p \left(T - T_b \right) \right] - \exp \left[p \left(T_m - T_b \right) \right] - 1 \right] / p \left(T_m - T \right)$$

در این فرمول:

T_b : کمترین دمای مورد آزمایش است.

T_m : آستانه بالای رشد که از مشاهدات بدست می‌آید. مقادیر P_1 ، P_2 و P_3 با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات محاسبه شدند. اعتبار مدل

با توجه به مقادیر r_m محاسبه شده برای هر دما و آزمون χ^2 سنجیده شد.

برای محاسبه پارامترهای مهم جدول تولیدمثلی در این تحقیق از روابط زیر برای تعیین نرخ خالص

تولیدمثلی $\frac{\beta}{\alpha} \sum l_x m_x$ ، متوسط طول دوره یک

نسل $\frac{\sum x l_x m_x}{\sum l_x m_x}$ ، نرخ ذاتی رشد

$1 = \sum e^{-rx} l_x m_x$ و نرخ افزایش متناهی

جمعیت $\lambda = e^r$ استفاده شد. در این روابط، l_x

نشان دهنده نسبت افراد زنده در هر فاصله زمانی از

جدول زندگی می‌باشد. m_x بیانگر متوسط نتاج ماده

تولید شده به ازاء هر یک از ماده‌های جمعیت می

باشد. برای محاسبه این پارامتر متوسط تخمهای

تولید شده به ازاء هر ماده در فواصل زمانی جدول

زندگی، در نسبت جنسی بدست آمده در طول

آزمایش ضرب می‌شود. همچنین r نیز نرخ ذاتی

افزایش طبیعی جمعیت را نشان می‌دهد.

نتایج و بحث

رشد و نمو مراحل نابالغ

نرخ رشد و نمو مراحل نابالغ (تخم تا استراحت

سوم) در دماهای ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد با

استفاده از روابط رگرسیونی، رابطه خطی مثبت با

دما نشان می‌دهد. مدت زمان رشد و نمو در دماهای

۱۵ و ۴۰ درجه سانتی‌گراد بترتیب ۳۰/۳۲ و ۵/۱۹

روز می‌باشد. کمترین و بیشترین مدت زمان بترتیب

در دماهای ۴۰ و ۱۵ درجه سانتی‌گراد مشاهده شده

است (جدول ۱). بقاء ویژه سنی نسبت به زمان در

شکل ۲ نشان داده شده است. این مقدار در دمای

۴۰ درجه سانتی‌گراد کمتر از دماهای دیگر است.

تجزیه واریانس و مقایسه میانگین طول مدت رشد و

(جدول ۲) اما تفسیر علمی درستی برای این نتایج وجود ندارد.

حداکثر طول عمر ثبت شده (۳۸/۲۲) مربوط به دمای ۱۵ درجه سانتی گراد است. طول عمر ماده ها در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد فقط ۶/۵۱ روز است و وجود کمترین شاخص بقاء (۰/۰۱۵) در این دما نشان دهنده نزدیک شدن به آستانه حرارتی بالایی باشد (شکل ۱).

میزان سرانه تخمهای تولید شده (تخم/ ماده/ روز) با افزایش دما، افزایش یافته (F=۱۱/۵۴، df=۱۲۱، p=۰/۰۰۰۱) و در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد به حداکثر مقدار خود (۱۳/۴) می رسد. کمترین میزان سرانه تخم (۲/۸۷) در دمای ۱۵ درجه سانتی گراد مشاهده می شود (جدول ۲).

تعداد کل تخم گذاشته شده به ازاء هر کنه ماده در دماهای مختلف تفاوت معنی داری با هم نشان می دهد (F=۷/۴۶، df=۱۲۱، p=۰/۰۰۰۱) بیشترین (۱۹۰/۵۸) و کمترین (۴۰/۸) تعداد تخم به ازای هر ماده بترتیب در دماهای ۳۵ و ۴۰ درجه سانتی گراد مشاهده شد (جدول ۲).

نمو مراحل نابالغ با آزمون دانکن، اختلاف معنی داری را در دماهای مختلف نشان می دهد (جدول ۱).

آستانه پایین رشد و نمو تتوریکی (صفر بیولوژیکی) برآورد شده با مدل رگرسیون خطی برابر ۱۳/۴ است (a=-۰/۱۳۴، b=۰/۰۱، p<۰/۰۰۶، r²=۰/۹۷). بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایش، گونه *T. turkestan* در دامنه حرارتی وسیعی از

۱۳/۴ تا بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد رشد می کند.

رشد و نمو کنه ماده

طول عمر کنه های ماده^۱ شامل سه دوره پیش - تخمگذاری (F=۲۳۰/۶۹، df=۱۹۶، p=۰/۰۰۰۱)، تخمگذاری (F=۱۵۳/۵، df=۱۹۷، p=۰/۰۰۰۱) و پس - تخمگذاری (F=۴۹۵/۵۴، df=۱۵۳، p=۰/۰۰۰۱) است که با افزایش دما کاهش می یابد (جدول ۲) طول دوره پس - تخمگذاری بین تمام دماهای ۱۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد اختلاف معنی داری نشان داد (p<۰/۰۰۰۱). مقایسه میانگین دوره های تخمگذاری و پیش تخمگذاری، اختلاف معنی داری در بعضی از دماها نشان می دهد

جدول ۱- میانگین طول دوره رشد و نمو (روز) مراحل نابالغ کنه تارتن دولکه ای *T. turkestan* در ۶ دمای ثابت

مراحل زیستی	دما					
	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰
تخم	±۰/۲۴ ^a ۱۳/۹	±۰/۱۴ ^b ۷/۸۵	±۰/۰۴۱ ^c ۴/۷۲	±۰/۰۲۳ ^d ۲/۳۵	±۰/۰۱۶ ^e ۱/۶۷	±۰/۰۵۷ ^f ۱/۴۸
لارو	±۰/۱۶ ^a ۳/۰۲	±۰/۰۱ ^b ۲/۰۱	±۰/۰۰۳ ^c ۱/۰۲	±۰/۰۰۱ ^d ۰/۷۶	±۰/۰۰۲ ^{ed} ۰/۵۱	±۰/۰۰۲ ^{ec} ۰/۶۹
استراحت ۱	±۰/۰۷۳ ^a ۲/۴۱	±۰/۰۲ ^b ۱/۶۸	±۰/۰۱ ^c ۰/۷۵	±۰/۰۰۱ ^d ۰/۴۹	±۰/۰۰۱ ^d ۰/۴	±۰/۰۰۱ ^d ۰/۴۵
پروتونف	±۰/۱۰۱ ^a ۲/۴۲	±۰/۰۳۳ ^b ۰/۸۶	±۰/۰۱ ^c ۰/۶۴	±۰/۰۰۳ ^d ۰/۵۶	±۰/۰۰۲ ^c ۰/۴۲	±۰/۰۰۴ ^c ۰/۶۴
استراحت ۲	±۰/۱۰۸ ^a ۲/۳۷	±۰/۰۱ ^b ۱/۳۸	±۰/۰۰۲ ^c ۰/۹۴	±۰/۰۰۱ ^{ed} ۰/۴۸	±۰/۰۰۲ ^{dd} ۰/۴۲	±۰/۰۰۲ ^{ec} ۰/۵۴
دئوتونف	±۰/۰۸ ^a ۲/۷	±۰/۰۰۲ ^b ۱/۶	±۰/۰۰۱ ^c ۰/۸۹	±۰/۰۰۲ ^d ۰/۵۲	±۰/۰۰۲ ^c ۰/۴۳	±۰/۰۰۲ ^f ۰/۷۴
استراحت ۳	±۰/۰۶ ^a ۳/۵	±۰/۰۰۳ ^b ۱/۷۶	±۰/۰۰۱ ^c ۱/۰۱	±۰/۰۰۱ ^d ۰/۵۵	±۰/۰۰۲ ^c ۰/۴۸	±۰/۰۰۳ ^f ۰/۶۵
جمع کل	±۰/۲۴ ^a ۳۰/۳۲	±۰/۱۷ ^b ۱۷/۴۱	±۰/۰۹ ^c ۹/۹۸	±۰/۰۶۸ ^d ۵/۷۱	±۰/۰۴۶ ^e ۴/۳۳	±۰/۰۳۴ ^f ۵/۱۹

• مقایسه از یک ردیف که با حروف مشابه مشخص شده اند از نظر آماری (α = ۰/۰۵) تفاوت معنی داری ندارند.

جدول ۲ - میانگین طول دوره رشدونمو مراحل مختلف رشدی کنه‌های ماده بالغ و میزان تخمگذاری در کنه تارتن دولکه‌ای *T. turkestanii* در ۶ دمای ثابت

مراحل زیستی	دما					
	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰
پیش-تخمگذاری	±۰/۰۵ ^a ۲/۰۲	±۰/۰۲ ± ^a ۱/۹۵	۰/۰۱ ± ^b ۱/۲۳	± ۰/۰۵ ^c ۰/۶۶	± ۰/۰۴ ^d ۰/۸۱	± ۰/۰۴ ^e ۰/۵۳
تخمگذاری	۰/۳۷ ± ^a ۲۹/۵۷	± ۱/۱۴ ^b ۱۴/۲۸	± ۰/۹ ^c ۹/۸۴	± ۰/۶۵ ^c ۹/۳	± ۰/۳۸ ^c ۱۰/۱۹	± ۰/۶۳ ^d ۵/۳۹
پس-تخمگذاری	± ۰/۱ ^a ۳/۶۲	± ۰/۰۲ ^b ۲/۰۶	± ۰/۰۲ ^c ۱/۰۲	± ۰/۲ ^d ۱/۵۴	± ۰/۰۵ ^e ۰/۹۹	± ۰/۰۵ ^f ۰/۵۸
طول عمر ماده	± ۱۷/۱۹ ^a ۳۸/۲۱	± ۷/۰۸ ^b ۱۸/۳	± ۰/۰۳ ^c ۱۲/۰۹	± ۴/۷۵ ^d ۱۱/۵۱	± ۵/۳۶ ^e ۱۰/۶۶	± ۲/۷۹ ^f ۶/۵۱
تخم/ماده/روز	۰/۱۰۸ ± ^{cc} ۲/۳۷	± ۱/۶ ^{ac} ۴/۵	± ۰/۰۲ ^c ۰/۹۴	± ۳/۴۶ ^a ۱۲/۶۶	± ۴/۶۳ ^a ۱۳/۴	± ۳/۰۳ ^b ۸/۸۱
تعداد کل تخم/ماده	۱/۵ ± ^{ac} ۲/۸۷	± ۵۱/۹۸ ^b ۵۸/۲۹	± ۲/۷۳ ^b ۱۰/۶	± ۱۲۲/۰۴ ^b ۹۹/۴۱	± ۱۴۶/۵۶ ^a ۱۹۰/۵۸	± ۴۲/۱۶ ^b ۴۰/۸
تعداد ماده	۷۵	۶۵	۵۵	۶۱	۵۶	۵۸

• مقادیری از یک ردیف که با حروف مشابه مشخص شده‌اند از نظر آماری (α = ۰/۰۵) تفاوت معنی داری ندارند.

تحلیل پارامترهای کمی جمعیت

مقادیر واقعی نرخ خالص تولید مثل (R_0)، متوسط طول دوره یک نسل (T)، نرخ ذاتی رشد (r_m)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) و زمان دو برابر شدن جمعیت (DT) که با استفاده از داده‌های حاصل از آزمایش در دماهای مختلف بدست آمده به همراه انحراف معیارهای برآورد شده به روش جک‌نایف در جدول ۳ دیده می‌شود. همچنین مقادیر این پارامترها و فواصل اطمینان مربوطه که با روش جک‌نایف برآورد شده‌اند در جدولهای ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ وجود دارد. مقایسه مقادیر این پارامترها در این جداول با مقادیر واقعی آنها (محاسبه شده به روشهای متداول) در جدول ۳ میزان دقت روش جک‌نایف رادر برآورد این پارامترها نشان می‌دهد.

مقادیر نرخ خالص تولید مثل با افزایش دما روند مشخصی ندارند اما طول دوره یک نسل با افزایش

دما کاهش می‌یابد. کمترین (۰/۰۸۹) و بیشترین (۰/۳۷۹) مقدار نرخ ذاتی رشد بترتیب در دماهای ۱۵ و ۳۵ درجه سانتی گراد محاسبه شد. مقادیر نرخ ذاتی رشد در دماهای ۱۵، ۲۰ و ۳۵ درجه سانتی گراد بطور معنی‌داری با هم اختلاف دارند (جدول ۸).

استفاده از مدل لوگان و همکاران (۱۹۷۶) امکان توصیف اثر دما روی نرخ ذاتی رشد جمعیت را فراهم می‌کند. مقادیر پارامترهای مدل لوگان و همکاران که از روش رگرسیون حداقل مربعات برآورد شده شامل $p_1=۰/۱۰۲$ ، $p_2=۰/۱۰۶$ و $p_3=۵/۴۷$ می‌باشند. اثر دما بر نرخ ذاتی رشد و توصیف این اثر با مدل مذکور در شکل ۲ قابل مشاهده است. آستانه حرارتی بالا و همینطور دمای بهینه برای رشد و نمو جمعیت بترتیب ۴۲/۴۴ و ۳۵ درجه سانتی‌گراد برآورد شد. با توجه به آستانه‌های حرارتی پایین و بالا (بترتیب ۱۳/۴ و ۴۲/۴۴ درجه سانتی‌گراد) و

بدست آمده را نمی‌توان با نتایج تحقیق ما مقایسه کرد. زیرا این پارامتر به عوامل مختلفی مثل روش پرورش، شرایط محیطی بویژه دما و عوامل دیگر بستگی دارد (۲، ۹). عامل مهم دیگری که در بعضی از منابع با آن برخورد می‌شود چگونگی برآورد میزان بقاء برای محاسبه پارامترهای جدولهای تولید مثلی است. بعنوان مثال مقادیر نرخ ذاتی رشد محاسبه شده توسط تانیگوشی (۲۶) بدون در نظر گرفتن مرگ و میر نابالغها تعیین شده است که طبق نظر این محقق، برای ۷ دمای انتخابی (۱۸ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد) تفاوتی نداشت.

دمای بهینه (۳۵ درجه سانتی‌گراد) می‌توان گفت که گونه *T. turkestanii* در مقایسه با گونه‌های دیگر جنس *Tetranychus* در دامنه حرارتی وسیع تری رشد و نمو می‌یابد.

مطالعات محققین دیگر (۲، ۴، ۶، ۸، ۹، ۲۱، ۲۶، ۲۸) دمای بهینه ۳۰ و آستانه حرارتی ۳۵ درجه سانتی‌گراد را برای گونه‌های *T. desertorum*، *T. telarius* Linnnaeus، *T. neocaledonicus*، *T. kanzawai*، *T. cinnabarinus* (Boisduval) نشان می‌دهد. نرخهای رشد ذاتی جمعیت که بوسیله محققین دیگر برای گونه‌های مختلف جنس *Tetranychus*

جدول ۳- مقادیر میانگین (\pm SE) شاخصهای رشد جمعیت کنه تارتن دولکه‌ای *T. turkestanii* در ۶ دمای ثابت

شاخصهای جمعیت					دما
DT	λ	r_m	T	R_0	
۷/۷۸ (۰/۲۸)	۱/۰۹۳ (۰/۰۰۳)	۰/۰۸۹ (۰/۰۰۳)	۳۶/۶۷ (۰/۸۱)	۲۶/۲۵ (۰/۸۱)	۱۵
۴/۷۶ (۰/۰۹)	۱/۱۵۶ (۰/۰۰۳)	۰/۱۴۵ (۰/۰۰۲)	۲۳/۴۷ (۰/۳۲)	۳۰/۵۳ (۰/۳۲)	۲۰
۳/۱۲ (۰/۷۸)	۱/۲۴۸ (۰/۰۰۶)	۰/۲۲۲ (۰/۰۰۵)	۱۵/۵۶ (۰/۳۲)	۳۱/۷ (۲/۸۲)	۲۵
۲/۲۱ (۰/۰۶۳)	۰/۳۶۸ (۰/۰۱۲)	۰/۳۱۳ (۰/۰۰۹)	۹/۵ (۰/۱۶)	۱۹/۶۹ (۱/۶۷)	۳۰
۱/۸۳ (۰/۰۰۴)	۱/۴۶ (۰/۰۱۲۴)	۰/۳۷۹ (۰/۰۰۸)	۸/۶۴ (۰/۰۹)	۲۶/۴۵ (۱/۸۲)	۳۵
۲/۷۴ (۰/۰۳۷)	۱/۲۸۸ (۰/۰۰۴۱)	۰/۲۵۳ (۰/۰۰۳۲)	۶/۵۹ (۰/۵۱)	۵/۳۱ (۰/۸۴)	۴۰

جدول ۴- مقادیر میانگین، کمینه و بیشینه نرخ خالص تولیدمثل کنه تارتن دولکه‌ای *T. turkestanii* با روش جک‌نایف

R_0 نرخ خالص تولیدمثل			دما
کمینه	میانگین	بیشینه	
۱۷/۵۲	۲۶/۲۵	۳۳/۹۷	۱۵
۲۵/۶۱	۳۰/۵۳	۳۵/۴۵	۲۰
۲۵/۹۲	۳۱/۷۰۲	۳۷/۴۸	۲۵
۱۶/۲۹	۱۹/۶۹	۲۳/۰۹	۳۰
۲۲/۷۲	۲۶/۴۴	۳۰/۱۷	۳۵
۳/۶۰۳	۵/۳۱	۷/۰۲	۴۰

جدول ۵- مقادیر میانگین، کمینه و بیشینه طول دوره یک نسل کنه تارتن دولکه‌ای
T. turkestanii با روش جک‌نایف

طول دوره یک نسل (T)			دما
کمینه	میانگین	بیشینه	
۳۵/۱۰۳	۳۶/۷۴	۳۸/۳۸	۱۵
۲۲/۸۴	۲۳/۴۹	۲۴/۱۴	۲۰
۱۴/۹۰۷	۱۵/۵۷	۱۶/۲۳	۲۵
۹/۱۸	۹/۴۹	۹/۸۲	۳۰
۸/۴۴	۸/۶۴	۸/۸۳	۳۵
۵/۵۲	۶/۵۸	۷/۶۳	۴۰

جدول ۶- مقادیر میانگین، کمینه و بیشینه مدت زمان دو برابر شدن یک نسل کنه تارتن دولکه‌ای
T. turkestanii با روش جک‌نایف

مدت زمان دو برابر شدن یک نسل (DT)			دما
کمینه	میانگین	بیشینه	
۸/۱۹	۷/۷۶	۸/۳۲	۱۵
۴/۵۷	۴/۷۶	۴/۹۴	۲۰
۲/۹۶	۳/۱۲	۳/۲۸	۲۵
۲/۰۷۵	۲/۲۰۵	۲/۳۳	۳۰
۱/۷۴	۱/۸۳	۱/۹۱	۳۵
۱/۹۲	۲/۶۸	۳/۴۴	۴۰

جدول ۷- مقادیر میانگین، کمینه و بیشینه نرخ متناهی افزایش جمعیت کنه تارتن دولکه‌ای
T. turkestanii با روش جک‌نایف

نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ)			دما
کمینه	میانگین	بیشینه	
۱/۰۸۶	۱/۰۹۳	۱/۱۰۰	۱۵
۱/۱۵۰۲	۱/۱۵۶	۱/۱۶۳	۲۰
۱/۲۳۴	۱/۲۴۸	۱/۲۶۲	۲۵
۱/۳۴۳	۱/۳۶۸	۱/۳۹۴	۳۰
۱/۴۳۵	۱/۴۶۱	۱/۴۸۶	۳۵
۱/۲۰۳	۱/۲۸۸	۱/۳۷۳	۴۰

جدول ۸- مقادیر میانگین، کمینه و بیشینه نرخ ذاتی افزایش جمعیت کنه تارتن دولکه‌ای *T. turkestanii* با روش جک‌نایف

نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r_m)			دما
کمینه	میانگین	بیشینه	
۰/۰۸۲	۰/۰۸۹	۰/۰۹۵	۱۵
۰/۱۳۹	۰/۱۴۵	۰/۱۵۱	۲۰
۰/۲۱۰	۰/۲۲۲	۰/۲۳۳	۲۵
۰/۲۹۵	۰/۳۱۴	۰/۳۳۲	۳۰
۰/۳۶۱	۰/۳۷۹	۰/۳۹۶	۳۵
۰/۱۸۷	۰/۲۵۴	۰/۳۲۰	۴۰


می‌باشد. در این تحقیق بالاترین مقدار نرخ ذاتی رشد گونه *T. turkestanii* در دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد ۰/۳۷۹ کنه ماده به ازای هر ماده در هر روز تخمین زده شد. این مقدار بیشتر از حداکثر مقدار ثبت شده برای گونه *T. urticae* (۰/۳۳) و کمتر از مقدار تعیین شده برای گونه *T. mcdanieli* (۰/۴۳۱) در دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد (۲). بنابراین می‌توان فرض نمود که *T. turkestanii* پتانسیل بالایی برای رشد و نمو جمعیت در دامنه حرارتی تعیین شده دارد بطوریکه مقدار نرخ رشد ذاتی بالایی از (۰/۰۸۹ تا ۰/۳۷۹) در دماهای ۱۵ و ۳۵ درجه سانتی‌گراد بدست می‌آید.

بر اساس گزارش محققین مختلف، گونه *T. turkestanii* یک آفت مهم برای تعداد زیادی از محصولات زراعی و باغی می‌باشد (۴، ۹). بر اساس نتایج این تحقیق، این کنه گیاهخوار در مقایسه با گونه‌های دیگر این خانواده دریک دامنه حرارتی گسترده (کمتر از ۱۵ تا بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد)، دارای نرخ ذاتی رشد زیادی (از ۰/۰۸۹


در دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد، تقریباً تمام مقادیر نرخ ذاتی رشد جمعیت که برای گونه‌های جنس *Tetranychus* محاسبه شده در دامنه ۰/۲۴ تا ۰/۳۲ قرار می‌گیرد. مثلاً برای گونه‌های *T. kanzawai*، *T. mcfarlani*، *T. caledonicus*، *T. urticae*، *T. pacificus*، *T. turkestanii* و *T. mcdanieli* بترتیب ۰/۲۴۳، ۰/۲۴۴، ۰/۲۶۷، ۰/۲۹۳، ۰/۲۹۴ و ۰/۳۱۸ تخمین زده شده است. فقط مقادیر نرخ ذاتی رشد محاسبه شده برای گونه *T. desertorum* و *T. telarius* بترتیب ۰/۴۲ و ۰/۴۶ بوده است. همانطور که در بالا نیز ذکر شد، روش محاسبه نرخ ذاتی رشد می‌تواند سبب ایجاد تغییرات قابل توجهی شود و بیشتر مواقع باعث تخمین مقدار بالاتری برای این پارامتر می‌شود (۲۳). بنابراین برای یک مقایسه منطقی لازم است که محاسبه نرخ ذاتی رشد به روش مشابهی انجام شده باشد. در گونه‌های *T. evansi*، *T. mcdaneili* و *T. urticae* دمای بهینه نسبت به بقیه جمعیت‌های جنس *Tetranychus* که قبلاً ذکر شد، بالاتر

بیشترین نرخ رشد در دماهای بیشتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد است و این دامنه حرارتی در استان خوزستان وجود دارد لذا در اواخر فصل بهار تا اواسط پاییز جمعیت این گونه به وفور روی میزبانهای

تا ۰/۳۷۹ کنه ماده به ازای هر ماده در هر روز) است. این ویژگی، این کنه را قادر ساخته که هنگام مهیا بودن میزبان و قرار گرفتن در یک دامنه حرارتی مناسب سرعت ازدیاد یابد. از آنجا که



شکل ۱- تغییرات بقای ویژه سنی کنه تارتن دولکه‌ای *T.turkestani* در ارتباط با زمان در ۶ دمای ثابت



شکل ۲- مقایسه مقادیر نرخ ذاتی رشد بدست آمده در آزمایش و برآورد شده از مدل تغییر یافته لوگان

$$R^2 = 0.999, \quad \chi^2 = 0.00003, \quad r_m = p_1 [\exp[p_2(T - T_b)] - \exp[p_2(T_m - T_b)] - 1 / p_3(T_m - T)]$$

و $SSR = 0.000002$ در این مدل p_1, p_2, p_3 ثابتهای مدل (بترتیب $0.102, 0.106, 5/43$)، T_m, T_b, T دماهای بترتیب

مورد آزمایش، کمترین دمای مورد آزمایش و دمای حداکثر کشنده برآورد شده با مدل (۴۲/۴۴) است. فواصل اطمینان r_m بدست آمده از روش جک نایف روی شکل نشان داده شده است.

T. turkestanii باید انجام شود تا عوامل اصلی موثر در تغییرات جمعیت شناخته شده و به کمک آن روشهای مناسبی برای توسعه و ایجاد یک برنامه مدیریتی مبارزه برای این آفت بدست آید.

مختلف مشاهده می‌شود (مشاهدات نگارندگان). بنا بر این با توجه به اهمیت این گونه از نظر ایجاد خسارت روی میزبانهای متعدد در مناطق جنوبی کشور تحقیقات بیشتری در زمینه تاثیر عوامل زنده و غیرزنده دیگر روی زیست شناسی گونه

منابع

- 1- Allen, J. C. 1976. A modified method for calculating degree days. *Environmental Entomology*, 5(3) : 388-396.
- 2- Bonato, O. 1999. The effect of temperature on life history parameters of *Tetranychus evansi* (Acari : Tetranychidae). *Experimental and Applied Acarology* 23: 11-19.
- 3- Broufas, G. D. and Koveos, D. S. 2000. Threshold temperature for post –diapause development and degree-day to hatching of winter eggs of the European red mite (Acari : Tetranychidae) in northern Greece . *Environmental Entomology* 29 (4) : 710-713.
- 4- Carey, J. R. and Bradley, J. W. 1982. Developmental rates, vital schedules, sex ratios, and life tables for *Tetranychus urticae*, *T. turkestanii* and *T. pacificus* (Acarina Tetranychidae) on cotton. *Acarologia* 23 (4) : 333-345.
- 5- Carey, J. R. 2001. Insect biodemography. *Annual Review of Entomology*, 46 : 79-110.
- 6- Carey, J. R. 1982. Demography of the two-spotted spider mite *Tetranychus urticae* Koch. *Oecologia*, 52 : 389-395.
- 7- CHI, H. 1988 . Life- table analysis incorporating both sexes and variable development rates among individuals. *Environmental Entomology* 17 (1) : 26-34 .
- 8- Gotoh, T. and Nagata, T. 2001. Development and reproduction of *Oligonychus coffeae* (Acari : Tetranychidae) on tea . *International Journal of Acarology* 27 (4) : 293-289.
- 9- Helle, W. and Sabelis, M. W. 1985. Spider Mites , Their Biology, Natural Enemies and Control. Vol.A, Elsevier , Amsterdam. 405 pp.
- 10- Huffaker, C. H. and Gutierrez, A. P. 1999. *Ecological Entomology*. Second Edition, John Wiley and Sons, Inc. New York 756 pp.
- 11- Hulting, F. L., David, B. O. and Obrycki, J. J. 1990. A computer program for calculation and statistical comparison of intrinsic rates of increase and associated life table parameters. *Florida Entomologist* , 73 (4) : 601 – 612.

- 12- Jones, V. P. and Morse, J. G. 1984 . A synthesis of temperature dependent developmental studies with the citrus red mite , *Panonychus citri* (McGregor) (Acari : Tetranychidae). Florida Entomologist, 67(2): 213-221.
- 13- Lobinske, R. J., ALI, A. and Firouz, J .2002. Laboratory estimation of degree – day developmental requirements of *Glyptotendipes paripes* (Diptera : Chironomidae). Environmental Entomology, 31 (4) : 608- 611.
- 14- Logan, J. R., Wollkind, D. J., Hoyp, S. C. and Tanigoshi , L. K. 1976. An analytic for description of temperature dependent rate phenomena in arthropods. Environmental Entomology, 5 (6): 1133-1140.
- 15- Mala, Aline DE H. N., Luiz, Aalfredo, J. B. and Campanhola, C. 2000 .Statistical inference on associated fertility life table parameters using Jacknife technique: Computational aspects. Journal of Economic Entomology, 93 (2) : 511-518.
- 16- Meyer, J. S., Ingersoll, C. G., Mcdonald, L. L. and Boyce, M. S. 1986. Estimating uncertainty in population growth rate: Jackknife vs. Bootstrap techniques. Ecology, 67 : 1156 – 1166.
- 17- Mittyakina, O. N., Ziskind, L. A., Iizhevskiy, S. S. and Klimenko, A. 1994. The effects of temperature and humidity on the development of *Edovum puttleri* (Hymenoptera, Eulopidae), an egg parasite of the colorado potato beetle. Entomological Review, 73(3): 64 -70.
- 18- Nechols, J. R., Tauber, M. J., Tauber, T. A. and Masaki, S. 1999. Adaptations to hazardous seasonal conditions: dormancy, migration, and polyphenism, pp. 159- 200. In: C. B. Huffaker and A. P. Gutierrez (EDS.), Ecological Entomology, Second Edition, Wiley, New York.
- 19- Nordenfors, H., Hoglund, J. and Uggl, A. 1999. Effect of temperature and humidity on oviposition, molting, and longevity of *Dermanysus gallinae* (Acari: Dermanyssidae) .Journ of Medical Entomology, 36(1): 68-72.
- 20- Nowierski, R. M., Zeng, Z. and Scharen, A. L. 1995 . Age-specific life table modeling of the Russian wheat aphid (Homoptera : Aphididae) on barley grown in benzimidazole agar.Environmental Entomology ,24 (5): 1284-1290.
- 21- Roy, M., Brodeur, J. and Cloutier, C. 2002.Relationship between temperature and developmental rate of *Stethorus punctillum* (Coleoptera : Coccinellidae) and its prey *Tetranychus macdanieli* (Acari: Tetranychidae). Environmental Entomology , 31 (1): 177- 187.
- 22- Sheng, S. L., Zhang, G. M., and Zhu, J.1995.Influence of temperature variations on rate of development in insect : analysis of case studies from Entomological literature. Annals of the Entomological Society of America , 88(2) : 107- 119.
- 23- Southwood, T. R. E. 1978. Ecological Methods. Chapman and Hall , London . 524 PP

- 24 -Stinner, R. E. 1974. An algorithm for temperature dependent growth rate simulation . Canadian Entomologist, 106 : 519-524.
- 25- Stinner, R. E., Butler, G. D., Bachler, J. S. and Tuttle, C. 1975. Simulation of temperature dependent development in population dynamics models. Canadian Entomologist, 107 : 1167-1174.
- 26- Tanigoshi, L. K. , Hoyt S. C., Browne, R. W. and Logan, J. A. 1975. Influence of temperature on population increase of *Tetranychus mcdaneili* (Acarina: Tetranychidae). Annals of the Entomological Society of America, 86 (6): 972 – 978.
- 27- Thomas, D. B. 1997 .Degree- day accumulations and seasonal duration of the pre-imaginal stages of the Mexican fruit fly (Diptera: Tephritidae). Florida Entomologist , 80 (1) : 71-79.
- 28- Trchilo, P. J. and Leigh, T. F. 1985. The use of life tables to assess varietal resistance of cotton to spider mites .Entomologia Experimentalis et Applicata, 39 : 27- 33.
- 29- Wagner,T. L., WU, H. I., Sharpe, P. J. H., Schoolfeld, R. M. and Coulson, R. N.1984. Modeling insect development rates: a literature review and application of a biophysical model. Annals of the Entomological Society of America, 77:208-225.