

## بررسی شیوع اروژن دندانی و عوامل ایجاد کننده آن در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی یزد در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۹۲

دکتر فرناز فراحت<sup>۱</sup>- دکتر عبدالرحیم داوری<sup>۲</sup>- دکتر مطهره امیری<sup>۳</sup>- دکتر ابراهیم مکاریزاده<sup>۴</sup>

- ۱- استادیار گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi، یزد، ایران
- ۲- استاد گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی و عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi، یزد، ایران
- ۳- استادیار گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi، یزد، ایران
- ۴- دندانپزشک

### **Evaluation of dental erosion prevalence and contributing factors in patients referring to Yazd dental school in 2012-2013**

Farnaz Farahat<sup>1†</sup>, Abdolrahim Davari<sup>2</sup>, Motahare Amiri<sup>3</sup>, Ebrahim Mokarizadeh<sup>4</sup>

1<sup>†</sup>- Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran (Farnaz.farahat@gmail.com)

2- Professor, Department of Operative Dentistry, Member of Social Determinant of Oral Health Research Center, School of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

3- Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

4- Dentist

**Background and Aims:** Dental erosion refers to the loss of tooth structure by being scratched chemically without bacterial involvement which needs to care about due to its prevalence and treatment problems. This study was designed with the aim of evaluation of the frequency of dental erosion and its causing factors in patients referring to yazd dental school in 2012-2013.

**Materials and Methods:** In this cross-sectional study, 400 patients referring to yazd dental school were randomly selected. All of their teeth were evaluated in three surfaces (buccal, lingual and occlusal). The BEWE score was used for classification the extent of damages. Also, patients were given a questionnaire that included patient demographic information and questions to investigate the causes of dental erosion. Data were analyzed using SPSS version 17 and Mann-Whiney, Fisher exact, and Chi-square tests.

**Results:** In this study, 138 men and 261 women were participated with the mean age of  $33.26 \pm 10.83$ . 84 persons (21.1%) had erosion. There was a direct and significant relationship between the dental erosion and patient's age ( $P < 0.001$ ). Also, there was a direct relationship between the dental erosion and reflux and consumption of lemon and pickle, beverages, soft beer and juice ( $P < 0.001$ ).

**Conclusion:** Consumption of lemon and pickle, beverages, soft beer and juice increases the risk of erosion. Considering the prevalence of dental erosion in about 21% of patients, it is necessary to pay more attention to the knowledge of the causes of erosion and reduction strategies of it.

**Key Words:** Tooth erosion, Prevalence, Contributing factors

Journal of Dental Medicine-Tehran University of Medical Sciences 2016;28(4):315-22

+ مولف مسؤول: نشانی: یزد- خیابان امام خمینی- ابتدای بلوار دهه فجر- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi- گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی  
تلفن: ۳۶۲۵۵۸۸۱ نشانی الکترونیک: Farnaz.farahat@gmail.com

### چکیده

**زمینه و هدف:** اروژن دندانی، از دست رفتن یا سایش شیمیایی ساختار دندان بدون دخالت عامل باکتریایی است که شیوع روزافروزی دارد و با توجه به مشکلات درمانی آن نیازمند توجه و پیگیری دقیق است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع اروژن و عوامل ایجاد کننده آن در مراجعین به دانشکده دندانپزشکی یزد در سال ۱۳۹۱-۹۲ انجام شد.

**روش بررسی:** در این مطالعه توصیفی- مقطعي، ۴۰۰ بیمار مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی یزد در سال ۱۳۹۲، به صورت تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. تمام دندان‌های آن‌ها در سه سطح باکال، لینگوال و اکلوزال مورد بررسی قرار گرفتند. برای درجه‌بندی وسعت ضایعات، از شاخص (Basic Erosive Wear Examination) BEWE استفاده شد. همچنین پرسشنامه‌ای در اختیار بیماران قرار گرفت که شامل اطلاعات دموگرافیک بیمار و سوالاتی جهت بررسی از نرم‌افزار آماری SPSS17 و آزمون‌های Fisher Exact test، Mann-Whiney test و Chi-Square test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

**یافته‌ها:** در این مطالعه ۱۳۸ مرد و ۲۶۱ زن با میانگین سنی  $۳۳/۲۶ \pm ۱۰/۸۲$  شرکت داشتند. در مجموع ۸۴ نفر از بیماران (۱۱/۲۱٪) دارای اروژن و ۳۱۵ بیمار (۷۸/۷٪) فاقد اروژن بودند. بین ابتلاء به اروژن دندانی و سن بیماران ارتباط آماری مستقیم و معنی‌داری وجود داشت ( $P < 0.001$ )، همچنین رابطه مستقیمی بین اروژن دندانی با ترشی کردن معده، مصرف لیموترش و ترشی، نوشابه، دلسترهای آبمیوه دیده شد ( $P < 0.001$ ).

**نتیجه‌گیری:** مصرف موادی مثل لیموترش و ترشی، نوشابه، دلسترهای آبمیوه احتمال اروژن را افزایش می‌دهند. بنابراین با توجه به شیوع حدود ۲۱ درصد اروژن در بیماران مورد بررسی لازم است توجه بیشتری به آموزش علل اروژن و راهکارهای کاهش آن معطوف گردد.

### کلیدواژه‌ها: اروژن دندانی، شیوع، عوامل مؤثر

وصول: ۹۴/۰۱/۲۲ اصلاح نهایی: ۹۴/۰۸/۳۰ تأیید چاپ: ۹۴/۰۹/۱۲

### مقدمه

می‌شود<sup>(۵)</sup>. در مطالعه Mousavi-Nasab و Abbasi<sup>(۶)</sup>، فراوانی اروژن دندانی در صنف باطری ساز اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، ۲۷/۲٪ از افراد مورد مطالعه دارای اروژن دندانی در سطح باکال و لینگوال بودند و ۷۲/۸٪ فاقد اروژن دندانی بودند. همچنین رابطه معناداری بین سن، سابقه کار و رژیم غذایی با اروژن دندانی گزارش شد.

در مطالعه Nahás-Pires-Corréa<sup>(۷)</sup> و همکاران در سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۶ به منظور بررسی شیوع اروژن بین ۲۳۲ نفر در سینی ۲ تا ۲۰ سال انجام گرفت، شیوع اروژن ۲۵/۴۳٪ گزارش شد که هم در دندان شیری و هم دندان دائمی بیشترین ضایعه اروژن با رقم ۷۶٪ در سطح اکلوزال مشاهده گردید و در گیری سطح باکال ۹/۲٪ بود.

در مطالعه Moslemi و همکاران<sup>(۸)</sup>، اپیدمیولوژی اروژن دندانی در ۱۷-۱۴ دختر ساله قزوینی بررسی گردید، که شیوع اروژن در جمعیت مورد مطالعه ۱۴/۴٪ گزارش شد، از میان دندان‌های معاینه شده بیشترین دندان‌های در گیر سانترال بالا و بیشترین سطح در گیر نیز سطح لبیال بود.

باتوجه به این که مطالعات محدودی در ایران پیرامون اروژن دندانی انجام شده است که آن‌ها نیز محدود به شغل و یا سن خاصی

اروژن یا سایش شیمیایی دندان از دست رفتن پاتولوژیک بافت سخت دندانی (مینا و عاج) در اثر فرایند شیمیایی اسیدی است که عامل باکتریایی و پلاک دندانی در ایجاد آن دخیل نیستند. این ضایعه غیرقابل برگشت است و به تغییر ظاهر و عملکرد دندان منجر می‌شود<sup>(۱)</sup>.

اروژن یک روند چندعاملی است و توسط بسیاری از عوامل داخلی و یا خارجی پدید می‌آید. عوامل خارجی شامل نوشیدنی‌های اسیدی و گازدار، ترشیجات، میوه‌های خانواده مرکبات و برخی داروها نظیر قرص‌های جوشان می‌باشد. از عوامل عمده اروژن با منشاء داخلی می‌توان به برگشت محتویات معده به مری (Reflux)، التهاب مزمن سیستم گوارشی و یا ناهنجاریهای اشتهاهی نظیر پرخوری عصبی (Bulimia) و بی‌اشتهاهی عصبی (Anorexia) که باعث استفراغ‌های پیاپی می‌شوند، اشاره کرد<sup>(۲)</sup>.

با تغییر شیوه زندگی طی دهه‌ها، میزان کلی و فراوانی مصرف غذاها و نوشیدنی‌های اسیدی نیز تغییر یافته است. پژوهش‌ها<sup>(۳،۴)</sup> نشان داده که اگر در رژیم غذایی، مصرف مواد اسیدی بیش از ۴ بار در روز وجود داشته باشد، در صورتی که همراه با سایر عوامل خطر مانند نگهداری نوشیدنی در دهان باشد، منجر به ایجاد و پیشرفت اروژن

### استفاده می‌کنند؟

پس از معاینه و تکمیل پرسشنامه‌ها، داده‌های جمع‌آوری شده وارد نرم‌افزار آماری SPSS 17 شد. برای مقایسه سن بیماران بین گروه‌های با یا بدون اروژن از آزمون Mann-Whiney استفاده گردید. برای بررسی ارتباط جنسیت با اروژن از آزمون Chi-Square استفاده شد. برای بررسی اثر عواملی مثل مسوک زدن، دندان قروچه، ریفلاکس بزرگ، Chi-Square test و Fisher Exact test به اروژن برابر شد. معده بر ابتلا به اروژن کار رفت. جهت بررسی اثر عوامل مختلف غذایی بر روی اروژن از آزمون Chi-Square استفاده گردید. حد معنی داری آماری کمتر از ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

### یافته‌ها

با توجه به محدودش بودن اطلاعات یکی از پرسشنامه‌ها، حجم نمونه‌های مورد بررسی، ۳۹۹ نفر بود. از این تعداد ۱۳۸ نفر مرد (۵۸/۴٪) با میانگین سنی  $32/9 \pm 12$  سال و ۲۶۱ نفر زن (۴۱/۶٪) با میانگین سنی  $33/4 \pm 10$  سال بودند. محدوده سنی افراد مورد مطالعه ۷۴–۱۴ سال و میانگین سنی آن‌ها  $26 \pm 10/83$  بود. در مجموع ۸۴ نفر (۱۱/۲۱٪) از بیماران، دارای اروژن دندانی و ۳۱۵ بیمار (۹/۷۸٪) فاقد اروژن بودند.

بررسی نمره BEWE بیماران مبتلا به اروژن نشان داد که در ۴۳ نفر (۲/۵۱٪) هیچ Erosion risk ای وجود ندارد و در ۴۱ نفر (۸/۴۸٪)، Erosion risk پایین است. فراوانی Erosion risk مربوط به افراد دارای اروژن در جدول ۲ نشان داده شده است.

میانگین سنی افراد دارای اروژن دندانی  $39/0 \pm 12/74$  و در بیماران فاقد اروژن دندانی  $27/3 \pm 9/72$  بود. نتایج آزمون آماری Mann-Whiney test از نظر سن تفاوت معنی داری وجود دارد ( $P < 0/001$ ).

از ۱۳۸ مرد شرکت کننده در مطالعه ۳۳ نفر (۹/۲۳٪) و از ۲۶۱ زن مورد مطالعه ۵۱ نفر (۱۹/۵٪) مبتلا به اروژن دندانی بودند. نتایج آزمون آماری Chi-Square اختلاف معنی‌داری بین زنان و مردان مورد مطالعه در ابتلا به اروژن دندانی نشان نداد ( $P = 0/306$ ).

همان گونه که در جدول ۳ ملاحظه می‌شود با توجه به نتایج آزمون آماری Chi-Square Test اختلاف آماری معنی‌داری بین

بوده‌اند، بر آن شدیدم تا با استفاده از شاخص معتبر BEWE (Basic Erosive Wear Examination) که در مطالعات مشابه داخلی از آن استفاده نشده است، میزان شیوع اروژن دندانی و عوامل ایجاد کننده آن را در بین بیماران دانشکده دندانپزشکی یزد در سال تحصیلی ۱۳۹۱–۹۲ مورد بررسی قرار دهیم.

### روش بررسی

در این مطالعه توصیفی- مقطعي، پس از تصویب طرح پژوهشی در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به شماره پ/۱۷/۱۱۶۸۸۱/۱/۱۷، ۴۰۰ بیمار بالای ۱۲ سال مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی یزد در سال ۱۳۹۱–۹۲ به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. افرادی که دارای پروتزهای ثابت و متحرک بودند (حتی یک پروتز دندانی) از مطالعه خارج شدند. معاینه توسط یک دانشجوی سال ششم دندانپزشکی و با نظارت یکی از اعضاء هیئت علمی انجام شد. همچنین برای تشخیص صحیح اروژن، توسط یکی از اعضاء هیئت علمی بخش ترمیمی و زیبایی آموزش‌های لازم به وی داده شد. تمام دندان‌ها به وسیله گاز خشک گردید و در سه سطح باکال، لینگوال و اکلوزال (اینسیزال) زیر نور یونیت توسط آئینه تخت دندانپزشکی مورد بررسی قرار گرفتند و برای دقت بیشتر از چراغ قوه استفاده گردید. برای درجه بندی وسعت ضایعات از شاخص BEWE (Basic Erosive Wear Examination) (۹) استفاده شد. جدول ۱ درجه بندی اروژن بر اساس میزان درگیری سطوح را نشان می‌دهند. در این مقیاس، گرفتارترین سطح در هر Sextant به عنوان نماینده آن Sextant در نظر گرفته می‌شود. درگیری آن سطح توسط مشاهده چشمی بررسی و عدد مربوطه بر اساس جدول ۱ ثبت گردید. سپس اعداد مربوط به شش Sextant با هم جمع شده و به عنوان نمره اروژن آن فرد در نظر گرفته شد. Erosion risk هر فرد با توجه به جدول ۲ تعیین گردید. پس از آن پرسشنامه‌ای در اختیار بیمار قرار گرفت. این پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک (سن، جنس)، بیماری‌ها و داروهای مصرفی بیمار، دفعات و شدت مسوک زدن و وجود دندان قروچه بود. همچنین در مورد عادات غذایی بیمار سوالاتی پرسیده شد از جمله این که آیا موادی مانند آلوچه اینه پرتقال کیوی، دلستر نوشابه‌های گازدار آبمیوه، ترشی و لیمو ترش را حداقل دو بار در هفته

جدول ۱- معیارهای درجه بندی سایش اروژیو (Bartlett and Others) (۹)

میزان سایش اروژیو	Score
هیچ گونه سایش اروژیو دندان وجود ندارد.	۰
از دست رفتن اولیه سطح دندان مشاهده شود.	۱
نقص واضح، ولی کمتر از ۵۰٪ سطح بافت سخت دندانی از دست رفته است.	۲
بیش از ۵۰٪ سطح بافت سخت دندانی از دست رفته است.	۳

جدول ۲- تعیین فراوانی میزان Erosion risk (۹) در افراد مورد مطالعه

درصد	تعداد افراد	مجموع امتیازهای همه Sextant ها در مقیاس BEWE	Risk level
۵۱/۲	۴۳	کمتر یا مساوی ۲	هیچ
۴۸/۸	۴۱	۳-۸	پایین
۰	۰	۹-۱۳	متوسط
۰	۰	۱۴ و بالاتر	بالا
۱۰۰	۸۴		جمع

جدول ۳- تعیین و مقایسه توزیع فراوانی پاسخ به سوالات مطرح شده توسط افراد دارای اروژن و فاقد اروژن دندانی

سوالات	اروژن					
	دارد			ندارد		
P-Value	جمع	درصد	تعداد	درصد	تعداد افراد	
# .۰/۷۰	۱۰۰	۳۷۹	۲۰/۶	۷۸	۷۹/۴	۳۰۱
	۱۰۰	۱۱	۲۷/۳	۳	۷۲/۷	۸
* .۰/۳۰	۱۰۰	۱۸۸	۲۲/۳	۴۲	۷۷/۷	۱۴۶
	۱۰۰	۱۹۷	۱۷/۸	۳۵	۸۲/۲	۱۶۲
* .۰/۳۶	۱۰۰	۵۳	۲۶/۴	۱۴	۷۳/۶	۳۹
	۱۰۰	۳۴۶	۲۰/۲	۷۰	۷۹/۸	۲۷۶
* .۰/۱۰	۱۰۰	۱۴	۵۰	۷	۵۰	۷
	۱۰۰	۳۸۵	۲۰	۷۷	۸۰	۳۰۸
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۰۰	۳۹۳	۲۱/۱	۸۳	۷۸/۹	۳۱۰
* < .۰/۰۱	۱۰۰	۵۸	۷۰/۷	۴۱	۲۹/۳	۱۷
	۱۰۰	۳۳۵	۱۲/۵	۴۲	۸۷/۵	۲۹۳

#Fisher Exact test

\*Chi-square test

جدول ۴- توزیع فراوانی علل ایجاد کننده اروژن دندانی در افراد مورد مطالعه

Odds ratio	P-Value	جمع		ندارد		دارد		اروژن		علل ایجاد کننده اروژن
		درصد	تعداد	درصد	تعداد افراد	درصد	تعداد افراد	درصد	تعداد افراد	
۱/۵۹ (۰/۹۷-۲/۵۹)	۰/۹۰	۱۰۰	۱۵۰	۷۴	۱۱۱	۲۶	۳۹	۳۹	۳۹	کبوی، پرتقال، آلوچه، آبیه
۲/۳۶ (۱/۴۵-۳/۸۵)	<۰/۰۰۱	۱۰۰	۱۹۰	۷۰/۵	۱۳۴	۲۹/۵	۵۶	۵۶	۵۶	لیموترش و ترشی
۴/۳۳ (۲/۶۱-۷/۱۷)	<۰/۰۰۱	۱۰۰	۱۳۸	۶۲/۳	۸۶	۳۷/۷	۵۲	۵۲	۵۲	نوشابه، دلستر، آبمیوه
-	۰/۱۴	۱۰۰	۵۰	۷۰	۳۵	۳۰	۱۵	۱۵	۱۵	هیچ کدام

Chi-Square test

است و نیز می‌توان از آن برای بررسی تغییرات اروژن در طی زمان استفاده کرد (۹).

تشخیص اروژن از ضایعاتی مثل اتریشن و ابریژن حائز اهمیت است. در اروژن سطح پالاتال، معمولاً مینای مجاور مارژین جینجیوال دست نخورده باقی می‌ماند. در اروژن سطح باکال، ضایعات مقعر با مارژین‌های روند مشاهده می‌شود و گاهی عاج زرد زیرین هم مشخص است. در مراحل اولیه اروژن سطح اکلوزال تغییرات سطحی اندکی مشاهده می‌شود و با پیشرفت ضایعه نواحی گود شده با مارژین‌های روند در نوک کاسپ‌ها دیده می‌شود. همچنین ممکن است لبه اینسیزال دندان‌های قدمی نازک شده و نمای ترانسلوستنت پیدا کنند. به طور کلی نواحی مبتلا به اروژن نمای نعلبکی شکل (saucer-shaped) با مارژین صاف، روند و Dull دارند که وجه تمایز آن با ضایعاتی مثل ابریژن و اتریشن می‌باشد. هرچند ممکن است ابریژن و اتریشن موجب تشیدی ضایعات اروژن گردند. در مراحل اولیه اتریشن Facet‌هایی در سطح اکلوزال مولرها ایجاد می‌شود و لبه اینسیزال دندان‌های قدمی سائیده می‌شوند. سطح Facet‌ها صاف (Flat) بود و میزان سایش در دو فک مشابه است. اگر سطوح مقابل facet با آن سایش مشابه یا تماسی نداشته باشند احتمالاً اروژن علت اصلی ایجاد Facet است. ضایعات ابریژن برخلاف ضایعات روند اروژن، زاویدار (Angular) بوده و زوایای مینایی حاده دارند (۱۰).

بیان کردن رقم دقیقی جهت بیان شیوع اروژن دندانی بر طبق مقالات منتشر شده دشوار است، چرا که استاندارد جهانی پذیرفته

ریفلaks معده و ابتلا به اروژن دندانی مشاهده گردید (P<۰/۰۰۱) و با سایر عوامل اختلاف معنی‌داری دیده نشد (P>۰/۰۵). همان‌گونه که در جدول ۴ مشاهده می‌شود، ۳۹ نفر (۲۶٪) از بیمارانی که حداقل هفته ای دو بار، کبوی، پرتقال، آلوچه و آبیه مصرف می‌کردند و همچنین ۵۶ نفر (۳۹/۵٪) از افرادی که از لیموترش و ترشی استفاده می‌کردند و ۵۲ نفر (۳۷/۷٪) از افرادی که از نوشابه، دلستر و آبمیوه مصرف می‌کردند، مبتلا به اروژن بودند. با توجه به مقادیر Odds ratio، مصرف لیموترش و ترشی حداقل ۲ بار در هفته ریسک ابتلا به اروژن را ۲/۳۶ برابر می‌کند. همچنین استفاده از نوشابه، دلستر و آبمیوه حداقل هفته ای دو بار، ریسک ابتلا به اروژن را ۴/۳۳ برابر می‌کند.

## بحث و نتیجه‌گیری

روش‌های مختلفی برای بررسی و طبقه‌بندی اروژن وجود دارد مانند Jenkins و Eccles (۹). مشکل اصلی در اندازه‌گیری اروژن دندانی در نظر گرفتن یک نقطه رفرنس برای اندازه‌گیری و بررسی اروژن است. البته هنوز محققان برای اندازه‌گیری اروژن به اتفاق نظر نرسیده‌اند (۱۰). BEWE روشی ساده بوده و ساختاری معین و واضح برای کاربرد کلینیکی و علمی دارد. این روش موجب تعیین صحیح شدت از دست رفتن ساختار دندان شده و از Overestimate شدن مشکل جلوگیری می‌کند. بنابراین این مقیاس، برای مطالعات غربالگری ایده‌آل است. همچنین BEWE در استراتژی درمان بیمار کمک کننده

اروژن دندان عنوان کرده‌اند. در پژوهش حاضر ۲۶٪ از افرادی که حین خواب دندان قروچه می‌کردن دارای اروژن بودند. Pettengill (۱۸) در مطالعه خود دندان قروچه و فشار دادن دندان‌ها را به خصوص اگر توام با یکدیگر باشند از عوامل مهم ایجاد اروژن عنوان کرده است. Shirani و همکاران (۱۹) نیز در بررسی شیوع دندان قروچه، بیشترین فراوانی عالیم دهانی در افراد مبتلا به دندان قروچه را سایش دندانی (%) عنوان کرده‌اند. هر چند ممکن است اتریشن و ابریزن موجب تشدید ضایعات اروژن گردند ولی اروژن از نظر بالینی از دو ضایعه دیگر قابل افتراق است. سطوح درگیر اروژن، ظاهر صاف (Smooth) و قاشقی شکل دارند، در حالی که ضایعات ناشی از ابریزن، تخت (Flat) و زاویه دار و مشخص (Sharp) هستند. عدم ارتباط اروژن با دفعات و نوع مسوک زدن و دندان قروچه در این مطالعه احتمالاً نشان دهنده تشخیص صحیح ضایعات اروژن از دو ضایعه دیگر می‌باشد.

در مطالعه حاضر ۵۰٪ از افرادی که به شنا می‌رفتند دارای اروژن بودند. اما از آن جا که تنها ۱۴ فرد مورد بررسی به شنا می‌رفتند، رابطه مشبّتی بین شنا رفتن و بروز اروژن مشاهده نشد. مطالعه Mehdipoor و همکاران (۲۰) اختلاف آماری معنی‌داری بین شناگران با مدت زمان بیش از شش ساعت در هفته و شناگران با مدت زمان کمتر از شش ساعت در هفته مشاهده ننمودند.

مطالعات مربوط به فرآیند اروژن دندانی در شناگران، کم و بیش pH آب استخر را به عنوان یکی از مؤلفه‌های فعال و یا بالقوه مخرب ایجاد آن معرفی می‌نمایند. در حالی که در کنار این تحقیقات محققانی نظیر Scheper نیز اعلام کرده اند که در pH بالای ۶/۵ نیز فرآیند فرسایش شیمیایی دندان‌ها آغاز می‌شود که غالب به صورت بروز رنگریزه (Dental staining) ظاهر می‌شوند (۲۱)، همچنین Amaechi و Higham (۲۲) نیز ایجاد اروژن دندانی را در انحرصار میزان pH آب استخر نمی‌دانند و به اهمیت درجه حرارت آب استخر و مدت زمان تماس با آن، ساختمن هیدروکسی آپاتیت در مینای دندان و نیز خصوصیات بzac جهت خنثی سازی عوامل اشاره داشته‌اند. در این مطالعه امکان بررسی شرایط استخر وجود نداشت. از طرف دیگر احتمالاً کم بودن تعداد افرادی که به شنا می‌رفتند دلیل متناقض بودن نتایج آن با نتایج سایر مطالعات می‌باشد.

در این مطالعه ارتباط آماری معنی‌داری بین اروژن دندانی با

شده‌ای برای ارزیابی بالینی این بیماری وجود ندارد. از طرف دیگر تشخیص اروژن دندانی از سایر اشکال سایش دندان تقریباً همیشه پیچیده است. لذا شیوع گزارش شده اروژن، در مطالعات مختلف، متفاوت است که می‌تواند تا حدی به علت بررسی گروه‌های سنی مختلف یا روش‌های ارزیابی استفاده شده و یا حتی کشور محل تحقیق باشد ولی به طور کلی شیوع متوسط اروژن دندانی در کودکان ۳۴٪ و در بزرگسالان ۳۱٪ گزارش شده است (۱۱-۱۴). در مطالعه حاضر شیوع اروژن ۲۱٪ بود. در ایران مطالعات اندکی در زمینه شیوع اروژن انجام شده است. به عنوان مثال Abbasi و Mousavi-Nasab (۶) در سال ۲۰۰۱ شیوع اروژن را در صنف باطری‌ساز شهر اصفهان ۲۷٪ در درصد گزارش کردند. همچنین Moslemi و همکاران (۸) شیوع اروژن در دانش آموزان دختر ۱۴-۱۷ ساله شهرستان قزوین در سال ۲۰۰۸ را ۱۴٪ درصد بیان نمودند. نتایج این مطالعات به علت تفاوت در متداول‌تری و گروه‌های مورد مطالعه قابل مقایسه با نتایج مطالعه حاضر نبود.

در بررسی حاضر، سن بیماران دارای اروژن بطور معنی‌داری بیشتر از سن افراد فاقد اروژن بود. در مطالعاتی که اروژن دندانی در گروه‌های سنی مختلف را بررسی کرده‌اند، در کودکان و بزرگسالان شیوع اروژن با افزایش سن بیشتر می‌شود (۱۲،۴-۱۴). چرا که با افزایش سن به علت زمان تماس بیشتر با عوامل ایجاد کننده اروژن شیوع اروژن نیز افزایش می‌یابد (۳،۴). Lussi و Jaeggi (۱۵) در یک مطالعه سیستمیک شیوع اروژن را در افراد ۸۸ تا ۸۸ ساله بین ۴٪ تا ۸۲٪ ذکر کرده‌اند. نتایج مطالعه Eisenburger و همکاران (۱۶) نیز نشان داده که عمق اروژن دارای رابطه خطی با زمان می‌باشد.

در مطالعه حاضر میزان ابتداء از اروژن دندانی بر حسب جنسیت افراد مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری نداشت. نتایج مطالعه Johansson (۱۷) نشان داد که اروژن دندانی، در میان مردان جوان عربستان سعودی رایج است و علل احتمالی آن را مصرف نوشابه، میزان پلاک دندان‌های قدامی فک بالا و غلظت اوره بzac دانست که با مطالعه جاری همخوانی نداشت.

هرچند در مطالعه حاضر اختلاف آماری معنی‌داری بین تعداد دفعات و نوع مسوک زدن در افراد با و بدون اروژن مشاهده نشد اما Lussi و Schaffner (۴) تعداد دفعات مسوک زدن را از ریسک فاکتورهای

نوشیدنی‌های اسیدی باعث ایجاد اروژن دندانی می‌گرددند (۳۱-۳۳). نتایج مطالعه Margaritis و همکاران (۳۴) در یونان نشان داد که ضایعات حاصل از لیمو و بیکربنات نوشابه بر روی دندان بزرگتر از ضایعات حاصل از سیب و گریپ فروت می‌باشد. همچنین پژوهش‌ها نشان داده که اگر در رژیم غذایی، مصرف مواد اسیدی بیش از ۴ بار در روز وجود داشته باشد، در صورتی که همراه با سایر عوامل خطر مانند نگهدارش نوشیدنی در دهان باشد، منجر به ایجاد و پیشرفت اروژن می‌شود (۳۴).

باتوجه به نتایج حاصل از این مطالعه، مصرف موادی مثل لیموترش و ترشی، نوشابه، دلستر و آبمیوه احتمال اروژن را افزایش می‌دهند. بنابراین با توجه به شیوع حدود ۲۱ درصد اروژن در بیماران مورد بررسی لازم است توجه بیشتری به آموزش علل اروژن و راهکارهای کاهش آن معطوف گردد. هدف از برنامه پیشگیری، کاهش اسپیوژر اسیدی با کاهش میزان و تعداد دفعات مصرف نوشیدنی‌ها و مواد غذایی بالقوه مضر و به همان نسبت کاهش زمان تماس مواد مذکور با دندان از طریق مصرف سریع آن‌ها (نسبت به جرمه جرمه نوشیدن) می‌باشد. به علاوه ریفلакс یا تهوع نیز باید کنترل گردد.

### تشکر و قدردانی

این مقاله منتج از پایان نامه دانشجویی مصوب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi یزد به شماره ۶۰۶ می‌باشد. بدینوسیله از حمایت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi یزد تشکر و قدردانی می‌گردد.

1- Imfeld T. Dental erosion. Definition, classification and links. Eur J Oral Sci. 1996; 104(2):151-5.

2- Lussi A. Dental erosion. Clinical diagnosis and case history taking. Eur J Oral Sci. 1996;109(2):191-8.

3- O'Sullivan EA, Curzon ME. A comparison of acidic dietary factors in children with and without dental erosion. ASDC J Dent Child. 2000;67(3):186-92.

4- Lussi A, Schaffner M. Progression of and risk factors for dental erosion and wedge-shaped defects over a 6-year period. Caries Res. 2000;34(2):182-7.

5- Dugmore CR, Rock WP. Awareness of tooth erosion in 12 year old children and primary care dental practitioners. Community Dent Health. 2003;20(4):223-8.

6- Mousavi Nasab SM, Abbasi M. Dental erosion prevalence in battery workers of Isfahan city. J Res Med Sci. 2001;6(3):234-7.

7- Nahás Pires Corrêa MS, Nahás Pires Corrêa F, Nahás Pires

Rivela克斯 معده مشاهده شد که با نتایج مطالعه Holbrook و همکاران در ایسلند (۲۳) و Bartlett در انگلستان (۲۴) و Feiz و Ghorbanzadeh در اصفهان (۲۵) مطابقت دارد. Aziz و همکاران (۲۶) در تحقیقی که به بررسی رابطه Rivela克斯 معده با اروژن پرداخته بودند عنوان نموده‌اند که بسیاری از مردم میزان خفیفی از برگشت اسید دارند (Rivela克斯 خاموش) که تنها نشانه آن ممکن است اروژن دندان‌ها باشد. اگر برگشت اسید بدون درمان ادامه یابد، ممکن است به اروژن منجر گردد. بنابراین با توجه به آگاه نبودن بیماران از Rivela克斯 خاموش، احتمالاً ارتباط بین اروژن و Rivela克斯 بیش از چیزی است که در مطالعه ما به دست آمد.

با تغییر شیوه زندگی طی دهه‌ها، میزان کلی و فراوانی مصرف غذاها و نوشیدنی‌های اسیدی نیز تغییر یافته است. در این مطالعه %۲۶ از کسانی که کیوی، پرتقال، آلوجه و آنبه مصرف می‌کرددند دارای اروژن دندانی بودند. همچنین اروژن در ۲۹/۵٪ از افرادی که لیموترش و ترشی مصرف نموده بودند، دیده شد. در ۷/۷٪ از افرادی که نوشابه، دلستر، آبمیوه مصرف می‌کرددند نیز اروژن دندانی مشاهده شد. در مطالعات West و همکاران (۲۸-۲۷) نیز نشان داده شد که آب پرتقال، پتنسیل اروژن دندان را دارد. غلظت یون کلسیم موجود در نوشیدنی‌های اسیدی نقش مهمی در دمینرالیزاسیون و رمینرالیزاسیون دارد (۲۹). تحقیقات گزارش کرده‌اند که حدود ۲۰ میلی گرم در لیتر از کلسیم در آب پرتقال قادر به کاستن از اروژن مینای دندان می‌باشد (۳۰). همچنین مطالعات زیادی موید این مطلب هستند که

### منابع:

- Corrêa JP, Murakami C, Mendes FM. Prevalence and associated factors of dental erosion in children and adolescents of a private dental practice. Int J Paediatr Dent. 2011; 21(6):451-8.
- 8- Moslemi M, Khalaji M, Anaraki-Baghaei M. Epidemiology of dental erosion in high school girl students 14-17 years old city of Qazvin in 2003. J Dent Sch. 2008;26(1):73-8.
- 9- Bartlett D, Ganss C, Lussi A. Basic erosive wear examination (BEWE): a new scoring system for scientific and clinical needs. Clin Oral Investig. 2008;12(1):65-8.
- 10- Addy M, Embry G, Edgar WM, Orchardson R. Tooth wear and sensitivity. London. Martin Dunitz;2000:88-9.
- 11- Ren YF. (2011). Dental erosion: etiology, diagnosis and prevention. ADA CERP, web site: [http://preview.colgateprofessional.com/Professional/v1/en/us/cale-assets/docs/1104cei\\_erosion\\_web1.pdf](http://preview.colgateprofessional.com/Professional/v1/en/us/cale-assets/docs/1104cei_erosion_web1.pdf).
- 12- Dugmore CR, Rock WP. The progression of tooth erosion

- in a cohort of adolescents of mixed ethnicity. *Int J Paediatr Dent.* 2003;13(5):295-303.
- 13-** El Aidi H, Bronkhorst EM, Truin GJ. A longitudinal study of tooth erosion in adolescents. *J Dent Res.* 2008;87(8):731-5.
- 14-** Van Rijkom HM, Truin GJ, Frencken JEFM, Konig KG, Van't Hof MA, Bronkhorst EM, et al. Prevalence, distribution and background variables of smooth-bordered tooth wear in teenagers in The Hague, The Netherlands. *Caries Res.* 2002;36(2):147-54.
- 15-** Jaeggi T, Lussi A. Prevalence, incidence and distribution of erosion. *Monogr Oral Sci.* 2006;20:44-65.
- 16-** Eisenburger M, Hughes J, West NX, Shellis RP, Addy M. The use of ultrasonication to study remineralization of eroded enamel. *Caries Res.* 2001;35(1):61-6.
- 17-** Johansson AK. On dental erosion and associated factors. *Swed Dent J Suppl.* 2002;156:1-77.
- 18-** Pettengill CA. Interaction of dental erosion and bruxism: the amplification of tooth wear. *J Calif Dent Assoc.* 2011;39(4):251-6.
- 19-** Shirani AM, Khozeimeh F, Rafi-Zadeh M, Ghasemi Azar. Prevalence of bruxism and clenching the teeth together with oral manifestations-temporal-jaw in patients clinics in Isfahan. *J Isfahan Dent Sch.* 2009; 4(2):89-94.
- 20-** Mehdipour M, Taghavi Zenooz A, Ghлизаде N, Bahramian A, Sartip Pour N. Evaluation the Effect of Swimming Time on Dental Erosion among swimmers. *J Islamic Dent Assoc IRAN.* 2013;25(1):31-5.
- 21-** Scheper WA, Van Nieuw AA, Eijkman MA. Oral conditions in swimmers. *Ned Tijdschr Tandheelkd.* 2005;112(4):147-8.
- 22-** Amaechi BT, Higham SM. Dental erosion: Possible approaches to prevention and control. *J Dent.* 2005;33(3):243-52.
- 23-** Holbrook WP, Furuholm J, Gudmundsson K, Theodórs A, Meurman JH. Gastric reflux is a significant causative factor of tooth erosion. *J Dent Res.* 2009;88(5):422-6.
- 24-** Bartlett DW, Lussi A, West NX, Bouchard P, Sanz M, Bourgeois D. Prevalence of tooth wear on buccal and lingual surfaces and possible risk factors in young European adults. *J Dent.* 2013; 41(11):1007-13.
- 25-** Faiz A, Ghorbanzadeh S. Prevalence and etiology of non-carious cervical lesions in dental patients dental school in 2007. *J Isfahan Dent Sch.* 2009;6(5):533-42.
- 26-** Aziz K, Ziebert AJ, Cobb D. Restoring erosion associated with gastroesophageal reflux using direct resins: case report. *Oper Dent* 2005;30(3):395-401.
- 27-** West NX, Maxwell A, Hughes JA, Parker DM, Newcombe RG, Addy M. A method to measure clinical erosion: the effect of orange juice consumption on erosion of enamel. *J Dent.* 1998;26(4):329-35.
- 28-** West NX, Hughes JA, Parker DM, Newcombe RG, Addy M. Development and evaluation of a low erosive blackcurrant drink. 2. Comparison with a conventional blackcurrant juice drink and orange juice. *J Dent.* 1999;27(5):341-4.
- 29-** Lussi A, Schlueter N, Rakhamatullina E, Ganss C. Dental erosion - an overview with emphasis on chemical and histopathological aspects. *Caries Res.* 2011;45(suppl 1):2-12.
- 30-** Attin T, Meyer K, Hellwig E, Buchalla W, Lennon AM. Effect of mineral supplements to citric acid on enamel erosion. *Arch Oral Biol.* 2003;48(11):753-9.
- 31-** Chłapowska J, Pawlaczyk-Kamieńska T. Epidemiological evaluation of soft drinks consumption-students surveys. *Przegl Lek.* 2011; 69(10):896-9.
- 32-** Jawale BA, Bendgude V, Mahuli AV, Dave B, Kulkarni H, Mittal S. Dental plaque pH variation with regular soft drink, diet soft drink and high energy drink: an in vivo study. *J Contemp Dent Pract.* 2012;13(2):201-4.
- 33-** Cavalcanti AL, Costa Oliveira M, Florentino VG, dos Santos JA, Vieira FF, Cavalcanti CL. Short communication: In vitro assessment of erosive potential of energy drinks. *Eur Arch Paediatr Dent.* 2010;11(5):253-5.
- 34-** Margaritis V, Mamai-Homata E, Koletsi-Kounari H. Novel methods of balancing covariates for the assessment of dental erosion: a contribution to validation of a synthetic scoring system for erosive wear. *J Dent.* 2011;39(5):361-7.