

مقایسه اثر سیمواستاتین ساخت ایران (سیمواستاتین، شهردارو) با مشابه خارجی Zocor

دکتر پیمانه حیدریان، دکتر جعفر قانیلی، حبیب امامی، دکتر فریدون عزیزی

چکیده به منظور مقایسه اثر سیمواستاتین ساخت ایران (سیمواستاتین، شهردارو) با مشابه خارجی Zocor (Simvastatin, Merck Sharp and Dohme) هیپرلیپیدمی که بر اساس راهنماییهای National Cholesterol Education Program اندیکاسیون دریافت دارو را داشته، کنترالدیکاسیونی برای مصرف «استاتین‌ها» نداشتند، بصورت دوسوکر، به دو گروه تقسیم شدند. میانگین کلسترول تام بیماران $326 \pm 38 \text{ mg/dl}$ و میانگین LDL کلسترول آنها $225 \pm 47 \text{ mg/dl}$ بود. تعداد ۱۱ بیمار، سیمواستاتین ساخت ایران و ۹ بیمار، مشابه خارجی را به میزان ۲۰ میلی گرم روزانه، مصرف نمودند. بیماران، ۴ هفته و ۸ هفته پس از شروع درمان جهت تکرار آزمایشها و بررسی بالینی، مراجعة نمودند، بین دو گروه از نظر نسبت مرد به زن، میانگین سنی، مقادیر پایه لیپیدهای سرمه و میزان پیگیری مراجعه‌ها، تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت. در ۴ هفته بعد از درمان، کاهش کلسترول تام در گروه سیمواستاتین $24/9 \pm 4/8 \text{ mg/dl}$ و در گروه Zocor $24/4 \pm 5/4 \text{ mg/dl}$ ($P < 0.001$). در گروه Zocor بود؛ تقریباً تمام این کاهش مربوط به کاهش LDL کلسترول می‌شد که در گروه سیمواستاتین $24/4 \pm 3/8 \text{ mg/dl}$ ($P < 0.001$) و در گروه Zocor $24/4 \pm 3/9 \text{ mg/dl}$ ($P < 0.001$) کاهش باقی بود. در ۸ هفته بعد از درمان، کاهش کلسترول تام به قبل از درمان در گروه سیمواستاتین $26/8 \pm 4/2 \text{ mg/dl}$ ($P < 0.001$) و در گروه Zocor $26/7 \pm 3/9 \text{ mg/dl}$ ($P < 0.001$) بود. تقریباً تمام این کاهش مربوط به کاهش LDL کلسترول می‌شد که در گروه سیمواستاتین $26/4 \pm 4/0 \text{ mg/dl}$ ($P < 0.001$) و در گروه Zocor $26/4 \pm 4/5 \text{ mg/dl}$ ($P < 0.001$) کاهش یافته بود. در هیچ یک از گروه، تغییرات غلظت HDL کلسترول و تری‌گلیسرید در ۴ هفته و ۸ هفته بعد از درمان تفاوت معنی دار آماری نداشت. تغییرات غلظت هیچ یک از لیپیدهای سرمه در بین دو گروه تفاوت معنی دار آماری نداشت. این بررسی نشان می‌دهد که توانایی داروی سیمواستاتین ساخت ایران در کاهش کلسترول تام و LDL کلسترول، با مشابه خارجی آن مطابقت دارد.

وازنگان کلیدی: هیپرلیپیدمی، هیپرکلسترولمی، پایین آورنده پربی، سیمواستاتین.

LDL کلسترول و تری‌گلیسرید و افزایش اندک غلظت HDL کلسترول با مصرف سیمواستاتین در مقایسه با شبه دارو (Placebo) در افرادی که در خطر بیماری ایسکمیک قلبی داشته‌اند^۵ و در مطالعه‌های پیشگیری ثانویه بیماری ایسکمیک قلبی^{۶-۷} نشان داده شده است. در مطالعه‌های بالینی کنترل شده، بروز عوارض جانبی مصرف

مقدمه

سیمواستاتین یک مهار کننده HMG-CoA reductase^{*} است. مهار کننده‌های این آنزیم یا «استاتین‌ها» در کاهش غلظت کلسترول تام و LDL کلسترول در بیماران با هیپرکلسترولمی مؤثر هستند.^{۱-۴} کاهش قابل توجه غلظت کلسترول تام،

* 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme, A reductase

میک تحقیقات عدد درون ریز و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - دهانی شهید بهشتی

آزمایش‌های کلسترول تام، LDL کلسترول، HDL کلسترول، تری‌گلیسیرید، CBC، Cr، CPK، ALT، AST و نمونه ادرار از نظر پروتئینوری معرفی شدند. همه بیماران در فاصله ۱-۸ هفته از آزمایش‌های بار اول خود، آزمایش‌های قبل از شروع درمان را انجام دادند و سپس در فاصله ۱ هفته توسط فوق تخصص غدد در مطب یا متخصص داخلی در «کلینیک تخصصی واحد بررسی قند و چربی‌های خون» معاینه شدند و تحت بررسی بالینی قرار گرفتند. بررسی بالینی بر اساس پرسشنامه و با تأکید بر علایم و نشانه‌های گوارشی، کبدی، قلبی - عروقی، ماهیچه‌ای، عصبی، روانی و پوست و مو و سابقه مصرف داروها در یک ماه اخیر (بویژه داروهای آنتیکوآگولان، ایمونوساپرسیو، مشتقات اسیدفیبریک و نیکوتینیک اسید) صورت گرفت و در مورد زنانی که در سنین باروری قرار داشتند، اطمینان از عدم وجود آبستنسی و استفاده از روش پیشگیری قابل اطمینان بدست می‌آمد. بیمارانی که دوباره در آزمایش‌های قبل از شروع درمان معیارهای جدول (۱) را دارا بودند؛ آزمایش‌های Cr، ALT، AST، CPK و CBC آنان در حدود طبیعی بود؛ در آزمایش ادرار پروتئینوری نداشتند؛ فشار خون دیاستولی بالاتر از ۱۱۰ میلی‌متر جیوه نداشتند؛ و نیز سابقه مصرف داروهای آنتیکوآگولان، ایمونوساپرسیو، مشتقات اسیدفیبریک و نیکوتینیک اسید در یک ماه اخیر نداشتند، جهت شروع درمان با دارو انتخاب می‌شدند و در غیر این صورت از مطالعه حذف می‌گشتند. هیچ یک از زنانی که در سنین باروری قرار داشتند، آبستن نبودند و همگی آنان از روش پیشگیری قابل اطمینان استفاده می‌نمودند.

سیمواستاتین حدود ۱٪ بوده است.^۵ از آنجا که این دارو برای اولین بار در کشور فرموله شده است، این مطالعه به منظور مقایسه اثر سیمواستاتین ساخت ایران (سیمواستاتین، شهر دارو) با مشابه خارجی Simvastatin، Zocor (Merck Sharp and Dohme) هیپرلیپیدمی که براساس راهنمایی‌های NCEP^{*} پس از محاسبه «عوامل خطر» بیماری عروق کرونر قلب (CAD)^{**} (اندیکاسیون دریافت دارو داشته‌اند، بصورت یک کارازمایی دوسوکور کنترل شده تصادفی تناوبی انجام شد.

مواد و روشها

انتخاب بیماران جهت شرکت در مطالعه از میان مراجعه‌کنندگان به دو مرکز زیر صورت گرفت: (۱) مراجعه‌کنندگان متوالی جهت درمان هیپرلیپیدمی به مطب فوق تخصصی غدد؛ (۲) مراجعه‌کنندگان متوالی جهت شرکت در بررسی آینده‌نگر قند و لیپید تهران^۶ که بین شهریور تا آذرماه ۱۳۷۸ به واحد بررسی قند و چربی‌های خون مراجعه نموده بودند. در مرحله اول، بیماران ۳۰-۷۰ ساله، مرد یا زن، برحسب غلظت LDL کلسترول و تری‌گلیسیرید و براساس «عوامل خطر» CAD و بدون در نظر گرفتن وجود یا عدم وجود CAD مطابق جدول (۱) جهت شرکت در مطالعه انتخاب شدند. تمام بیماران انتخاب شده جهت شرکت در مطالعه مراجعه نمودند.

در مرحله دوم پس از ارایه توضیحات کامل درباره طرح، شرکت کنندگان جهت دادن نمونه خون صبحگاهی پس از ۱۴ ساعت ناشستایی جهت

* National Cholesterol Education Program

** Coronary artery disease

جهت آنالیز آماری برای مقایسه یافته‌های هر گروه از paired t test و برای مقایسه یافته‌های بین گروهها از t test استفاده شد. متغیرهای کیفی با Fisher's exact test بررسی شدند. آنالیز بر اساس اطلاعات بدست آمده از تمام بیمارانی که در مطالعه شرکت نمودند، بدون ارزیابی ظرفیت پذیری (intention to treat analysis) مصرف داروی آنان (intention to treat analysis) صورت پذیرفت.

جدول ۱- معیارهای اولیه انتخاب بیماران جهت شرکت در مطالعه

	تعداد عوامل خطر*	غلظت LDL کلسترول mg/dl	غلظت تری‌گلیسیرید mg/dl
<۴۰۰	≥۲۲۰	<۲	
>۴۰۰	≥۱۹۰	≥۲	

* عوامل خطر بیماری عروق کرونر قلب شامل موارد زیر می‌باشد: سابقه خانوادگی سکته قلبی یا مغزی یا مرگ ناگهانی (<55 سالگی در پدر یا برادر یا پسر یا <65 سالگی در مادر یا خواهر یا دختر); پرفشاری خون (فشار خون سیستولیک ≥ 140 میلی‌متر جیوه یا دیاستولیک ≥ 90 میلی‌متر جیوه، حتا اگر با دارو کنترل شده باشد); مصرف سیگار (>10 در روز); دیابت ملیتوس؛ HDL کلسترول پایین (<45 mg/dl) و سن (>45) سال در مردان و (>55) سال در زنان یا کمتر از آن در زنانی که یائسگی زودرس بدون جایگزینی با استروژن داشته‌اند). ضمناً HDL کلسترول <60 mg/dl یک عامل خطر را حذف می‌کند.

جدول ۲- غلظت کلسترول تام و LDL کلسترول قبل و پس از درمان با سیمواستاتین و Zocor

	Zocor	سیمواستاتین	تفاوت‌بین دو گروه
		کلسترول تام (mg/dl)	
NS	221 ± 26	220 ± 52	قبل
NS	$240 \pm 42^*$	$247 \pm 62^*$	هفت
NS	$222 \pm 21^{\dagger}$	$222 \pm 22^{\dagger}$	هفت
		کلسترول LDL (mg/dl)	
NS	24 ± 49	24 ± 55	قبل
NS	$161 \pm 28^*$	$162 \pm 59^*$	هفت
NS	$161 \pm 25^{\dagger}$	$154 \pm 28^{\dagger}$	هفت

* در مقایسه با قبل از درمان: $P < 0.05$, $\dagger P < 0.01$.

.NS: از نظر آماری با اهمیت نیست.

در مجموع، ۲۰ بیمار (۱۴ زن، ۶ مرد) جهت دریافت دارو انتخاب شدند. افراد انتخاب شده بصورت تصادفی و دوسوکور به دو گروه تقسیم شدند. تعداد ۱۱ نفر سیمواستاتین ساخت ایران (سیمواستاتین، شهردارو) و ۹ نفر مشابه خارجی، (Simvastatin, MSD) Zocor دریافت نمودند. درمان برای تمام افراد با قرصهای ۲۰ میلی‌گرم، ۱ عدد هر شب بعد از شام صورت گرفت و به همه افراد توصیه‌های رژیم غذایی و افزایش فعالیت بدنی ارایه داده شد. بیماران ۴ هفته و ۸ هفته بعد از معاینه اول جهت تکرار آزمایشها و بررسی بالینی (compliance) مراجعه نمودند. ظرفیت پذیری بیماران در مصرف دارو مورد ارزیابی قرار نمی‌گرفت. بیماران در طول مدت درمان از داروی پایین آورنده چربی خون دیگری استفاده نمی‌کردند. اندازه‌گیری کلسترول تام و تری‌گلیسیرید به روش آنزیمی صورت گرفت. اندازه‌گیری HDL کلسترول و پس از رسوب شیمیایی VLDL، LDL و شیلومیکرون‌ها با همان روش آنزیمی اندازه‌گیری کلسترول تام صورت گرفت. غلظت LDL کلسترول در افراد با تری‌گلیسیرید کمتر از ۴۰۰ mg/dl براساس فرمول زیر محاسبه گردید:

$$(LDL = \frac{(\text{تری‌گلیسیرید} + \text{HDL}) - \text{کلسترول تام}}{5})$$



اندازه‌گیری ALT, AST و CPK به روش آنزیمی و اندازه‌گیری Cr به روش Jaffe صورت گرفت. جهت اندازه‌گیری کلسترول تام، CPK, ALT, AST، HDL کلسترول، Selectra 2 استفاده شد. و Cr از دستگاه اتوآنالیزر CBC Sysmex K-1000 انجام گرفت و برای بررسی پروتئینوری از روش سولفوسالیسیلیک اسید استفاده شد.

نتایج

تعداد ۱۱ بیمار شامل ۹ زن و ۲ مرد با میانگین سنی ۵۵ ± ۹ سال، سیمواستاتین ساخت ایران و ۹ بیمار شامل ۵ زن و ۴ مرد با میانگین سنی ۵۲ ± ۶ سال، مشابه خارجی، (Zocor) را دریافت نمودند (به ترتیب گروه‌های سیمواستاتین و Zocor). تمام بیماران از قرصهای ۲۰ میلی‌گرمی، ۱ عدد هر شب، استفاده می‌کردند. بین دو گروه از نظر نسبت مرد به زن و میانگین سنی اختلاف معنی‌دار آماری وجود نداشت. در گروه سیمواستاتین ۴ بیمار و در گروه Zocor ۳ بیمار جهت انجام آزمایشها و بررسی بالینی ۸ هفته بعد از درمان مراجعه ننمودند. بین دو گروه از نظر میزان پیگیری مراجعات اختلاف معنی‌دار آماری وجود نداشت.

غاظت لیپیدهای سرم قبل از شروع درمان در گروه سیمواستاتین و Zocor به ترتیب برای کلسترول تام ۳۲۱ ± ۴۶ mg/dl و ۳۲۰ ± ۵۲ mg/dl؛ برای LDL کلسترول ۲۴۹ ± ۵۰ mg/dl و ۲۴۰ ± ۴۹ mg/dl؛ برای HDL کلسترول ۱۸۹ ± ۵۴ mg/dl و ۲۰۷ ± ۴۰ mg/dl بود. قبل از درمان بین غاظت لیپیدهای سرم در بین دو گروه اختلاف معنی‌دار آماری وجود نداشت.

در ۴ هفته بعد از درمان، کاهش کلسترول تام در گروه سیمواستاتین $۲۴/۹ \pm ۴/۸$ ٪ ($P < 0.001$) و در گروه Zocor $۲۴/۹ \pm ۳/۸$ ٪ ($P < 0.001$) بود. تقریباً تمام این کاهش مربوط به کاهش LDL کلسترول می‌شد که در گروه سیمواستاتین $۲۴/۲ \pm ۵/۵$ ٪ ($P < 0.001$) و در گروه Zocor $۲۴/۰ \pm ۴/۸$ ٪ ($P < 0.001$) بود. کاهش یافته بود (جدول ۱).



Zocor = سیمواستاتین (شهردارو)

نمودار ۱- میانگین غاظت کلسترول تام و کلسترول در طول دوره درمان با سیمواستاتین شهردارو (Zocor) و شهردارو (Zocor)

سیمواستاتین و نیز ۳ بیمار از گروه Zocor جهت انجام آزمایشها و معاينه ۸ هفته بعد از درمان مراجعه ننمودند. علت عدم مراجuge مشخص نشد. در آزمایش‌های ۴ هفته و ۸ هفته پس از شروع دارو در گروه سیمواستاتین در ۱ مورد شمارش پلاکتی $10^3/\text{mm}^3$ ($578 \times 10^3/\text{mm}^3$) و در ۱ مورد پروتئینوری + ۱ و در گروه Zocor در ۱ مورد شمارش لکوسیت $10^3/\text{mm}^3$ ($11 \times 10^3/\text{mm}^3 - 4/5$) و در ۱ مورد IU/L $\text{AST} = 55 \text{ IU/L}$ $\text{ALT} = 68 \text{ IU/L}$ (۵ - ۴۰) در هیچ یک از بیماران دو گروه قطع درمان به علت یافته‌های بالینی یا آزمایشگاهی توصیه نشد.

بحث

در این مطالعه، بیمارانی جهت دریافت دارو انتخاب شدند که براساس تعداد عوامل خطر CAD و دو بار اندازه‌گیری غلظت لیپیدهای سرم مقادیر LDL کلسترول آنها 30 mg/dl بالاتر از حدودی بود که براساس راهنماییهای NCEP^۱ نیاز به دریافت دارو داشتند. انتخاب این معیار بدان جهت صورت گرفت تا تنها بیماران با LDL کلسترول بشدت بالا که انتظار تصحیح آن با رژیم غذایی نمی‌رود، جهت دریافت دارو انتخاب شوند.

این مطالعه که بصورت یک کارآزمایی دوسوکور کنترل شده تصادفی تناوبی انجام شد، نشان داد که هر دو داروی سیمواستاتین و Zocor در یک دوره کوتاه مدت، مشابه یکدیگر، سبب کاهش قابل توجه در غلظت کلسترول تام (به ترتیب 27% و 22%) و LDL کلسترول (به ترتیب 35% و 28%) شدند. این کاهش قابل توجه در غلظت کلسترول تام و LDL کلسترول که در ۸ هفته بعد

۲ و نمودار ۱). افزایش HDL کلسترول در گروه سیمواستاتین $4/4 \pm 6/9 \text{ mg/dl}$, NS (% ۴/۴ ± ۶/۹) و در گروه Zocor $6/8 \pm 4/9 \text{ mg/dl}$, NS (% ۶/۸ ± ۴/۹) بود. در گروه سیمواستاتین، تری گلیسرید $7/8 \pm 15/4 \text{ mg/dl}$, NS (% ۷/۸ ± ۱۵/۴) افزایش و در گروه Zocor $20 \pm 37 \text{ mg/dl}$, NS (% ۲۰ ± ۳۷) کاهش یافته بود. در ۸ هفته بعد از درمان، کاهش کلسترول تام نسبت به قبل از درمان در گروه سیمواستاتین $26/8 \pm 4/3 \text{ mg/dl}$, P < ۰/۰۱ (% ۲۶/۸ ± ۴/۳) و در گروه Zocor $22/4 \pm 3/2 \text{ mg/dl}$, P < ۰/۰۱ (% ۲۲/۴ ± ۳/۲) بود. تقریباً تمام این کاهش مربوط به کاهش LDL کلسترول می‌شد که در گروه سیمواستاتین $34/6 \pm 4/3 \text{ mg/dl}$, P < ۰/۰۱ (% ۳۴/۶ ± ۴/۳) و در گروه Zocor $27/8 \pm 6/5 \text{ mg/dl}$, P < ۰/۰۵ (% ۲۷/۸ ± ۶/۵) کاهش یافته بود (جدول ۲ و نمودار ۱). افزایش HDL کلسترول نسبت به قبل از درمان در گروه سیمواستاتین $4/5 \pm 3/1 \text{ mg/dl}$, NS (% ۴/۵ ± ۳/۱) و در گروه Zocor $2/2 \pm 5/9 \text{ mg/dl}$, NS (% ۲/۲ ± ۵/۹) کاهش تری گلیسرید نسبت به قبل از درمان در گروه سیمواستاتین 82 mg/dl , NS (% ۶/۸ ± ۱۵/۷) و در گروه Zocor $5/22 \pm 1/29 \text{ mg/dl}$, NS (% ۳/۵ ± ۲۲/۱) و در گروه Zocor $82 \pm 23 \text{ mg/dl}$, NS (% ۲۳ ± ۸۲) بود.

در ۴ هفته و ۸ هفته بعد از درمان تغییرات غلظت لیپیدهای سرم در هیچ مورد در بین دو گروه سیمواستاتین و Zocor اختلاف معنی‌دار آماری نداشت.

در بررسی بالینی ۴ هفته و ۸ هفته پس از شروع دارو از نظر بروز علایم و نشانه‌هایی که قبل از شروع دارو وجود نداشته‌اند، در گروه سیمواستاتین در ۱ مورد راش جلدی و در ۱ مورد اسهال و در گروه Zocor در ۱ مورد خارش و در ۱ مورد گزگز اندام‌ها ثبت شد. در ۴ بیمار از گروه

دارو حدود ۱٪ بوده است، این مطالعه به سبب کم بودن حجم نمونه و طول مدت درمان، توانایی بررسی عوارض جانبی داروهای دو گروه را ندارد. اگر چه در این مطالعه عارضه دارویی مهمی مشاهده نشد و در هیچ یک از بیماران دو گروه قطع درمان به علت یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی صورت نگرفت.

در مجموع، این مطالعه نشان داد که سیمواستاتین ساخت ایران نظیر مشابه خارجی Zocor سبب کاهش کلسترول تام و LDL کلسترول می‌گردد و با توجه به اثرهای مفید، با در نظر داشتن عوارض جانبی دارو که در مطالعه‌های قبلی شناخته شده است، می‌تواند در مواردی که مصرف «استاتین‌ها» توصیه شده است، مورد استفاده قرار گیرد.

قدرتانی

بدین وسیله نویسندهای مراتب قدردانی خود را از خانم سهیلا اللهوردیان که در اجرای طرح همکاری صمیمانه داشته‌اند، ابراز می‌دارند.

Reference

- Hoeg JM, Brewere HB. 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase inhibitors in the treatment of hypercholesterolemia. *JAMA* 1987;258: 3532-6.
- Illingworth DR, Bacon S. Hypolipidemic effects of HMG-CoA reductase inhibitors in patients with hypercholesterolemia. *Am J Cardiol* 1987;60: 33G-42G.
- Grundy SM. HMG-CoA reductase inhibitors for treatment of hypercholesterolemia. *N Engl J Med* 1988;319: 24-33.
- Slater EE, MacDonald JS. Mechanism of action and biological profile of HMG-CoA reductase inhibitors. *Drugs* 1988; 36(suppl 3): 72-82.
- Keech A, et al. Three-year follow-up of the Oxford Cholesterol Study: assessment of the efficacy and safety of simvastatin in preparation for a large mortality study. *Eur Heart J* 1994; 15: 255-69.
- MAAS Investigators. Effect of simvastatin on coronary atheroma: the Multicentre Anti-Atherosclerosis Study (MASS). *Lancet* 1994; 344: 633-8.
- Scandinavian Simvastatin Survival Study Group. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444

از شروع دارو مشاهده شد، در ۴ هفته بعد از شروع دارو نیز وجود داشت.

یافته‌های این تحقیق مشابه نتایج بدست آمده از اثر سیمواستاتین در مطالعه‌های قبلی است.^{۵-۷} در این مطالعه افزایش HDL کلسترول و کاهش تری‌گلیسرید در مصرف هیچ یک از دو دارو معنی‌دار نبود. این در حالی است که در مطالعه‌های قبلی افزایش معنی‌دار ۵-۹% در HDL کلسترول و کاهش معنی‌دار ۱۵-۱۸% در تری‌گلیسرید در طی مصرف کوتاه مدت ۲۰ میلی‌گرم روزانه سیمواستاتین نشان داده شده بود.^{۵-۷} عدم مشاهده تغییرات معنی‌دار در تری‌گلیسرید و HDL کلسترول به احتمال زیاد بدلیل تعداد کم بیماران در مطالعه ماست، با این وجود از آنجایی که در این مطالعه ظرفیت پذیری دارویی بیماران در مصرف دارو مورد ارزیابی قرار نگرفت، حضور بیمارانی با ظرفیت پذیری پایین می‌تواند سبب تخفیف اثر داروهای در تغییرات غلظت لیپیدهای سرم شده باشد. عوارض جانبی درمان با سیمواستاتین^{۱۰} شامل اختلالات گوارشی، سرد رد، راش‌های پوستی، سرگیجه، تاری دید، اختلال حس چشایی، افزایش برگشت پذیر آمینوترانسفرازهای سرم، میوپاتی همراه با افزایش کراتین فسفوکیناز بویژه در مبتلایان به نارسایی کلیه و یا در مصرف همزمان با داروهای ایمونوساپرسیو، مشتقه اسیدوفیبریک یا نیکوتینیک اسید، خونریزی در مصرف همزمان با داروهای ضد انعقاد کومارینی، آلوپسی^{۱۱}، پروتئینوری^{۱۲}، عالیم افسردگی^{۱۳}، پارستزی و نوروپاتی^{۱۵}، اختلالات خواب^{۱۶} و واکنش‌های حساسیتی می‌باشد؛ همچنین از مصرف دارو در حین آبسنتی باید خودداری شود.^۹ از آنجایی که در مطالعه‌های بالینی کنترل شده، بروز عوارض جانبی

- Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. *JAMA* 1993; 269: 3015.
10. Parfitt K, editor. Martindale the complete drug reference 32nd ed. Pharmaceutical Press, 1999.
11. Anonymous. Simvastatin and alopecia. *Adverse Drug React Bull* 1993; 12:7.
12. Deslypere JP, et al. Proteinuria as complication of simvastatin treatment. *Lancet* 1990; 336: 1453.
13. Lechleitner M, et al. Depressive Symptoms in hypercholesterolaemic patients treated with pravastatin. *Lancet* 1992; 340: 910.
14. Duits N, Bos FM. Depressive symptoms and cholesterol-lowering drugs. *Lancet* 1993; 341: 114.
15. Anonymous. Paresthesia and neuropathy with hypolipidaemic agents. *Aust Adverse Drug React Bull* 1993; 12:6.
16. Eckernas S-A, et al. The effects of simvastatin and pravastatin on objective and subjective measures of patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). *Lancet* 1994; 344: 1383-9.
۸. عزیزی، ف. همکاران. بررسی آینده‌نگر قند و لپید تهران طرح تحقیقات ملی، شورای پژوهش‌های علمی کشور. تهیه شده در مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بیشتبانی، ۱۳۷۷.
9. Summary of The Second Report of The National Cholesterol Education Program Expert Panel On nocturnal sleep: a comparison of two structurally different HMG CoA reductase inhibitors in patients with primary moderate hypercholesterolemia. *Br J Clin Pharmacol* 1993; 35: 287-9