

وضعیت بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم در کشور سال ۱۳۸۰

دکتر فریدون عزیزی

بررسی کشوری سال ۱۳۷۵ بیش از ۹۰٪ دانش‌آموzan دارای ید ادرار بیشتر از ۱۰ میکروگرم در دسی‌لیتر هستند^{۱۶}، معندا هنوز گواتر در سنین بالاتر از ۱۹ سال شایع است، زیرا مصرف نمک یددار در کاهش درصد گواتر در بزرگسالان اثر قابل توجهی ندارد. به هر صورت کنترل کمبود ید و حذف بیماری‌های ناشی از آن از افتخارات کشور و از اقدامات مهم پیشگیری در دهه ۷۰ بوده است. دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۰ کشور ایران را عاری از بیماری‌های ناشی از کمبود ید یا IDD Free نام نهاده است^{۱۷} و برگزاری دوره آموزشی سالیانه «پایش برنامه‌های کنترل کمبود ید» را به مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار نموده است تا با کمک دفتر امور تغذیه وزارت بهداشت و نیز انتیتو تحقیقات تغذیه، مسؤولان کشورهای منطقه و سراسر جهان را برای موفقیت در برنامه کنترل کمبود ید آموزش دهد.^{۱۸} در همایش امسال سمپوزیومی در مورد برنامه‌های کنترل و پیشگیری از کمبود ید در کشور و نیز اصول تداوم این نوع برنامه‌ها بر اساس معیارهای جهانی برگزار گردید.

در زمینه سایر بیماری‌های غده تیروئید در سال‌های اخیر تحقیقات مهمی در کشور انجام

به بهانه برگزاری ششمین همایش (کنگره) بین‌المللی بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم، مناسب است که نظری به وضعیت بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم در کشور داشته باشیم. در اینجا خلاصه‌ای از مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در دو دهه گذشته و نیز چکیده‌ای از مقالات ارسال شده به همایش ششم آورده می‌شود. بدون شک هنوز بیشترین بیماری غدد درون‌ریز «گواتر» است که از سال‌ها قبل در زمرة شایعترین بیماری‌های کشور محسوب می‌شود.^۱ در دهه ۶۰ شمسی و قبل از شروع طراحی و اجرای برنامه کشوری مبارزه با کمبود ید، حدود ۲۰ میلیون نفر دچار گواتر و سایر اختلالات ناشی از کمبود ید بودند.^{۲-۷} مطالعه کشوری سال ۱۳۶۸ شیوع گواتر در دانش‌آموzan بیشتر استان‌های کشور را بالاتر از ۴۰٪ و در برخی استان‌ها بیشتر از ۸۰٪ گزارش نمود.^۸ بعلاوه اختلال شدید رشد ذهنی و کاهش ضریب هوشی، اختلالات پسیکوموتور و اختلالات رشد جسمی در برخی از دانش‌آموzan وجود داشت.^{۹-۱۰} اگر چه این بیماری‌ها با تولید و توزیع نمک یددار در همه کشورها^{۱۱} و نیز استفاده از محلول روغنی یددار در مناطق هیپرآندمیک کاهش قابل توجهی یافته است^{۱۲-۱۴} و طبق بررسی‌های دوره‌ای در مورد مصرف نمک یددار بیش از ۹۰٪ خانوارها نمک یددار مصرف می‌کنند^{۱۵} و بر اساس

مقالات‌های دیگری در زمینه اپیدمیولوژی اختلالات تیروئید در یک جامعه شهری،^{۲۹} بررسی روش‌های تشخیصی و درمانی در گره‌های تیروئید،^{۳۰-۳۱} تعیین میزان طبیعی بیرون زدگی چشم در افراد سالم و اگزوفتالمالی در بیماران گریوز در تهران،^{۳۲} فلچ دوره‌ای تیروتوکسیک در شمال غرب ایران،^{۳۳} مقاومت به هورمون تیروئید،^{۳۴} پیامد ضریب هوشی و آزمون‌های عملکرد تیروئید کودکانی که مادران آنها در دوران بارداری متیمازول مصرف کردنداند،^{۳۵} تظاهرات سونوگرافیک در اختلالات تیروئید بعد از زایمان،^{۳۶} کمکاری تیروئید پس از درمان با ید رادیواکتیو،^{۳۷} عملکرد غده تیروئید در بیماران مبتلا به گلوکوم،^{۳۸} شیوع گواتر و پایش نمک‌های یددار،^{۳۹-۴۰} پایش ید در دانشآموزان منطقه‌ای که شدیدترین اختلالات ناشی از کمبود ید داشتند ۱۰ سال پس از یدرسانی،^{۴۱} اختلالات عملکرد تیروئید در بیماران بخش مراقبت‌های ویژه قلبی،^{۴۲} و بررسی همراهی هیپرتیروئیدی و انفارکتوس حاد میوکارد^{۴۳} از زمرة مقالاتی هستند که در این همایش ارایه گردیدند.

پژوهش‌های دهه اخیر نشان داده‌اند که شیوع دیابت در ایران در حد متوسط جهانی و بین ۲ تا ۴٪ است. دیابت نوع ۲ در افراد بالای ۳۰ سال بین ۶ تا ۱۱٪ و شیوع IGT (اختلال تحمل گلوکز) بین ۷ تا ۱۳٪ در نواحی مختلف ایران گزارش شده است.^{۴۴-۴۸} شیوع در مناطق روستایی پایین‌تر از شهرها است.^{۴۹} بر اساس یافته‌های اپیدمیولوژیک و نظر مشاور سازمان جهانی بهداشت،^{۵۰} برنامه پیشگیری و کنترل دیابت در هر سه نوع پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه با ادغام دیابت در

شده است. این بررسی‌ها نشان داده‌اند که در اکثریت بیماران ایرانی دوز مورد نیاز داروهای ضد تیروئید در درمان پرکاری تیروئید کمتر از دوزهای نوشته شده در کتب مرجع و مطالعات دیگر کشورها است.^{۱۹} درمان با داروهای ضد تیروئید در زمان شیردهی بلامانع است و نه تنها در سال اول شیرخوارگی، بلکه در سنین ۵ تا ۸ سالگی، فرزندانی که در زمان کودکی شیر مادرانی را دریافت کرده‌اند که با متیمازول درمان می‌شدند، عارضه‌ای از نظر فعالیت تیروئید و رشد جسمی و ذهنی ندارند.^{۲۰-۲۱} در مورد گره‌های خوش‌خیم و بدخیم تیروئید، بررسی‌ها شیوع گره، خصوصیات پاتولوژی و جواب به درمان را مشابه یافته‌های دیگران نشان داده است.^{۲۲} بررسی تیروئیدیت پس از زایمان در جامعه زنان تهران شیوع بالاتری از برخی گزارش‌های دیگر نشان داده است و لزوم توجه به این عارضه را - که حدود ۱۲٪ زنان پس از زایمان به آن دچار می‌شوند - گوشزد کرده است.^{۲۳} در سمپوزیومی در همایش ششم در مورد خصوصیات بیماری‌های تیروئید در دوران بارداری و شیردهی ۵ سخنرانی ارایه گردید.

در همایش ششم مقالات تحقیقاتی مهمی در زمینه بیماری‌های تیروئید عرضه شدند. غربالگری کمکاری مادرزادی تیروئید که به علت بالا بودن فراخوان (Recall rate) در دهه ۶۰ متوقف شده بود،^{۲۴} در اواخر دهه ۷۰ آغاز شد و شیوع بالای هیپوتیروئیدی نوزادان را نشان داد که نیاز به ملی شدن غربالگری را یاداور می‌شود.^{۲۵-۲۶} تغییرات LDL-C پاراکسوناز، آنزیمی که از اکسیداسیون C جلوگیری می‌کند، در بیماری‌های تیروئید برای اولین بار در جهان در این همایش ارایه شد.^{۲۷-۲۸}

روش‌های ویژه جهت برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های تغییر در شیوه زندگی^۱ آغاز گردیده است.^{۶۰،۶۱}

مقالات تحقیقاتی فراوانی در کنگره ششم در مورد دیابت ارایه شدند؛ شیوع دیابت قندی و ارتباط آن با عوامل خطرزای قلبی - عروقی در قزوین،^{۶۲،۶۳} تعیین الگوی اختلالات گلوكز در جامعه شهری با معیارهای WHO و ADA^{۶۴}؛ بررسی HLA در دیابتی‌ها^{۶۵} ارتباط دیابت و IGT با مصرف سیگار؛^{۶۶} شیوع دیابت بارداری در زنان جوان؛^{۶۷} بررسی شیوع چاقی، هیپرلیپیدمی و فشارخون در بیماران دیابتی؛^{۶۸} شیوع آنژین صدری در دیابت نوع ۲؛^{۶۹} شیوع سنگ‌های صفرایی،^{۷۰} افسردگی،^{۷۱} عوارض دیررس؛^{۷۲} میکروآلبومینوری؛^{۷۳،۷۴} هیپرگاما-گلوبولینمی و هیپوآلبومینمی؛^{۷۵} ناتوانی جنسی؛^{۷۶} مقایسه چگونگی روابط خانوادگی بانوان دیابتی و غیردیابتی؛^{۷۷} بررسی رابطه الگوهای رفتاری در بیماران دیابتی نوع ۱ و ۲؛^{۷۸} تأثیر روش‌های مختلف آموزشی بر کنترل قند و HbA1C^{۷۹} و تعداد زیادی مقالات دیگر در ارتباط با فیزیوپاتولوژی، تشخیص و درمان عوارض و پیشگیری بیماری دیابت^{۸۰،۸۱} و تأثیر روش‌های گوناگون درمانی در کنترل بیماری قند.^{۸۰-۸۷}

بررسی‌های تحقیقاتی در زمینه اختلالات لیپید و شیوع دیس‌لیپوپروتئینمی در ساکنان تهران^{۹۰} و بوشهر؛^{۹۱} چاقی خانوادگی و نقش تغذیه در بروز آن؛^{۹۲} ارزیابی دریافت‌های غذایی یک جامعه شهری در تهران،^{۹۳} وضعیت نمایه توده بدنی در جوامع مختلف^{۹۴} و ارتباط آن با عوامل دیگر

برنامه‌های شبکه بهداشتی - درمانی روستایی کشور در اواخر دهه ۷۰ شروع گردید و بیش از ۱۸ دانشگاه برنامه‌های محدودی در بخشی از یک شبکه را آغاز نموده‌اند. نظارت بر این برنامه بسیار مهم که شناسایی حدود ۵۰٪ دیابتی‌های ناشناخته و پیشگیری ثانویه به منظور کنترل دیابت و پیشگیری عوارض آن را به عهده دارد و اهتمام در اجرای صحیح و توسعه آن به سایر نواحی، در زمرة اهداف عالیه برنامه‌های بهداشتی کشور است. در همایش ششم، سمپوزیومی در ارتباط با اپیدمیولوژی، تشخیص و عوارض، برنامه کشوری و یک سخنرانی جامع در مورد پیشگیری از دیابت ارایه شد.

هیپرلیپیدمی در زمرة عوامل خطرساز بیماری‌های قلبی - عروقی است که شناخت و کنترل آن در پیشگیری بیماری‌های قلبی - عروقی از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش‌های سال‌های اخیر نشان داده‌اند که شیوع انواع هیپرلیپیدمی در کشور در حد بالای نورم‌های بین‌المللی است.^{۵۱-۵۸} این امر نه تنها در بزرگسالان بلکه با توجه به شیوع نسبتاً بالای آنها در کودکان و نوجوانان^{۵۹} نیز بصورت زنگ خطری برای سلامت جامعه است که با توجه به تغییر هرم سنی جمعیت کشور و شیوع نسبتاً بالای فشارخون، دیابت و چاقی در هر دو جامعه شهری و روستایی لزوم برنامه‌ریزی‌های گسترده برای کنترل آنها را مشخص می‌کند.

در اوخر دهه ۷۰ چند برنامه تحقیقاتی در زمینه شناسایی عوامل خطرساز بیماری‌های قلبی - عروقی از جمله دیابت، هیپرلیپیدمی، فشارخون و چاقی بویژه در تهران، اصفهان و قزوین انجام شده است. نتایج اولیه این تحقیقات مجددًا شیوع این عوامل خطرساز را به میزان زیاد آشکار نموده و

کلیه^{۱۱۱}، پیوند مغز استخوان^{۱۱۲} و شیمی درمانی^{۱۱۳} بر عملکرد غدد درون ریز بویژه غدد تولید مثل می‌گذارند، ارایه گردید.

در دو دهه اخیر مطالعات زیادی در کشور، رشد جسمی و عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار داده و با استانداردهای بین‌المللی مقایسه کردند.^{۱۱۴-۱۱۷}

در همایش ششم مقایسه منحنی رشد وزنی و قدی نوجوانان دبیرستانی در دو سطح اقتصادی مختلف،^{۱۱۸} بررسی اعتبار فرمول تانر برای پیش‌بینی قد نهایی کودکان در تهران،^{۱۱۹} علل کوتاهی قد در یزد،^{۱۲۰} اثر آنالوگ‌های GnRH و رشد طولی دختران با بلوغ زودرس سرشتی در شیراز^{۱۲۱} و بررسی اثرات سولفات روی بر رشد کودکان^{۱۲۲} ارایه شد.

مقالات تحقیقاتی بسیار دیگری مانند اولین گزارش آدنالکتومی لایپاروسکوپیک در ایران^{۱۲۳} و بسیاری از مقالات پژوهشی در علوم پایه مرتبط با غدد آندوکرین در کنگره ششم ارایه شده‌اند.^{۱۲۴-۱۲۱} اگر چه مقالات علوم پایه رشد قابل توجهی را نسبت به همایش‌های قبلی نشان می‌دهد و تعداد آنها از هجده عدد افزون است، ولی تنها ۸٪ کل مقالات پذیرفته شده در همایش را تشکیل می‌دهد و نیاز به توجه بیشتری به پژوهش‌های پایه در تمامی رشته‌ها بویژه بیماری‌های آندوکرین را گوشزد می‌نماید.

با لطف و عنایت خداوند منان، پژوهش‌های عمده‌ای در دو دهه اخیر در ارتباط با پیشگیری، اپیدمیولوژی، اتیولوژی، پاتوژن، فیزیوپاتولوژی، علوم بالینی، عوارض، تشخیص، درمان و مراقبت‌های بیماری‌های غدد درون ریز و متابولیسم در کشور انجام شده است. با پیشرفت

خطرساز و نیز با الگوی قاعده‌گی و هیرسوتیسم^{۹۴} در زمرة مقالات دیگری هستند که به شناسایی عوامل خطرساز بیماری‌های قلبی - عروقی و برنامه‌ریزی جهت تغییر در شیوه زندگی کمک می‌نمایند.

اختلالات متابولیک استخوان بویژه کمبود کلسیم و ویتامین D از مدت‌ها قبل بصورت تظاهرات بالینی مورد توجه پزشکان ما بوده است. شیوع ریکتر و استئومالاسی از دیرباز و شیوع استئوپروز در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شمسی مورد توجه متخصصان بالینی قرار گرفته است.^{۹۵} در چند سال گذشته بررسی سطح سرمی کلسیم دانش‌آموزان کشور، کاهش شدید کلسیم^{۹۶} و کمبود دریافت مواد غذایی حاوی کلسیم را در اکثر افراد مشخص نموده و توصیه‌هایی جهت افزایش مصرف شیر و مواد لبنی و غنی نمودن شیر با ویتامین D داده شده است^{۹۷} که امید است مورد توجه مسؤولان بهداشتی کشور قرار گیرد.

در کنگره ششم تغییرات فصلی سطح سرمی ۲۵-هیدروکسی ویتامین D در تهران،^{۹۸} عدم ارتباط کمبود ویتامین D با تحمل گلوکز^{۹۹} و مصرف سیگار^{۱۰۰} در همین جامعه و وضعیت تراکم استخوان در خانم‌های دیابتی نوع دو^{۱۰۱} عرضه شد. بررسی‌های فراوانی در سال‌های گذشته در مورد بلوغ در دختران و پسران کشور، میزان شیوع هیرسوتیسم، نازایی و بیماری‌های غددی در ارتباط با غدد و تولید مثل انجام شده است.^{۱۰۲-۱۰۴}

در همایش ششم بررسی میزان اضطراب و افسردگی دختران در حوالی بلوغ،^{۱۰۵} فراوانی هیرسوتیسم،^{۱۰۶} عملکرد تیروئید،^{۱۰۷} میزان انسولین و قند^{۱۰۸} در مبتلایان به تخمدان پلی‌کیستیک، اثراتی که تالاسمی،^{۱۰۹} سیروز،^{۱۱۰} نارسایی کلیه و پیوند

صاحبان علوم پایه پزشکی و سایر متخصصان گروه پزشکی بتوانند پژوهش‌هایی را که در جهت رفع نیازهای بهداشتی - درمانی و ارتقای دانش علم اندوکرینولوژی مفید باشد، به انجام برسانند.

سطح تحقیقات در کشور، این پژوهش‌ها از نظر کمی و کیفی ارتقای چشمگیری را نشان می‌دهد. معهذا نیاز به تحقیقات با کیفیت والاتر و در سطح گسترده‌تر وجود دارد.

امید است که متخصصان غدد درون‌ریز، همراه با متخصصان داخلی، متخصصان کودکان،

References

- Emami A, Shabbazi H, Sabzevari M, et al. Goiter in Iran. Am J Clin Nutr 1969; 22:1584-8.
- عزیزی ف، کیمیاگر م، باستانی ج، و همکاران. بررسی گواتر در شهریار، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۴؛ سال نهم، شماره دوم، صص ۷۵-۸۴.
- نوایی ل، کیمیاگر م، عزیزی ف، و همکاران. بررسی اپیدمیولوژیک یدر شهریار، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۶۵؛ سال دهم، شماره اول، صص ۸-۱۹.
- Kimiagar M, Azizi F, Navai L, Yassai M, Nafarabadi T. Survey of iodine deficiency in a rural area near Tehran: association of food intake and endemic goiter. Eur J Clin Nutr 1990; 44:17-22.
- عزیزی ف، نفرآبادی م، آذرتابش پ، و همکاران. بررسی گواتر در شرق تهران. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۶۶؛ صص ۴۱-۴۷.
- Azizi F, Kimiagar M, Navai L, Yassai M, et al. Goiter in Tehran and suburbs. Recent progress in thyroidology. Vichayanast A et al (eds). Proceedings of the Tird Asia and Oceania Thyroid Asociation Meting. 1986; 388-91.
- رجیبان ر، شهبازی ح، پریزاده ج، و همکاران. بررسی گواتر در نیشابور. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۶۹؛ سال چهاردهم، شماره ۱ و ۲، صص ۱۷-۲۳.
- Azizi F, Kimiagar M, Nafarabdi M, Yassai M. Current status of iodine deficiency in the Islamic Republic of Iran. EMR Health Serv J 1990; 8:23-7.
- Azizi F, Kalani H, Kimiagar M, et al. Physical neuromotor and intellectual impairment in non-cretinous schoolchildren with iodine deficiency. Int J Vitam Nutr Res 1995; 65:199-205.
- Azizi F, Sarshar A, Nafarabadi M, Ghazi A, Kimiagar M, Noohi S, et al. Impairment of neuromotor and cognitive development in iodine deficient schoolchildren with normal physical growth. Acta Endocrinol 1993; 129:501-4.
- عزیزی ف، و همکاران. بررسی تأثیر مصرف نمک ید دار بر شیوع و شدت گواتر و غلظت ید ادرار در خانوارهای ساکن شهریار و رباط کریم در سال ۱۳۷۴، طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۷۴-۷۶.
- Azizi F, Kimiagar M, Ghazi A, et al. Treatment of goitrous hypothyroidism with iodized oil supplementation in an area of iodine deficiency. Exp Clin Endocrinol Diabetes 1996; 104:387-91.
- Azizi F, Kimiagar M, Ghazi AA, Nafarabadi M. The effects of iodized oil in eu- and hypothyroid iodine deficient girls. J Endocrinol Invest 1997; 20:18-23.
- Salarkia N, Azizi F, Kimiagar M, et al. Monitoring iodine following consumption of iodized salt in Tehran inhabitants. INT J Vitam Nutr Res 2000; 70:65-9.
- عزیزی ف، شیخ‌الاسلام ر. برنامه کشوری مبارزه با کمبود یod. طب و تزکیه، زمستان ۷۴ و بهار ۱۳۷۵؛ شماره‌های ۱۹ و ۲۰، صص ۱۸-۲۲.
- عزیزی ف، شیخ‌الاسلام ر، هدایتی م، میرمیران پ، ملک‌اصلی ح، کیمیاگر م، پژوهی م. پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش‌آموzan ۸ تا ۱۰ ساله کشور در سال ۱۳۷۵. طب و تزکیه، ۱۳۷۰؛ شماره ۴۰، صص ۴۴-۵۰.
- Assessment of monitoring of iodine deficiency disorders in countries of the Eastern Mediterranean Region. WHO-EMRO. Report of a symposium-workshop, 9-11 Sept. 1999, Tehran, I.R.Iran, 2000.
- Regional training course on monitoring and evaluation of IDD elimination programs. May 27-June 7, 2001; Endocrine Research Center, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, I.R.Iran. [http://www.erc-iran.com/idd].
- Azizi F. Environmental iodine intake affects the response to methimazole in patients with diffuse toxic goiter. J Clin Endocrinol Metab 1985; 61:3747-7.
- Azizi F. Effect of methimazole treatment of maternal thyrotoxicosis on thyroid function in breast-feeding infants. J pediatr 1996; 128:855-9.
- Azizi F, Khoshnati M, Bahrainian M, Hedayati M. Thyroid function and intellectual development of infants nursed by mothers taking methimazole. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85:3233-8.
- لاریجانی ب، پژوهی م، باستان حق م، و همکاران. بررسی مقایسه‌ای اثرات درمان توقی در کاهش اندازه ندول سرد تیروئید، کارازمایی بالینی و دوسوکور با گروه شاهد. مجله

۱. غدد درون ریز و متابولیسم ایران ۱۳۸۰؛ سال سوم، شماره ۱، صص ۱-۱۰.
۲۳. سروقدی ف، شهبازیان ح، هدایتی م، محرابی ع، عزیزی ف، شیوع تیروئیدیت پس از زایمان در گروهی از زنان شهر تهران. مجله پژوهش در پزشکی ۱۳۷۹؛ ۲۴، شماره ۲، صص ۱۱۳-۱۰۵.
۲۴. عزیزی ف، اولادی ب، نفرآبادی م، حاجیپور ر. غربالگری برای شناسایی کمکاری مادرزادی تیروئید در تهران. مجلة دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۷۳؛ ۱۸، شماره ۱، ص ۳۴.
۲۵. اردوانخانی آ، هدایتی م، میرمیران پ، حاجیپور ر، عزیزی ف. شیوع بالای هیپوتیروئیدی نوزادان در تهران: نیاز برای ملی نمودن طرح غربالگری کمکاری مادرزادی تیروئید. ویژه نامه مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران (خلاصه مقالات ششمین کنگره بین المللی غدد درون ریز)، تابستان ۱۳۸۰؛ خلاصه شماره ۱۰.
۲۶. اردوانخانی آ، هدایتی م، میرمیران پ، حاجیپور ر، عزیزی ف. بررسی توصیفی علل اتیولوژیک در ۲۲ نوزاد مبتلا به هیپوتیروئیدی: طرح غربالگری کمکاری مادرزادی تیروئید در تهران (اسفند ۷۶ تا خرداد ۸۰) ibid. ۲۸۰.
۲۷. رئیس زاده ف، صولتی م، اعرابی م، عزیزی ف. بررسی فعالیت آنزیم پاراکسوناز و سطح سرمی لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها در بیماران مبتلا به اختلال عملکرد تیروئید. ibid. ۴۵۰.
۲۸. رئیس زاده ف، صولتی م، اعتمادی آ، عزیزی ف. آیا درمان هیپرتیروئیدی در تغییر سطح سرمی لیپیدها، آپولیپوپروتئین‌ها و فعالیت سرمی آنزیم پاراکسوناز مؤثر است؟ ibid. ۳۴۰.
۲۹. حیدریان پ، هدایتی م، محرابی ای، امامی ح، عزیزی ف. مطالعه تیروئید تهران: شیوع اختلالات تیروئید در بالغین منطقه ۱۳ شهری تهران. ibid. ۲۵۰.
۳۰. موسوی ز، زکوی ر، رضائی کلوبی ح. بررسی توده‌های تیروئید در افراد با سابقه رادیوتراپی به ناحیه سر و گردن در استان خراسان. ibid. ۴۱۰.
۳۱. نخجوانی م، خلف‌پور م. بررسی ماهیت پاتولوژیک ۵۵۸ مورد ندول سرد تیروئید در یک دهه ۱۳۷۰-۷۸ و مقایسه آن با نتایج دهه قبل. ibid. ۴۲۰.
۳۲. حدائقی ف، عزیزی ف. تعیین میزان طبیعی بیرون‌زدگی چشم در برخی از ساکنان تهران و تعیین شیوع بیرون‌زدگی چشم در مبتلایان به گریوز. ibid. ۸۲۰.
۳۳. بهرامی ا، اسلامیان ف. فلچ دوره‌ای تیروتوکسیک در ایران: یک دهه تجربه بر روی یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی، عوامل مساعد کننده، تشخیص و درمان ۸۳ بیمار. ibid. ۳۰.
۳۴. میرسعید قاضی عا. بررسی ژنتیک یک خانواده ایرانی مبتلا به مقاومت به هورمون تیروئید. ibid. ۲۰.
۳۵. عزیزی ف، خمسه م، بحرینیان ع. ضریب هوشی و آزمون‌های عملکرد تیروئید کودکانی که مادران آنها در دوران بارداری داروی متی‌مازول مصرف کردند. ibid. ۰.
۳۶. سروقدی ف، شهبازیان ح، محرابی ای، هدایتی م، عزیزی ف. تظاهرات سونوگرافیک و تغییرات حجم تیروئید در اختلالات تیروئید بعد از زایمان. ibid. ۲۹۰.
۳۷. نظام‌مافي ص، والی ر. چگونه می‌توان از کمکاری تیروئید پس از درمان پرکاری با ید رادیواکتیو جلوگیری نمود. ibid. ۴۰.
۳۸. بهجتی اردکانی ج، حاجیپور ر، والایی ف، عزیزی ف. عملکرد غده تیروئید، در بیماران مبتلا به گلوكوم. ibid. ۴۲۰.
۳۹. سیمانی‌زاده ل، صالحی ل، آقا ملایی ت. بررسی عوامل مؤثر بر شیوع گواتر در دانش‌آموزان مدارس شهر بندرعباس، سال ۱۳۷۹. ibid. ۱۱۰.
۴۰. دژآگاه ر، علوی ک، کتانچی م، منظوری ن، یوسفی‌نژاد ک. بررسی کیفیت نمک‌های یددار در استان تهران. ibid. ۱۱۲۰.
۴۱. سالارکیان، هدایتی م، رئیس‌زاده ف، کیمیاگر م، میرمیران پ، عزیزی ف. پایش ید در دانش‌آموزان روزتاهای واقع در شمال غرب تهران ۱۰ سال پس از یدرسانی. ibid. ۰.
۴۲. بیرانویند مر، حاج‌شیخ‌الاسلامی ف، حبیبی معینی س، صادقی قهروندی م، والایی ن. شیوع بیماری‌های عملکرد تیروئید در بیماران بستری در CCU. ibid. ۱۰۹۰.
۴۳. رحمانی مح. بررسی همراهی هیپرتیروئیدی و انفارکتوس خاد میوکارد. ibid. ۱۱۶۰.
۴۴. نوابی ل، کیمیاگر م، عزیزی ف. بررسی شیوع دیابت و در اسلامشهر و مقایسه روش غربالگری با نتایج OGTT برای تشخیص اختلالات تحمل گلوكز. مجلة پژوهش ۱۳۷۶؛ ۲۱، شماره ۱، صص ۵۸-۹۷.
45. Larijani B, Bastanagh M, Pajouhi M, et al. Prevalence of NIDDM in Tehran. Proceedings of the Third International Congress on Endocrine Disorders, Tehran, September 1995; 4-8.
46. Azizi F. Diabetes mellitus in the Islamic Republic of Iran. IDF Bulletin 1996; 4:38-9.
47. Amini M, Afshinnia F, Bashardoost N, et al. Prevalence and risk factors of diabetes mellitus in the Isfahan city population (aged 40 or over) in 1993. Diabetes Res Clin Pract 1997; 38:185-190.
۴۸. عزیزی ف، نوابی ل. بررسی شیوع دیابت و عدم تحمل گلوكز در روزتاهای استان تهران. مجلة حکیم، دوره ۱۳۸۰؛ ۹۲-۹۹.
- چهارم، شماره دوم، صص ۹۲-۹۹.
۴۹. شریفی ف، عزیزی ف. بررسی شیوع هایپرلیپیدمی، اضافه وزن، فشارخون بالا و میزان فعالیت بدنی در افراد دیابتی

۶۴. امامی ح، سعادت ن، صالحی پ، قانبلی ح، عزیزی ف. تعیین الگوی اختلالات گلوكز در جامعه شهری ساکن منطقه تهران: مقایسه دو معیار WHO و ADA. *ibid.* ۱۰۲۰.
۶۵. افخمی اردکانی م، مرادپور س. بررسی فنتیپ‌های مختلف کلاس یک HLA در بیماران دیابتی غیروابسته به انسولین در بیماران مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات درمانی دیابت یزد. *ibid.* ۵۹۰.
۶۶. امامی ح، محمد ح، عزیزی ف. ارتباط دیابت و IGT با مصرف سیگار در جمعیت شهری تهران: مطالعه قند و لیپید تهران. *ibid.* ۱۴۰.
۶۷. لاریجانی ب، عزیزی ف، باستان حق مح، پژوهی م، حسین‌زاد آ. شیوع دیابت بارداری در خانم‌های جوان. *ibid.* ۸۶۰.
۶۸. قنادی اصل ف، ایران‌پرور م. بررسی شیوع چاقی، هیپرلیپیدمی و هیپرگلیسمی در بیماران دیابتی نوع دو. *ibid.* ۱۶۰.
۶۹. حبیبیان س، عینی ا، مجید م، عزیزی ف. شیوع آنژین صدری بر اساس پرسشنامه رز در بیماران دیابتی نوع دو مطالعه آینده‌نگر قند و لیپید تهران. *ibid.* ۱۰۰.
۷۰. میرمیران پ، میربلوکی م، محمدی نصرآبادی ف، سربازی ن، عزیزی ف. چاقی خانوادگی و نقش تغذیه در بروز آن، مطالعه آینده‌نگر قند و لیپید تهران. *ibid.* ۶۸۰.
۷۱. توکلی ع، افخمی اردکانی م، وفادار ن، علی فتاحی ن. بررسی شیوع افسردگی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی - درمانی دیابت یزد در تابستان ۱۳۷۹. *ibid.* ۱۱۰.
۷۲. ایران‌پرور م، منافزارده ف. شیوع عوارض دیررس دیابت در بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک دیابت بوعلی اردبیل در فاصله سال ۷۶-۷۹. *ibid.* ۷۶-۷۹.
۷۳. باستان حق مح، لاریجانی ب، پژوهی م، شیرزاد ن، یاراحمدی ش، جوادی ا، شفایی ع. تعیین دقت آزمون میکرال در تشخیص میکروآلبومنوری در مقایسه با روش استاندارد ایمونوتوربیدومتری در بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به کلینیک دیابت بیمارستان شریعتی در سال ۱۳۷۹-۸۰. *ibid.* ۹۶۰.
۷۴. افخمی اردکانی م، شکیبا م، عرفانی ام، بررسی شیوع میکروآلبومنوری در بیماران مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد. *ibid.* ۱۰۲۰.
۷۵. استقامتی ع، نخجوانی م، گل‌محمدی ت، عسگری لویه م. هیپرگام‌الگلوبولینمی و هیپوآلبومنیمی در بیماران دیابتی نوع دو. *ibid.* ۱۰۴۰.
۶۱. Azizi F. Assignment report WHO-EMRO Diabetes mellitus in the Islamic Republic of Iran. Dec 7-23. 1996.
۶۲. نوایی ل، کیمیاگر م، حاجی‌پور ر، عزیزی ف. بررسی اپیدمیولوژیک هیپرلیپیدمی و چاقی در اسلامشهر. پژوهش در پژوهشی، ۱۳۷۷؛ سال ۲۲، شماره ۱، صص ۷۱-۸۰.
۶۳. شریفی ف، عزیزی ف. بررسی شیوع هیپرلیپیدمی، اضافه وزن، فشارخون بالا و میزان فعالیت بدنی در افراد دیابتی و IGT و مقایسه آن با افراد سالم در روستاهای استان زنجان. پژوهش در پژوهشی، ۱۳۷۶؛ سال ۲۱، شماره ۴، صص ۴۱-۵۰.
۶۴. عزیزی ف. بررسی اپیدمیولوژیک فشارخون، قند و لیپیدها در ساکنان روستاهای استان تهران. گزارش تحقیقاتی به معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۷۸.
۶۵. Nematipour E. Study of lipid profile and the prevalence of its disturbances in 2592 Tehran citizens. *Iranian Heart J* 1998; 1:195.
۶۶. Sarrafzadegan N, Najafian J. Priorities in cardiovascular prevention in Iran. *Iranian Heart J* 1998; 1:137.
۶۷. Maleki M, Noohi F, Oraii S, et al. Prevalence of cardiovascular risk factors in Tehran: Healthy Heart Project. *Iranian Heart J* 1998; 1:130.
۶۸. Sami HA, Eftekharzadeh M, Oraii S, Latifi H. Prevaence of cardiovascular risk factors in NIOC industrial workers and administration clerks. *Iranian Heart J* 1998 1;127.
۶۹. Azizi F, Rahmani M, Majid M, et al. Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS): Rationale and design. CVD prevention 2000; 3:50-3.
۷۰. Azizi F, Rahmani M, Majid M, et al. Serum lipid levels in an Iranian population of children and adolescents: Tehran Lipid and Glucose Study. *Europ J Epidemiol* (in press).
۷۱. ایجاد تغییر در شیوه زندگی به منظور پیشگیری و کاهش عوامل خطرساز بیماری‌های قلبی - عروقی، مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پروژه ویژه مصوب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۹.
۷۲. پیشگیری و کنترل بیماری‌های قلبی - عروقی در ایران، پایلوت در استان اصفهان، مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پروژه ویژه مصوب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۹.
۷۳. باستان حق مح، ملک‌افضلی ح، پژوهی م، لاریجانی ب، سمات ط، حجت‌زاده ع، ادبی ح، جوادی ا، شفایی ع. شیوع دیابت قندی و اختلال تحمل گلوكز در افراد بالای ۲۵ سال قزوین. ویژه نامه مجله‌غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران (خلاصه مقالات ششمین کنگره بین‌المللی غدد درون‌ریز)، تابستان ۱۳۸۰؛ خلاصه شماره ۱۸۰.
۷۴. ملک‌افضلی ح، شهرزاد مک، لاریجانی ب، پژوهی م، فخرزاده ح، سمات ط، حجت‌زاده ع، شفایی ع، ادبی ح. ارتباط دیابت قندی با عوامل خطرزای کرونری در افراد با سن ۲۵ سال یا بالاتر در شهر قزوین. *ibid.* ۴۴۰.

۷۶. رجبیان ر، عباسی م، ناتوانی جنسی در مبتلایان به دیابت. *ibid*. ۱۰۵۰.
۷۷. والایی ف، محمدی ح. مقایسه چگونگی روابط خانوادگی بانوان دیابتی و غیردیابتی. *ibid*. ۱۹۰.
۷۸. کلافی ای، پیشداد غ، باقری ص. بررسی رابطه الگوهای رفتاری در بیماران دیابتی نوع یک و دو *ibid*. ۱۰۱۰.
۷۹. کلاترتی ف، مسایلی ن، کبیرزاده م، اباذری پ، امینی پ، امینی م. بررسی تأثیر آموزش بر سطح HbA1c دیابتی‌های نوع دو مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان. *ibid*. ۵۷۰.
۸۰. باستان حق مح، ملک‌اصلی ح، پژوهی م، لاریجانی ب، سموات ط، حجت‌زاده ع، ادبی ح، جوادی ا، شفایی ع. شیوع اتفاقی دیابت قندی و اختلال تحمل گلوکز در افراد بالای ۲۵ سال قزوین. *ibid*. ۱۸۰.
۸۱. اظهاری پ، رجبیان ر. عدم پاسخ به ترکیبات سولفونیل اوره و ضرورت تجویز انسوولین نزد ۲۰۰ بیمار دیابتی نوع دو. *ibid*. ۵۶.
۸۲. اشتیاقی ر، دهقانی غ، عمرانی غ. بررسی اثرات متابولیک سولفات‌وانادیل بر بیماران دیابتی نوع دو. *ibid*. ۵۸۰.
۸۳. پژوهی م، لاریجانی ب، سلطانی ا، حسین ر. سنجش تراکم استخوان در خانم‌های دیابتی نوع ۲ مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان شریعتی در مقایسه با گروه شاهد. *ibid*. ۶۶.
۸۴. صالحی پ، سعادت ن، امامی ح، سربازی ن. عزیزی ف. بررسی ارتباط بین عدم تحمل گلوکز و فشارخون، نمایه توده بدنی و نسبت دور کمر به دور باسن در جمعیت شهری تهران: مطالعه قند و لیپید تهران. *ibid*. ۷۵۰.
۸۵. نیکویشخان اک، رجب ا. نقش آموزش و کاهش وزن و کنترل دیابت نوع دو. *ibid*. ۹۰۰.
۸۶. رضوانیان ح، امیریانی ت، امینی م، امین‌الرعایا ا، کچوئی ع. بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر پروتئینوری نفروپاتی دیابتی دیابت نوع آن با کاپتوپریل در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. *ibid*. ۹۵۰.
۸۷. لاریجانی ب، افشاری م، فدایی م، پژوهی م، باستان حق مح، شهرزاد مک، برادرجلیلی ر. تأثیر فاکتور رشد در تسریع بهبود زخم پای دیابتی. *ibid*. ۹۷۰.
۸۸. حبیبی معینی س، حاجی‌پور ر، قنبریان آ، عزیزی ف. پروفشاری خون و اختلالات لیپید در گروه‌های مختلف سنی در جمعیت شهری تهران: مطالعه قند و لیپید تهران. *ibid*. ۴۷۰.
۸۹. حیدریان پ، حبیبی معینی س، الهوردیان س، مجید م، عزیزی ف. گزارش نهایی مطالعه قند و لیپید تهران: شیوع دیس‌لیپوپروتئینمی در بالغان منطقه ۱۳ شهری تهران. *ibid*. ۶۷۰.
۹۰. قنبریان آ، قانبلی مچ، محرابی ای، عزیزی ف. عوامل خطرساز قلبی - عروقی در سالخوردگان تهرانی: مطالعه قند و لیپید تهران. *ibid*. ۶۹۰.
۹۱. کریمی ف، رایانی م، اکبرزاده ص، طهماسبی ر. شیوع انواع هایپرلیپیدمی در افراد بالای ۱۹ سال جامعه شهری بندربوشهر، ۱۳۷۸ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. *ibid*. ۴۸۰.
۹۲. میرمیران پ، محمدی نصرآبادی ف، بایگی ف، عزیزی ف. ارزیابی دریافت‌های غذایی ساکنان منطقه ۱۲ تهران بر پایه هرم راهنمای غذایی. *ibid*. ۴۶۰.
۹۳. لاریجانی ب، قانعی م، خالق‌نژاد، برادرجلیلی ر. بررسی وضعیت نمایه توده بدنی در یک جمعیت منتخب از کشور ایران در سال ۱۳۷۹. *ibid*. ۱۳۷۹.
۹۴. علامه ز، رضایی ه. بررسی BMI و تعیین ارتباط آن با الگوی قاعدگی و هیرسوتویسم در زنان اصفهان در سال ۱۳۷۸. *ibid*. ۱۱۷۰.
۹۵. Amirkhani GH. Rickets in a developing country, observations of general interest from southern Iran. *Clinical Pediatrics* 1973; 12:88-92.
۹۶. حسین‌پناه ف، هدایت م، عزیزی ف. بررسی سطح سرمه کلسيم، فسفر و آلبومين در دانشآموزان ۸-۱۰ ساله استان کشور در سال ۱۳۷۵. کتاب خلاصه مقالات پنجمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های غدد درون‌ریز، تهران، ایران. ص ۴۴.
۹۷. عزیزی ف، رئیس‌زاده ف، میرسعید قاضی ع. کمبود ویتامین D در گروهی از ساکنین شهر تهران؛ پژوهش در پزشکی، زمستان ۱۳۷۹؛ شماره ۱.
۹۸. رئیس‌زاده ف، میرسعید قاضی ع، پزشک پ، عزیزی ف. تغییرات فصلی سطح سرمه ۲۵ - هیدروکسی ویتامین D در برخی از ساکنین تهران. ویژه نامه مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران (خلاصه مقالات ششمین کنگره بین‌المللی غدد درون‌ریز)، تابستان ۱۳۸۰، خلاصه شماره ۶۴۰.
۹۹. دلشاد ح، رئیس‌زاده ف، میرسعید قاضی ع، عزیزی ف. ارتباط بین عدم تحمل به گلوکز با کمبود ویتامین D. *ibid*. ۹۴.
۱۰۰. میرسعید قاضی ع، رئیس‌زاده ف، محمدی ح، عزیزی ف. بررسی ارتباط مصرف سیگار و وضعیت ویتامین D در مردان تهران. *ibid*. ۶۵۰.
۱۰۱. پژوهی م، لاریجانی ب، سلطانی ا، حسینی ر. سنجش تراکم استخوان در خانم‌های دیابتی نوع ۲ مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان شریعتی در مقایسه با گروه شاهد. *ibid*. ۰.
۱۰۲. امین‌الرعایا ا، میرمیران پ، حامدی پ، عزیزی ف. بررسی مراحل مختلف بلوغ در دختران شرق تهران: مجله پژوهش در پزشکی، ۱۳۷۵؛ سال ۲۰، شماره ۴، صص ۱۰-۲۲. ۱۳۷۵.
۱۰۳. عزیزی ف، نفرآبادی م، آذرتاش پ، کاتوزیان ب، آزادگان م، نجاتی ه. بررسی مراحل مختلف بلوغ در پسران دانشآموز

- شرق تهران. مجله پژوهش در پزشکی، ۱۳۶۷؛ سال دوازدهم، صص ۹۹-۹۱.
۱۰۴. عزیزی ف. مقایسه اثرات سیپروترون کامپاند و دیان در درمان هیرسوتیسم. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال ۲۰، شماره ۳، صص ۶۹-۶۶.
۱۰۵. لطیف‌نژاد ر، رستگاری ا، صابحی ع، مظلوم ر. بررسی میزان اضطراب و افسردگی دختران در حوالی بلوغ. ویژه نامه مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران (خلاصه مقالات ششمین کنگره بین‌المللی غدد درون‌ریز)، تابستان ۱۳۸۰؛ خلاصه شماره ۱۲۲۰.
۱۰۶. معین ا، کابوسی م، فلاخ ن، خوشبنت نیکو م، مؤید محسنی س. بررسی فراوانی هیرسوتیسم در دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دخترانه دانشگاه شاهد و تجدیدنظر در درجه‌بندی فریمن گالوی. ibid، ۱۲۰.
۱۰۷. مصباحی ار، عمرانی غ. بررسی عملکرد غده تیروئید در بیماران مبتلا به بیماری تحمنان پلی‌کیستیک در شیراز. ibid، ۱۲۷۰.
۱۰۸. افتخاری م، احمدی ن، قندی ع. بررسی میزان انسولین و قندخون ناشتا در بیماران مبتلا به تحمنان پلی‌کیستیک. ibid، ۱۲۵.
۱۰۹. احمدی ا، وحید ع، ترابی‌نژاد مح، مقدادی ب. بررسی قد، وزن، عملکرد گنادها و تکامل جنسی در مبتلایان به تالاسمی ماذور در استان کرمان. ibid، ۷۸۰.
۱۱۰. فروتن ح، استقامتی ع، قاسمی حسینی ع، غفرانی ح، میرمؤمن ش، محمدی ح. هیپوگنادیسم در مبتلایان به سیروز: مرکزی (هیپوتالامیک) یا محيطي؟. ibid، ۷۶۰.
۱۱۱. مختاری م. بررسی ارزش تشخیصی Intraoperative cytology & frozen section در تشخیص ضایعات تیروئید. ibid، ۱۰۷۰.
۱۱۲. قوامزاده ا، لاریجانی ب، بهار ب، خوشبنت م، طباطبایی ع، شهریاری. بررسی تأثیر پیوند مغز استخوان بر عملکرد غدد درون‌ریز در بیماران کاندیدای پیوند مغز استخوان در بیمارستان شریعتی طی سال‌های ۱۳۷۶-۸۱. ibid، ۷۳۰.
۱۱۳. قوامزاده ا، لاریجانی ب، خلیلیان ع، میردامادی مج. بررسی اثر شیمی درمانی روی اسپرموگرام و هورمون‌های جنسی در مردان مبتلا به بیماری هوچکین و لنفوم غیرهوچکین و بیماران نامزد پیوند مغز استخوان. ibid، ۱۱۸۰.
۱۱۴. عزیزی ف. بررسی قد و وزن در کودکان و نوجوانان تهرانی. دارو و درمان، اسفند ۱۳۶۴؛ شماره ۲۶، صص ۱۲-۵.
۱۱۵. آیت‌اللهی م. استاندارد وزن برای قد ویژه سنی کودکان شیراز. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال شانزدهم - شماره ۳، ۴، صص ۱۲-۷.
۱۱۶. هدایتی م، بربزیگر س، اسماعیلی م و همکاران. بررسی قد و وزن در دانشآموزان رشت و سنگر. مجله دانشکده پزشکی کیلان، ۱۳۷۲؛ شماره‌های ۶ و ۷، صص ۲۰-۱۲.
۱۱۷. امین‌الرعایا ا، میرمیران پ، حامدی پ، عزیزی ف. بررسی قد و وزن کودکان و نوجوانان شرق تهران (سال ۱۳۷۳). مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۷۵؛ سال ۲۰، شماره ۳، صص ۲۲-۱۰.
۱۱۸. سوید م، دبیری غ. مقایسه محنی رشد وزنی و قدی نوجوانان دیبرستانی پسر شهر شیراز در دو سطح اقتصادی مختلف در سال ۱۳۷۸-۷۹. ویژه نامه مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران (خلاصه مقالات ششمین کنگره بین‌المللی غدد درون‌ریز)، تابستان ۱۳۸۰؛ خلاصه شماره ۵۰.
۱۱۹. دلشاد ح، محرابی ا، عزیزی ف. اعتبار فرمول تائز برای پیش‌بینی قد نهایی کودکان در جمعیت شهری تهران. ibid، ۴۰.
۱۲۰. سهیلی‌خواه ص، هلوانی ا. بررسی علل کوتاهی قد در مراجعین ۷-۱۵ ساله به درمانگاه غدد شهر بیزد در طی سال‌های ۱۳۷۶-۷۹. ibid، ۸۲۰.
۱۲۱. کرمی‌زاده ز. بررسی اثر Long acting LHRH agonist در رشد طولی دخترانی که با بلوغ زودرس سرشتی مراجعت کرده‌اند. ibid، ۱۲۱۰.
۱۲۲. خزاعی مح، موسوی ز. مقایسه اثرات سولفات روی و دارونما بر رشد کودکان رستاهای مهدی‌آباد و حاجی‌آباد مشهد. ibid، ۹۰.
۱۲۳. سیم‌فروش ن، ضیایی ام، طینی ع. اولین گزارش آدرنالکتومی لاپاروسکوپیک در ایران به همراه گزارش اولین آدرنالکتومی لاپاروسکوپیک میلولیپوم در بیماران پیوندی در جهان. ibid، ۷۰.
۱۲۴. قیروانی ز، پورغلامی مح. بررسی مقایسه‌ای اثرات ناشی از تزریق داخل صفاقی و داخل بطني مغزی موسیمیول در تنظیم گلوكز پلاسمایی موش کوچک آزمایشگاهی. ibid، ۲۲۰.
۱۲۵. شهابی س، مقدمیا ع. بررسی نقش سیستم NA مرکزی متأثر از اسیدهای آمینه تحریکی بر ترشح FSH در رت. ibid، ۲۲۰.
۱۲۶. زربان ا، دوستی م، استقامتی ع. بکارگیری روش FRAP برای ارزیابی استرس اکسیداتیو در موش‌های صحرایی مبتلا شده به دیابت توسط استریپتوزوتوسین. ibid، ۲۶۰.
۱۲۷. عباسی م، نخجوانی م. بررسی اثر میدان مغناطیسی ۰/۰۵ تسلیا بر رشد و قند خون موش BALB/C. ibid، ۲۷۰.
۱۲۸. محقق حضرتی ص، محترم ف، شرفی ج، جباری ح، بابان ب، محقق حضرتی ف، آقازاده چ. تأثیر اتو آنتی‌ژن‌ها و اجوانتهای فعال کننده رده سلول‌ها بر روی آدنومای غده.

۱۲۰. مصباحزاده ب، صادقی ح. تغییرات هورمون‌های گنادوتروپ بر اثر هیپوتیروئیدی در موش‌های صحرایی ماده. *ibid.* ۲۲۰.
۱۲۱. ربانی مر، عربان ش، حائری ع، پورآذر ع، زری دست مر، امینی م. بررسی تأثیر تزریق وریدی (I.V) پرازووسین بر محور HPT و اریتروپوئز در هیپوتیروئیدیسم. *ibid.* ۲۱۰.
۱۲۲. هیپوفیز از نوع پرولاکتینوما (ارایه موارد مطالعه شده). *ibid.* ۲۸.

Archive of SID